

Gemeindegebiet Dulliken zusammenfassende Artenliste der Fauna und Flora Georg Artmann-Graf

Beobachtungsdauer: 559 Stunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
STRUDELWÜRMER		1995				
Strudelwurm Gattung	<i>Planaria</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht
Strudelwurm-Art	<i>Euplanaria</i> = <i>Planaria</i>	<i>gonocephala</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht
WEICHTIERE		1995				
Kleine Walddeckelschnecke	<i>Cochlostoma</i>	<i>septemspirale</i>	1995	2005	3 F 4 E	häufig gefunden
Schlammschnecke Gattung	<i>Radix</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese beim Gemeindehaus	wemog häufig gefunden, weil selten danach gesucht
Spitz-Schlammschnecke	<i>Lymnaea</i>	<i>stagnalis</i>	1995	1995	1 F 3 E Naturnahe Anlage Neumatt	in stehenden Gewässern häufig gefunden
Posthornschncke	<i>Planorbarius</i>	<i>corneus</i>	2005	2005	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht
Gemeine Bernsteinschnecke	<i>Succinea</i>	<i>putris</i>	1995	2005	9 F 21 E	in Feuchtlebensräumen sehr häufig gefunden
Schlanke Bernsteinschnecke	<i>Oxyloma</i>	<i>elegans</i>	1995	2005	2 F 3 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden
Berg-Turmschnecke	<i>Ena</i>	<i>montana</i>	1995	2005	2 F 2 E	wenig häufig nachgewiesen, nach Literatur vor allem im Jura häufig
Kleine Turmschnecke	<i>Merdigera</i> = <i>Ena</i>	<i>obscura</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig nachgewiesen, nach Literatur vor allem im Jura häufig
Gefleckte Schüsselschnecke	<i>Discus</i>	<i>rotundatus</i>	1995	2005	7 F 8 E	häufig nachgewiesen, nach Literatur in der Schweiz sehr häufig
Wegschnecke Gattung	<i>Arion</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	17 F 21 E	häufig gefunden
Grosse Wegschnecke	<i>Arion</i>	<i>rufus</i>	1995	2005	13 F 19 E	häufig gefunden, wird aber in letzter Zeit durch die Spanische Wegschnecke verdrängt
Kugelige Glasschnecke	<i>Vitrina</i>	<i>pellucida</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli	mässig häufig gefunden

F = Fundort

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region	
Ohrförmige Glasschnecke	<i>Eucobresia</i>	<i>diaphana</i>	2005	2005	1 F 1 E	Feldgehölz Engelberg-Felli	wenig häufig gefunden
Weitmündige Glanzzschnecke	<i>Aegopinella</i>	<i>nitens</i>	1995	2005	9 F 18 E		sehr häufig gefunden
Grosser Schnegel	<i>Limax</i>	<i>maximus</i>	2005	2005	1 F 1 E	Leimgruben, Bächlein Südwest	wenig häufig gefunden
Schwarzer Schnegel	<i>Limax</i>	<i>cinereoniger</i>	1995	1995	1 F 1 E	Wald Hard	mässig häufig gefunden
Ackerschnecke Gattung	<i>Deroceras</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	4 F 4 E		häufig gesehen, aber nur mässig häufig registriert
Glatte Schliessmundschnecke	<i>Cochlodina</i>	<i>laminata</i>	1995	2005	5 F 9 E		häufig gefunden
Bauchige Schliessmundschnecke	<i>Macrogastra</i>	<i>ventricosa</i>	1995	2005	2 F 2 E	Feldgehölz Engelberg-Felli und Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Gefälte Schliessmundschnecke	<i>Macrogastra</i>	<i>plicatula</i>	1995	2005	2 F 4 E		mässig häufig nachgewiesen, aber nach Lit. in der Schweiz, vor allem im Jura, häufig
Kleine Schliessmundschnecke	<i>Clausilia</i>	<i>rugosa</i>	1995	2005	1 F 1 E	Waldrand Engelberg-Schürli Ost	wenig häufig gefunden
Scharfgerippte Schliessmundschn.	<i>Clausilia</i>	<i>cruciata</i>	1995	1995	1 F 1 E	Waldrand Boniger	wenig häufig gefunden
Genabelte Strauchschnecke	<i>Fruticicola = Bradybaena</i>	<i>fruticum</i>	1995	2005	10 F 18 E		sehr häufig gefunden
Riemenschnecke	<i>Helicodonta</i>	<i>obvoluta</i>	1995	2005	7 F 12 E		häufig gefunden, nach Literatur in der Schweiz, vor allem im Jura, sehr häufig
Kartäuserschnecke	<i>Monacha</i>	<i>cartusiana</i>	1995	2005	3 F 5 E		häufig gefunden, kann lokal in grossen Massen auftreten
Seidenhaarschnecke	<i>Trochulus = Trichia</i>	<i>sericeus</i>	1995	2005	16 F 32 E		sehr häufig gefunden
Seidenhaarschnecke oder Quendelschnecke (nicht	<i>Trochulus = Trichia</i>	<i>sericea cf. Candidula unifasciata</i>	1995	1995	1 F 1 E		häufig gefunden, wahrscheinlich meist T. sericea
Gemeine Heideschnecke	<i>Helicella</i>	<i>itala</i>	1995	2005	1 F 2 E	Kiesgrube Hard	sehr häufig gefunden
Kantige Laubschnecke	<i>Hygromia</i>	<i>cinctella</i>	2005	2006	2 F 3 E	Kiesgrube Hard und Baumhecke Täli Nordost	Neozoon, Erstbeobachtung in der Region: 1997, wird seither häufiger, besonders im
Rötliche Laubschnecke	<i>Monachoides = Perforatella</i>	<i>incarnatus</i>	1995	2005	13 F 24 E		häufig nachgewiesen, nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen sehr häufig
Gefleckte Schnirkelschnecke	<i>Arianta</i>	<i>arbustorum</i>	1995	2005	10 F 18 E		in beschatteten und/oder feuchten Lebensräumen überall sehr häufig gefunden
Steinpicker	<i>Helicigona</i>	<i>lapicida</i>	1995	2005	2 F 2 E	Waldrand Boniger und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig nachgewiesen, nach Literatur vor allem im Jura häufig
Maskenschnecke	<i>Isognomostoma</i>	<i>isognostomos</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig nachgewiesen

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Bänderschnecke Gattung	<i>Cepaea</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	2 F 2 E	sehr häufig gefunden
Schwarzmündige Bänderschnecke	<i>Cepaea</i>	<i>nemoralis</i>	1995	2005	19 F 58 E	sehr häufig gefunden
Weissmündige Bänderschnecke	<i>Cepaea</i>	<i>hortensis</i>	1995	2005	14 F 24 E	häufig gefunden
Weinbergschnecke	<i>Helix</i>	<i>pomatia</i>	1995	2005	23 F 65 E	sehr häufig gefunden
Wandermuschel	<i>Dreissena</i>	<i>polymorpha</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht

RINGELWÜRMER

Regenwurm Gattung	<i>Lumbricus</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	2 F 2 E	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert
-------------------	------------------	------------	------	------	---------	--

GLIEDERFÜSSLER

SPINNENTIERE

Mooskorpion Gattung der Pseudoskorpione	<i>Neobisium</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E einziger Zufalls-Fund in der Region	erst ein Mal gefunden
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(<i>Phalangidae</i>)	<i>non det.</i>	1995	2005	20 F 37 E	sehr häufig gefunden
Streckerspinne Gattung	<i>Tetragnatha</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	12 F 19 E	häufig gefunden
Streckerspinnen-Art	<i>Tetragnatha</i>	<i>extensa</i>	1995	2005	3 F 5 E	an Bächen mässig häufig gefunden, vermutlich aber häufig
Streckerspinnen-Art	<i>Tetragnatha</i>	<i>montana</i>	1995	2005	3 F 3 E	häufig gefunden
Herbstspinnen-Art	<i>Metellina</i>	<i>mengei</i>	1995	2005	4 F 4 E	mässig häufig gefunden
Herbstspinnen-Art	<i>Metellina</i>	<i>segmentata</i>	1995	2005	25 F 44 E	sehr häufig gefunden
Eichblatt-Radspinne	<i>Aculepeira</i>	<i>ceropegia</i>	1995	2005	3 F 5 E	häufig gefunden
Gartenkreuzspinne	<i>Araneus</i>	<i>diadematus</i>	1995	2011	25 F 41 E	sehr häufig gefunden
Kürbiskreuzspinnen-Art	<i>Araniella</i>	<i>cucurbitina</i>	1995	2005	14 F 22 E	häufig gefunden
Wespenpinne, Zebraspinne	<i>Argiope</i>	<i>bruennichi</i>	1995	2005	4 F 8 E	häufig gefunden
Konische Radspinne, Kreisspinne	<i>Cyclosa</i>	<i>conica</i>	2005	2005	2 F 2 E	wenig häufig gefunden, weil klein und unscheinbar

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
						Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schilfradspinne	<i>Larinioides</i>	<i>cornutus</i>	1995	2005	2 F 3 E		mässig häufig gefunden
Brückenspinne	<i>Larinioides</i>	<i>sclopetarius</i>	1995	2005	2 F 5 E Kiesgrube Hard und Tümpel beim Gemeindehaus		wenig häufig gefunden
Streifenkreuzspinne	<i>Mangora</i>	<i>acalypha</i>	1995	2005	3 F 4 E		mässig häufig gefunden
Spaltenkreuzspinne	<i>Nuctenea</i>	<i>umbratica</i>	1995	1995	1 F 1 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug		wenig häufig gefunden, weil versteckt
Baldachinspinne Familie	<i>(Linyphiidae)</i>	<i>non det.</i>	1995	1995	2 F 2 E		sehr häufig gefunden
Baldachinspinnen-Art	<i>Lepthyphantes</i>	<i>leprosus</i>	1990	1995	1 F 3 E in der Wohnung Hasenweid		nur in unserer Wohnung, wenig häufig gefunden
Baldachinspinnen-Art	<i>Linyphia</i>	<i>hortensis</i>	1995	2005	12 F 16 E		häufig gefunden
Baldachinspinnen-Art	<i>Linyphia</i>	<i>triangularis</i>	1995	2005	32 F 71 E		sehr häufig gefunden
Baldachinspinnen-Art	<i>Microlinyphia</i>	<i>pusilla</i>	1995	2005	2 F 2 E		häufig gefunden
Kugel- oder Haubennetzspinnen-Art	<i>Enoplognatha</i>	<i>ovata</i>	1995	2005	2 F 2 E		mässig häufig gefunden
Kugel- oder Haubennetzspinnen-Art	<i>Theridion</i>	<i>impressum</i>	1995	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard		wenig häufig gefunden, weil klein und unscheinbar
Wolfsspinne Familie	<i>(Lycosidae)</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	28 F 60 E		sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert
Tarantel , Wolfsspinne Gattung	<i>Alopecosa</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	8 F 8 E		sehr häufig gefunden
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	<i>Alopecosa</i>	<i>accentuata</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Wiese Nord		häufig gefunden
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	<i>Alopecosa</i>	<i>pulverentula</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus		häufig gefunden
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	<i>Alopecosa</i>	<i>trabalis</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Magerwiese West und Engelberg-Felli, Waldrand Nord		häufig gefunden
Wolfsspinne Gattung	<i>Pardosa</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	10 F 11 E		sehr häufig gefunden
Wolfsspinnen-Art	<i>Pardosa</i>	<i>agrestis</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest		wenig häufig gefunden
Wolfsspinnen-Art	<i>Pardosa</i>	<i>amentata</i>	1995	2005	26 F 63 E		sehr häufig gefunden
Wolfsspinnen-Art	<i>Pardosa</i>	<i>hortensis</i>	1995	2005	11 F 18 E		sehr häufig gefunden
Wolfsspinnen-Artkomplex	<i>Pardosa</i>	<i>lugubris-Komplex</i>	1995	2005	11 F 18 E		sehr häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Wolfsspinnen-Art	<i>Pardosa</i>	<i>palustris</i>	1995	2005	3 F 3 E		sehr häufig gefunden
Wolfsspinnen-Art	<i>Pardosa</i>	<i>pullata</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Büchs beim Franziskushaus		sehr häufig gefunden
Wolfsspinnen-Art	<i>Pardosa</i>	<i>wagleri</i>	1995	2006	1 F 6 E Kiesgrube Hard		mässig häufig gefunden, typisch für Kiesgruben
Wolfsspinne Gattung	<i>Pirata</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesbänke an der Aare		wenig häufig gefunden
Wolfsspinnen-Art	<i>Pirata</i>	<i>knorri</i>	1995	2005	2 F 3 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare		selten gefunden
Wolfsspinnen-Art	<i>Trochosa</i>	<i>terricola</i>	1995	2005	4 F 4 E		mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Wolfsspinnen-Art	<i>Xerolycosa</i>	<i>nemoralis</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		mässig häufig gefunden
Listspinne	<i>Pisaura</i>	<i>mirabilis</i>	1995	2007	25 F 65 E		sehr häufig gefunden
Labyrinthspinne Gattung	<i>Agelena</i>	<i>sp.</i>	1995	2011	37 F 136 E		sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil <i>Agelena labyrinthica</i>
Bodentrichterspinnen-Art	<i>Coelotes</i>	<i>terrestris</i>	1995	2005	3 F 4 E		von mir mässig häufig gefunden, aber in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Hausspinnen-, Winkelspinnen-Art	<i>Tegenaria</i>	<i>atrica</i>	1990	2011	1 F 7 E im und am Haus		wenig häufig gefunden, weil meist versteckt
Glattbauchspinne Gattung	<i>Zelotes</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Glattbauchspinne Gattung	<i>Zora</i>	<i>sp.</i>	2005		1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Mitte		selten gefunden
Laufspinne-, Flachstrecker Gattung	<i>Philodromus</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	2 F 2 E		häufig gefunden
Grüne Krabbenspinne	<i>Diaea</i>	<i>dorsata</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		mässig häufig gefunden
Veränderliche Krabbenspinne	<i>Misumena</i>	<i>vatia</i>	1995	2006	13 F 16 E		sehr häufig gefunden
Krabbenspinne Gattung	<i>Xysticus</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	11 F 12 E		sehr häufig gefunden
Krabbenspinnen-Art	<i>Xysticus</i>	<i>bifasciatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Reservoir Leimgruben		mässig häufig gefunden
Krabbenspinnen-Art	<i>Xysticus</i>	<i>cristatus</i>	1995	2005	5 F 6 E		häufig gefunden
Krabbenspinnen-Art	<i>Xysticus</i>	<i>kochi</i>	1995	2005	4 F 5 E		häufig gefunden
Springspinnen-Art	<i>Evarcha</i>	<i>arcuata</i>	1995	2005	6 F 8 E		häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Springspinnen-Art	<i>Evarcha</i>	<i>falcata</i>	2005	2005	1 F 1 E	Wiesenstreifen Schützenhaus	mässig häufig gefunden
Springspinne Gattung	<i>Heliophanus</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E	Wald Hard	mässig häufig gefunden
Springspinnen-Art	<i>Heliophanus</i>	<i>cupreus</i>	2005	2005	2 F 2 E		häufig gefunden
Springspinnen-Art	<i>Marpissa</i>	<i>muscosa</i>	1995	1995	1 F 1 E	Reservoir Täli Rüti/Leimgruben	wenig häufig gefunden
Springspinnen-Art	<i>Phlegra</i>	<i>fasciata</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg, Magerwiese West	wenig häufig gefunden
Zebra-Springspinnen-, Harlekinspinnen-Art	<i>Salticus</i>	<i>scenicus</i>	1995	1995	1 F 1 E	Baumhecke Engelberg-Felli	an Mauern und Felsen häufig gefunden
KREBSTIERE			1995				
Muschelkrebs Ordnung	<i>(Ostracoda)</i>	<i>non det.</i>	1995	1995	1 F 1 E	Kiesgrube Hard	selten gefunden, weil nicht danach gesucht
Flohkrebs Gattung	<i>Gammarus</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	3 F 4 E		in Gewässern oft sehr häufig, aber nur mässig häufig registriert
Wasserassel	<i>Asellus</i>	<i>aquaticus</i>	1995	1995	1 F 1 E	Auenwald und Kiesbänke an der Aare	selten gefunden, weil selten danach gesucht
Landassel Ordnung	<i>(Oniscoidea)</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	15 F 25 E		häufig gefunden
Mauerassel	<i>Oniscus</i>	<i>asellus</i>	2005	2005	6 F 7 E		häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig
Assel-Art	<i>Philoscia</i>	<i>muscorum</i>	2005	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten häufig
Kellerassel-Art	<i>Porcellio</i>	<i>scaber</i>	1999	2005	3 F 3 E		mässig häufig registriert, wahrscheinlich im Versteckten häufig
Assel-Art	<i>Cylisticus</i>	<i>convexus</i>	1995	1995	1 F 1 E	Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Assel-Art	<i>Trachelipus</i>	<i>ratzeburgi</i>	2005	2005	6 F 6 E		mässig häufig registriert, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig
Assel-Art	<i>Trachelipus</i>	<i>rathkei</i>	2005	2005	3 F 3 E		häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig
Rollassel Gattung	<i>Armadillidium</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E	Leimgruben, Bächlein Südwest	mässig häufig gefunden
Rollassel-Art	<i>Armadillidium</i>	<i>opacum</i>	2005	2005	5 F 5 E		mässig häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten häufig
Rollassel-Art	<i>Armadillidium</i>	<i>nasutum</i>	2005	2005	1 F 1 E	Wiese Schäfer	wenig häufig gefunden
Rollassel-Art	<i>Armadillidium</i>	<i>pictum</i>	2005	2005	1 F 1 E	Waldrand Engelberg-Schürli Ost, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
VIELFÜSSER		1995			
Steinläufer Gattung	<i>Lithobius</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	15 F 17 E häufig gefunden, aber nie auf die Art bestimmt und oft nicht registriert
Erdläufer Gattung	<i>Geophilus</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	3 F 3 E mässig häufig registriert, in der Erde vermutlich sehr häufig
Gesprenkelter Saftkugler	<i>Glomeris</i>	<i>undulata</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord wenig häufig nachgewiesen
Gesprenkelter Saftkugler	<i>Glomeris</i>	<i>undulata f. conspersa</i>	1995	2005	4 F 7 E häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig
Westlicher Sechsstreifen-Saftkugler	<i>Glomeris</i>	<i>intermedia</i>	1995	2005	4 F 4 E mässig häufig gefunden
Gerandeter Saftkugler	<i>Glomeris</i>	<i>marginata</i>	1995	2005	5 F 8 E häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig
Tausendfüsser Familie	<i>(Julidae)</i>	<i>non det.</i>	2005	2005	2 F 2 E häufig gefunden
Tausendfüsser-Art	<i>Allajulus</i>	<i>nitidus</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein beim Franziskushaus wenig häufig gefunden
Tausendfüsser-Art	<i>Cylindrojulus</i>	<i>caeruleocinctus</i>	1995	2005	2 F 2 E unter Steinen und Totholz am Bodenm häufig gefunden
Tausendfüsser-Art	<i>Omatojulus</i>	<i>sabulosus</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare wenig häufig gefunden
Tausendfüsser-Art	<i>Tachypodojulus</i>	<i>niger</i>	2005	2005	2 F 3 E mässig häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten häufig
Tausendfüsser-Art	<i>Craspedosoma</i>	<i>alemannicum</i>	1995	2005	2 F 2 E selten gefunden
Tausendfüsser-Art	<i>Chordeuma</i>	<i>sylvestre</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Obere Ei, bisher einziger Fund in der Region! erst ein Mal gefunden
Tausendfüsser-Art	<i>Polydesmus</i>	<i>angustus</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest wenig häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten häufig
Tausendfüsser-Art	<i>Polydesmus</i>	<i>testaceus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard wenig häufig gefunden, aber vermutlich in der Erde häufig
INSEKTEN		1995			
Eintagsfliegen		1995			
Eintagsfliege Ordnung	<i>(Ephemeroptera)</i>	<i>non det.</i>	1995	1995	5 F 5 E mässig häufig gefunden
Eintagsfliege Gattung	<i>Baetis</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Dorfbach wenig häufig gefunden
Eintagsfliege Familie	<i>(Heptagenidae)</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	2 F 2 E häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Eintagsfliegen-Art	<i>Rhithrogena</i>	<i>picteti = iridina</i>	1995	2005	2 F 3 E		wenig häufig gefunden, aber lokal oft in grossen Schwärmen
Feuerfarbene Eintagsfliege	<i>Ephemerella (Serratella)</i>	<i>ignita</i>	1995	1995	1 F 1 E Dorfbach		selten gefunden
Libellen			1995				
Gebänderte Prachtlibelle	<i>Calopteryx</i>	<i>splendens</i>	1995	2005	11 F 12 E		an Flüssen und Bächen häufig gefunden
Blauflügel-Prachtlibelle	<i>Calopteryx</i>	<i>virgo</i>	2005	2005	6 F 9 E		an Bächen häufig gefunden
Weidenjungfer	<i>Lestes</i>	<i>viridis</i>	1995	2005	4 F 7 E		an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, besonders im Herbst
Frühe Adonislibelle	<i>Pyrrhosoma</i>	<i>nymphula</i>	1995	2005	11 F 23 E		an stehenden Gewässern häufig gefunden
Grosse Pechlibelle	<i>Ischnura</i>	<i>elegans</i>	1995	2006	4 F 10 E		an stehenden Gewässern häufig gefunden
Kleine Pechlibelle	<i>Ischnura</i>	<i>pumilio</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard		mässig häufig, vor allem in flachen Kiesgrubentümpeln
Becher-Azurjungfer	<i>Enallagma</i>	<i>cyathigerum</i>	1995	2006	2 F 3 E		an stehenden Gewässern häufig gefunden
Hufeisen-Azurjungfer	<i>Coenagrion</i>	<i>puella</i>	1995	2005	14 F 35 E		an stehenden Gewässern häufig gefunden
Pokal-Azurjungfer	<i>Cercion</i>	<i>lindenii</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)		wenig häufig gefunden
Blaugrüne Mosaikjungfer	<i>Aeshna</i>	<i>cyanea</i>	1990	2011	4 F 41 E		sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern
Blaugrüne Mosaikjungfer	<i>Aeshna</i>	<i>cyanea</i>	1995	2005	19 F 33 E		sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern
Grosse Königslibelle	<i>Anax</i>	<i>imperator</i>	1995	2007	9 F 17 E		häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern
Gemeine Keiljungfer	<i>Gomphus</i>	<i>vulgatissimus</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare		wenig häufig gefunden
Zweigestreifte Quelljungfer	<i>Cordulegaster</i>	<i>boltonii</i>	2005	2005	2 F 2 E Bächlein Niggisberg und Weiher Tälli Rütli / Leimgruben		wenig häufig gefunden
Glänzende Smaragdlibelle	<i>Somatochlora</i>	<i>metallica</i>	1995	1995	2 F 2 E Weiher Tälli Rütli / Leimgruben und Weiher Altersheim Bruggli		wenig häufig gefunden
Vierfleck	<i>Libellula</i>	<i>quadrifasciata</i>	1995	2005	10 F 14 E		an stehenden Gewässern häufig gefunden
Plattbauch	<i>Libellula</i>	<i>depressa</i>	1995	2005	2 F 3 E		an stehenden Gewässern häufig gefunden
Südlicher Blaupfeil	<i>Orthetrum</i>	<i>brunneum</i>	1995	2005	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Leimgruben, Bächlein Südwest		an Gewässern mässig häufig, oft auch an Pfützen

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Heidelibelle Gattung	<i>Sympetrum</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt	häufig gefunden
Gemeine Heidelibelle	<i>Sympetrum</i>	<i>vulgatum</i>	2005	2005	1 F 1 E Dorfbach	wenig häufig gefunden
Grosse Heidelibelle	<i>Sympetrum</i>	<i>striolatum</i>	1995	2005	12 F 19 E	häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst
Blutrote Heidelibelle	<i>Sympetrum</i>	<i>sanguineum</i>	1995	1995	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,
Steinfliegen			1995			
Steinfliegen-Art	<i>Protonemoura</i>	<i>risi = fumosa</i>	1995	1995	3 F 5 E	wenig häufig gefunden
Steinfliege Gattung	<i>Nemoura</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	2 F 2 E	mässig häufig gefunden
Steinfliegen-Art	<i>Nemoura</i>	<i>marginata</i>	1995	1995	2 F 2 E	wenig häufig gefunden
Ohrwürmer			1995			
Ohrwurm Ordnung	<i>(Dermaptera)</i>	<i>non det.</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost	häufig gefunden
Wald-Ohrwurm	<i>Chelidurella</i>	<i>acanthopygia</i>	2005	2005	2 F 2 E Wald Hard und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig nachgewiesen
Gebüsch-Ohrwurm	<i>Apterygida</i>	<i>media</i>	1995	2005	5 F 6 E	häufig gefunden
Kleiner Ohrwurm	<i>Labia</i>	<i>minor</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord, bisher einziger Fund in der	erst ein Mal gefunden
Gemeiner Ohrwurm	<i>Forficula</i>	<i>auricularia</i>	1995	2005	4 F 4 E	häufig gefunden
Schaben			1995			
Waldschabe Gattung	<i>Ectobius</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost	häufig gefunden
Podas Waldschabe	<i>Ectobius</i>	<i>sylvestris</i>	2005	2005	3 F 4 E	häufig gefunden
Gemeine Waldschabe	<i>Ectobius</i>	<i>lapponicus</i>	1995	2005	2 F 2 E	häufig gefunden
Heuschrecken			1995			
Gemeine Sichelschrecke	<i>Phaneroptera</i>	<i>falcata</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard	früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen
Laubholz-Säbelschrecke	<i>Barbitistes</i>	<i>serricauda</i>	2005	2005	5 F 6 E	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Punktierte Zartschrecke	<i>Leptophyes</i>	<i>punctatissima</i>	2005	2005	4 F 5 E		häufig gefunden
Gemeine Eichenschrecke	<i>Meconema</i>	<i>thalassinum</i>	1990	2011	2 F 5 E Hasenweid-Quartier und Hagberg/Gämpfi (Bannwald)		mässig häufig gefunden
Südliche Eichenschrecke	<i>Meconema</i>	<i>meridionale</i>	1991	2010	3 F 6 E		Neueinwanderer aus dem Süden
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	<i>Tettigonia</i>	<i>sp. J</i>	2005	2005	4 F 4 E		häufig gefunden
Grünes Heupferd	<i>Tettigonia</i>	<i>viridissima</i>	1995	2007	37 F 93 E		sehr häufig gefunden
Warzenbeisser	<i>Decticus</i>	<i>verrucivorus</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli, aber nicht sicher		sehr häufig gefunden
Gewöhnliche Strauschschrecke	<i>Pholidoptera</i>	<i>griseoptera</i>	1995	2007	32 F 93 E		sehr häufig gefunden
Feldgrille	<i>Gryllus</i>	<i>campestris</i>	1995	2005	10 F 31 E		sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, aber in letzter Zeit zunehmend auch im Flachland
Waldgrille	<i>Nemobius</i>	<i>sylvestris</i>	1995	2011	18 F 56 E		sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern
Säbeldornschrecke	<i>Tetrix</i>	<i>subulata</i>	1995	2001	25 F 40 E		häufig gefunden
Langfühler-Dornschrecke	<i>Tetrix</i>	<i>tenuicornis</i>	1995	2005	16 F 23 E		sehr häufig gefunden
Blaufügelige Sandschrecke	<i>Sphingonotus</i>	<i>caerulans</i>	2005	2006	1 F 6 E Kiesgrube Hard		mässig häufig und in Ausbreitung begriffen, nur auf nacktem Kiesboden
Lauschschrecke	<i>Mecostethus</i> = <i>Parapleurus</i>	<i>parapleurus</i>	1995	2011	3 F 3 E		sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren
Kurzfühlerschrecke Familie	<i>(Acrididae)</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	5 F 5 E		sehr häufig gefunden
Grosse Goldschrecke	<i>Chrysochraon</i>	<i>dispar</i>	2005	2005	1 G 1 E Leimgruben, Bächlein Nordost		sehr häufig gefunden
Heidegrashüpfer	<i>Stenobothrus</i>	<i>lineatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West		sehr häufig gefunden
Rote Keulenschrecke	<i>Gomphocerippus</i>	<i>rufus</i>	1995	2011	27 F 68 E		sehr häufig gefunden
Brauner Grashüpfer	<i>Chorthippus</i>	<i>brunneus</i>	1995	2005	19 F 46 E		sehr häufig gefunden
Nachtigall-Grashüpfer	<i>Chorthippus</i>	<i>biguttulus</i>	1995	2005	35 F 116 E		sehr häufig gefunden
Wiesengrashüpfer	<i>Chorthippus</i>	<i>dorsatus</i>	1995	2005	2 F 6 E		häufig gefunden
Gemeiner Grashüpfer	<i>Chorthippus</i>	<i>parallelus</i>	1986	2011	44 F 179 E		sehr häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen			Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Wanzen			1995			
Rückenschwimmer Gattung	Notonecta	sp.	1995	2005	3 F 3 E	in stehenden Gewässern überall sehr häufig gefunden
Wasserläufer Gattung	Gerris	sp.	1995	2005	5 F 21 E	in stehenden Gewässern überall sehr häufig gefunden
Wasserläufer-Art	Gerris	najas	2005	2005	ev. 1 F 1 E Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Wasserläufer-Art	Gerris	gibbifer	1995	2005	1 F 3 E Naturnahe Anlage Neumatt	mässig häufig registriert, aber vermutlich auf stehenden Gewässern häufig
Wasserläufer-Art	Gerris	lacustris	1995	2005	3 F 4 E	in stehenden Gewässern überall sehr häufig gefunden
Stoss- od. Bachwasserläufer Gattung	Velia	sp.	2005	2005	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Nordost	wenig häufig gefunden
Gemeiner Teichläufer	Hydrometra	stagnorum	1995	2005	2 F 4 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	in stehenden Gewässern überall mässig häufig gefunden,
Erdwanzen-Art	Tritomegas	bicolor	1995	1995	2 F 2 E Leimgruben, Bächlein Südwest und Waldrand Schwizeracher	selten gefunden
Erdwanzen-Art	Sehirus	luctuosus	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	wenig häufig gefunden
Gras-Schildwanze	Eurygaster	maura	2005	2005	2 F 2 E Engelberg, Magerwiese West und Wiese Hardstrasse	mässig häufig gefunden
Schildkrötenwanze	Eurygaster	testudinaria	2007	2007	2 F 2 E Engelberg, Wiese Nord und Engelberg, Magerwiese West	häufig gefunden
Streifenwanze	Graphosoma	lineatum	1995	2005	6 F 8 E	häufig gefunden
Spitzling, Getreide-Spitzwanze	Aelia	acuminata	1995	1995	1 F 1 E Wiese Hardstrasse	mässig häufig gefunden
Schwieliger Dickwanst	Eusarcoris	aeneus	1995	1995	1 F 1 E Wiese Schäfer	wenig häufig gefunden
Dunkler Dickwanst	Eusarcoris	fabricii	1995	2005	2 F 3 E Bächlein Niggelisberg und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Baumwanzen-Art	Holcostethus	vernalis	2005	2005	1 F 1 E Trockenstandort Schäfer	mässig häufig gefunden
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	1995	2007	5 F 6 E	sehr häufig gefunden
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	1995	2007	10 F 11 E	häufig gefunden
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	1995	2005	16 F 21 E	sehr häufig gefunden
Stinkwanze Gattung	Palomena	sp.	1995	2005	16 F 22 E	häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Grüne Stinkwanze	<i>Palomena</i>	<i>prasina</i>	1995	2005	9 F 13 E		häufig gefunden
Ginster-Baumwanze	<i>Piezodorus</i>	<i>lituratus</i>	1995	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Gartenwanze	<i>Raphigaster</i>	<i>nebulosa</i>	2005	2005	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Baumhecke Täli Nordost		wenig häufig gefunden, lebt vor allem in unserem Siedlungsraum
Rotbeinige Baumwanze	<i>Pentatoma</i>	<i>rufipes</i>	1995	2011	3 F 3 E		mässig häufig gefunden, Waldrandbewohner
Kohlwanze	<i>Eurydema</i>	<i>oleraceum</i>	1995	2005	5 F 6 E		häufig gefunden
Zweispitzwanze	<i>Picromerus</i>	<i>bidens</i>	2005	2005	1 F 1 E Quellgerinne Rüti		wenig häufig gefunden
Bläuling, Blaugrüne Baumwanze	<i>Zicrona</i>	<i>coerulea</i>	1995	1995	1 F 2 E Kiesgrube Hard		mässig häufig gefunden
Kleine Blattwanze	<i>Elasmotethus</i>	<i>minor</i>	1995	2005	1 F 3 E Waldrand Boniger		wenig häufig gefunden
Fleckige Brutwanze	<i>Elasmucha</i>	<i>grisea</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Kleinfeld, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) 1 Fang
Randwanzen-Art	<i>Gonocerus</i>	<i>acuteangulatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Dorfbach		wenig häufig gefunden
Randwanzen-Art	<i>Enoplops</i>	<i>scava</i>	1995	1995	1 F 2 E Kiesgrube Hard		mässig häufig gefunden
Leder- oder Saumwanzen-Art	<i>Coreus</i>	<i>marginatus</i>	1995	2005	23 F 60 E		sehr häufig gefunden
Leder- oder Saumwanzen-Art	<i>Coriomeris</i>	<i>denticulatus</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Magerwiese West und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		mässig häufig gefunden
Glasflügelwanzen-Art	<i>Corizus</i>	<i>hyoscyami</i>	1995	2007	7 F 7 E		häufig gefunden
Glasflügelwanzen-Art	<i>Rhopalus</i>	<i>maculatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Wald Hard		wenig häufig gefunden
Glasflügelwanzen-Art	<i>Rhopalus</i>	<i>subrufus</i>	1995	2005	10 F 11 E		häufig gefunden
Glasflügelwanzen-Art	<i>Rhopalus</i>	<i>parumpunctatus</i>	1995	2005	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Engelberg, Baumhecke Mitte		wenig häufig gefunden
Glasflügelwanzen-Art	<i>Stictopleurus</i>	<i>punctatonervosus</i>	1995	2005	8 F 13 E		häufig gefunden
Glasflügelwanzen-Art	<i>Stictopleurus</i>	<i>abutilon</i>	1995	2007	4 F 4 E		mässig häufig gefunden
Feuerwanze	<i>Pyrrhocoris</i>	<i>apterus</i>	1995	2005	7 F 21 E		sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden
Rotrückiger Irrwisch	<i>Alydus</i>	<i>calcaratus</i>	1995	2005	2 F 2 E Baumhecke Täli Nordost und Ruderalgelände westlich Recycling AG		mässig häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region	
Brennesselwanze	<i>Heterogaster</i>	<i>urticae</i>	1995	2005	3 F 3 E		selten gefunden
Salbei-Langwanze	<i>Platyplax</i>	<i>salviae</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Wiese Mitte		wenig häufig gefunden
Bodenwanzen-Art	<i>Acompus</i>	<i>rufipes</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggelisberg		selten gefunden
Bodenwanzen-Art	<i>Plinthisus</i>	<i>brevipennis</i>	1995	1995	1 F 1 E Wald Hard, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Bodenwanze Gattung	<i>Rhyparochromus</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	2 F 2 E		häufig gefunden
Bodenwanzen-Art	<i>Peritrechus</i>	<i>gracilicornis</i>	2005	2005	2 F 2 E Wiese Hardstrasse und Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)		wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig
Bodenwanzen-Art	<i>Drymus</i>	<i>ryei</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Boniger		selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig
Hexenkraut-Wanze	<i>Metatropis</i>	<i>rufescens</i>	1995	2005	2 F 2 E Baumhecke Täli Nordost und Waldrand Engelberg-Schürli Ost		wenig häufig gefunden
Springwanzen-Art	<i>Saldula</i>	<i>c-album</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare		selten gefunden
Springwanzen-Art	<i>Macrosaldula</i>	<i>scotica</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesbänke an der Aare		wenig häufig gefunden
Raubwanzen-Art	<i>Rhinocoris</i>	<i>annulatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Wald Hard		häufig gefunden
Sichelwanzen-Art	<i>Aptus</i>	<i>mirmicoides</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Baumhecke Südost und Wiese beim Gemeindehaus		häufig gefunden
Sichelwanze Artengruppe	<i>Nabis</i>	<i>ferus-Gruppe</i>	1995	1995	1 F 1 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug		wenig häufig gefunden
Sichelwanze Artengruppe	<i>Nabis</i>	<i>rugosus-Gruppe</i>	1995	1995	7 F 10 E		häufig gefunden
Sichelwanzen-Art	<i>Nabis</i>	<i>rugosus</i>	1995	2005	6 F 6 E		häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Deraeocoris</i>	<i>ruber</i>	1995	2005	7 F 8 E		häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Deraeocoris</i>	<i>annulipes</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest		wenig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Capsus</i>	<i>ater</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Baumhecke Nord und Wiese Schuhfabrik Hug		mässig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Polymerus</i>	<i>unifasciatus</i>	2005	2005	2 F 4 E Wiese hinter Recycling AG und Wiese Schuhfabrik Hug		mässig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Orthops</i>	<i>basalis</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus		wenig häufig gefunden
Behaarte Wiesenwanze	<i>Lygus</i>	<i>rugulipennis</i>	1995	2005	5 F 6 E		mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Wiesenwanzen-Art	<i>Lygus</i>	<i>punctatus</i>	1995	1995	1 F 1 E	wenig häufig gefunden
Gemeine Wiesenwanze	<i>Lygus</i>	<i>pratensis</i>	1995	2006	17 F 22 E	häufig gefunden
Wiesenwanzen-Art	<i>Lygocoris</i>	<i>pabulinus</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Miris</i>	<i>striatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost	wenig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Calocoris</i>	<i>striatellus</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	wenig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Calocoris</i>	<i>biclavatus</i>	1995	2005	2 F 2 E Waldrand Boniger und Baumhecke Täli Nordost	mässig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Calocoris</i>	<i>affinis</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Calocoris</i>	<i>norvegicus</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Gemeine Zierwanze	<i>Adelphocoris</i>	<i>lineolatus</i>	1995	2005	5 F 8 E	häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Pantilius</i>	<i>tunicatus</i>	1995	2005	2 F 2 E Feldgehölz Engelberg-Felli und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	wenig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Stenodema</i>	<i>calcaratum</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	mässig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Stenodema</i>	<i>laevigatum</i>	1995	2005	12 F 18 E	häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Notostira</i>	<i>elongata</i>	1995	2005	3 F 4 E	mässig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Notostira</i>	<i>erratica</i>	1995	2005	11 F 11 E	häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Megaloceraea</i>	<i>recticornis</i>	2005	2005	2 F 2 E Wiese Hardstrasse und Wiesenstreifen Schützenhaus	häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Leptopterna</i>	<i>dolobrata</i>	1995	2005	8 F 10 E	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig
Weichwanzen-Art	<i>Cyllecoris</i>	<i>histrionicus</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	selten gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Dryophilocoris</i>	<i>flavoquadri-maculatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	wenig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	<i>Harpocera</i>	<i>thoracica</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig
Weichwanzen-Art	<i>Plagiognathus</i>	<i>arbustorum</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig
Gleichflügler			1995			

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schaumzikade Familie	<i>(Cercopidae)</i>	<i>non det. (Nest)</i>	1995	2005	8 F 12 E	Schaumnester sehr häufig gefunden
Wiesen-Schaumzikade	<i>Philaenus</i>	<i>spumarius</i>	1995	2011	5 F 8 E	sehr häufig gefunden
Erlen-Schaumzikade	<i>Aphrophora</i>	<i>alni</i>	1995	2005	19 F 31 E	sehr häufig gefunden
Schaumzikaden-Art	<i>Lepyronia</i>	<i>coleoptrata</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug	häufig gefunden
Blutzikaden-Art	<i>Cercopis</i>	<i>vulnerata</i>	1995	2005	17 F 24 E	häufig gefunden
Büffelzirpe	<i>Stictocephala</i>	<i>bisonia</i>	1995	2005	4 F 5 E	Neozoon, mässig häufig gefunden
Zwergzikaden-Art	<i>Oncopsis</i>	<i>carpini</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti/ Ischl., bisher einziger Fund in der	erst ein Mal gefunden
Zwergkikaden-Art	<i>Jassus</i>	<i>lanio</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	selten gefunden
Zwergzikaden-Art	<i>Aphrodes</i>	<i>bicinctus</i> - Gruppe	1995	2005	2 F 2 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Wiese Schäfer	mässig häufig gefunden
Grüne Zwergzikade	<i>Cicadella</i>	<i>viridis</i>	1995	2006	18 F 34 E	sehr häufig gefunden, in Feuchtlebensräumen oft massenhaft
Zwergzikaden-Art	<i>Graphocephala</i>	<i>fennahi</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Büchs beim Franziskushaus (incl. Weiher)	Neozoon, wenig häufig gefunden
Schlammfliegen			1995			
Wasserflorfliege Gattung	<i>Sialis</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	2 F 2 E	mässig häufig gefunden
Wasserflorfliegen-Art	<i>Sialis</i>	<i>lutaria</i>	2005	2005	1 F 1 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, aber vermutlich häufig
Wasserflorfliegen-Art	<i>Sialis</i>	<i>fuliginosa</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest	an fliessenden Gewässern mässig häufig gefunden, aber vermutlich häufig
Kamelhalsfliegen			1989			
Kamelhalsfliegen-Art	<i>Phaeostigma = Raphidia</i>	<i>notata</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Netzflügler			1995			
Bachhaft	<i>Osmylus</i>	<i>fulvicephalus</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti / Ischlegli	wenig häufig gefunden
Florfliegen-Art	<i>Hypochrysa</i>	<i>elegans</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Schwizeracher	mässig häufig gefunden
Florfliegen-Art	<i>Chrysotropia</i>	<i>ciliata</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti / Ischlegli	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Florfliegen-Art	<i>Chrysopa</i>	<i>perla</i>	1995	2005	8 F 11 E	häufig gefunden
Goldauge, Florfliegen-Art	<i>Chrysoperla</i>	<i>carnea</i>	1995	2005	16 F 27 E	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern
Käfer			1995			
Dünen-Sandläufer	<i>Cicindela</i>	<i>hybrida</i>	2005	2005	1 F 1 E, Larve, unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden, nur auf Sandböden
Feld-Sandläufer	<i>Cicindela</i>	<i>campestris</i>	1995	2005	5 F 14 E, bes. Kiesgrube Hard und Engelberg	sehr häufig gefunden
Laufkäferlarve (nicht bestimmt)	(<i>Carabidae</i>)	(<i>Larve</i>)	1995	1999	1 F 2 E Kiesgrube Hard	selten gefunden
Goldglänzender Laufkäfer	<i>Carabus</i>	<i>auronitens</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Feingestreifter Laufkäfer	<i>Carabus</i>	<i>monilis</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig
Hain-Laufkäfer	<i>Carabus</i>	<i>nemoralis</i>	1995	2005	1 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Schmaler Schaufelläufer	<i>Cychrus</i>	<i>attenuatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	selten gefunden , in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Dammläufer-Art	<i>Nebria</i>	<i>brevicollis</i>	1995	2005	2 E 7 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Strandläufer-Art	<i>Notiophilus</i>	<i>biguttatus</i>	1995	1995	2 F 2 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Baumhecke Engelberg-Felli	selten gefunden
Flinkläufer-Art	<i>Trechus</i>	<i>quadristriatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Ahlenläufer-Art	<i>Tachys</i>	<i>sexstriatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesbänke an der Aare	selten gefunden
Ahlenläufer Gattung	<i>Bembidion</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	häufig gefunden
Glatter Ahlenläufer	<i>Bembidion</i>	<i>lampros</i>	1995	1995	4 F 4 E	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Ahlenläufer-Art	<i>Bembidion</i>	<i>properans</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger)mässig häufig
Ahlenläufer-Art	<i>Bembidion</i>	<i>atrocoeruleum</i>	2005	2005	1 F 4 E Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden, aber auf Kiesbänken der Aare häufig
Ahlenläufer-Art	<i>Bembidion</i>	<i>conforme</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden, nur auf Kiesbänken der Aare
Ahlenläufer-Art	<i>Bembidion</i>	<i>fasciolatum</i>	1995	2005	2 F 3 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden
Schieffleckiger Ahlenläufer	<i>Bembidion</i>	<i>tetracolum</i>	1995	2005	3 F 5 E	mässig häufig gefunden, an geeigneten Stellen häufig

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
						Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Ahlenläufer-Art	<i>Bembidion</i>	<i>testaceum</i>	1995	2005	2 E 3 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare		wenig häufig gefunden, nur auf Kiesbänken der Aare
Ahlenläufer-Art	<i>Bembidion</i>	<i>decorum</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare		wenig häufig gefunden, nur auf Kiesbänken der Aare
Ahlenläufer-Art	<i>Bembidion</i>	<i>tetragrammum</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		selten gefunden
Ahlenläufer-Art	<i>Bembidion</i>	<i>decoratum</i>	1995	1995	1 F 1 F Auenwald und Kiesbänke an der Aare		erst zwei Mal gefunden, bisher nur auf Kiesbänken der Aare
Zweifleckiger Schmuckläufer	<i>Anisodactylus</i>	<i>binotatus</i>	1995	2005	11 F 13 E		häufig gefunden
Schmuckläufer-Art	<i>Anisodactylus</i>	<i>signatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Laufkäfer-Art	<i>Diachromus</i>	<i>germanus</i>	1995	2005	6 F 7 E		häufig gefunden
Schnellläufer-Art	<i>Trichotichnus</i>	<i>nitens</i>	1995	2005	2 F 3 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		mässig häufig gefunden
Schnellläufer-Art	<i>Ophonus</i>	<i>ardosianus</i>	1995	2005	2 F 4 E Kiesgrube Hard und Wiesenstreifen Schützenhaus		wenig häufig gefunden
Schnellläufer-Art	<i>Ophonus</i> = <i>Metophonus</i>	<i>puncticeps</i>	1995	2005	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Engelberg, Baumhecke Nord		mässig häufig gefunden
Schnellläufer-Art	<i>Harpalus</i> = <i>Pseudophonus</i>	<i>rufipes</i>	1995	2005	2 F 2 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare und Kiesgrube Hard		wenig häufig gefunden
Schnellläufer-Art	<i>Harpalus</i> = <i>Pseudophonus</i>	<i>griseus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Erzgrüner Schnellläufer	<i>Harpalus</i>	<i>affinis aeneus</i>	1995	2005	3 F 6 E		mässig häufig gefunden
Schnellläufer-Art	<i>Harpalus</i>	<i>distinguendus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		wenig häufig gefunden
Schnellläufer-Art	<i>Harpalus</i>	<i>dimidiatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		mässig häufig gefunden
Schnellläufer-Art	<i>Harpalus</i>	<i>latus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Behaarter Schnellläufer	<i>Harpalus</i>	<i>rubripes</i>	1995	1995	2 F 3 E Kiesgrube Hard und Wiese Schuhfabrik Hug		mässig häufig gefunden
Schnellläufer-Art	<i>Harpalus</i>	<i>tardus</i>	1995	2005	2 F 2 E Baumhecke Täli Nordost und Ruderalgelände Schuhfabrik Hug		wenig häufig gefunden
Laufkäfer-Art	<i>Stenolophus</i>	<i>teutonus</i>	1995	1995	3 F 3 E		wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig
Laufkäfer-Art	<i>Bradycellus</i>	<i>verbasci</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden , in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) 1 Fang
Kupferiger Schulterläufer, Listkäfer-Art	<i>Poecilus</i>	<i>cupreus</i>	1995	2005	11 F 22 F		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schulterläufer- oder Listkäfer-Art	<i>Poecilus</i>	<i>versicolor</i>	1995	1995	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Waldrand Engelberg-Schürli Ost	häufig gefunden
Grabkäfer-Art	<i>Pterostichus</i>	<i>ovoideus</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	wenig häufig gefunden
Frühlings-Grabkäfer	<i>Pterostichus</i>	<i>vernalis</i>	1995	2005	6 F 8 E	mässig häufig gefunden
Grabkäfer-Art	<i>Pterostichus</i>	<i>anthracinus</i>	2005	2005	2 F 2 E Kiesbänke an der Aare und Waldrand Engelberg-Schürli Ost	wenig häufig gefunden
Grabkäfer-Art	<i>Pterostichus</i>	<i>madidus</i>	1995	2005	4 F 9 E	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Metallischer Grabkäfer	<i>Pterostichus</i>	<i>burmeisteri</i>	1995	2005	2 F 3 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Wald Hard	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Grabkäfer-Art	<i>Pterostichus</i>	<i>selmanni</i>	1995	2005	3 F 4 E	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig h., in der Schweiz nur im Jura
Pechfarbiger Striemenkäfer	<i>Molops</i>	<i>piceus</i>	1995	2005	2 F 2 E Wald Hard und Waldrand Engelberg-Schürli Ost	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Grosser Breitkäfer	<i>Abax</i>	<i>parallelepipedus</i>	1990	2011	2 F 2 E Hagberg/Gämpfi (Bannwald) und Hasenweid-Quartier	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Grosser Breitkäfer	<i>Abax</i>	<i>parallelepipedus</i>	1995	1995	1 F 1 E Wald Hard	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Paralleler Breitkäfer	<i>Abax</i>	<i>parallelus</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Waldrand Engelberg-Schürli Ost	mässig häufig gefunden, vor allem unter Steinen, in den Bodenfallen der WSL häufig
Müllers Putzläufer	<i>Agonum</i>	<i>muelleri</i>	1995	2005	4 F 4 E	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Ähnlicher Putzläufer	<i>Platynus</i>	<i>assimilis</i>	2005	2005	2 F 2 E Auenwald an der Aare und Waldrand Schwizeracher	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig
Putzläufer-Art	<i>Platynus</i>	<i>albipes</i>	1995	2005	2 F 4 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	mässig häufig gefunden
Grüner Putzläufer	<i>Platynus</i>	<i>dorsalis</i>	1995	2005	6 F 13 E	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Gemeiner Kanalkäfer-, Kamelläufer	<i>Amara Zezea</i>	<i>plebeja</i>	1995	1995	5 F 6 E	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig
Ovaler Kanalkäfer-, Kamelläufer	<i>Amara s.str.</i>	<i>ovata</i>	1995	1999	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Baumhecke Engelberg-Felli	mässig häufig gefunden, gilt in der Schweiz als sehr häufig
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	<i>Amara s.str.</i>	<i>aenea</i>	1995	2005	2 F 2 E Baumhecke Engelberg-Felli und Kiesbänke an der Aare	mässig häufig gefunden, gilt in der Schweiz nach Literatur als häufig
Gelbbeiniger Kanalkäfer-, Kamelläufer	<i>Amara s.str.</i>	<i>familiaris</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Kleiner Bombardierkäfer	<i>Brachinus</i>	<i>explorens</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West	mässig häufig gefunden, gilt in der Schweiz als häufig
Schnellschwimmer-Art	<i>Platambus</i>	<i>maculatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare, einziger Fund in der	erst ein Mal gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schnellschwimmer-Art	<i>Rhantus</i>	<i>pulverosus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Schnellschwimmer-Art	<i>Agabus</i>	<i>didymus</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesbänke an der Aare, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Taumelkäfer Gattung	<i>Gyrinus</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese beim Gemeindehaus	wenig häufig gefunden
Wasserkäfer-Art	<i>Cercyon</i>	<i>unipunctatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Quellgerinne Rüti, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Wasserkäfer-Art	<i>Hydrobius</i>	<i>fuscipes</i>	2005	2005	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Stutzkäfer-Art	<i>Margarinotus (Paralister)</i>	<i>neglectus</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Leimgruben, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Schwarzer Schneckenjäger	<i>Phosphuga</i>	<i>atrata</i>	1995	2005	4 F 4 E	mässig häufig gefunden, im Versteckten vermutlich häufig
Vierfleckiger Kahnkäfer	<i>Scaphidium</i>	<i>quadrinaculatum</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer Artengruppe	<i>Anotylus</i>	<i>sculpturatus-Gruppe</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Waldrand Boniger	selten gefunden, gilt in der Schweiz nach Literatur als häufig
Kurzflügelkäfer-Art	<i>Anotylus</i>	<i>mutator</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord, bisher einziger Fund in der	erst ein Mal gefunden
Zweifleckiger Schmalräuber	<i>Stenus</i>	<i>biguttatus</i>	2005	2005	1 F 2 F Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden
Schmalräuber-Art	<i>Stenus</i>	<i>comma</i>	1995	1995	1 F 2 F Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden, vermutlich in geeigneten Habitaten häufig
Schmalräuber-Art	<i>Stenus</i>	<i>flavipes</i>	2005	2005	1 F 1 E Quellgerinne Rüti, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Gemeiner Uferräuber	<i>Paederus</i>	<i>litoralis</i>	1995	1995	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Waldrand Engelberg-Schürli Ost	mässig häufig gefunden
Braunfüssiger Uferräuber	<i>Paederus</i>	<i>fuscipes</i>	1995	2005	5 F 9 E	mässig häufig gefunden, aber vermutlich häufig
Uferräuber-Art	<i>Rugilus (Stilicus)</i>	<i>subtilis</i>	2005	2005	bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	<i>Othius</i>	<i>punctulatus</i>	2005	2005	1 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	selten gefunden
Grabender Raubkäfer (Kurzflügler)	<i>Parabemus</i>	<i>fossor</i>	1995	2005	2 F 2 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	<i>Staphylinus</i>	<i>dimidiaticornis</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord	wenig häufig gefunden
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	<i>Ocypus</i>	<i>olens</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer Gattung	<i>Gabrius</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Quellgerinne Rüti	wenig häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kurzflügelkäfer Gattung	<i>Philonthus</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli	häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	<i>Philonthus</i>	<i>cognatus</i>	1995	2005	2 F 5 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Feldgehölz Engelberg-Felli	mässig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	<i>Philonthus</i>	<i>carbonarius</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli	wenig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	<i>Philonthus</i>	<i>atratus</i>	1995	1995	1 F 2 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	<i>Philonthus</i>	<i>laminatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	selten gefunden
Schnellräuber Gattung	<i>Tachinus</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	wenig häufig gefunden
Schnellräuber-Art (Kurzflügler)	<i>Tachinus</i>	<i>signatus</i> =	1995	1995	2 F 2 E Dorfbach und Waldrand Boniger	wenig häufig gefunden
Schnellräuber-Art (Kurzflügler)	<i>Tachinus</i>	<i>laticollis</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Boniger, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Schnellräuber-Art (Kurzflügler)	<i>Tachyporus</i>	<i>chrysomelinus</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	wenig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	<i>Aleochara</i>	<i>ripicola</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	selten gefunden
Rotdeckenkäfer (im weiteren Sinne)	<i>Homalysius</i>	<i>fontisbellaquei</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Boniger	wenig häufig gefunden
Gemeiner Weichkäfer	<i>Cantharis</i>	<i>fusca</i>	1995	2005	10 F 13 E	häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Cantharis</i>	<i>rustica</i>	1995	2005	9 F 12 E	sehr häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Cantharis</i>	<i>nigricans</i>	1995	2005	9 F 10 E	häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Cantharis</i>	<i>pellucida</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Cantharis</i>	<i>livida</i>	1995	2005	11 F 16 E	häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Cantharis</i>	<i>decipiens</i>	1995	2005	3 F 6 E	wenig häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Cantharis</i>	<i>rufa</i>	1995	1995	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Cantharis</i>	<i>pallida</i>	1995	2005	2 F 2 E Dorfbach und Leimgruben, Bächlein Südwest	mässig häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Metacantharis</i>	<i>discoidea</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Rhagonycha</i>	<i>lutea</i>	1995	2005	2 F 2 F Waldrand Boniger und Engelberg, Baumhecke Nord	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Rotgelber Weichkäfer	<i>Rhagonycha</i>	<i>fulva</i>	1995	2007	16 F 19 E	sehr häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Rhagonycha</i>	<i>limbata</i>	2005	2005	5 F 5 E	häufig gefunden
Weichkäfer-Art	<i>Rhagonycha</i>	<i>lignosa</i>	1995	2005	1 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand West	mässig häufig gefunden
Schneckenhauskäfer-Art	<i>Drilus</i>	<i>flavescens</i>	1995	1995	4 F 4 E	wenig häufig gefunden
Grosser Blasenkäfer	<i>Malachius</i>	<i>aeneus</i>	2005	2005	4 F 4 E	mässig häufig gefunden
Zweifleckiger Warzenkäfer	<i>Malachius</i>	<i>bipustulatus</i>	1995	2005	4 F 4 E	häufig gefunden
Grüner Warzenkäfer	<i>Malachius</i>	<i>viridis</i>	2005	2005	3 F 4 E	mässig häufig gefunden
Blauer Wollhaarkäfer	<i>Dasytes</i>	<i>caeruleus</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Boniger	mässig häufig gefunden
Bleischwarzer Wollhaarkäfer	<i>Dasytes</i>	<i>plumbeus</i>	1995	2005	4 F 4 E	mässig häufig gefunden
Ameisen-Buntkäfer	<i>Thanasimus</i>	<i>formicarius</i>	1995	2005	2 F 3 E Baumhecke Engelberg-Felli und Wiese Büchs beim Franziskushaus	mässig häufig gefunden
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	<i>Trichodes</i>	<i>alvearius</i>	1995	2007	10 F 15 E	häufig gefunden
Buchenwerftkäfer, Bohrkäfer	<i>Hylecoetus</i>	<i>dermestoides</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Zahnhalziger Schnellkäfer	<i>Denticollis</i>	<i>linearis</i>	1995	2005	2 F 3 E Waldrand Boniger und Engelberg, Baumhecke Südost	wenig häufig gefunden
Mausgrauer Schnellkäfer	<i>Adelocera</i>	<i>murina</i>	1995	2005	5 F 5 E	häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	<i>Agriotes</i>	<i>pilosellus</i>	1995	2005	2 F 2 E Feldgehölz Engelberg-Felli und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	mässig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	<i>Agriotes</i>	<i>sputator</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese und Rasen Altersheim Brüggli (incl. Weiher)	mässig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	<i>Agriotes</i>	<i>ustulatus</i>	1995	2005	1 F 3 E Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	<i>Agriotes</i>	<i>gallicus</i>	1995	2005	1 F 2 E Kiesgrube Hard	häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	<i>Agriotes</i>	<i>pallidulus</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost, bisher einziger Fund in der	erst ein Mal gefunden
Schnellkäfer-Art	<i>Cidnopus</i>	<i>pilosus</i>	1995	2005	5 F 5 E	mässig häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	<i>Athous</i> (<i>Pseudathous</i>)	<i>niger</i>	1995	2005	10 F 11 E	häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Rauhhaariger Schnellkäfer	<i>Athous (Pseudathous)</i>	<i>hirtus</i>	1995	2005	13 F 14 E		wenig häufig gefunden
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	<i>Athous</i>	<i>haemorrhoidalis</i>	1995	2005	9 F 16 E		häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	<i>Athous</i>	<i>vittatus</i>	1995	2005	6 F 9 E		mässig häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	<i>Athous</i>	<i>subfuscus</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand West und Nord		wenig häufig gefunden
Zierliches Prachtkäferchen	<i>Anthaxia</i>	<i>nitidula</i>	1995	2005	6 F 6 E		häufig gefunden
Prachtkäfer Gattung	<i>Agrilus</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Kleinfeld		mässig häufig gefunden
Prachtkäfer-Art	<i>Agrilus</i>	<i>laticornis</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Braunwurz-Blütenkäfer	<i>Anthrenus</i>	<i>scrophulariae</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Leimgruben, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Wollkraut-Blütenkäfer	<i>Anthrenus</i>	<i>verbasci</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Baumhecke Mitte und Ruderalgelände Schuhfabrik Hug		wenig häufig gefunden, Konkurrent des Menschen
Blütenfresser	<i>Byturus</i>	<i>aestivus</i>	1995	2005	14 F 17 E		häufig gefunden
Glanzkäfer-Art	<i>Glischrochilus</i>	<i>hortensis</i>	2005	2005	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Nordost		wenig häufig gefunden, weil klein und versteckt
Glanzkäfer Gattung	<i>Meligethes</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	20 F 25 E		sehr häufig gefunden
Glanzkäfer-Art	<i>Cychramus</i>	<i>luteus</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Boniger		wenig häufig gefunden
Nierenfleckiger Kugelkäfer	<i>Chilocorus</i>	<i>renipustulatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli		wenig häufig gefunden
Veränderlicher Marienkäfer	<i>Adonia</i>	<i>variegata</i>	2005	2005	3 F 4 E		mässig häufig gefunden
Siebenpunkt	<i>Coccinella</i>	<i>septempunctata</i>	1995	2007	27 F 67 E		sehr häufig gefunden
Fünfpunkt-Marienkäfer	<i>Coccinella</i>	<i>quinquepunctata</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost, einziger Fund in der Reg.!		erst ein Mal gefunden
Zweipunkt	<i>Adalia</i>	<i>bipunctata</i>	1995	2006	4 F 4 E		mässig häufig gefunden
Zehnpunkt	<i>Adalia</i>	<i>decempunctata</i>	1995	2005	5 F 5 E		mässig häufig gefunden
Marienkäfer-Art	<i>Harmonia</i>	<i>quadripunctata</i>	1995	2005	1 F 1 E Wiese beim Gemeindehaus		wenig häufig gefunden
Marienkäfer-Art	<i>Tytthaspis</i>	<i>sedecimpunctata</i>	2005	2005	3 F 4 E		selten gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Marienkäfer-Art	<i>Halysia</i>	<i>sedecimguttata</i>	2005		2 F 3 E Waldrand Boniger und Engelberg, Baumhecke Nord	mässig häufig gefunden
Zweiundzwanzigpunkt	<i>Thea</i>	<i>vigintiduopunctata</i>	1995	2005	2 F 2 E Baumhecke Engelberg-Felli und Engelberg, Baumhecke Nord	mässig häufig gefunden
Marienkäfer-Art	<i>Calvia</i>	<i>quatordecimguttata</i>	1990	2010	3 F 4 E	mässig häufig gefunden
Marienkäfer-Art	<i>Calvia</i>	<i>decimgutta</i>	1995	1995	2 F 2 E Wald Hard und Waldrand Schwizeracher	wenig häufig gefunden
Vierzehnpunktiger Marienkäfer	<i>Propylaea</i>	<i>quadridecem-punctata</i>	1995	2005	19 F 27 E	häufig gefunden
Marienkäfer-Art	<i>Subcoccinella</i>	<i>vigintiquattro-punctata</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West	wenig häufig gefunden
Scheinbockkäfer-Art	<i>Xanthochroa</i>	<i>carniolica</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Scheinbockkäfer-Art	<i>Nacerta (Anoncodes)</i>	<i>rufiventris</i>	1995	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Scheinbockkäfer-Art	<i>Ischnomera</i>	<i>coerulea</i>	1995	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	<i>Oedemera</i>	<i>femorata</i>	1995	2007	14 F 17 E	häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	<i>Oedemera</i>	<i>subulata</i>	1995	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Graugrüner Schenkelkäfer	<i>Oedemera</i>	<i>virescens</i>	1995	2005	4 F 6 E	häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	<i>Oedemera</i>	<i>lurida</i>	1995	2007	12 F 19 E	häufig gefunden
Feuerkäfer-Art	<i>Pyrochroa</i>	<i>serraticornis</i>	1995	2005	6 F 9 E	häufig gefunden
Feuerkäfer-Art	<i>Pyrochroa</i>	<i>coccinea</i>	2005	2005	2 F 2 Engelberg-Felli, Waldrand West und Waldrand Boniger	mässig häufig gefunden
Feuerkäfer-Art	<i>Schizotus</i>	<i>pectinicornis</i>	1995	2005	3 F 4 E	wenig häufig gefunden
Gemeiner Einhornkäfer	<i>Notoxus</i>	<i>monocerus</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesbänke an der Aare , einer von zwei Funden in der Region	erst zwei Mal gefunden, gilt aber nach Literatur als häufige Art
Blauer Maiwurm, Oelkäfer-Art	<i>Meloe</i>	<i>violaceus</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden
Triungulinus-Larve, Oelkäfer-Larve (nicht bestimmt)	<i>(Meloidae)</i>	<i>non det. (Larve)</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Obere Ei, Erstfund in der Region!	selten gefunden, weil nicht danach gesucht
Gebänderter Stachelkäfer	<i>Variimorda</i>	<i>villosa</i>	1995	2007	8 F 8 E	sehr häufig gefunden
Stachelkäfer-Art	<i>Mordella</i>	<i>brachyura</i>	1995	1995	1 F 1 E Quellgerinne Rüti	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Stachelkäfer-Art	<i>Mordellistena</i>	<i>brevicauda</i>	1995	1995	1 F 2 E Quellgerinne Rüti	häufig gefunden
Stachelkäfer-Art	<i>Mordellochroa</i>	<i>abdominalis</i>	1995	2005	3 F 4 E	mässig häufig gefunden
Stachelkäfer-Art	<i>Anaspis</i>	<i>costalis</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti/ Ischlegli, einziger Fund in der Reg.!	erst ein Mal gefunden
Gemeiner Wollkäfer	<i>Lagria</i>	<i>hirta</i>	1995	2005	5 F 5 E	mässig häufig gefunden
Pflanzenkäfer-Art	<i>Gonodera</i>	<i>luperus</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Schwefelkäfer	<i>Ctenopius</i>	<i>flavus</i>	1995	1995	2 F 2 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiese hinter Recycling AG	wenig häufig gefunden
Mistkäfer-Art	<i>Geotrupes</i>	<i>spiniger</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord, einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Waldmistkäfer	<i>Geotrupes</i>	<i>stercorosus</i>	2005	2005	1 F 2 E Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden, besonders im Wald
Dungkäfer-Art	<i>Aphodius</i>	<i>contaminatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West	selten gefunden
Dungkäfer-Art	<i>Aphodius</i>	<i>prodromus</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Dungkäfer-Art	<i>Aphodius</i>	<i>rufipes</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Junikäfer-Art	<i>Amphimallon</i>	<i>solstitiale</i>	1991	2009	1 F 4 E Hasenweid, am Abend vor dem Haus	wenig häufig gefunden, aber gelegentlich in grosser Anzahl
Feldmaikäfer, Gemeiner Maikäfer	<i>Melolontha</i>	<i>melolontha</i>	1991	2009	2 F 6 E Weide Ruttigen und vor der Wohnung Hasenweid	wenig häufig gefunden
Gartenlaubkäfer	<i>Phyllopertha</i>	<i>horticola</i>	1995	2005	4 F 5 E	häufig gefunden
Purzelkäfer-Art	<i>Hoplia</i>	<i>philanthus</i>	1995	1995	5 F 5 E	mässig häufig gefunden
Silbriger Purzelkäfer	<i>Hoplia</i>	<i>farinosa</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost	häufig gefunden
Blatthornkäfer-Art	<i>Valgus</i>	<i>hemipterus</i>	2005	2005	1 F 1 E Wald Hard	seit einigen Jahren in Ausbreitung, jetzt mässig häufig gefunden
Gebänderter Pinselkäfer	<i>Trichius</i>	<i>fasciatus</i>	1995	2007	12 F 18 E	sehr häufig gefunden
Gemeiner Rosenkäfer	<i>Cetonia</i>	<i>aurata</i>	1995	2005	11 F 15 E	häufig gefunden
Rehschröter-Art	<i>Platycerus</i>	<i>caraboides</i>	2005	2005	2 F 2 E Baumhecke Engelberg-Felli und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden
Bissiger Zangenbock	<i>Rhagium</i>	<i>mordax</i>	1995	2005	4 F 4 E	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Zangenbock-Art	<i>Rhagium</i>	<i>inquisitor</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Büchs beim Franziskushaus (incl. Weiher)	wenig häufig gefunden
Schmalbock-Art	<i>Stenocorus</i>	<i>meridianus</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Blaubock	<i>Gaurotes</i>	<i>virginea</i>	2005	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Rothörniger Blütenbock	<i>Grammoptera</i>	<i>ruficornis</i>	1995	2005	8 F 8 E	mässig häufig gefunden
Feldahornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	<i>Alosterna</i>	<i>tabacicolor</i>	1995	2005	4 F 6 E	häufig gefunden
Schmalbock-Art	<i>Leptura</i>	<i>fulva</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg, Magerwiese West und Dorfbach	mässig häufig gefunden
Roter Schmalbock, Roter Halsbock	<i>Corymbia</i> = <i>Leptura</i>	<i>rubra</i>	1995	2005	6 F 6 E	häufig gefunden
Gefleckter Schmalbock	<i>Leptura</i> = <i>Strangalia</i>	<i>maculata</i>	1995	2005	21 F 31 E	sehr häufig gefunden
Goldglänzender Schmalbock	<i>Strangalia</i>	<i>aurulenta</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Schwarzschwänziger Schmalbock	<i>Stenurella</i> = <i>Strangalia</i>	<i>melanura</i>	1995	2005	19 F 24 E	sehr häufig gefunden
Gefleckter Blütenbock	<i>Pachytodes</i> = <i>Judolia</i>	<i>cerambyciformis</i>	2005	2005	5 F 6 E	häufig gefunden
Kleiner Eichenbock, Buchenbock	<i>Cerambyx</i>	<i>scopolii</i>	1991	2010	4 F 6 E	mässig häufig gefunden
Kleiner Eichenbock, Buchenbock	<i>Cerambyx</i>	<i>scopolii</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli	mässig häufig gefunden
Moschusbock	<i>Aromia</i>	<i>moschata</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Echter Widderbock	<i>Clytus</i>	<i>arietis</i>	1995	2005	9 F 11 E	häufig gefunden
Zierbock	<i>Anaglyptus</i>	<i>mysticus</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	wenig häufig gefunden
Wimpernhornbock	<i>Exocentrus</i>	<i>adspersus</i>	1990	1990	1 F 3 E in der Wohnung , bisher einziger Fundort in der Region!	erst ein Mal gefunden
Rothalsiger Linien- oder Weidenbock	<i>Oberea</i>	<i>oculata</i>	1995	1995	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt	wenig häufig gefunden
Zylindrischer Walzenhalsbock	<i>Phytoecia</i>	<i>cylindrica</i>	1995	2005	1 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand West und Nord	wenig häufig gefunden
Blattkäfer Familie	(<i>Chrysomelidae</i>)	<i>non det.</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	sehr häufig gefunden
Schilfkäfer-Art	<i>Donacia</i>	<i>vulgaris</i>	2005	2005	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
						Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Seidiger Rohrkäfer	<i>Plateumaris</i>	<i>sericea</i>	1995	2005	2 F 5 E		mässig häufig gefunden, in Feuchtgebieten lokal sehr häufig
Kirsch-Blatthähnchen	<i>Orsodacne</i>	<i>cerasi</i>	1995	2005	2 F 2 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	mässig häufig gefunden
Rothalsiges Getreidehähnchen	<i>Oulema</i>	<i>melanopus</i>	1995	2005	12 F 15 E		sehr häufig gefunden, hier handelt es sich um zwei sehr ähnliche Arten
Gemeiner Langbeinkäfer	<i>Labidostomis</i>	<i>longimana</i>	1995	1995	1 F 1 E	Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Blauer Langbeinkäfer	<i>Smaragdina</i>	<i>salina</i>	1995	2005	3 F 3 E		häufig gefunden
Hieroglyphenkäfer	<i>Pachybrachys</i>	<i>sinuatus</i>	1995	1995	1 F 1 E	Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Goldiger Fallkäfer	<i>Cryptocephalus</i>	<i>aureolus</i>	1995	2005	2 F 2 E	Engelberg, Magerwiese West und Engelberg, Magerwiese West	auf Blumen sehr häufig gefunden , bes. auf gelben
Fallkäfer-Art	<i>Cryptocephalus</i>	<i>ocellatus</i>	2005	2005	1 F 1 E	Trockenstandort Schäfer, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Querbindiger Fallkäfer	<i>Cryptocephalus</i>	<i>morei</i>	1995	2005	2 F 2 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Wiese Schuhfabrik Hug	wenig häufig gefunden
Tatzenkäfer-Art	<i>Timarcha</i>	<i>tenebricosa</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Bunter oder Prächtiger Blattkäfer	<i>Chrysolina</i> = <i>Diochrysa</i>	<i>fastuosa</i>	1995	2005	13 F 22 E		häufig gefunden
Blattkäfer-Art	<i>Chrysolina</i> = <i>Chrysomela</i>	<i>auricalcea</i>	1995	1995	1 F 1 E	Weiher Täli Rüti/Leimgruben, einziger Fund in der R.!	erst ein Mal gefunden
Johanniskraut-Blattkäfer	<i>Chrysolina</i> = <i>Chrysomela</i>	<i>varians</i>	1995	1995	3 F 6 E		an Johanniskraut, mässig häufig gefunden
Blattkäfer-Art	<i>Chrysolina</i> = <i>Chrysomela</i>	<i>hyperici</i>	1995	2005	2 F 2 E	Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiese Hardstrasse	selten gefunden
Weidenblattkäfer Gattung	<i>Phratora</i> = <i>Phyllodecta</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E	Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Kleiner Weidenblattkäfer	<i>Phratora</i> = <i>Phyllodecta</i>	<i>vitellinae</i>	1995	1995	1 F 1 E	Dorfbach	wenig häufig gefunden, aber manchmal in grösserer Anzahl
Blattkäfer-Art	<i>Plagiodera</i>	<i>versicolora</i>	2005	2005	1 F 1 E	Leimgruben, Bächlein Nordost	selten gefunden
Erlenblattkäfer	<i>Agelastica</i>	<i>alni</i>	1995	1995	1 F 1 E	Dorfbach	wenig häufig gefunden
Labkraut-Blattkäfer	<i>Sermylassa</i>	<i>halensis</i>	2005	2005	2 F 2 E	Wiesenstreifen Schützenhaus und Wiese Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Schneeballblattkäfer	<i>Pyrrhalta</i>	<i>viburni</i>	1995	2005	11 F 38 E		sehr häufig gefunden
Kohlerdfloh Gattung	<i>Altica</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	5 F 7 E		mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Bingelkraut-Erdflohkäfer	<i>Hermaeophaga</i>	<i>mercurialis</i>	1995	2005	5 F 9 E	mässig häufig gefunden
Erdflohkäfer-Art	<i>Crepidodera</i>	<i>aurata</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Stachelkäfer-Art	<i>Hispella</i>	<i>atra</i>	2005	2005	1 f 1 E Wiese Schuhfabrik Hug	selten gefunden
Schildkäfer-Art	<i>Hypocassida</i>	<i>subferruginea</i>	2005	2005	2 F 2 E Engelberg, Baumhecke Mitte und Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Wicken-Samenkäfer	<i>Bruchus</i>	<i>atomarius</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Leimgruben	wenig häufig gefunden
Ginster-Samenkäfer	<i>Bruchidius</i>	<i>fasciatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese und Rasen Altersheim Brüggli (incl. Weiher)	selten gefunden
Rebenstecher, Rebstichler, Zigarrenwickler	<i>Byctiscus</i>	<i>betulae</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Haselblattroller, Haselnuss-Dickkopfröller	<i>Apoderus</i>	<i>coryli</i>	1995	2005	5 F 9 E	häufig gefunden
Menningroter Ampfer-Spitzmausrüssler	<i>Apion s.str.</i>	<i>frumentarium = miniatum</i>	2005	2005	1 F 1 E Wald Hard	selten gefunden, weil sehr klein
Grüner Klee-Spitzmausrüssler	<i>Ischnopterapion = Apion</i>	<i>virens</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Schwizeracher	wenig häufig gefunden, weil sehr klein
Brauner Schmalbauch, Länglicher Blattrüssler	<i>Phyllobius</i>	<i>oblongus</i>	1995	2005	2 F 2 E Naturnahe Anlage Neumatt und Wiese hinter Recycling AG	mässig häufig gefunden
Nessel-Blattrüssler	<i>Phyllobius</i>	<i>pomaceus = urticae</i>	1995	2005	4 F 12 E	mässig häufig gefunden
Gespornter Blattrüssler	<i>Phyllobius</i>	<i>glaucus = calcaratus</i>	1995	2005	6 F 6 E	mässig häufig gefunden, stllerweise in grosser Anzahl
Breiter Birnengrünrüssler, Kupfriger Blattrüssler	<i>Phyllobius</i>	<i>pyri</i>	2005	2005	5 F 5 E	häufig gefunden
Weissdorn-Blattrüssler	<i>Phyllobius</i>	<i>betulinus = betulae</i>	2005	2005	3 F 3 E	häufig gefunden
Gefurchter oder Gewächshaus-Dickmaulrüssler	<i>Otiorhynchus</i>	<i>sulcatus</i>	1990	2008	2 F 4 E in der Wohnung Hasenweid	an Gartenpflanzen, Konkurrent der Gärtner, bei uns wenig häufig gefunden
Fichten-Glanzrüssler	<i>Polydrusus</i>	<i>impar</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Dickkopf-Glanzrüssler	<i>Polydrusus</i>	<i>pterygomalis</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Gescheckter oder Hirsch-Glanzrüssler	<i>Polydrusus</i>	<i>cervinus</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	mässig häufig gefunden
Marmorierter Glanzrüssler	<i>Polydrusus</i>	<i>tereticollis = undatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Kleinfeld, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Seidiger Glanzrüssler	<i>Polydrusus</i>	<i>formosus = sericeus</i>	1995	2005	7 F 12 E	häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kupfriger oder Schimmernder Glanzrüssler	<i>Polydrusus</i>	<i>mollis</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Schwarzflockiger TrapeZRüssler	<i>Strophosoma</i>	<i>melanogrammum</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Hardstrasse, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Gestreifter Blattrandrüssler	<i>Sitona</i>	<i>lineatus</i>	1995	2005	2 F 2 E Wiesenstreifen vor Recycling AG und Waldrand Schwizeracher	wenig häufig gefunden
Rotklee-Blattrandrüssler	<i>Sitona</i>	<i>lepidus = flavescens</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Kratzdistelrüssler	<i>Larinus</i>	<i>turbinatus</i>	2005	2005	6 F 7 E	mässig häufig, stellenweise in grosser Zahl auf Disteln
Langbein-Holzrüssler	<i>Kyklioacalles = Acalles</i>	<i>aubei</i>	2005	2005	1 F 1 E Wald Hard, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Irisrüssler, Weisspunktiger Schwertlilienrüssler	<i>Mononychus</i>	<i>punctumalbum</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Bruggli	wenig häufig gefunden, aber stellenweise in grosser Anzahl auf Gelber Schwertlilie
Gefleckter Rapsstängel- oder Kohlstängel- oder	<i>Ceutorhynchus</i>	<i>pallidactylus = quadridens</i>	2005	2005	1 F 1 E Quellgerinne Rüti	wenig häufig gefunden
Veränderlicher Gallenrüssler	<i>Rhinusa = Gymnaetron</i>	<i>tetra</i>	1995	2005	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Buchen-Springrüssler, Buchenblattrüssler	<i>Orchestes = Rhynchaenus</i>	<i>fagi</i>	1995	1995	4 F 6 E	Frassspuren an Rotbuchen in allen Laubwäldern sehr häufig gefunden
Hautflügler			1995			
Planzenwespe Unterordnung	(<i>Symphyta</i>)	<i>non det.</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost	sehr häufig gefunden
Gespinstblattwespen-Art	<i>Cephalcia</i>	<i>arvensis</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	selten gefunden
Gespinstblattwespen-Art	<i>Neurotoma</i>	<i>saltuum</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Gespinstblattwespen-Art	<i>Pamphilius</i>	<i>aurantiacus</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	selten gefunden
Gespinstblattwespen-Art	<i>Pamphilius</i>	<i>sylvaticus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Holzwespen-Art	<i>Sirex</i>	<i>juvencus</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus, einziger Fund in der Reg.!	erst ein Mal gefunden
Halmwespen-Art	<i>Hartigia</i>	<i>nigra</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Halmwespen-Art	<i>Cephus</i>	<i>pygmaeus</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	mässig häufig gefunden
Halmwespen-Art	<i>Cephus</i>	<i>spinipes = cultratus</i>	2005	2005	4 F 5 E	mässig häufig gefunden
Bürstenhornblattwespen-Art	<i>Arge</i>	<i>berberidis</i>	1995	2005	2 F 2 E Wiese Hardstrasse und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region	
Bürstenhornblattwespen-Art	<i>Arge</i>	<i>rustica</i>	1995	2005	1 F 2 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Bürstenhornblattwespen-Art	<i>Arge</i>	<i>pagana</i>	1995	1995	1 F 1 E	Dorfbach	mässig häufig gefunden
Keulenblattwespen-Art	<i>Corynis</i>	<i>crassicornis</i>	1995	2005	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Duplophanes = Neoselandria</i>	<i>morio</i>	1995	1995	2 F 2 E	Kiesgrube Hard und Wiese Schäfer	mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Selandria</i>	<i>serva</i>	1995	1995	4 F 7 E		häufig gefunden
Blattwespe Gattung	<i>Dolerus</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	3 F 3 E		häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>eversmanni</i>	2005	2005	1 F 1 E	Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>vestigialis</i>	1995	1995	1 F 1 E	Wiese Hardstrasse	wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>madidus</i>	2005	2005	1 F 1 E	Quellgerinne Rüti	selten gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>germanicus</i>	1995	2005	2 F 2 E	Wiese Schäfer und Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>haematodes</i>	1995	1995	1 F 1 E	Wiese Leimgruben	wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>fumosus</i>	1995	2005	2 F 2 E	Waldrand Schwizeracher und Waldrand Boniger	wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>nitens</i>	2005	2005	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>gonager</i>	1995	2005	2 F 2 E	Bächlein Niggelisberg und Engelberg, Baumhecke Mitte	mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>nigratus</i>	1995	2005	3 F 4 E		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>picipes</i>	1995	2005	2 F 2 E	Wiese Schäfer und Wiese Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Dolerus</i>	<i>niger</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	selten gefunden
Blattwespen-Art	<i>Athalia</i>	<i>circularis</i>	1995	2005	15 F 19 E		häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Athalia</i>	<i>cordata</i>	1995	2005	11 F 14 E		häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Athalia</i>	<i>liberta</i>	1995	1995	2 F 2 E	Engelberg, Wiese Ost und Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Athalia</i>	<i>lugens</i>	1995	2005	3 F 4 E		wenig häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Kohlrübsenblattwespe	<i>Athalia</i>	<i>rosae</i>	1995	2005	14 F 17 E		häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Empria</i>	<i>sexpunctata = klugii</i>	1995	2005	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Empria</i>	<i>liturata</i>	1995	2005	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Empria</i>	<i>longicornis</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Boniger		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Empria</i>	<i>pallimacula = baltica</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Ametastegia</i>	<i>albipes</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Nordost, einer von drei Funden in der Region!		selten gefunden
Blattwespen-Art	<i>Ametastegia</i>	<i>equiseti</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Schwizeracher		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Ametastegia = Protemphytus</i>	<i>carpini</i>	2005	2005	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Taxonus</i>	<i>agrorum</i>	1995	1995	2 F 2 E Bächlein Niggliisberg und Baumhecke Obere Ei		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Allantus</i>	<i>calceatus</i>	1995	1995	2 F 2 E Leimgruben, Bächlein Südwest und Bächlein Niggliisberg		wenig häufig gefunden
Weissgürtelige Rosensägewespe	<i>Allantus</i>	<i>cinctus</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg		mässig häufig gefunden
Kirschblattwespen-Art	<i>Endelomyia</i>	<i>aethiops</i>	1995	1995	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli , einer von drei Funden in der Region!		selten gefunden
Kirschblattwespe Gattung	<i>Caliroa</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Eutomostethus = Atomostethus</i>	<i>ephippium</i>	2005	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Stethomostus</i>	<i>fuliginosus</i>	1995	1995	2 F 2 E Bächlein Niggliisberg und Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Phymatocera</i>	<i>aterrima</i>	1995	1995	2 F 2 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Waldrand Boniger		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Rhadinoceraea</i>	<i>micans</i>	2005	2005	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Monophadnus</i>	<i>pallescens</i>	1995	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Monophadnus</i>	<i>spinolae</i>	1995	2005	1 F 2 E Baumhecke Täli Nordost		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Periclista</i>	<i>albida = melanocephala</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus, einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden , in den Fallender WSL (P. Flückiger) 3 Fänge
Blattwespen-Art	<i>Halidamia</i>	<i>affinis</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord		selten gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region	
Blattwespen-Art	<i>Monophadnoides</i>	<i>rubi = geniculata</i>	2005	2005	2 F 2 E Leimgruben, Bächlein Nordost und Bächlein Nigglisberg	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Claremontia</i>	<i>brevicornis = confusa</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost	mässig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Claremontia</i>	<i>waldheimii</i>	1995	1995	4 F 4 E	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Eriocampa</i>	<i>ovata</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Aglaostigma</i>	<i>fulvipes</i>	1995	2005	5 F 5 E	mässig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredopsis</i>	<i>nassata</i>	1995	2005	5 F 6 E	mässig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredopsis</i>	<i>friesei = pavidata</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredopsis</i>	<i>sordida</i>	1995	2005	7 F 7 E	häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredopsis</i>	<i>stigma</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredopsis</i>	<i>tesselata</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West	wenig häufig gefunden	
Grüne Blattwespe	<i>Rhogogaster</i>	<i>viridis</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Nigglisberg	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Rhogogaster</i>	<i>chlorosoma</i>	2005	2005	1 F 1 E Auenwald an der Aare (ohne Kiesbänke)	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>maculata</i>	1995	2005	1 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>temula</i>	2005	2005	7 F 8 E	häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>mesomela</i>	1995	2005	9 F 13 E	häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>livida</i>	1995	2005	4 F 5 E	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>solitaria</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>crassa = albicornis</i>	1995	1995	1 F 1 E Dorfbach	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>campestris = flava</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>scrophulariae</i>	2005	2005	1 F 1 E Wald Hard	wenig häufig gefunden	
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>amoena</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Boniger	mässig häufig gefunden	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>zonula</i>	1995	2005	5 F 5 E		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>zona</i>	2005	2005	1 F 1 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Artkomplex	<i>Tenthredo</i>	<i>marginella-Komplex</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Schwizeracher		häufig gefunden, möglicherweise zwei verschiedene Arten
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>vespa</i>	1995	2005	3 F 3 E		häufig gefunden
Blattwespe Artengruppe	<i>Tenthredo</i>	<i>arcuata-Gruppe</i>	1995	1995	2 F 2 E Baumhecke Engelberg-Felli und Wiese Reservoir Leimgruben		sehr häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>arcuata</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord		häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo</i>	<i>notha</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli		häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Pachyprotasis</i>	<i>rapae</i>	1995	1995	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>sanguinolenta = quadrimaculata</i> (	1995	2005	5 F 6 E		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>rufipes</i>	1995	2005	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Engelberg, Wiese Nord		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>militaris = analis</i>	2005	2005	2 F 2 E Baumhecke Täli Nordost und Wiese Kleinfeld		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>annulata = ligata</i>	1995	2005	6 F 8 E		häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>blanda</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand West und Waldrand Schwizeracher		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>duodecimpunctata</i>	2005	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Bächlein Niggliisberg		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>montana</i>	2005	2005	3 F 3 E		häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>ribis</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>alboannulata</i>	1995	2005	6 F 8 E		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Cladius</i>	<i>pectinicornis</i>	2005	2005	2 F 2 E Dorfbach und Baumhecke Täli Nordost		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Cladius = Priophorus</i>	<i>pallipes</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Boniger, einer von drei Funden in der Region!		selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig
Blattwespen-Art	<i>Cladius = Priophorus</i>	<i>brullei</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Pristiphora</i>	<i>laricis</i>	2005	2005	1 F 1 E Dorfbach, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Blattwespe Gattung	<i>Pontania</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	<i>Craesus</i>	<i>brischkei</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost, bisher einziger Fund in der R.!		erst ein Mal gefunden
Blattwespen-Art	<i>Nematus</i>	<i>fagi</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Boniger, einer von zwei Fundorten in der Region!		
Blattwespen-Art	<i>Nematus</i>	<i>incompletus</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus, einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) 2 Fänge
Blattwespen-Art	<i>Nematus</i>	<i>myosotidis</i>	1995	2005	2 F 2 E Waldrand Boniger und Wiese Büchs beim Franziskushaus (incl. Weiher)		mässig häufig gefunden
Brackwespe Unterfamilie	<i>(Braconinae)</i>	<i>non det.</i>	2005	2005	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Brackwespe Gattung (Puppenkokon)	<i>Apanteles</i>	<i>sp. (Puppenkokon)</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg, Wiese Mitte und Kiesgrube Hard		häufig gefunden
Brackwespe Unterfamilie	<i>(Sigalphinae)</i>	<i>non det.</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Brackwespe Gattung	<i>Chelonus</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Brackwespen-Art	<i>Chelonus</i>	<i>oculator</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Reservoir Leimgruben		wenig häufig gefunden
Brackwespen-Art	<i>Homolobus</i>	<i>annulicornis</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig gefunden
Brackwespen-Art	<i>Helcon</i>	<i>angustator</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli		wenig häufig gefunden, bes. an Holzstapeln
Schlupfwespe Familie	<i>Ichneumonidae</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	4 F 4 E		sehr häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Vulgichneumon</i>	<i>bimaculatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Dorfbach		selten gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Cratichneumon</i>	<i>flavifrons = fabricator</i>	1995	2011	5 F 5 E		mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Cratichneumon</i>	<i>culex</i>	1995	2005	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Cratichneumon</i>	<i>coruscator</i>	2005	2005	3 F 4 E		mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Cratichneumon</i>	<i>albiscuta</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Boniger		selten gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Homotherus</i>	<i>varipes</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Boniger, einer von zwei Funden in der Region!		erst zwei Mal gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Ichneumon s.str.</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	3 F 4 E		sehr häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Ichneumon</i>	<i>sarcitorius</i>	1995	2007	3 F 4 E		häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen			Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region	
Schlupfwespen-Art	<i>Ichneumon</i>	<i>extensorius</i>	2005		4 F 4 E	mässig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Ichneumon</i>	<i>suspiciosus</i>	2005	2005	1 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Ichneumon</i>	<i>bucculentus</i>	2005	2005	3 F 3 E	häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Thyrateles</i>	<i>camelinus</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und West	wenig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Patrocloides</i> = <i>Patroclus</i>	<i>sputator</i>	2005	2005	2 F 3 E Engelberg, Baumhecke Nord und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Stenichneumon</i>	<i>militarius</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg	wenig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Amblyteles</i>	<i>armatorius</i>	1995	2005	10 F 11 E	sehr häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Diphyus</i>	<i>quadripunctorius</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Diphyus</i>	<i>palliatorius</i>	1995	2005	5 F 5 E	mässig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Eutanyacra</i>	<i>crispatoria</i>	2005	2005	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt	wenig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Spilichneumon</i>	<i>occisarius</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Ctenichneumon</i>	<i>panzeri</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West	wenig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Protichneumon</i>	<i>similatorius</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord, einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Colpognathus</i>	<i>celerator</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg	selten gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Oronotus</i>	<i>binotatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg	wenig häufig gefunden	
Schlupfwespe Gattung	<i>Phaeogenes</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	wenig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Alomya</i>	<i>debellator</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand West und Waldrand Boniger	wenig wenig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Alomya</i>	<i>punctalata</i> = <i>ripulator</i>	2005	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	<i>Alomya</i>	<i>semiflava</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden	
Schlupfwespe Unterfamilie	(<i>Cryptinae</i>)	<i>non det.</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Reservoir Leimgruben		
Schlupfwespen-Art	<i>Glyphicnemis</i>	<i>profligator</i>	2005	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden	

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schlupfwespe Gattung	<i>Bathytrix</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	2 F 3 E Feldgehölz Engelberg-Felli und Waldrand Schwizeracher	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Phygadeuon</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	mässig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Cubocephalus</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Polytribax</i>	<i>perspicillator</i>	2005	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Aptesis</i>	<i>nigrocincta sensu Horstmann 1993</i>	2005	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art nicht bestimmt	<i>Aptesis</i>	<i>sp. D</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost, einer von drei Funden in der Region!	selten gefunden
Schlupfwespen-Art nicht bestimmt	<i>Aptesis</i>	<i>sp. R</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost, einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Schlupfwespen-Art nicht bestimmt	<i>Aritranis</i> = <i>Pycnocyrtus</i>	<i>sp. A</i>	2005	2005	2 F 3 E Engelberg, Baumhecke Nord und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Trychosis</i>	<i>legator</i>	2005	2005	2 F 2 E Dorfbach und Wiese Hardstrasse	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Buathra</i>	<i>laborator</i>	2005	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Cryptus</i>	<i>armator</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Unterfamilie	<i>(Ophioninae)</i>	<i>non det.</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Nordost	
Schlupfwespen-Art	<i>Ophion</i>	<i>costatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Enicospilus</i>	<i>ramidulus</i>	1995	1995	1 F 1 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben	wenig häufig gefunden
Sichelwespe Unterfamilie	<i>(Anomaloninae)</i>	<i>non det.</i>	1995	1995	3 F 3 E	
Sichelwespen-Art	<i>Therion</i>	<i>circumflexum</i>	1995	1995	7 F 8 E	sehr häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Campoplex</i>	<i>sp.</i>	2005	2011	2 F 2 E Wiesenstreifen Schützenhaus und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Tribus	<i>(Porizontini)</i>	<i>non det.</i>	2005	2005	2 F 2 E Wiese Schuhfabrik Hug und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	
Schlupfwespe Gattung	<i>Dusona</i>	<i>sp.</i>	2005	2011	2 F 2 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Bächlein und Waldrand Rüti / Ischlegli	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Dusona</i>	<i>stragifex</i> = <i>delusor</i>	2005	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Campoletis</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	2 F 3 E Engelberg, Baumhecke Nord und Engelberg-Felli, Waldrand West	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Schlupfwespen-Art	<i>Campoletis zonata</i>	2005	2005	2 F 2 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli und Engelberg, Baumhecke Nord	mässig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Hyposoter</i> sp.	2005	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Diadegma</i> sp.	2005	2005	2 F 2 E Feldgehölz Engelberg-Felli und Wiese hinter Recycling AG	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Scirtetes robustus</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Leimgruben einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Cymodusa</i> sp.	2005	2005	2 F 2 E Bächlein Niggliisberg und Wiese Schuhfabrik Hug	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Barycnemis</i> sp.	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Rynchobanchus</i> <i>bicolor</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Exetastes degener</i>	2005	2005	1 F 1 E Wald Hard, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Lissonota</i> sp.	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord	häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Lissonota fundator</i>	2005	2005	8 F 8 E	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Lissonota proxima</i>	2005	2005	2 F 2 E Wiese Hardstrasse und Wiese Schuhfabrik Hug	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Lissonota coracina = bellator</i>	2005	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Lissonota admontensis</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus, einziger Fund in der Region, unsicher best.	erst ein Mal gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Pimpla</i> sp.	1995	1995	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli	häufig gefunden
Schwarze Schlupfwespe	<i>Pimpla rufipes</i>	1995	2005	5 F 5 E	häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Pimpla contemplator</i>	2005	2005	5 F 5 E	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Apechthis quadridentata</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Dolichomitus mesocentrus</i>	2005	2005	2 F 2 E Wald Hard und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Scambus planatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli, einziger Fund in der R.!	erst ein Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Paraperithous gnathaulax</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli, einziger Fund in der R.!	erst ein Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Tromatobia lineatoria</i>	2005	2005	1 F 1 E Dorfbach	selten gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Schlupfwespen-Art	<i>Collyria</i>	<i>trichophthalma</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg, Baumhecke Nord	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Colpotrochia</i>	<i>cincta</i>	1995	2005	5 F 5 E		häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Exochus</i>	<i>gravis</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg, Baumhecke Mitte, einer von zwei Funden in der Region	In der Schweiz bisher noch nicht publiziert!
Schlupfwespen-Art	<i>Metopius</i>	<i>dissectorius</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand West, einer von drei Funden in der Region!	selten gefunden
Schlupfwespe Unterfamilie	(<i>Ctenopelmatinae</i>)	<i>non det.</i>	2005	2005	1 F 1 E	Feldgehölz Engelberg-Felli	sehr häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Ctenopelma</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E	Waldrand Boniger, bisher einziger Fund in der Region, aber unsicher bestimmt	erst ein Mal gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Lethades</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand West	selten gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Rhorus</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	2 F 2 E	Leimgruben, Bächlein Südwest und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Perilissus</i>	<i>amperis</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Lagarotis</i>	<i>debitor</i>	2005	2005	2 F 3 E	Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli und Wiese Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Lagarotis</i>	<i>semicaligata</i>	2005	2005	5 F 5 E		mässig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Mesoleius</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	2 F 2 E	Waldrand Boniger und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Synodites</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E	Waldrand Schwizeracher	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Hadrodactylus</i>	<i>graminicola</i>	2005	2005	1 F 1 E	Feldgehölz Engelberg-Felli	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	<i>Euryproctus</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E	Baumhecke Engelberg-Felli	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Smicroplectrus</i>	<i>quinquecinctus</i> = <i>trianguligena</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand West	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Netelia</i>	<i>testacea</i>	2005	2005	1 F 1 E	Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Untergattung	<i>Netelia</i> (<i>Bessobates</i>)	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg, Baumhecke Südost	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Tryphon</i>	<i>atriceps</i> = <i>ephippium</i>	2005	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Tryphon</i>	<i>nigripes</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg, Wiese Nord	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Tryphon</i>	<i>signator</i>	2005	2005	1 F 1 E	Waldrand Boniger	wenig häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schlupfwespen-Art	<i>Tryphon</i>	<i>rarus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West, einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Monoblastus</i>	<i>brachyacanthus</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus, einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	<i>Diplazon</i>	<i>tibiatorius</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard, erster von zwei Funden in der Region!	
Schlupfwespen-Art	<i>Campocraspedon</i>	<i>annulitarsis</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord, einziger Fund in der Region!	In der Schweiz bisher noch nicht publiziert!
Schlupfwespen-Art	<i>Syrphophilus</i>	<i>tricinctorius</i>	2005	2005	1 F 1 E Dorfbach	wenig häufig gefunden
Schmalbauchwespen-Art	<i>Gasteruption</i>	<i>assectator</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli	mässig häufig gefunden
Erzwespen-Art	<i>Brachymeria</i>	<i>tibialis</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	<i>Diplolepis</i>	<i>rosae (Galle)</i>	2005	2011	5 F 9 E	sehr häufig gefunden
Ahorn-Gallwespe	<i>Pediaspis</i>	<i>aceris</i>	1995	2005	11 F 20 E	Gallen überall häufig, wo Bergahorn wächst
Zehrwespen-Art	<i>Proctotrupes</i>	<i>gravidator</i>	2011	2011	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli	wenig häufig gefunden
Zehrwespen-Art	<i>Phaenoserphus</i>	<i>dubiosus</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost, einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Zehrwespe Gattung	<i>Codrus</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Feuergoldwespe, Gemeine Goldwespe	<i>Chrysis</i>	<i>ignita</i>	1991	2010	1 F 15 E an der Bienen-Nisthilfe auf dem Balkon und in der Wohnung Hasenweid	an Totholz mässig häufig gefunden
Dolchwespen-Verwandte	<i>Sapygina</i>	<i>decemguttata</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	wenig häufig gefunden
Gemeine Rollwespe	<i>Tiphia</i>	<i>femorata</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	mässig häufig gefunden
Knotennameisen-Art	<i>Manica</i>	<i>rubida</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig, auf Sandböden lokal sehr häufig
Knotennameisen-Art	<i>Myrmica</i>	<i>rubra</i>	1995	2005	10 F 18 E	häufig gefunden
Knotennameisen-Art	<i>Myrmica</i>	<i>ruginodis</i>	1995	2005	6 F 14 E	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Knotennameisen-Art	<i>Myrmica</i>	<i>sabuleti</i>	1995	2005	5 F 5 E	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Knotennameisen-Art	<i>Myrmica</i>	<i>schencki</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Leimgruben	selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig
Knotennameisen-Art	<i>Myrmecina</i>	<i>gramminicola</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare, einer von drei Fundorten in der	selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region	
Diebsameise	<i>Solenopsis = Diplorhoptrum</i>	<i>fugax</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Obere Ei	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig	
Gemeine Rasenameise	<i>Tetramorium</i>	<i>caespitum</i>	1995	2005	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Wiesenstreifen Schützenhaus	häufig gefunden	
Drüsenameise-Art	<i>Dolichoderus (Hypoclinea)</i>	<i>quadripunctatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Wald Hard	wenig häufig gefunden	
Gemeine Rossameise	<i>Camponotus</i>	<i>ligniperda</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	häufig gefunden	
Schwarzgraue Wegameise	<i>Lasius</i>	<i>niger</i>	1995	2005	31 F 72 E	sehr häufig gefunden	
Wegameisen-Art	<i>Lasius</i>	<i>platythorax</i>	2005	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden	
Braune Wegameise	<i>Lasius</i>	<i>brunneus</i>	1995	2005	4 F 6 E	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig	
Gelbe Wegameise	<i>Lasius</i>	<i>flavus</i>	1995	2005	6 F 7 E	sehr häufig gefunden	
Glänzendschwarze Holzameise	<i>Lasius</i>	<i>fuliginosus</i>	1995	2005	4 F 8 E	häufig gefunden	
Grauschwarze Sklavenameise	<i>Formica</i>	<i>fusca</i>	1995	2005	8 F 18 E	häufig gefunden	
Gewöhnliche Sklavenameise	<i>Formica</i>	<i>cunicularia</i>	1995	2005	10 F 19 E	sehr häufig gefunden	
Zweifarbige Sklavenameise	<i>Formica</i>	<i>rufibarbis</i>	1995	1995	7 f 14 E	sehr häufig gefunden	
Urbane Sklavenameise	<i>Formica</i>	<i>fuscocinerea = lefrancoisi</i>	1995	2006	7 F 30 E	häufig, gefunden, aber nur auf Kiesböden (Alluvionen)	
Wiesen-Waldameise	<i>Formica</i>	<i>pratensis</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Schäfer	sehr häufig gefunden	
Blutrote Raubameise	<i>Formica</i>	<i>sanguinea</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg, Baumhecke Mitte und Engelberg, Wiese Mitte	sehr häufig gefunden	
Grosse Töpferwespe	<i>Delta</i>	<i>unguiculatus</i>	1995	2005	2 F 2 E Bächlein beim Franziskushaus und Wiese Hardstrasse	Imagines selten gefunden , alte Mörtel-nester in der Stadt nicht selten an Mauern	
Pillenwespen-Art	<i>Eumenes</i>	<i>papillarius</i>	1995	1995	2 F 2 E Dorfbach und Baumhecke Obere Ei	wenig häufig gefunden	
Pillenwespen-Art	<i>Eumenes</i>	<i>coronatus</i>	1995	2005	3 F 3 E	sehr häufig gefunden	
Schornsteinwespem-Art	<i>Gymnomerus = Odynerus</i>	<i>laevipes</i>	1995	2005	2 F 2 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	wenig häufig gefunden	
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>nigricornis</i>	1995	2005	9 F 9 E	häufig gefunden	
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>oviventris</i>	2005	2005	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Nordost	mässig häufig gefunden	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>antilope</i>	1991	2004	1 F 5 E an der Bienen-Nisthilfe auf dem Balkon und in der Wohnung Hasenweid	selten gefunden
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>trifasciatus</i>	1995	2005	2 F 2 E Bächlein beim Franziskushaus und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>parietinus</i>	1991	2011	3 F 7 E	wenig häufig gefunden
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>parietinus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Wiese Nord	wenig häufig gefunden
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>claripennis</i>	1995	2007	2 F 2 E Engelberg, Wiese Ost und Engelberg, Magerwiese West	wenig häufig gefunden
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>gazella</i>	1995	2005	4 F 4 E	mässig häufig gefunden
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>parietum</i>	1990	1990	bisher einziger, aber unsicher bestimmter Fund in der Region.	schwierig von A. gazella zu unterscheiden
Lehmwespen-Art	<i>Symmorphus</i>	<i>bifasciatus</i>	1991	1991	1 F 1 E in der Wohnung Hasenweid	wenig häufig gefunden
Lehmwespen-Art	<i>Symmorphus</i>	<i>gracilis</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg	mässig häufig gefunden
Französische Feldwespe	<i>Polistes</i>	<i>dominulus</i>	1995	2007	37 F 118 E	sehr häufig gefunden, nistet an Felsen und regelmässig auch an Mauern im Siedlungsraum
Hornisse	<i>Vespa</i>	<i>crabro</i>	1995	2005	15 F 23 E	sehr häufig gefunden
Mittlere Wespe, Kleine Hornisse	<i>Dolichovespula</i>	<i>media</i>	1995	2005	2 F 2 E Bächlein beim Franziskushaus und Weiher Täli Rüti / Leimgruben	wenig häufig gefunden
Waldwespe	<i>Dolichovespula</i>	<i>sylvestris</i>	1995	2007	4 F 5 E	häufig gefunden
Sächsische Wespe	<i>Dolichovespula</i>	<i>saxonica</i>	1995	2005	14 F 19 E	häufig gefunden
Soziale Faltenwespe Gattung	<i>Vespula</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	3 F 3 E	sehr häufig gefunden
Rote Wespe	<i>Vespula</i>	<i>rufa</i>	1995	2005	6 F 6 E	häufig gefunden
Deutsche Wespe	<i>Vespula</i>	<i>germanica</i>	1995	2005	25 F 36 E	sehr häufig gefunden
Gemeine Wespe	<i>Vespula</i>	<i>vulgaris</i>	1995	2011	35 F 55 E	sehr häufig gefunden
Wegwespe Familie	<i>(Pompilidae)</i>	<i>non det.</i>	1995	1995	2 F 2 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Quellgerinne Rüti	sehr häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Priocnemis</i>	<i>perturbator</i>	1995	2005	7 F 8 E	häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Priocnemis</i>	<i>schioedtei</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und West	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Wegwespen-Art	<i>Priocnemis</i>	<i>cordivalvata</i>	1995	2005	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Priocnemis</i>	<i>hyalinata</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		wenig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Priocnemis</i>	<i>fennica</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg		wenig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Priocnemis</i>	<i>parvula</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost		mässig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Priocnemis</i>	<i>agilis</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West		mässig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Caliadurgus</i>	<i>fasciatellus</i>	1995	1995	1 F 2 E Baumhecke Täli Nordost		mässig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Auplopus</i>	<i>albifrons</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost		wenig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Arachnospila</i>	<i>anceps</i>	2005	2005	4 F 4 E		mässig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Arachnospila</i>	<i>spissa</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus		mässig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Evagetes (Contemptevag)</i>	<i>siculus villicus</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost, einer von zwei Funden in der Region!		erst zwei Mal gefunden
Wegwespen-Art	<i>Anoplius</i>	<i>nigerrimus</i>	1995	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Wegwespen-Art	<i>Anoplius</i>	<i>infuscatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		mässig häufig gefunden
Bienenwolf (Grabwespe)	<i>Philanthus</i>	<i>triangulum</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		wenig häufig gefunden
Bienenjagende Knotenwespe	<i>Cerceris</i>	<i>rybiensis</i>	1995	2007	7 F 9 E		häufig gefunden
Knotenwespen-Art	<i>Cerceris</i>	<i>quinguefasciata</i>	1995	2005	5 F 5 E		wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Gorytes</i>	<i>laticinctus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Gorytes (s.s.)</i>	<i>quinguecinctus</i>	1995	2005	2 F 2 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli		mässig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Argogorytes</i>	<i>mystaceus</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Magerwiese West und Waldrand Engelberg-Schürli Ost		wenig häufig gefunden
Kotwespen-Art (Grabwespe)	<i>Mellinus</i>	<i>arvensis</i>	2006	2006	1 F 1 E Kiesgrube Hard		wenig häufig gefunden
Wanzengrabwespen-Art	<i>Astata (s.s.)</i>	<i>boops</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus		wenig häufig gefunden
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	<i>Trypoxylon</i>	<i>figulus</i>	2005	2005	2 F 2 E Engelberg, Baumhecke Südost und Baumhecke Engelberg-Felli		mässig häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	<i>Trypoxylon minus</i>		1995	2011	4 F 5 E	mässig häufig gefunden, nistet an Totholz
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	<i>Trypoxylon attenuatum</i>		2005	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Psen s.str. ater</i>		2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden , nach De Beaumont nur in der Südschweiz, im Wallis und selten im
Grabwespen-Art	<i>Psen (Mimumesa) unicolor</i>		1995	1995	1 F 1 E Wiese und Rasen Altersheim Brüggli (incl. Weiher)	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Psen (Mimumesa) atratinus</i>		1995	1995	1 F 2 E Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Psen (Mimumesa) dahlbomi</i>		2005	2005	2 F 2 E Baumhecke Täli Nordost und Wiese Büchs beim Franziskushaus (incl. Weiher)	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Pemphredon lugubris</i>		2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Pemphredon podagrica</i>		2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Pemphredon rugifera</i>		1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Pemphredon inornata</i>		1995	2005	3 F 4 E	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Pemphredon lethifera</i>		2005	2005	3 F 4 E	mässig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Passaloecus insignis = roettgeni</i>		2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Leimgruben	wenig häufig gefunden, in den Fallender WSL (P. Flückiger) mässig häufig
Grabwespen-Art	<i>Passaloecus pictus</i>		1990	1991	1 F 2 E in der Wohnung, bisher einziger Fundort in der Region!	erst ein Mal gefunden
Grabwespen-Art	<i>Stigmus pendulus</i>		2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost, einer von drei Funden in der Region!	erst ein Mal gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig
Grabwespen-Art	<i>Ectemnius (Metacrabro) cephalotes</i>		1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Obere Ei	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Ectemnius (Metacrabro) lituratus</i>		1995	2005	4 F 5 E	häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Ectemnius (Hypocrabro) continuus</i>		1995	2005	5 F 6 E	häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Ectemnius (s.str.) dives</i>		1995	2005	5 F 5 E	mässig häufig gefunden
Silbermundwespen-Art (Grabwespe)	<i>Lestica clypeata</i>		2005	2005	1 F 1 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Schildbeinige Silbermundwespe (Grabwespe)	<i>Crabro cribrarius</i>		1995	1995	1 F 1 E Dorfbach	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Crossocerus (s.str.) distinguendus</i>		2005	2005	2 F 2 E Baumhecke Engelberg-Felli und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Grabwespen-Art	<i>Crossocerus (Coelocrabro)</i>	<i>barbipes</i>	2011	2011	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Crossocerus (Blepharipus)</i>	<i>vagabundus</i>	1995	2005	4 F 4 E	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Lindenius</i>	<i>albilabris</i>	1995	2005	4 F 7 E	mässig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Lindenius</i>	<i>panzeri</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	<i>Lindenius</i>	<i>pygmaeus armatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug	selten gefunden
Fliegenspiesswespen-Art (Grabwespe)	<i>Oxybelus</i>	<i>bipunctatus</i>	1995	2005	1 F 2 E Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden
Fliegenspiesswespen-Art (Grabwespe)	<i>Oxybelus</i>	<i>trispinosus</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Maskenbiene Gattung	<i>Hylaeus</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard	sehr häufig gefunden
Gehörnte Maskenbiene	<i>Hylaeus</i>	<i>cornutus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Rainfarn-Maskenbiene	<i>Hylaeus</i>	<i>nigritus</i>	1995	1995	2 F 2 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	mässig häufig gefunden
Gewöhnliche Maskenbiene	<i>Hylaeus</i>	<i>communis</i>	1995	2007	8 F 11 E	häufig gefunden
Mauer-Maskenbiene	<i>Hylaeus</i>	<i>hyalinatus</i>	2005	2005	2 F 2 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	wenig häufig gefunden
Grobpunktierte Maskenbiene	<i>Hylaeus</i>	<i>punctatus</i>	1995	2005	2 F 2 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiese hinter Recycling AG	wenig häufig gefunden
Reseden-Maskenbiene	<i>Hylaeus</i>	<i>signatus</i>	2005	2005	2 F 5 E Kiesgrube Hard und Wiese Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden, fliegen an Gelber Resede
Maskenbienen-Art	<i>Hylaeus</i>	<i>difformis</i>	1995	1995	1 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Verkannte Maskenbiene	<i>Hylaeus</i>	<i>confusus</i>	1995	2005	1 F 3 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	häufig gefunden
Maskenbienen-Art	<i>Hylaeus</i>	<i>gibbus</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Steirische Maskenbiene	<i>Hylaeus</i>	<i>styriacus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Mitte	wenig häufig gefunden
Geschweifte Maskenbiene	<i>Hylaeus</i>	<i>sinuatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	mässig häufig gefunden
Rainfarn-Seidenbiene	<i>Colletes</i>	<i>similis</i>	2005	2007	3 F 4 E	wenig häufig gefunden
Rotbeinige Furchenbiene	<i>Halictus</i>	<i>rubicundus</i>	1995	2005	3 F 3 E	häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gelbbindige Furchenbiene	<i>Halictus</i>	<i>scabiosae</i>	1995	2005	4 F 10 E, bes. Kiesgrube Hard	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", zur Zeit ist sie häufig
Furchenbienen-Art	<i>Halictus</i>	<i>simplex</i>	1995	2005	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Baumhecke Täli Nordost	sehr häufig gefunden
Gewöhnliche Furchenbiene	<i>Halictus</i>	<i>tumulorum</i>	1995	2007	23 F 40 E	sehr häufig gefunden
Schmalbiene Gattung	<i>Lasioglossum</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Mitte	sehr häufig gefunden
Glockenblumen-Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>costulatum</i>	1995	1995	1 F 1 E Trockenstandort Schäfer	wenig häufig gefunden
Schmalbienen-Art	<i>Lasioglossum</i>	<i>leucozonium</i>	1995	2007	17 F 25 E	häufig gefunden
Schmalbienen-Art	<i>Lasioglossum</i>	<i>zonulum</i>	1995	2005	12 F 13 E	häufig gefunden
Schmalbienen-Art	<i>Lasioglossum</i>	<i>lativentre</i>	1995	2011	4 F 4 E	mässig häufig gefunden
Gewöhnliche Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>calceatum</i>	1995	2007	31 F 65 E	sehr häufig gefunden
Schmalbienen-Art	<i>Lasioglossum</i>	<i>albipes</i>	1995	2005	3 F 3 E	häufig gefunden
Feldweg-Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>malachurum</i>	1995	2005	7 F 9 E	häufig gefunden
Breitkopf-Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>laticeps</i>	1995	2005	15 F 28 E	sehr häufig gefunden
Lappenspornige Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>pauillum</i>	1995	2007	16 F 27 E	sehr häufig gefunden
Braunfühler-Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>fulvicorne</i>	1995	2005	4 F 5 E	häufig gefunden
Dickkopf-Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>glabriusculum</i>	2005	2005	4 F 4 E	häufig gefunden
Polierte Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>politum</i>	1995	2005	3 F 4 E	mässig häufig gefunden
Punktierete Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>punctatissimum</i>	1995	1995	1 F 2 E Wiese Schäfer	wenig häufig gefunden
Zottige Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>villosulum</i>	1995	2005	16 F 24 E	sehr häufig gefunden
Rotfüssige Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>rufitarse</i>	1995	1995	4 F 4 E	wenig häufig gefunden
Kleinste Schmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>minutissimum</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug, bisher einziger Fund in der Region !	erst ein Mal gefunden
Schmalbienen-Art	<i>Lasioglossum</i>	<i>semilucens</i>	2005	2005	2 F 2 E, zwei von drei Funden in der Region!	selten gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region	
Schmalbienen-Art	<i>Lasioglossum</i>	<i>nitidiusculum</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg, Baumhecke Mitte	wenig häufig gefunden
Dunkelgrüne Goldschmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>morio</i>	1995	2005	12 F 29 E		sehr häufig gefunden
Goldschmalbienen-Art	<i>Lasioglossum</i>	<i>leucopus</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg, Baumhecke Mitte	selten gefunden
Dickkopf-Blutbiene	<i>Sphecodes</i>	<i>monilicornis</i>	1995	1995	1 F 1 E	Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden
Blutbienen-Art	<i>Sphecodes</i>	<i>scabricollis</i>	2007	2007	1 F 1 E	Engelberg, Wiese Nord	wenig häufig gefunden, ist aber in letzter Zeit häufiger geworden
Blutbienen-Art	<i>Sphecodes</i>	<i>reticulatus</i>	2005	2005	2 F 2 E	Wiese beim Gemeindehaus und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	selten gefunden
Blutbienen-Art	<i>Sphecodes</i>	<i>gibbus</i>	1995	1995	1 F 1 E	Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden
Blutbienen-Art	<i>Sphecodes</i>	<i>ephippius</i>	1995	2005	7 F 9 E		häufig gefunden
Blutbienen-Art	<i>Sphecodes</i>	<i>puncticeps</i>	1995	2005	2 F 3 E	Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	mässig häufig gefunden
Blutbienen-Art	<i>Sphecodes</i>	<i>ferruginatus</i>	1995	2005	4 F 8 E	bes. Kiesgrube Hard	häufig gefunden
Schwarze Blutbiene	<i>Sphecodes</i>	<i>niger</i>	2005	2005	1 F 1 E	Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Blutbienen-Art	<i>Sphecodes</i>	<i>crassus</i>	2005	2005	2 F 3 E	Engelberg, Baumhecke Mitte und Baumhecke Täli Nordost	mässig häufig gefunden
Gewöhnliche Zottelbiene	<i>Panurgus</i>	<i>calcaratus</i>	1995	1995	1 F 1 E	Wiese hinter Recycling AG, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>pandellei</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg, Baumhecke Mitte	wenig häufig gefunden
Zwerg-Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>nana</i>	2005	2005	1 F 1 E	Kiesgrube Hard, einer von zwei Funden in der Region !	erst zwei Mal gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>falsifica</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg, Magerwiese West	wenig häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>strohella</i>	1995	2005	6 F 7 E		mässig häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>subopaca</i>	1995	2005	8 F 9 E		häufig gefunden
Winzige Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>minutula</i>	1995	2005	17 F 20 E		häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>minutuloides</i>	1995	1995	1 F 1 E	Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Ehrenpreis-Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>viridescens</i>	1995	1995	3 F 3 E		mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
						Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Grauschwarze Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>cineraria</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Kleinfeld		mässig häufig gefunden
Rotschopfige Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>haemorrhoa</i>	1995	2005	8 F 9 E		häufig gefunden
Rotpelzige oder Fuchsrote Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>fulva</i>	1995	2005	2 F 2 E Wiesenstreifen Schützenhaus und Waldrand Boniger		mässig häufig gefunden
Pippau-Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>fulvago</i>	1995	1995	4 F 5 E		mässig häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>humilis</i>	1995	2005	13 F 19 E		häufig gefunden
Zweifarbige Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>bicolor</i>	1995	2005	8 F 10 E		häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>fulvata</i>	1995	2005	12 F 15 E		häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>labiata</i>	1995	1995	2 F 2 E Wiesenstreifen Schützenhaus und Engelberg, Baumhecke Nord		wenig häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>rosae</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Schäfer, einer von zwei Funden in der Region!		erst zwei Mal gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>nitida</i>	1995	2005	12 F 14 E		häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>helvola</i>	1995	2005	5 F 6 E		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Gesellige Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>carantonica = jacobi</i>	1995	2005	2 F 3 E Waldrand Boniger und Baumhecke Täli Nordost		mässig häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>gravida</i>	2005	2005	5 F 5 E		häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>flavipes</i>	1995	2005	6 F 7 E		häufig gefunden
Zaunwicken-Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>lathyri</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Reservoir Leimgruben		mässig häufig gefunden
Mittlere Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>intermedia</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>ovatula</i>	2005	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>chrysosceles</i>	1995	2005	15 F 19 E		häufig gefunden
Zweizellige Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>lagopus</i>	1995	1995	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Glockenblumen-Sägehornbiene	<i>Melitta</i>	<i>haemorrhoidalis</i>	1995	2005	3 F 4 E		häufig gefunden
Auen-Schenkelbiene	<i>Macropis</i>	<i>europaea</i>	1995	1995	1 F 1 E Dorfbach		mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Wald-Schenkelbiene	<i>Macropis</i>	<i>fulvipes</i>	1995	2005	2 F 2 E	Dorfbach und Wald Hard	wenig häufig gefunden
Gemeine Wollbiene	<i>Anthidium</i>	<i>manicatum</i>	1995	2005	6 F 6 E		häufig gefunden
Felsspalten-Wollbiene	<i>Anthidium</i>	<i>oblongatum</i>	1995	2005	4 F 4 E		mässig häufig gefunden
Kleine Harzbiene	<i>Anthidium</i>	<i>strigatum</i>	1995	1995	2 F 2 E	Engelberg, Wiese Mitte und Wiese beim Gemeindehaus	mässig häufig gefunden
Gewöhnliche Löcherbiene	<i>Heriades</i>	<i>truncorum</i>	2005	2007	5 F 5 E		mässig häufig gefunden
Hahnenfuss-Scherenbiene	<i>Chelostoma</i>	<i>florisomne</i>	2005	2005	4 F 4 E		mässig häufig gefunden
Glockenblumen-Scherenbiene	<i>Chelostoma</i>	<i>rapunculi = fuliginosum</i>	1995	2005	11 F 16 E		häufig gefunden
Zwerg-Scherenbiene	<i>Chelostoma</i>	<i>campanularum</i>	1995	2005	9 F 15 E		häufig gefunden
Scherenbienen-Art	<i>Chelostoma</i>	<i>distinctum</i>	1995	2005	7 F 8 E		mässig häufig gefunden
Rostrote Mauerbiene	<i>Osmia</i>	<i>bicornis = rufa</i>	1991	2012	6 F 27 E	registriert	sehr häufig gefunden, dominierende Art an Wildbienen-Nisthilfen
Rostrote Mauerbiene	<i>Osmia</i>	<i>bicornis = rufa</i>	1995	2005	17 F 21 E		sehr häufig gefunden, dominierende Art an Wildbienen-Nisthilfen
Goldene Schneckenhaus-Mauerbiene	<i>Osmia</i>	<i>aurulenta</i>	1995	1995	3 F 3 E		häufig gefunden
Zweihöckrige Mauerbiene	<i>Osmia</i>	<i>leaiana</i>	1995	1995	1 F 2 E	Engelberg, Magerwiese West	mässig häufig gefunden
Schwarzspornige Stengel-Mauerbiene	<i>Osmia</i>	<i>leucomelana</i>	2005	2005	1 F 1 E	Baumhecke Täli Nordost	wenig häufig gefunden
Gelbspornige Stengel-Mauerbiene	<i>Osmia</i>	<i>claviventris</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg, Wiese Nord	mässig häufig gefunden
Platterbsen-Mörtelbiene	<i>Megachile</i>	<i>ericetorum</i>	1995	1995	8 F 8 E		mässig häufig gefunden
Garten-Blattschneiderbiene	<i>Megachile</i>	<i>willoughbiella</i>	2005	2007	2 F 2 E	Wiesenstreifen Schützenhaus und Engelberg, Magerwiese West	häufig gefunden
Frühlings-Pelzbiene	<i>Anthophora</i>	<i>plumipes</i>	1991	2011	6 F 15 E		häufig gefunden
Frühlings-Pelzbiene	<i>Anthophora</i>	<i>plumipes</i>	1995	2005	8 F 8 E		häufig gefunden
Wald-Pelzbiene	<i>Anthophora</i>	<i>furcata</i>	1995	2005	2 F 2 E	Baumhecke Engelberg-Felli und Naturnahe Anlage Neumatt	mässig häufig gefunden
Gewöhnliche Trauerbiene	<i>Melecta</i>	<i>albifrons = punctata</i>	1995	2005	1 F 2 E	Engelberg, Baumhecke Mitte	"Kuckuck" der Frühlings-Pelzbiene, wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Juni-Langhornbiene	<i>Eucera</i>	<i>longicornis</i>	1995	1995	18 F 20 E	häufig gefunden
Mai-Langhornbiene	<i>Eucera</i>	<i>nigrescens = tuberculata</i>	1995	2005	14 F 16 E	häufig gefunden
Gewöhnliche Keulenhornbiene	<i>Ceratina</i>	<i>cyanea</i>	1995	2005	3 F 3 E	häufig gefunden
Schnauzen-Wespenbiene	<i>Nomada</i>	<i>sexfasciata</i>	1995	1995	1 F 1 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	wenig häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>fulvicornis = lineola</i>	1995	2005	2 F 2 E Wiesenstreifen Schützenhaus und Wiese Schäfer	wenig häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>goodeniana = succincta</i>	1995	2005	10 F 10 E	häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>marshamella</i>	1995	2005	3 F 4 E	mässig häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>signata</i>	1995	2005	6 F 7 E	wenig häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>flava</i>	1995	2005	10 F 13 E	häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>panzeri</i>	1995	2005	7 F 8 E	mässig häufig gefunden
Gespaltene Wespenbiene	<i>Nomada</i>	<i>ruficornis = bifida</i>	1995	2005	4 F 5 E	mässig häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>bifasciata lepeletieri</i>	2005	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>flavoguttata</i>	1995	2005	9 F 13 E	häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>atroscutellaris</i>	2005	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Engelberg, Baumhecke Mitte	mässig häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>integra</i>	1995	2005	5 F 7 E	mässig häufig gefunden
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>abriciana</i>	1995	2005	11 F 16 E	häufig gefunden
Hummel Gattung	<i>Bombus</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	6 f 6 E	sehr häufig gefunden
Dunkle Erdhummel	<i>Bombus</i>	<i>terrestris</i>	1995	2005	31 F 65 E	sehr häufig gefunden
Helle Erdhummel	<i>Bombus</i>	<i>lucorum</i>	1995	2007	29 F 43 E	sehr häufig gefunden
Bergwaldhummel	<i>Bombus</i>	<i>wurfleini</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West	häufig gefunden
Baumhummel	<i>Bombus</i>	<i>hypnorum</i>	1995	2005	7 F 8 E	häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Wiesenhummel	<i>Bombus</i>	<i>pratorum</i>	1995	2005	26 F 47 E	sehr häufig gefunden
Steinhummel	<i>Bombus</i>	<i>lapidarius</i>	1995	2007	24 F 41 E	sehr häufig gefunden
Ackerhummel	<i>Bombus</i>	<i>pascuorum</i>	1995	2011	44 F 216 E	sehr häufig gefunden
Veränderliche Hummel	<i>Bombus</i>	<i>humilis</i>	1995	2007	17 F 34 E	sehr häufig gefunden
Gartenhummel	<i>Bombus</i>	<i>hortorum</i>	1995	2005	16 F 23 E	sehr häufig gefunden
Bärtige Schmarotzerhummel (der Gartenhummel)	<i>Psithyrus</i>	<i>barbutellus</i>	1995	2005	2 F 3 E Engelberg, Magerwiese West und Engelberg, Baumhecke Nord	häufig gefunden
Böhmische Schmarotzerhummel (der Hellen Erdhummel)	<i>Psithyrus</i>	<i>bohemicus</i>	1995	2007	11 F 14 E	sehr häufig gefunden
Feld-Schmarotzerhummel (der Ackerhummel)	<i>Psithyrus</i>	<i>campestris</i>	1995	2007	5 F 7 E	häufig gefunden
Felsen-Schmarotzerhummel (der Steinhummel)	<i>Psithyrus</i>	<i>rupestris</i>	2007	2007	2 F 2 E Engelberg, Wiese Nord Engelberg, Magerwiese West	häufig gefunden
Wald-Schmarotzerhummel (der Wiesenhummel)	<i>Psithyrus</i>	<i>sylvestris</i>	1995	2005	17 F 27 E	sehr häufig gefunden
Honigbiene	<i>Apis</i>	<i>mellifera</i>	1995	2007	47 F 270 E	sehr häufig gefunden
Köcherfliegen			1995			
Köcherfliege Ordnung	(<i>Trichoptera</i>)	<i>non det.</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein beim Franziskushaus	mässig häufig gefunden
Köcherfliegen-Art	<i>Rhyacophila</i>	<i>pubescens</i>	2005	2005	1 F 1 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben	wenig häufig gefunden
Köcherfliegen-Art	<i>Polycentropus</i>	<i>flavomaculatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare, einziger Fund in der R!	erst ein Mal gefunden
Köcherfliege Gattung	<i>Hydropsyche</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli	mässig häufig gefunden
Köcherfliegen-Art	<i>Hydropsyche</i>	<i>incognita</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 9 Quadrate zu 25 qkm
Köcherfliegen-Art	<i>Odontocerum</i>	<i>albicorne</i>	2005	2005	1 F 1 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben	mässig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 12 Quadrate zu 25 qkm
Köcherfliege Familie	(<i>Limnephilidae</i>)	<i>non det.</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest	häufig gefunden
Köcherfliegen-Art	<i>Limnephilus</i>	<i>lunatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Köcherfliegen-Art	<i>Limnephilus</i>	<i>rhombicus</i>	1995	1995	1 F 1 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Köcherfliegen-Art	<i>Sericostoma</i>	<i>personatum</i>	2005	2005	2 F 2 E Leimgruben, Bächlein Nordost und Weiher Büchs beim Franziskushaus	wenig häufig gefunden
Schmetterlinge			1995			
Schmetterlingsraupe Ordnung	<i>(Lepidoptera)</i>	<i>non det.</i>	2005	2005	1 F 1 E	
Kleinschmetterling (nicht bestimmt)	<i>(Microlepidoptera)</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Urmotten-Art	<i>Micropteryx</i>	<i>aruncella</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Bächlein Nigglisberg	wenig häufig gefunden
Langfühlermotte Gattung	<i>Nematopogon</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand West und Feldgehölz Engelberg-Felli	
Langfühlermotten-Art	<i>Nematopogon</i>	<i>adansoniella</i>	1995	2005	7 F 11 E	mässig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	<i>Nematopogon</i>	<i>swammerdamella</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	<i>Nematopogon</i>	<i>robertella</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	<i>Nemophora</i>	<i>metallica</i>	2005	2005	3 F 3 E	sehr häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	<i>Nemophora</i>	<i>degeerella</i>	1995	2005	10 F 11 E	mässig häufig gefunden
Grüne Langfühlermotte	<i>Adela</i>	<i>reaumurella</i>	1995	2005	9 F 10 E	mässig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	<i>Cauchas</i>	<i>violella</i>	1995	1995	1 F 1 E Trockenstandort Schäfer	mässig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	<i>Cauchas</i>	<i>fibulella</i>	1995	2005	4 F 4 E	wenig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	<i>Cauchas</i>	<i>rufimitrella</i>	2005	2005	3 F 3 E	häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	<i>Incurvaria</i>	<i>koerneriella</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Sackträger-Art	<i>Psyche</i>	<i>casta</i>	1995	2005	10 F 11 E	Säcke häufig gefunden, männliche Falter aber selten und vor allem im Siedlungsraum
Weichgras-Sackträger Gattung	<i>Epichnopteryx</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Wiese Nord und Engelberg, Baumhecke Nord	häufig gefunden
Weichgras-Sackträger-Art	<i>Epichnopteryx</i>	<i>plumella</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Magerwiese West und Wiese Schäfer	mässig häufig gefunden
Fliedermotte	<i>Caloptilia (Gracillaria)</i>	<i>syringella</i>	1995	1995	5 F 5 E	mässig häufig gefunden
Fliedermotten-Art	<i>Caloptilia (Gracillaria)</i>	<i>rufipennella</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli, bisher einziger	erst ein Mal gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gespinstmotte Gattung	<i>Yponomeuta</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Wiese Mitte	häufig gefunden
Traubenkirschen-Gespinstmotte	<i>Yponomeuta</i>	<i>evonymella</i>	1995	1995	1 F 2 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	mässig häufig gefunden
Schwarzdorn-Gespinstmotte	<i>Yponomeuta</i>	<i>padella</i>	1995	1995	4 F 5 E	mässig häufig gefunden
Pfaffenhütchen-Gespinstmotte	<i>Yponomeuta</i>	<i>cagnagella</i>	1995	2005	11 F 13 E	häufig gefunden
Gespinstmotten-Art	<i>Yponomeuta</i>	<i>plumbella</i>	2005	2005	2 F 2 E Baumhecke Täli Nordost und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	wenig häufig gefunden
Silbermotten-Art	<i>Argyresthia</i>	<i>semitestacella</i>	1995	2011	2 F 2 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli und Engelberg-Felli, Waldrand N	wenig häufig gefunden
Motten-Art	<i>Ypsolopha</i>	<i>parenthesella</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	wenig häufig gefunden
Kohlmotte, Schleiermotte	<i>Plutella</i>	<i>xylostella</i>	1995	1995	3 F 3 E	häufig gefunden
Sackträgermotte Familie	<i>(Coleophoridae)</i>	<i>non det.</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord	häufig gefunden
Sackträgermotte Gattung	<i>Coleophora</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	1 F 2 E Wiese Schuhfabrik Hug	häufig gefunden
Sackträgermotten-Art	<i>Coleophora</i>	<i>ornatipenella</i>	1995	2005	1 F 2 E Engelberg, Magerwiese West	häufig gefunden
Grasminiermotte Gattung	<i>Elachista</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	2 F 3 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben und Leimgruben, Bächlein Nordost	
Grasminiermotten-Art	<i>Elachista</i>	<i>quadripunctella</i>	1995	1995	1 F 1 E Wald Hard, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Grasminiermotten-Art	<i>Elachista</i>	<i>argentella</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Grasminiermotte Gattung	<i>Depressaria</i>	<i>sp.</i>	2005	2006	2 F 2 E Wiesenstreifen Schützenhaus und Kiesgrube Hard	häufig gefunden
Grasminiermotten-Art	<i>Depressaria</i>	<i>douglasella</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Faulholzmotten-Art	<i>Batia</i>	<i>unitella</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Boniger	wenig häufig gefunden, weil klein und unscheinbar
Faulholzmotten-Art	<i>Metalampra</i>	<i>cinnamomea</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost	selten gefunden
Faulholzmotten-Art	<i>Harpella</i>	<i>forficella</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Boniger	wenig häufig gefunden
Palpenmotten-Art	<i>Bryotropha</i>	<i>terrella</i>	1990	1998	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Palpenmotten-Art	<i>Acompsia</i>	<i>cinerella</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord	mässig häufig gefunden

			erste Beobacht.	letzte Beobacht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Spulers Glasflügler	<i>Synanthedon</i>	<i>spuleri</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli , einer von drei Funden in der Region!		selten gefunden
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	<i>Zygaena</i>	<i>filipendulae</i>	1995	2005	2 F 3 E Wiese Reservoir Leimgruben und Engelberg, Magerwiese West		sehr häufig gefunden
Ampfer-Grünwidderchen	<i>Adscita</i>	<i>statices</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West		häufig gefunden
Kleinschmetterlings-Art	<i>Anthophila</i>	<i>fabriciana</i>	1995	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Wickler Familie	<i>(Tortricidae)</i>	<i>non det.</i>	2005	2005	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest		
Wickler-Art	<i>Olindia</i>	<i>schumacherana</i>	2005	2005	1 F 1 E Dorfbach		selten gefunden
Wickler-Art	<i>Aethes</i>	<i>tesserana</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus		mässig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Aethes</i>	<i>hartmanniana</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus		häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Cochylis</i>	<i>dubitana</i>	1995	2005	4 F 4 E		wenig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Tortrix</i>	<i>viridana</i>	1995	2005	2 F 2 E Waldrand Boniger und Wald Hard		wenig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Acleris</i>	<i>schalleriana</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli, einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Wickler-Art	<i>Acleris</i>	<i>variegana</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost, einziger Fund in der Reg.!		erst ein Mal gefunden
Wickler Gattung	<i>Cnephasia</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	2 F 2 E Waldrand Boniger und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		mässig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Cnephasia</i>	<i>asseclana</i>	2005	2005	2 F 2 E Dorfbach und Waldrand Engelberg-Schürli Ost		selten gefunden
Wickler-Art	<i>Eulia</i>	<i>ministrana</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Boniger, einer von zwei Funden in der Region!		erst zwei Mal gefunden
Wickler-Art	<i>Pseudargyrotoza</i>	<i>conwagana</i>	1995	1995	4 F 5 E		wenig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Capua</i>	<i>vulgana</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli		wenig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Archips</i>	<i>rosana</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli, einziger Fund in der R.!		erst ein Mal gefunden
Wickler-Art	<i>Pandemis</i>	<i>corylana</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli		wenig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Pandemis</i>	<i>cerasana</i>	1995	1995	2 F 2 E Bächl. und Waldrand Rüti /Ischlegli und Wr Schwizeracher, die 2 einzigen		
Wickler-Art	<i>Clepsis</i>	<i>senecionana</i>	1995	1995	1 F 1 E Trockenstandort Schäfer		wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Wickler-Art	<i>Bactra</i>	<i>lancealana</i>	2005	2005	1 F 1 E Quellgerinne Rüti	in Feuchtgebieten mässig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Endothenia</i>	<i>marginana</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Selenodes</i>	<i>karelica</i>	1995	2005	1 F 2 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Pflaumenknospenwickler	<i>Hedya</i>	<i>pruniana</i>	1995	2005	5 F 5 E	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Celypha</i>	<i>rufana</i>	1995	2005	5 F 7 E	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Celypha</i>	<i>striana</i>	1995	2005	7 F 10 E	häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Celypha</i>	<i>lacunana</i>	1995	2007	29 F 60 E	sehr häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Phiaris</i> (<i>Olethreutes</i>)	<i>olivana</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Rhopobota</i> = <i>Griselda</i>	<i>stagnana</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Epilotia</i>	<i>thapsiana</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	wenig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Eucosma</i>	<i>conterminana</i>	1995	2005	1 F 2 E Kiesgrube Hard	selten gefunden
Wickler-Art	<i>Gypsonoma</i>	<i>sociana</i>	1995	1995	1 F 2 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare, einer von zwei Fundorten in der Reg.	
Wickler-Art	<i>Epiblema</i>	<i>sticticana</i>	1995	1995	1 F 3 E Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden, Raupen an Huflattich
Wickler-Art	<i>Epiblema</i>	<i>graphana</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	selten gefunden
Brombeertriebwickler	<i>Notocelia</i> (<i>Epiblema</i>)	<i>uddmanniana</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Notocelia</i> (<i>Epiblema</i>)	<i>trimaculana</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächl. und Waldrand Rüti /Ischlegli, bisher einziger Fund in der Reg., unsicher	erst ein Mal gefunden
Wickler-Art	<i>Cydia</i>	<i>compositella</i>	1995	1995	2 F 3 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik) und Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden
Apfelwickler	<i>Cydia</i>	<i>pomonella</i>	1990	1998	1 F 3 E in der Wohnung Hasenweid	Imagines wenig häufig gefunden, die Larven ("Apfelwurm") sind wohl häufig
Wickler-Art	<i>Cydia</i>	<i>splendana</i> = <i>triangulella</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Wickler-Art	<i>Lathronympha</i>	<i>strigana</i>	1995	1995	2 F 3 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Wiese hinter Recycling AG	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Pammene</i>	<i>regiana</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Boniger, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Wickler Gattung	<i>Dichrorampha</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	3 F 3 E	häufig gefunden
Wickler-Art	<i>Dichrorampha</i>	<i>gueneeana</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	wenig häufig gefunden, unsicher bestimmt
Wickler-Art	<i>Dichrorampha</i>	<i>petiverella</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Wiese hinter Recycling AG	mässig häufig gefunden
Federgeistchen-Art	<i>Oxyptilus</i>	<i>pilosellae</i>	2005	2005	1 F 1 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Federgeistchen-Art	<i>Platyptilia</i>	<i>gonodactyla</i>	1995	2005	1 F 5 E Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden, auf Huflattich
Federgeistchen-Art	<i>Amblyptilia</i>	<i>acanthodactyla</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden
Federgeistchen-Art	<i>Stenoptilia</i>	<i>pterodactyla</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Skabiosen-Federgeistchen	<i>Stenoptilia</i>	<i>bipunctidactyla</i>	1995	2007	3 F 4 E	häufig gefunden
Schlehengeistchen, Winden-Federgeistchen	<i>Pterophorus</i>	<i>pentadactylus</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Federgeistchen-Art	<i>Emmelina</i>	<i>monodactyla</i>	1995	2005	3 F 4 E	mässig häufig gefunden
Zünsler-Art	<i>Synaphe</i>	<i>punctalis</i>	1995	2005	8 F 8 E	häufig gefunden
Fruchtzünsler-Art	<i>Oncocera</i>	<i>semirubella</i>	1995	2005	1 F 2 E Kiesgrube Hard	sehr häufig gefunden
Fruchtzünsler-Art	<i>Acrobasis</i>	<i>consociella</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus, bisher einziger Fund in der Region,	erst ein Mal gefunden
Rispengraszünsler	<i>Chrysoteuchia</i>	<i>culmella</i>	1995	2005	26 F 38 E	sehr häufig gefunden
Graszünsler-Art	<i>Crambus</i>	<i>pascuellus</i>	1995	2005	6 F 7 E	mässig häufig gefunden
Graszünsler-Art	<i>Crambus</i>	<i>lathoniellus</i>	1995	2005	20 F 33 E	sehr häufig gefunden
Weisser Graszünsler	<i>Crambus</i>	<i>perlellus</i>	1995	2005	24 F 30 E	sehr häufig gefunden
Graszünsler-Art	<i>Agriphila</i>	<i>tristella</i>	1995	2011	23 F 37 E	sehr häufig gefunden
Graszünsler-Art	<i>Agriphila</i>	<i>inquinatella</i>	1995	2005	15 F 15 E	sehr häufig gefunden
Graszünsler-Art	<i>Agriphila</i>	<i>straminella</i>	1995	2006	32 F 55 E	sehr häufig gefunden
Graszünsler-Art	<i>Agriphila</i>	<i>geniculea</i>	1995	2005	5 F 5 E	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Graszünsler-Art	<i>Catoptria</i>	<i>falsella</i>	2005	2005	2 F 2 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Engelberg, Baumhecke Mitte	wenig häufig gefunden
Graszünsler-Art	<i>Pediasia</i>	<i>luteella</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächl. und Waldrand Rüti /Ischlegli, bisher einziger Fund in der Region,	erst ein Mal gefunden
Seerosenzünsler	<i>Elophila</i>	<i>nymphaeata</i>	1995	2005	4 F 8 E	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, hier oft in grosser Zahl
Wasserlinsenzünsler	<i>Cataclysta</i>	<i>lemnata</i>	1995	1995	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt	an stehenden Gewässern wenig häufig, aber hier oft in sehr grosser Zahl
Zünsler-Art	<i>Scoparia</i>	<i>subfusca zelleri</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard	selten gefunden
Zünsler-Art	<i>Evergestis</i>	<i>pallidata</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggelisberg	wenig häufig gefunden
Goldzünsler	<i>Pyrausta</i>	<i>aurata</i>	1995	2005	1 F 2 E Wiesenstreifen Schützenhaus	häufig gefunden
Purpurroter Zünsler	<i>Pyrausta</i>	<i>purpuralis</i>	1995	2005	15 F 21 E	sehr häufig gefunden
Olivbrauner Zünsler	<i>Pyrausta</i>	<i>despicata</i>	1995	2005	12 F 15 E	sehr häufig gefunden
Zünsler-Art	<i>Microstega</i>	<i>pandalis</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Obere Ei	häufig gefunden
Zünsler-Art	<i>Microstega</i>	<i>hyalinata</i>	1995	2005	5 F 6 E	häufig gefunden
Maiszünsler	<i>Ostrinia</i>	<i>nubilalis</i>	2005	2005	2 F 2 E Wiese Schuhfabrik Hug und Waldrand Schwizeracher	mässig häufig gefunden
Brennesselzünsler	<i>Eurrhynx</i>	<i>hortulata</i>	1995	2005	5 F 5 E	mässig häufig gefunden
Brennessel-Zünsler	<i>Phlyctaenia</i>	<i>coronata</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost, einziger Fund in der Reg.!	erst ein Mal gefunden
Zünsler-Art	<i>Udea</i>	<i>prunalis</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	wenig häufig gefunden
Zünsler-Art	<i>Udea</i>	<i>ferrugalis</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden, besonders im Herbst
Wanderzünsler	<i>Nomophila</i>	<i>noctuella</i>	1995	2006	2 F 3 E Kiesgrube Hard und Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	sehr häufiger Wanderfalter
Zünsler-Art	<i>Pleuroptya</i>	<i>ruralis</i>	2005	2006	8 F 9 E	häufig gefunden, besonders an Brennnesseln
Waldreben-Fensterschwärmerchen	<i>Thyris</i>	<i>fenestrella</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Hummelschwärmer	<i>Hemaris</i>	<i>fuciformis</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard	wenig häufig gefunden
Taubenschwänzchen	<i>Macroglossum</i>	<i>stellatarum</i>	1990	2011	5 F 16 E	am Tag sehr häufig gefunden, Wanderfalter

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
						Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Taubenschwänzchen	<i>Macroglossum</i>	<i>stellatarum</i>	1995	2006	8 F 11 E		am Tag sehr häufig gefunden, Wanderfalter
Nagelfleck	<i>Agria</i>	<i>tau</i>	1979	2005	5 F 6 E		am Tag häufig gefunden
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	<i>Thymelicus</i>	<i>sylvestris</i>	1995	2005	2 F 3 E Kiesgrube Hard und Baumhecke Täli Nordost		sehr häufig gefunden
Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter	<i>Thymelicus</i>	<i>lineola</i>	1995	1995	5 F 8 E		häufig gefunden
Mattfleckiger Kommafalter	<i>Ochlodes</i>	<i>venata</i>	1995	2005	14 F 21 E		sehr häufig gefunden
Dunkler Dickkopffalter	<i>Erynnis</i>	<i>tages</i>	1995	2007	2 F 2 E Quellgerinne Rüti und Engelberg, Magerwiese West		sehr häufig gefunden
Malven-Dickkopffalter, Eibischfalter	<i>Carcharodus</i>	<i>alceae</i>	2005	2005	2 F 2 E Baumhecke Engelberg-Felli und Wiese Schäfer		mässig häufig gefunden, galt Ende des letzten Jahrhunderts als "vom Aussterben bedroht"
Kleiner Nördlicher Würfelfalter	<i>Pyrgus</i>	<i>malvae</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Büchs beim Franziskushaus (incl. Weiher)		häufig gefunden
Schwalbenschwanz	<i>Papilio</i>	<i>machaon</i>	1990	2011	8 F 21 E		sehr häufig gefunden
Schwalbenschwanz	<i>Papilio</i>	<i>machaon</i>	1995	2006	6 F 9 E		sehr häufig gefunden
Weissling Familie	(<i>Pieridae</i>)	<i>non det.</i>	1995	2007	48 F 203 E		sehr häufig gefunden
Tintenfleckweissling- Komplex	<i>Leptidea</i>	<i>sinapis-Komplex</i>	1995	2005	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Wiese Büchs beim Franziskushaus (incl. Weiher)		sehr häufig gefunden
Grosser Kohlweissling	<i>Pieris</i>	<i>brassicae</i>	1995	2005	11 F 19 E		sehr häufig gefunden
Kleiner Kohlweissling	<i>Pieris</i>	<i>rapae</i>	1995	2005	30 F 60 E		sehr häufig gefunden
Grünaderweissling, Rapsweissling	<i>Pieris</i>	<i>napi</i>	1995	2007	36 F 98 E		sehr häufig gefunden
Aurorafalter	<i>Anthocaris</i>	<i>cardamines</i>	1995	2005	17 F 27 E		sehr häufig gefunden
Zitronenfalter	<i>Gonepteryx</i>	<i>rhamni</i>	1990	2012	9 F 32 E		sehr häufig gefunden
Zitronenfalter	<i>Gonepteryx</i>	<i>rhamni</i>	1995	2005	6 F 7 E		sehr häufig gefunden
Kleiner Eisvogel	<i>Limenitis</i>	<i>camilla</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost		häufig gefunden
Grosser Fuchs	<i>Nymphalis</i>	<i>polychloros</i>	2005	2005	2 F 2 E Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Engelberg-Felli, Waldrand West		mässig häufig gefunden
Tagpfauenauge	<i>Inachis</i>	<i>io</i>	1991	2011	8 F 26 E		sehr häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Tagpfauenauge	<i>Inachis</i>	<i>io</i>	1995	2005	12 F 18 E	sehr häufig gefunden
Admiral	<i>Vanessa</i>	<i>atalanta</i>	1995	2006	18 F 21 E	sehr häufig gefunden
Distelfalter	<i>Vanessa</i> = <i>Cynthia</i>	<i>cardui</i>	1995	1995	6 F 6 E	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich
Kleiner Fuchs	<i>Aglais</i>	<i>urticae</i>	1995	2005	25 F 45 E	sehr häufig gefunden
C-Falter	<i>Polygonia</i>	<i>c-album</i>	1995	2005	10 F 15 E	häufig gefunden
Landkärtchen	<i>Araschnia</i>	<i>levana</i>	2005	2005	4 F 4 E	häufig gefunden
Kaisermantel	<i>Argynnis</i>	<i>paphia</i>	1995	2011	2 F 3 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Weiher Täli Rüti / Leimgruben	sehr häufig gefunden
Veilchen- Perlmutterfalter	<i>Boloria</i> = <i>Clossiana</i>	<i>euphrosyne</i>	2005	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand West und Engelberg, Baumhecke Südost	häufig gefunden
Schachbrettfalter	<i>Melanargia</i>	<i>galathea</i>	1995	2007	4 F 6 E	sehr häufig gefunden
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	<i>Maniola</i>	<i>jurtina</i>	1995	2011	33 F 57 E	sehr häufig gefunden
Brauner Waldvogel	<i>Aphantopus</i>	<i>hyperantus</i>	1995	2005	21 F 36 E	sehr häufig gefunden
Kleines Wiesenvögelchen	<i>Coenonympha</i>	<i>pamphilus</i>	1995	2007	10 F 14 E	sehr häufig gefunden
Waldbrettspiel, Laubfalter	<i>Pararge</i>	<i>aegeria</i>	1995	2005	21 F 39 E	im Wald sehr häufig gefunden
Mauerfuchs	<i>Lasiommata</i>	<i>megera</i>	2005	2005	6 F 10 E	sehr häufig gefunden
Kleiner Feuerfalter	<i>Lycaena</i>	<i>phlaeas</i>	2007	2007	1 F 1 E Engelberg, Magerwiese West	häufig gefunden
Brauner Feuerfalter	<i>Lycaena</i>	<i>tityrus</i>	1995	2011	5 F 5 E	sehr häufig gefunden
Faulbaum-Bläuling	<i>Celastrina</i>	<i>argiolus</i>	1995	2005	4 F 4 E	häufig gefunden
Violetter Wald-Bläuling	<i>Polyommatus</i> = <i>Cyaniris</i>	<i>semiargus</i>	1986	2005	10 F 12 E	sehr häufig gefunden
Himmelblauer Bläuling	<i>Polyommatus</i> = <i>Lysandra</i>	<i>bellargus</i>	2005	2007	2 F 4 E Engelberg, Magerwiese West und Engelberg, Baumhecke Mitte	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume
Hauhechel-Bläuling	<i>Polyommatus</i>	<i>icarus</i>	1995	2011	23 F 52 E	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen
Schwarzrandspanner	<i>Lomaspilis</i>	<i>marginata</i>	1995	2005	4 F 5 E	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
						Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Spindelbaum-Harlekin	<i>Ligdia</i>	<i>adustata</i>	2005	2005	1 F 1 E	Auenwald an der Aare	am Tag wenig häufig gefunden
Gitterspanner	<i>Chiasmia</i> = <i>Semiothisa</i>	<i>clathrata</i>	1995	2007	10 F 15 E		auch am Tag sehr häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Cepphis</i>	<i>advenaria</i>	1995	1995	1 F 1 E	Dorfbach	wenig häufig gefunden
Gelbspanner	<i>Opisthograptis</i>	<i>luteolata</i>	1995	2005	2 F 2 E	Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli und Engelberg, Baumhecke	am Tag wenig häufig gefunden
Mondfleckspanner	<i>Selenia</i>	<i>tetralunaria</i>	1995	1995	1 F 1 E	Auenwald und Kiesbänke an der Aare	am Tag wenig häufig gefunden
Braunmarmorierter Baumspanner	<i>Alcis</i>	<i>repandata</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg, Wiese Nord	wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Ectropis</i>	<i>crepuscularia</i> = <i>bistortata</i>	1995	1995	1 F 1 E	Auenwald und Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden
Heidespanner	<i>Ematurga</i>	<i>atomaria</i>	1995	2005	3 F 3 E		am Tag sehr häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Cabera</i>	<i>exanthemata</i>	1995	2005	8 F 13 E		auch am Tag häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Lomographa</i>	<i>bimaculata</i>	2005	2005	1 F 1 E	Waldrand Boniger	wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Campaea</i>	<i>margaritata</i>	1995	2005	2 F 2 E	Dorfbach und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	am Tag mässig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Scopula</i>	<i>immorata</i>	1995	2007	6 F 12 E		am Tag sehr häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Scopula</i>	<i>nigropunctata</i>	1995	1995	3 F 4 E		am Tag mässig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Scopula</i>	<i>ornata</i>	1995	2005	2 F 2 E	Wiesenstreifen Schützenhaus und Engelberg, Baumhecke Mitte	am Tag häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Scopula</i>	<i>immutata</i>	2005	2007	7 F 8 E		am Tag häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Idaea</i>	<i>biselata</i>	1995	1995	2 F 2 E	Bächl. und Waldrand Rüti /Ischlegli und Wiese Büchs beim Franziskushaus	am Tag wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Idaea</i>	<i>fuscovenosa</i>	1995	1995	1 F 1 E	Wiesenstreifen Schützenhaus	am Tag wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Idaea</i>	<i>humiliata</i>	1995	2005	2 F 3 E	Kiesgrube Hard und Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	am Tag häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Cyclophora</i>	<i>linearia</i>	1995	2005	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	am Tag wenig häufig gefunden
Ampferspanner	<i>Timandra</i> = <i>Calothyranis</i>	<i>comae</i> = <i>griseata</i>	1995	2005	5 F 5 E		am Tag mässig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Epirrhoe</i>	<i>alternata</i>	1995	2011	21 F 35 E		am Tag sehr häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen			Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Löwenzahnspanner	<i>Camptogramma</i>	<i>bilineata</i>	1995	2011	17 F 21 E		am Tag sehr häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Eulithis</i>	<i>pyraliata</i>	1995	1995	2 F 2 E Baumhecke Leimgruben und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Ecliptopera</i>	<i>silaceata</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Weissgrauer Blattspanner	<i>Chloroclysta</i>	<i>truncata</i>	1995	1995	1 F 1 E Dorfbach		am Tag wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Colostygia</i>	<i>olivata</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost		wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Colostygia</i>	<i>pectinataria</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		am Tag wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Melanthia</i>	<i>procellata</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare		am Tag wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Philereme</i>	<i>vetulata</i>	1995	1995	2 F 2 E Dorfbach und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		wenig häufig gefunden
Kleiner Frostspanner	<i>Operophtera</i>	<i>brumata</i>	1990	2010	1 F 9 E in der Wohnung und am Haus Hasenweid		am Tag wnicg häufig gefunden, vor allem im Siedlungsraum und im Spätherbst
Spanner-Art	<i>Perizoma</i>	<i>alchemillata</i>	2005	2005	1 F 1 E Dorfbach		am Tag seltengefunden
Spanner-Art	<i>Perizoma</i>	<i>parallelolineata</i>	1995	1995	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli		am Tag selten gefunden
Rotgebänderter Blütenspanner	<i>Gymnoscelis</i>	<i>rufifasciata</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		am Tag wenig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Asthena</i>	<i>albulata</i>	1995	2005	3 F 4 E		am Tag mässig häufig gefunden
Spanner-Art	<i>Nothocasis</i>	<i>sertata</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost		am Tag wenig häufig gefunden
Rosenmotte	<i>Miltochrista</i>	<i>miniata</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli		am Tag wenig häufig gefunden
Laubholz-Flechtenbär	<i>Eilema</i>	<i>lurideola</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West		am Tag mässig häufig gefunden
Frühlings-Flechtenbär	<i>Eilema</i>	<i>sororcula</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		am Tag wenig häufig gefunden
Rostbär, Zimtbär	<i>Phragmatobia</i>	<i>fuliginosa</i>	2005	2005	2 F 2 E Wiese Schuhfabrik Hug und Wiese Büchs beim Franziskushaus (incl. Weiher)		am Tag wenig häufig gefunden
Weisse Tigermotte	<i>Spilosoma</i>	<i>lubricipeda</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West		am Tag wenig häufig gefunden
Rotrandbär	<i>Diacrisia</i>	<i>sannio</i>	2005	2005	5 F 5 E		am Tag häufig gefunden
Jakobskrautbär, Blutbär	<i>Tyria</i>	<i>jacobeae</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard		selten gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Pfeileule	<i>Acronicta</i>	<i>psi</i>	1995	1995	2 F 2 E Baumhecke Täli Nordost und Engelberg, Baumhecke Nord		am Tag selten gefunden
Ampfereule	<i>Acronicta</i>	<i>rumicis</i>	1995	1995	3 F 3 E		Raupen mässig häufig gefunden
Palpeneulen-Art	<i>Herminia</i>	<i>tarsicrinalis</i>	1995	1995	1 F 1 E Dorfbach		am Tag wenig häufig gefunden
Braune Tageule	<i>Euclidia</i> = <i>Ectypa</i>	<i>glyphica</i>	1995	2007	16 F 36 E		am Tag sehr häufig gefunden
Eulenfalter-Art	<i>Laspeyria</i>	<i>flexula</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Schwizeracher		am Tag selten gefunden
Seideneulchen	<i>Rivula</i>	<i>sericealis</i>	1995	2005	10 15 E		am Tag häufig gefunden
Eulenfalter-Art	<i>Hypena</i>	<i>proboscidalis</i>	2005	2005	3 F 3 E		am Tag wenig häufig gefunden
Eulenfalter-Art	<i>Macdunnoughia</i>	<i>confusa</i>	1995	2005	5 F 5 E		am Tag häufig gefunden
Gammaeule	<i>Autographa</i>	<i>gamma</i>	1995	2006	22 F 33 E		am Tag sehr häufig gefunden
Eulenfalter-Art	<i>Protodeltode</i> = <i>Lithacodia</i>	<i>pygarga</i>	2005	2005	1 F 1 E Quellgerinne Rüti		wenig häufig gefunden
Grünlichgraue Spannereule	<i>Trisateles</i>	<i>emortualis</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare		am Tag wenig häufig gefunden
Möndcheneule	<i>Calophasia</i>	<i>lunula</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Eulenfalter-Art	<i>Panemeria</i>	<i>tenebrata</i>	1995	2005	14 F 17 E		am Tag häufig gefunden
Violettbraune Ulmeneule	<i>Cosmia</i>	<i>pyralina</i>	1995	1995	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli, einer von zwei Funden in der Region!		erst zwei Mal gefunden
Weissrandige Erdeule	<i>Ochropleura</i>	<i>plecta</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost		am Tag selten gefunden
Hausmutter	<i>Noctua</i>	<i>pronuba</i>	1995	2006	2 F 2 E Kiesgrube Hard und Ruderalgelände Schuhfabrik Hug		am Tag wenig häufig gefunden
Eulenfalter-Art	<i>Noctua</i>	<i>interjecta</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest, einziger Fund in der Reg.!		erst ein Mal gefunden
Gemeine Graseule	<i>Agrotis</i>	<i>exclamationis</i>	1995	1995	2 F 2 E Dorfbach und Baumhecke Engelberg-Felli		am Tag mässig häufig gefunden
Alpen-Skorpionsfliege	<i>Panorpa</i>	<i>alpina</i>	1995	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Skorpionsfliegen-Art	<i>Panorpa</i>	<i>cognata</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Obere Ei		selten gefunden
Deutsche Skorpionsfliege	<i>Panorpa</i>	<i>germanica</i>	1995	2011	18 F 33 E		sehr häufig gefunden

			erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Gewöhnliche Skorpionsfliege	<i>Panorpa</i>	<i>communis</i>	1995	2005	16 F 21 E		sehr häufig gefunden
Skorpionsfliege (nicht genau bestimmt)	<i>Panorpa</i>	<i>vulgaris cf. communis</i>	1995	1995	15 F 20 E		sehr häufig gefunden
Gemeine Skorpionsfliege	<i>Panorpa</i>	<i>vulgaris</i>	1995	2011	18 F 30 E		sehr häufig gefunden
Zweiflügler			1995				
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Yamatotipula</i>	<i>lateralis</i>	1995	2005	8 F 14 E		häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Yamatotipula</i>	<i>pruinosa</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest		wenig häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Acutipula</i>	<i>fulvipennis</i>	1995	1995	1 F 1 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben		wenig häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Acutipula</i>	<i>luna</i>	1995	2005	5 f 5 E		häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Acutipula</i>	<i>maxima</i>	1995	2005	6 F 11 E		häufig gefunden
Kohlschnake	<i>Tipula U.g. Tipula s.str.</i>	<i>oleracea</i>	1995	1995	14 F 17 E		häufig gefunden
Gemeine Wiesenschnake	<i>Tipula U.g. Tipula s.str.</i>	<i>paludosa</i>	1995	2005	35 F 64 E		sehr häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Savtshenkia</i>	<i>confusa</i>	1995	1995	3 F 3 E		selten gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Savtshenkia</i>	<i>obsoleta</i>	1995	2005	9 F 11 E		wenig häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Pterelachisus</i>	<i>neurotica</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		mässig häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Pterelachisus</i>	<i>pseudovariipennis</i>	1995	1995	2 F 2 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare und Engelberg, Baumhecke Südost		wenig häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Pterelachisus</i>	<i>submarmorata</i>	1995	2005	4 f 4 E		wenig häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Pterelachisus</i>	<i>varipennis</i>	1995	1995	3 F 3 E		häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Vestiplex</i>	<i>scripta</i>	1995	2005	4 F 4 E		wenig häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Lunatipula</i>	<i>fascipennis</i>	1995	2005	5 F 7 E		mässig häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Lunatipula</i>	<i>helvola</i>	1995	2005	7 F 8 E		mässig häufig gefunden
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Lunatipula</i>	<i>lunata</i>	1995	2005	9 F 11 E		mässig häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region	
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Lunatipula</i>	<i>vernalis</i>	1995	2005	33 F 50 E	sehr häufig gefunden	
Schnaken-Art	<i>Tipula Ug. Dendrotipula</i>	<i>flavolineata</i>	1995	2005	3 F 4 E	wenig häufig gefunden	
Krähenschnaken-Art	<i>Nephrotoma</i>	<i>appendiculata</i>	1995	2005	25 F 32 E	häufig gefunden	
Krähenschnaken-Art	<i>Nephrotoma</i>	<i>cornicina</i>	1995	2005	8 F 9 E	mässig häufig gefunden	
Krähenschnaken-Art	<i>Nephrotoma</i>	<i>flavescens</i>	1995	2005	19 F 22 E	sehr häufig gefunden	
Krähenschnaken-Art	<i>Nephrotoma</i>	<i>quadrifaria</i>	1995	2005	5 F 6 E	wenig häufig gefunden	
Krähenschnaken-Art	<i>Nephrotoma</i>	<i>scurra</i>	1995	2005	2 F 3 E Kiesgrube Hard und Kiesbänke an der Aare	wenig häufig gefunden, vor allem in Kiesgruben	
Kammschnaken-Art	<i>Dictenidia</i>	<i>bimaculata</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz als selten	
Stelzmücke Familie	<i>(Limoniidae)</i>	<i>non det.</i>	1995	1995	5 F 5 E	sehr häufig gefunden	
Stelzmücke Unterfamilie	<i>(Chioneinae = Eriopterinae)</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest	wenig häufig gefunden, weil oft nicht registriert	
Stelzmücke Unterfamilie	<i>(Limnophilinae = Hexatominiae)</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	9 F 10 E	häufig gefunden	
Stelzmücken-Art	<i>Epiphragma</i>	<i>ocellare</i>	1995	2005	4 F 4 E	mässig häufig gefunden	
Stelzmücken-Art	<i>Dicranomyia</i>	<i>mitis</i>	1991	1998	3 F 3 E	mässig häufig nachgewiesen, vermutlich sehr häufig	
Stelzmücken-Art	<i>Dicranomyia</i>	<i>mitis</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg, Baumhecke Südost und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	mässig häufig nachgewiesen, vermutlich sehr häufig	
Stelzmücken-Art	<i>Dicranomyia</i>	<i>modesta</i>	1995	1995	7 F 8 E	mässig häufig gefunden	
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>dilutior</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest, einziger Fund in der Reg.!	erst ein Mal gefunden	
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>flavipes</i>	1995	1995	3 F 3 E	mässig häufig gefunden	
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>hercegovinae</i>	1995	2005	8 F 8 E	mässig häufig nachgewiesen, vermutlich häufig	
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>nigropunctata</i>	1995	2005	7 F 7 E	mässig häufig gefunden	
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>nubeculosa</i>	1995	2005	2 F 3 E Bächlein beim Franziskushaus und Auenwald an der Aare (ohne Kiesbänke)	mässig häufig gefunden	
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>phragmitidis = tripunctata</i>	1995	2005	13 F 15 E	häufig nachgewiesen, vermutlich sehr häufig	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	Bemerkungen zur Art in der Region
Stelzmücken-Art	<i>Rhipidia</i>	<i>maculata</i>	1991	2007	2 F 2 E Weide Ruttigen (beim Lichtfang) und Wohnung Hasenweid	wenig häufig gefunden
Stelzmücken-Art	<i>Pedicia</i>	<i>litoralis</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald an der Aare (ohne Kiesbänke)	wenig häufig gefunden
Stelzmücken-Art	<i>Tricyphona</i>	<i>schummeli</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg, einer von zwei Funden in der Region, aber nicht sicher	erst zwei Mal gefunden
Faltenmücke Gattung	<i>Ptychoptera</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	4 f 5 E	mässig häufig gefunden
Faltenmücken-Art	<i>Ptychoptera</i>	<i>albimana</i>	2005	2005	1 F 1 E Naturnahe Anlage Neumatt	wenig häufig gefunden
Faltenmücken-Art	<i>Ptychoptera</i>	<i>lacustris</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	selten gefunden
Stechmücke Gattung	<i>Culex</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	6 F 6 E	mässig häufig gefunden
Kriebelmücke Familie	<i>(Simuliidae)</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	23 F 27 E	sehr häufig gefunden
Pilzmücke Gattung	<i>Orphelia</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	selten gefunden
Trauermücken-Art	<i>Sciara</i>	<i>hemerobioides = thomae</i>	2005	2005	1 F 1 E Feldgehölz Engelberg-Felli	mässig häufig gefunden
Buchenblatt-Gallmücke	<i>Mikiola</i>	<i>fagi (Gallen)</i>	1995	2011	3 F 3 E	Gallen häufig gefunden
Haarmücken-Art	<i>Bibio</i>	<i>clavipes</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Haarmücken-Art	<i>Bibio</i>	<i>hortulanus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West, einer von drei Funden in der Region!	selten gefunden
Johannismücke	<i>Bibio</i>	<i>johannis</i>	1995	2005	7 F 10 E	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl
Haarmücken-Art	<i>Bibio</i>	<i>leucopterus</i>	2005	2005	2 F 2 E Waldrand Boniger und Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Märzmücke	<i>Bibio</i>	<i>marci</i>	1995	2005	20 F 23 E	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl
Haarmücken-Art	<i>Bibio</i>	<i>reticulatus</i>	2005	2005	2 F 2 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Engelberg-Felli, Waldrand West	selten gefunden
Haarmücken-Art	<i>Bibio</i>	<i>varipes</i>	1995	2005	7 F 8 E	mässig häufig gefunden
Schnepfenfliegen-Art	<i>Rhagio</i>	<i>vitripennis</i>	1995	2005	8 F 9 E	häufig gefunden
Schnepfenfliegen-Art	<i>Rhagio</i>	<i>strigosus</i>	1995	1995	2 F 2 E Waldrand Boniger und Engelberg, Baumhecke Südost	wenig häufig gefunden
Schnepfenfliegen-Art	<i>Rhagio</i>	<i>scolopaceus</i>	1995	2005	7 F 7 E	mässig häufig gefunden

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schnepfenfliegen-Art	<i>Rhagio</i>	<i>maculatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Schnepfenfliegen-Art	<i>Rhagio</i>	<i>tringarius</i>	1995	2005	4 F 5 E	mässig häufig gefunden
Schnepfenfliegen-Art	<i>Chrysopilus</i>	<i>auratus</i>	1995	2005	10 F 14 E	mässig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Beris</i>	<i>chalybata</i>	1995	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Chorisops</i>	<i>nagatomii</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Boniger, bisher einziger Fund in der Region!	erst ein Mal gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Chloromyia</i>	<i>formosa</i>	1995	2005	27 F 37 E	häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Microchrysa</i>	<i>polita</i>	1995	2005	2 F 2 E Quellgerinne Rüti und Bächlein Niggelisberg	wenig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Microchrysa</i>	<i>flavicornis</i>	1995	1995	1 F 1 E Dorfbach, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Sargus</i>	<i>bipunctatus</i>	1989	2010	3 F 12 E	mässig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Sargus</i>	<i>bipunctatus</i>	1995	2005	3 F 4 E	mässig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Sargus</i>	<i>iridatus</i>	1990	1990	1 F 1 E am Fenster der Wohnung Hasenweid	mässig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Sargus</i>	<i>iridatus</i>	1995	1995	2 F 2 E Dorfbach und Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	mässig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	<i>Odontomyia</i>	<i>argentata</i>	1995	1995	2 F 2 E Leimgruben, Bächlein Nordost und Weiher Täli Rüti / Leimgruben	selten gefunden
Bremsen-Art	<i>Silvius</i>	<i>alpinus</i>	1995	2005	5 F 5 E	wenig häufig gefunden
Regenbremsen-Art	<i>Haematopota = Chrysozona</i>	<i>pluvialis</i>	1995	2005	25 F 44 E	sehr häufig gefunden
Bremsen-Art	<i>Hybomitra</i>	<i>bimaculata</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggelisberg, einer von drei Fundorten in der Region!	
Bremsen-Art	<i>Tabanus</i>	<i>bromius</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Schwizeracher	häufig gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Choerades</i>	<i>fimbriata</i>	1995	2005	4 F 5 E	häufig gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Choerades</i>	<i>marginata</i>	1995	2005	5 F 6 E	mässig häufig gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Dioctria</i>	<i>baumhaueri</i>	1995	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Dioctria</i>	<i>linearis</i>	1995	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Raubfliegen-Art	<i>Dioctria</i>	<i>rufipes</i>	1995	2005	9 F 14 E	häufig gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Leptogaster</i>	<i>cylindrica</i>	1995	1995	2 F 3 E Engelberg, Magerwiese West und Wiese Sandrain	häufig gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Leptogaster</i>	<i>guttiventris</i>	2005	2005	1 F 1 E Auenwald an der Aare, einer von zwei Funden in der Region	erst zwei Mal gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Eutolmus</i>	<i>rufibarbis</i>	1995	2005	11 F 14 E	mässig häufig gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Neoitamus</i>	<i>cyanurus</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggelisberg	wenig häufig gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Paritamus</i>	<i>geniculatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Dorfbach	wenig häufig gefunden
Raubfliegen-Art	<i>Tolmerus</i>	<i>atricapillus</i>	1995	2005	8 F 11 E	häufig gefunden
Wollschweber Gattung	<i>Bombylius</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	2 F 2 E Wiesenstreifen Schützenhaus und Wiese Hardstrasse	sehr häufig gefunden
Wollschweber-Art	<i>Bombylius</i>	<i>major</i>	1995	2005	20 F 29 E	sehr häufig gefunden
Wollschweber-Art	<i>Bombylius</i>	<i>discolor</i>	1995	2005	5 F 5 E	häufig gefunden
Wollschweber-Art	<i>Bombylius</i>	<i>cinerascens</i>	1995	2005	6 F 6 E	mässig häufig gefunden
Trauersschweber Gattung	<i>Villa</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli	häufig gefunden
Trauersschweber-Art	<i>Villa</i>	<i>cingulata</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Mitte	häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Platypalpus</i>	<i>cruralis</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Tanzfliege Gattung	<i>Empis</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord	sehr häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Empis</i>	<i>nigripes</i>	1995	1995	1 F 1 E Leimgruben, Bächlein Südwest	wenig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Empis</i>	<i>nuntia</i>	2005	2005	1 F 1 E Dorfbach	wenig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Empis</i>	<i>pennipes</i>	1995	2005	4 F 5 E	mässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Empis</i>	<i>pseudonuntia</i>	1995	2005	7 F 9 E	häufig gefundenmässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Empis (Eue.)</i>	<i>ciliata</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Empis (Eue.)</i>	<i>tesselata</i>	1995	2005	25 F 37 E	sehr häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Tanzfliegen-Art	<i>Empis (Krite.) livida</i>	1995	2005	25 F 32 E		häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Empis (Xant.) lutea</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein beim Franziskushaus		wenig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Empis (Xant.) stercorea</i>	1995	2005	8 F 8 E		mässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Empis (Xant.) trigramma</i>	1995	2005	6 F 6 E		häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Hilara brevistyla</i>	1991	1991	1 F 1 E in der Wohnung, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Hilara lurida</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein beim Franziskus- haus, einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Hilara nitidula</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Leimgruben, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Rhamphomyia sulcata</i>	1995	2005	2 F 3 E Engelberg, Baumhecke Südost und Waldrand Engelberg-Schürli Ost		mässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Rhamphomyia sulcatina</i>	1995	2005	2 F 2 E Waldrand Schwizeracher und Dorfbach		mässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	<i>Rhamphomyia crassirostris</i>	1995	2005	4 F 5 E		mässig häufig gefunden, lokal oft in grosser Zahl
Langbeinfliege Familie	(<i>Dolichopodidae</i>) <i>non det.</i>	1995	2005	5 F 6 E		häufig gefunden
Langbeinfliegen-Art	<i>Chrysotus blepharosceles</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost, einer von drei Funden in der Region!, aber unsicher		selten gefunden
Langbeinfliegen-Art	<i>Chrysotus laesus</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg		selten gefunden
Langbeinfliegen-Art	<i>Dolichopus trivialis</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Nord		mässig häufig gefunden
Langbeinfliegen-Art	<i>Dolichopus unguatus</i>	1995	2005	10 F 12 E		mässig häufig gefunden
Langbeinfliegen-Art	<i>Rhaphium commune</i>	1995	2005	3 F 3 E		wenig häufig gefunden
Langbeinfliegen-Art	<i>Rhaphium crassipes</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost		selten gefunden
Gestreifte Waldschwebfliege Waldschneisenschwebfliege	<i>Dasysyrphus albostratus</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese beim Gemeindehaus		mässig häufig gefunden
Gemeine Waldschneisenschwebfliege	<i>Dasysyrphus venustus</i>	2005	2005	2 F 2 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost und Engelberg-Felli, Waldrand West		mässig häufig gefunden
Gelbe Breitbauschwebfliege	<i>Didea fasciata</i>	1995	1995	2 F 2 E Waldrand Boniger und Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig gefunden
Grosse Breitbauschwebfliege	<i>Didea = Megasyrphus erratica</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Blasenkopfschwebfliege Europäische	<i>Doros</i>	<i>profuges</i>	1995	1995	1 F 1 E	Bächlein beim Franziskushaus	wenig häufig gefunden
Zweiband-Wiesenschwebfliege, Zweiband-Heckenschwebfliege	<i>Epistrophe</i>	<i>eligans</i>	1995	2005	6 F 6 E		mässig häufig gefunden
Grosse Wiesenschwebfliege, Grosse Heckenschwebfliege	<i>Epistrophe</i>	<i>grossulariae</i>	1995	1995	2 F 2 E	Engelberg, Magerwiese West und Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	häufig gefunden
Gelbhaarige Wiesenschwebfliege Schwarzmund-Heckenschwebfliege	<i>Epistrophe</i>	<i>melanostoma</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden
Wiesenschwebfliegen-Art	<i>Epistrophe</i>	<i>flava</i> = <i>melanostomoides</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg, Wiese Ost	wenig häufig gefunden
Schwarzhaarige Wiesenschwebfliege	<i>Epistrophe</i>	<i>nitidicollis</i>	2005	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	<i>Episyrphus</i>	<i>balteatus</i>	1995	2005	42 F 126 E		sehr häufig gefunden
Gemeine Feldschwebfliege	<i>Eupeodes</i>	<i>corollae</i>	1995	2005	8 F 9 E		häufig gefunden
Breitband-Feldschwebfliege	<i>Eupeodes</i>	<i>latifasciatus</i>	1995	2005	1 F 2 E	Engelberg-Felli, Waldrand West	mässig häufig gefunden
Kurze oder Bogenader-Feldschwebfliege	<i>Eupeodes</i>	<i>lapponicus</i>	1990	2011	4 F 6 E		häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark
Kurze oder Bogenader-Feldschwebfliege	<i>Eupeodes</i>	<i>lapponicus</i>	1995	2005	10 F 13 E		häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark
Wald-Weissbandschwebfliege	<i>Leucozona</i>	<i>lucorum</i>	2005	2005	1 F 2 E	Waldrand Boniger	mässig häufig gefunden
Frühe Frühlingsschwebfliege	<i>Melangyna</i>	<i>lasiophthalma</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Gebänderte Frühlingsschwebfliege, Gelbe	<i>Melangyna</i>	<i>cincta</i>	1995	1995	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Gelbhals-Frühlingsschwebfliege, Dreieck-Zartschwebfliege	<i>Meliscaeva</i>	<i>auricollis</i>	1995	1995	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Späte Frühlingsschwebfliege, Gemeine Zartschwebfliege	<i>Meliscaeva</i>	<i>cinctella</i>	1995	1995	5 F 6 E		häufig gefunden
Helle Blattlausschwebfliege, Helle Buschschwebfliege	<i>Parasyrphus</i>	<i>annulatus</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Blattlausschwebfliegen-Art	<i>Parasyrphus</i>	<i>lineolus</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg, Wiese Ost	wenig häufig gefunden
Frühe Blattlausschwebfliege	<i>Parasyrphus</i>	<i>punctulatus</i>	2005	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Späte Grossstirnschwebfliege, Weisse Dickkopfschwebfliege	<i>Scaeva</i>	<i>pyrastris</i>	1995	2005	7 F 10 E		häufig gefunden
Frühe Grossstirnschwebfliege, Gelbe Dickkopfschwebfliege	<i>Scaeva</i>	<i>selenitica</i>	1995	1995	8 F 8 E		häufig gefunden

		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen			Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kugelträger Gattung	<i>Sphaerophoria</i> <i>sp.</i>	1995	2005	5 F 7 E	sehr häufig gefunden	
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebfliege	<i>Sphaerophoria</i> <i>scripta</i>	1995	2007	35 F 82 E	sehr häufig gefunden	
Kugelträger-Art	<i>Sphaerophoria</i> <i>taeniata</i>	1995	1995	5 F 5 E	häufig gefunden	
Grosse Schwebfliege, Gemeine Gartenschwebfliege	<i>Syrphus</i> <i>ribesii</i>	1995	2005	22 F 29 E	sehr häufig gefunden	
Behaarte Schwebfliege, Grosse Gartenschwebfliege	<i>Syrphus</i> <i>torvus</i>	1995	1995	20 F 25 E	häufig gefunden	
Kleine Gartenschwebfliege	<i>Syrphus</i> <i>vitripennis</i>	1995	2005	23 F 29 E	sehr häufig gefunden	
Gelbrandschwebfliege Gattung	<i>Xanthogramma</i> <i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 EDorfbach	häufig gefunden	
Frühe Gelbrandschwebfliege	<i>Xanthogramma</i> <i>festivum</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost	mässig häufig gefunden	
Späte Gelbrandschwebfliege	<i>Xanthogramma</i> <i>pedissequum</i>	1995	2005	10 F 14 E	häufig gefunden	
Gemeine Schattenschwebfliege, Helle Nadelschwebfliege	<i>Baccha</i> <i>elongata</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein beim Franziskushaus	wenig häufig gefunden	
Dunkle Schattenschwebfliege, Dunkle Nadelschwebfliege	<i>Baccha</i> <i>obscuripennis</i>	1995	1995	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost	wenig häufig gefunden	
Zweiband-Wespenschwebfliege	<i>Chrysotoxum</i> <i>bicinctum</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Wiese Mitte	häufig gefunden	
Elegante Wespenschwebfliege	<i>Chrysotoxum</i> <i>elegans</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost	häufig gefunden	
Kahle oder Südliche Wespenschwebfliege	<i>Chrysotoxum</i> <i>intermedium</i>	1995	2005	6 F 6 E	häufig gefunden	
Gemeine Wespenschwebfliege	<i>Chrysotoxum</i> <i>cautum</i>	1995	2005	3 F 3 E	häufig gefunden	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebfliege	<i>Melanostoma</i> <i>mellinum</i>	1990	2011	7 F 23 E	sehr häufig gefunden	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebfliege	<i>Melanostoma</i> <i>mellinum</i>	1995	2007	42 F 101 E	sehr häufig gefunden	
Matte Schwarzkopfschwebfliege, Lange Grasschwebfliege	<i>Melanostoma</i> <i>scalare</i>	1995	2005	17 F 23 E	häufig gefunden	
Graue oder Schwarze Breifussschwebfliege	<i>Platycheirus</i> <i>albimanus</i>	1995	2005	17 F 24 E	häufig gefunden	
Schmale Breitfussschwebfliege	<i>Platycheirus</i> <i>angustatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Schäfer	wenig häufig gefunden	
Gemeine Breitfussschwebfliege	<i>Platycheirus</i> <i>clypeatus</i>	1995	2005	8 F 10 E	häufig gefunden	

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen			Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Europäische Breitfussschwebfliege	<i>Platycheirus</i>	<i>europaeus</i>	1995	2011	4 F 4 E		häufig gefunden
Breitfussschwebfliegen-Art	<i>Platycheirus</i>	<i>parmatus</i>	1995	2005	3 F 5 E		wenig häufig gefunden
Wald-Breitfussschwebfliege	<i>Platycheirus</i>	<i>scutatus</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Wiesenstreifen Schützenhaus		mässig häufig gefunden
Schwebfliegen-Art	<i>Pyrophaena</i>	<i>rosarum</i>	2005	2005	4 F 4 E		wenig häufig gefunden
Schwebfliege Gattung	<i>Paragus</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard		häufig gefunden
Heideschwebfliegen-Art	<i>Paragus</i>	<i>haemorrhous</i>	1995	1995	1 F 1 E Trockenstandort Schäfer, unsicher bestimmt		mässig häufig gefunden
Schwarze Heideschwebfliege	<i>Paragus</i>	<i>tibialis</i>	1995	1995	1 F 1 E Trockenstandort Schäfer		selten gefunden
Schwarze Spitzwinkelschwebfliege	<i>Heringia</i>	<i>heringi</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein Nigglisberg		selten gefunden
Kleinschwebfliege Gattung	<i>Neocnemodon</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig gefunden
Zweifleck-Mondswebfliege, Waldrand-Schwebliiegen-Art	<i>Pipiza</i>	<i>bimaculata</i>	2005	2005	1 F 1 E Wald Hard		wenig häufig gefunden
Zweifleck-Waldrandschwebfliege, Mondswebfliegen-Art	<i>Pipiza</i>	<i>noctiluca</i>	1995	2005	5 F 5 E		mässig häufig gefunden
Gemeine Zwergschwebfliege	<i>Pipizella</i>	<i>viduata</i>	1995	2005	24 F 30 E		sehr häufig gefunden
Gemeine oder Lange Erzswebfliege Variabilis-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>variabilis</i>	1995	2005	5 F 5 E		häufig gefunden
Schwarze Erzswebfliege Imprensa-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>impressa</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Engelberg, Baumhecke Mitte		häufig gefunden
Weissfuss-Erzswebfliege Antigua-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>albitarsis</i>	1995	2005	18 F 21 E		sehr häufig gefunden
Erzswebfliegen-Art Antigua-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>impudens</i>	1995	2005	5 F 6 E		mässig häufig gefunden
Erzswebfliegen-Art Antigua-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>pubera</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig gefunden
Kerbel-Erzswebfliege Pagana-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>pagana</i>	1995	2005	6 F 7 E		häufig gefunden
Trüffel-Erzswebfliege Pagana-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>rufipes = soror</i>	1995	2005	6 F 7 E		häufig gefunden
Pilz-Erzswebfliege Pagana-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>scutellata</i>	1995	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden
Erzswebfliegen-Art Pagana-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>caerulescens</i>	2005	2005	1 F 1 EKiesgrube Hard		wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
						Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Hummel- oder Bunte Erzswebfliege Illustrata-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>illustrata</i>	2005	2005	1 F 1 E	Feldgehölz Engelberg-Felli	mässig häufig gefunden
Bärtige Erzswebfliege Illustrata-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>barbata</i>	1995	1995	1 F 1 E	Trockenstandort Schäfer	mässig häufig gefunden
Gelbfüssige Erzswebfliege wb: Pagana-Gruppe mn:	<i>Cheilosia</i>	<i>flavipes</i>	2005	2005	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Erzswebfliegen-Art Canicularis Gruppe Fraterna-Untergruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>fraterna</i>	1995	1995	1 F 1 E	Bächlein Niggelisberg	wenig häufig gefunden
Erzswebfliegen-Art Proxima-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>aerea</i>	1995	1995	2 F 2 E	Wiesenstreifen Schützenhau und Wiese hinter Recycling AG	wenig häufig gefunden
Frühlings- oder Aster-Erzswebfliege	<i>Cheilosia</i>	<i>vernalis</i>	1995	2005	3 F 3 E		häufig gefunden
Frühe Erzswebfliege Bergenstammi-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>praecox</i>	1995	1995	1 F 1 E	Kiesgrube Hard	mässig häufig gefunden
Gefleckte Erzswebfliege, Gefleckte Lauchschwebfliege	<i>Portevinia</i>	<i>maculata</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig häufig gefunden
Nordische Schnauzenschwebfliege	<i>Rhingia</i>	<i>borealis</i>	1995	1995	1 F 1 E	Waldrand Schwizeracher	selten gefunden
Gemeine Schnauzenschwebfliege,	<i>Rhingia</i>	<i>campestris</i>	1995	2011	25 F 62 E		sehr häufig gefunden
Schwebfliegen-Art	<i>Callicera</i>	<i>aenea</i>	1995	2005	2 F 2 E	Waldrand Boniger und Engelberg, Wiese Ost, 2 von 3 Funden in der Region!	
Gelbfleck-Waldschwebfliege, Zweifleck-Hummelschwebfliege	<i>Volucella</i>	<i>inflata</i>	2005	2005	2 F 2 E	Dorfbach und Engelberg, Baumhecke Südost	wenig häufig gefunden
Gemeine Waldschwebfliege, Gemeine Hummelschwebfliege	<i>Volucella</i>	<i>pellucens</i>	1995	2005	13 F 17 E		häufig gefunden
Baumsaftswebfliegen-Art	<i>Brachyopa</i>	<i>pilosa</i>	2005	2005	1 F 1 E	Dorfbach, einer von zwei Funden in der Region!	erst 2 Mal gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) 2 Fänge
Baumsaftswebfliegen-Art	<i>Brachyopa</i>	<i>vittata</i>	2005	2005	1 F 1 E	Waldrand Engelberg-Schürli Ost	selten gefunden
Gemeine Smaragd- oder Gelbbauch-Schwebfliege	<i>Chrysogaster</i>	<i>solstitialis</i>	1995	2005	5 F 6 E		häufig gefunden
Schwebfliegen-Art	<i>Myolepta</i>	<i>dubia</i> = <i>luteola</i> (Gmelin)	1995	2005	2 F 2 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	wenig häufig gefunden
Schwebfliegen-Art	<i>Orthonevra</i>	<i>nobilis</i>	2005	2005	1 F 1 E	Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	mässig häufig gefunden
Gemeine Keulenschwebfliege	<i>Neoascia</i>	<i>podagrica</i>	2005	2005	2 F 2 E	Baumhecke Engelberg-Felli und Engelberg, Baumhecke Südost	mässig häufig gefunden
Sibirische Taillenschwebfliege	<i>Sphegina</i>	<i>sibirica</i>	1995	1995	1 F 1 E	Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig häufig gefunden
Schwebfliegen-Art	<i>Sphegina</i>	<i>montana</i>	2005	2005	1 F 1 E	Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Hummel-Gebirgsschwebfliege, Gelbe Bärenschwebfliege	<i>Arctophila</i>	<i>bombiformis</i>	1995	1995	1 F 2 E Wiesenstreifen Schützenhaus	mässig häufig gefunden
Grosskopf-Zwiebelschwebfliege	<i>Eumerus</i>	<i>ornatus</i>	1995	2005	8 F 9 E	mässig häufig gefunden
Zwiebelschwebfliegen-Art	<i>Eumerus</i>	<i>tarsalis</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Baumhecke Täli Nordost	wenig häufig gefunden
Höcker-Zwiebelschwebfliege	<i>Eumerus</i>	<i>tuberculatus</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost	mässig häufig gefunden
Narzissenschwebfliegen-Art	<i>Merodon</i>	<i>aberrans</i>	1995	2007	5 F 5 E	wenig häufig gefunden
Gemeine Narzissenschwebfliege, Gemeine Zwiebelschwebfliege	<i>Merodon</i>	<i>equestris</i>	1995	2005	11 F 14 E	häufig gefunden
Narzissenschwebfliege, Bärlauch-Z.	<i>Merodon</i>	<i>ruficornis</i>	2005	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Schwebfliegen-Art	<i>Ceriana</i>	<i>conopsoides</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Büchs beim Franzis- kushaus, einziger Fund in der Reg.!	erst ein Mal gefunden
Matte Faulschlammschwebfliege, Schwarze	<i>Eristalinus</i>	<i>sepulchralis</i>	2005	2007	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Glänzende Faulschlammschwebfliege,	<i>Eristalinus</i>	<i>aeneus</i>	1995	2005	3 F 3 E	mässig häufig gefunden
Kleine Keilfleckschwebfliege, Kleine Bienenschwebfliege	<i>Eristalis</i>	<i>arbustorum</i>	1995	2005	10 F 23 E	sehr häufig gefunden
Keilfleckschwebfliegen-Art	<i>Eristalis</i>	<i>interrupta</i>	1995	2007	13 f 15 E	sehr häufig gefunden
Keilfleckschwebfliegen-Art, Distel-Binenenschwebfliege	<i>Eristalis</i>	<i>jugorum</i>	1995	2005	7 F 7 E	sehr häufig gefunden
Gemeine Keilfleckschwebfliege, Lange Bienenschwebfliege	<i>Eristalis</i>	<i>pertinax</i>	1995	2006	29 F 56 E	sehr häufig gefunden
Grosse "Mistbiene", Wanderer	<i>Eristalis</i>	<i>tenax</i>	1995	2011	45 F 131 E	sehr häufig gefunden
Grosse Sumpfschwebfliege, Grosse Sonnenschwebfliege	<i>Helophilus</i>	<i>parallelus</i>	1995	2005	8 F 12 E	häufig gefunden
Gemeine Sumpfschwebfliege, Gemeine Sonnenschwebfliege	<i>Helophilus</i>	<i>pendulus</i>	1995	2005	11 F 15 E	häufig gefunden
Teichrandschwebfliegen-Art, Haar-Streifenschwebfliege	<i>Parhelophilus</i>	<i>versicolor</i>	1995	2005	2 F 5 E Naturnahe Anlage Neumatt und Feldgehölz Engelberg-Felli	wenig häufig gefunden
Totenkopfschwebfliege	<i>Myathropa</i>	<i>florea</i>	1995	2007	35 F 96 E	sehr häufig gefunden
Gelbhaarige Hummelschwebfliege	<i>Brachymyia</i>	<i>berberina</i>	1995	2005	8 F 10 E	mässig häufig gefunden
Goldbandschwebfliege	<i>Caliprobola</i>	<i>speciosa</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Schmale Hummelschwebfliege, Bienen-Pelzschwebfliege	<i>Criorhina</i>	<i>asilica</i>	2005	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Schmale Hummelschwebfliege	<i>Criorhina</i>	<i>ranunculi</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost, einer von drei Funden in der Region!	selten gefunden
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebfliege, Gemeine	<i>Syritta</i>	<i>pipiens</i>	1995	2007	16 F 30 E	häufig gefunden
Hummel-Moderholzschwebfliege	<i>Temnostoma</i>	<i>bombylans</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig häufig gefunden
Wespen-Moderholzschwebfliege, Gelbe Tigerschwebfliege	<i>Temnostoma</i>	<i>vespiforme</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Wiese Ost und Waldrand Schwizeracher	wenig häufig gefunden
Schwarzfuss-Langbauschwebfliege	<i>Brachypalpoide</i> <i>s</i>	<i>lentus</i>	1995	2005	4 F 4 E	wenig häufig gefunden
Schwebfliegen-Art	<i>Brachypalpus</i>	<i>valgus</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost	wenig häufig gefunden
Schwebfliegen-Art	<i>Brachypalpus</i>	<i>laphriformis</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein Niggliisberg	wenig häufig gefunden
Gemeine Langbauschwebfliege,	<i>Xylota</i>	<i>segnis</i>	1995	2011	23 F 49 E	häufig gefunden
Goldhaar-Langbauschwebfliege, Goldhaar-Holzschwebfliege	<i>Xylota</i>	<i>sylvarum</i>	1995	2005	6 F 9 E	mässig häufig gefunden
Augenfliege Familie	<i>(Pipunculidae)</i>	<i>non det.</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig registriert, weil klein und unscheinbar
Augenfliege Gattung	<i>Pipunculus</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig registriert, vermutlich häufig
Augenfliege Gattung	<i>Nephrocerus</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächl. und Waldrand Rüti /Ischlegli, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Dickkopffliegen-Art	<i>Leopoldius</i>	<i>coronatus</i>	1995	1995	1 F 1 E Bächlein beim Franziskushaus, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Dickkopffliegen-Art	<i>Physocephala</i>	<i>rufipes</i>	1995	2007	4 F 4 E	häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	<i>Conops</i>	<i>flavipes</i>	2005	2007	4 F 4 E	häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	<i>Myopa</i>	<i>buccata</i>	1995	2005	8 F 10 E	mässig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	<i>Myopa</i>	<i>extricata</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Kleinfeld	wenig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	<i>Myopa</i>	<i>testacea</i>	1991	1991	1 F 1 E in der Wohnung Hasenweid, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Dickkopffliegen-Art	<i>Thecophora</i>	<i>pusilla</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg, Baumhecke Mitte und Wiese hinter Recycling AG	mässig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	<i>Thecophora</i>	<i>distincta</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Mitte	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Dickkopffliegen-Art	<i>Sicus</i>	<i>ferrugineus</i>	1995	2007	9 F 12 E		sehr häufig gefunden
Stelzfliegen-Art	<i>Micropeza</i>	<i>corrigiolata</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)		wenig häufig gefunden
Nacktfliegen-Art	<i>Loxocera</i>	<i>albiseta</i>	1995	1995	1 F 1 E Quellgerinne Rüti		wenig häufig gefunden
Nacktfliegen-Art	<i>Loxocera</i>	<i>aristata = ichneumonea</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug		wenig häufig gefunden
Nacktfliegen-Art	<i>Psila</i>	<i>merdaria</i>	1995	2005	3 F 4 E		wenig häufig gefunden
Schmuckfliegen-Art	<i>Otites</i>	<i>guttata</i>	1995	2005	2 F 4 E Waldrand Boniger und Engelberg, Wiese Ost		wenig häufig gefunden
Schmuckfliegen-Art	<i>Seioptera</i>	<i>vibrans</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard, bisher einziger Fund in der Region!		erst ein Mal gefunden
Fruchtfliegen-Art	<i>Tephritis</i>	<i>matricariae</i>	1995	1995	2 F 2 E Wiese Brüggli und Kiesgrube Hard		wenig häufig gefunden, weil klein, aber vermutlich häufig
Fruchtfliegen-Art	<i>Myoleia</i>	<i>lucida</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West		selten gefunden
Fruchtfliegen-Art	<i>Rhagoletis</i>	<i>cerasi</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost		Imagines selten gefunden, Larven (Kirschenmaden) aber wohl häufig
Baumfliegen-Art	<i>Dryomyza</i>	<i>anilis</i>	1995	1995	1 F 1 E Waldrand Schwizeracher		wenig häufig gefunden
Schwingfliegen-Art	<i>Sepsis</i>	<i>punctum</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese Leimgruben		selten registriert, weil sehr klein
Netzfliege Familie	(<i>Sciomycidae</i>)	<i>non det.</i>	1995	1995	2 F 2 E Engelberg, Magerwiese West und Waldrand Schwizeracher		sehr häufig gefunden
Netzfliegen-Art	<i>Pherbellia</i>	<i>cinerella</i>	2005	2005	3 F 3 E		mässig häufig gefunden, unscheinbar und oft übersehen oder nicht registriert, verm. sehr h.
Netzfliegen-Art	<i>Sepedon</i>	<i>sphegea</i>	1995	1995	1 F 1 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben		wenig häufig gefunden, vorwiegend in Feuchtgebieten
Netzfliegen-Art	<i>Dichetophora</i>	<i>obliterata</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese Schuhfabrik Hug		wenig häufig gefunden
Netzfliegen-Art	<i>Tetanocera</i>	<i>ferruginea</i>	2005	2005	1 F 2 E Naturnahe Anlage Neumatt		wenig häufig gefunden
Netzfliegen-Art	<i>Euthycera</i>	<i>fumigata</i>	1995	1995	4 F 4 E		wenig häufig gefunden
Netzfliegen-Art	<i>Limnia</i>	<i>unguicornis</i>	1995	2005	9 F 10 E		häufig gefunden
Polier- od. Faulfliegen-Art	<i>Lyciella</i>	<i>decempunctata</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost		wenig häufig gefunden
Zitterfliegen-Art	<i>Toxoneura = Palloptera</i>	<i>quinquemaculata</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Leimgruben		wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Scheufliegen-Art	<i>Suillia</i>	<i>similis</i>	1995	2005	1 F 1 E Wiese Hardstrasse, einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Saft- od. Wiesenfliege Gruppe	<i>Geomyza</i>	<i>combinata-Gruppe</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli, einziger Fund in der R.!	erst ein Mal gefunden
Saft- od. Wiesenfliegen-Art	<i>Opomyza</i>	<i>germinationis</i>	1995	2005	3 F 3 E	wenig häufig gefunden
Halmfliege Gattung	<i>Meromyza</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG , einer von zwei Funden in der Region!	erst zwei Mal gefunden
Kotfliegen-Art	<i>Phrosia</i>	<i>albilabris</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Täli Nordost	selten gefunden
Kotfliegen-Art	<i>Scatophaga</i>	<i>lutaria</i>	1995	2005	4 F 4 E	mässig häufig gefunden
Kotfliegen-Art	<i>Scatophaga</i>	<i>stercoraria</i>	1995	2005	36 F 75 E	sehr häufig gefunden
Stubenfliege Familie	(<i>Muscidae</i>)	<i>non det.</i>	1995	2005	2 F 2 E Baumhecke Täli Nordost und Kiesgrube Hard	sehr häufig gesehen, aber nur wenige auffällige und leicht zu bestimmende Arten registriert
Stubenfliegen-Verwandte (nicht bestimmt)	(<i>Muscidae</i>)	<i>non det. Art D</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Mitte	
Stubenfliegen-Verwandte	<i>Mesembrina</i>	<i>meridiana</i>	1995	2005	11 F 15 E	häufig gefunden
Herbst-Stubenfliege	<i>Musca</i>	<i>autumnalis</i>	1995	2005	19 F 30 E	sehr häufig gefunden
Stubenfliege Gattung	<i>Neomyia</i> = <i>Orthellia</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	4 F 5 E	sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen kann
Stubenfliegen-Verwandte	<i>Polietes</i>	<i>lardarius</i>	1995	2005	17 F 24 E	sehr häufig gefunden, auf Kuhfladen, im Herbst auch auf Blättern am Waldrand
Stubenfliegen-Verwandte	<i>Phaonia</i>	<i>pallida</i>	2005	2005	1 F 1 E Baumhecke Engelberg-Felli	wenig häufig nachgewiesen, vermutlich häufig
Hirschlausfliege	<i>Lipoptena</i>	<i>cervi</i>	2005	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Waldrand Engelberg-Schürli Ost	mässig häufig gefunden
Schmeissflieg Familie	(<i>Calliphoridae</i>)	<i>non det.</i>	1995	1995	2 F 2 E Bächlein beim Franziskushaus und Wiese Schäfer	
Schmeissfliegen-Art	<i>Calliphora</i>	<i>vicina</i>	1995	1995	3 F 3 E	wenig häufig registriert
Schmeissfliegen-Art	<i>Cynomyia</i>	<i>mortuorum</i>	1995	2005	5 F 6 E	häufig gefunden
Goldfliege Gattung	<i>Lucilia</i>	<i>sp.</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Schwizeracher	sehr häufig gefunden, aber nur selten registriert
Kaisergoldfliege	<i>Lucilia</i>	<i>caesar</i>	1995	1995	12 F 14 E, unsicher bestimmt	vermutlich sehr häufig, aber selten registriert
Goldfliegen-Art (nicht sicher bestimmt)	<i>Lucilia</i>	<i>sericata</i>	1995	1995	6 F 6 E, unsicher bestimmt	vermutlich häufig, aber selten registriert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Schmeissfliege Gattung	<i>Pollenia</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	34 F 52 E		sehr häufig gefunden
Fleischfliege Gattung	<i>Sarcophaga</i>	<i>sp.</i>	1995	2011	44 F 164 E		sehr häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Eriothrix</i>	<i>rufomaculata</i>	1995	2005	5 F 5 E		häufig gefunden
Raupenfliege Gattung	<i>Gymnosoma</i>	<i>sp.</i>	1995	2007	15 F 20 E		sehr häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Gymnosoma</i>	<i>clavatum</i>	2005	2005	1 F 1 E Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)		selten gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Gymnosoma</i>	<i>rotundatum</i>	2005	2005	2 F 2 E Baumhecke Täli Nordost und Wiese und Rasen Altersheim Brüggli		wenig häufig registriert, aber vermutlich sehr häufig
Raupenfliegen-Art	<i>Phasia</i>	<i>aurigera</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost		wenig häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Phasia</i> = <i>Alophora</i>	<i>hemiptera</i>	2005	2005	1 F 1 E Engelberg, Baumhecke Südost		häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Ectophasia</i>	<i>crassipennis</i>	2005	2005	3 F 4 E		häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Cylindromyia</i> = <i>Ocyptera</i>	<i>bicolor</i>	2005	2005	2 F 2 E Dorfbach und Baumhecke Täli Nordost, zwei von drei Funden in der		selten gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Cylindromyia</i> = <i>Ocyptera</i>	<i>brassicaria</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Wiese und Rasen Altersheim Brüggli		mässig häufig gefunden
Raupenfliege Gattung	<i>Tachina</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	5 F 5 E		sehr häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Tachina</i>	<i>lurida</i>	2005	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand West und Waldrand Boniger		selten gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Tachina</i> = <i>Echinomyia</i>	<i>ursina</i>	2005	2005	1 F 1 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben		wenig häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Tachina</i> = <i>Echinomyia</i>	<i>fera</i>	2005	2005	11 F 15 E		sehr häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Tachina</i> = <i>Echinomyia</i>	<i>magnicornis</i>	2005	2005	6 F 7 E		mässig häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	<i>Ernestia</i>	<i>rudis</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand West, bisher einziger Fund in der Region		
Raupenfliegen-Art	<i>Dexiosoma</i>	<i>caninum</i>	2005	2005	1 F 1 E Waldrand Engelberg-Schürli Ost		wenig häufig registriert, vermutlich häufig
WIRBELTIERE	Auswahl	ohne sehr häufige Arten	1995				
Goldfisch, Giebel	<i>Carassius</i>	<i>auratus</i>	2005	2005	1 F 1 E Weiher Täli Rüti / Leimgruben		wird leider oft aus Aquarien in stehende Gewässer entsorgt
Feuersalamander	<i>Salamandra</i>	<i>salamandra</i>	1995	1995	1 F 1 E Dulliken Dorf (Fundort nicht genau lokalisiert)		wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
						Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Bergmolch	<i>Triturus</i>	<i>alpestris</i>	1995	2005	3 F 4 E		in stehenden Gewässern häufig
Fadenmolch	<i>Triturus</i>	<i>helveticus</i>	1995	1995	1 F 1 E Kiesgrube Hard		wenig häufig gefunden, aber selten danach gesucht
Gelbbauchunke	<i>Bombina</i>	<i>variegata</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard		mässig häufig beobachtet
Geburtshelferkröte	<i>Alytes</i>	<i>obstetricans</i>	1995	2005	1 F 2 E Kiesgrube Hard		8 Begehungn
Erdkröte	<i>Bufo</i>	<i>bufo</i>	1995	1995	3 F 5 E		häufig beobachtet
Kreuzkröte	<i>Bufo</i>	<i>calamita</i>	1995	2006	1 F 5 E Kiesgrube Hard		mässig häufig gefunden, vorwiegend in Kiesgruben
Grasfrosch	<i>Rana</i>	<i>temporaria</i>	1995	2005	12 F 26 E		häufig beobachtet
Wasserfrosch	<i>Rana</i>	<i>esculenta</i>	2005	2005	1 F 1 E Kiesgrube Hard		häufig beobachtet
Blindschleiche	<i>Anguis</i>	<i>fragilis</i>	1995	2005	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Dulliken Dorf (Fundort nicht genau lokalis.)		häufig gefunden
Eidechse (nicht bestimmt)	<i>Lacerta cf. Podarcis</i>	<i>non det.</i>	1995	2005	5 F 8 E		sehr häufig beobachtet
Mauereidechse	<i>Podarcis</i>	<i>muralis</i>	1995	2006	7 F 21 E		häufig beobachtet
Zauneidechse	<i>Lacerta</i>	<i>agilis</i>	1995	2005	4 F 7 E		sehr häufig beobachtet, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus = Podiceps</i>	<i>ruficollis</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet		mässig häufig beobachtet
Haubentaucher	<i>Podiceps</i>	<i>cristatus</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet		mässig häufig beobachtet
Kormoran	<i>Phalacrocorax</i>	<i>carbo</i>	1995	1995	1 F 1 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare		früher wenig häufig beobachtet, in den letzten Jahren häufig, aber nicht mehr registriert
Graureiher	<i>Ardea</i>	<i>cinerea</i>	1995	2005	3 F 5 E		häufig beobachtet
Weissstorch	<i>Ciconia</i>	<i>ciconia</i>	1995	1995	1 F 1 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig häufig beobachtet
Höckerschwan	<i>Cygnus</i>	<i>olor</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet		mässig häufig beobachtet
Krickente	<i>Anas</i>	<i>crecca</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet		selten beobachtet
Stockente	<i>Anas</i>	<i>platyrhynchus</i>	1995	2005	7 F 15 E		häufig beobachtet
Spießente	<i>Anas</i>	<i>acuta</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet		selten beobachtet

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Knäckente	<i>Anas</i>	<i>querquendula</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	selten beobachtet
Tafelente	<i>Aythya</i>	<i>ferina</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	selten beobachtet
Reiherente	<i>Aythya</i>	<i>fuligula</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	mässig häufig beobachtet
Gänsesäger	<i>Mergus</i>	<i>merganser</i>	1995	2005	1 F 1 E Kiesbänke an der Aare	früher selten, aber in der letzten Zeit mässig häufig beobachtet
Schwarzer Milan (Schwarzmilan)	<i>Milvus</i>	<i>migrans</i>	1981	2005	8 F 8 E	häufig beobachtet
Roter Milan (Rotmilan)	<i>Milvus</i>	<i>milvus</i>	1995	2005	14 F 16 E	sehr häufig beobachtet
Sperber	<i>Accipiter</i>	<i>nisus</i>	1995	2005	2 F 2 E Leimgruben, Bächlein Südwest und ev. Waldrand Boniger	mässig häufig beobachtet
Mäusebussard	<i>Buteo</i>	<i>buteo</i>	1967	1995	24 F 49 E	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert
Turmfalke	<i>Falco</i>	<i>tionnunculus</i>	1995	2006	5 F 8 E	häufig beobachtet
Baumfalke	<i>Falco</i>	<i>subbuteo</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	wenig häufig beobachtet
Grünfüssiges Teichhuhn	<i>Gallinula</i>	<i>chloropus</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	mässig häufig beobachtet
Blässralle, Blässhuhn	<i>Fulica</i>	<i>atra</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	häufig beobachtet
Flussuferläufer	<i>Actitis</i>	<i>hypoleucos</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	selten beobachtet
Lachmöve	<i>Larus</i>	<i>ridibundus</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	früher an der Aare sehr häufig beobachtet, heute nur noch mässig häufig
Sturmmöve	<i>Larus</i>	<i>canus</i>	1995	1995	Wiese beim Gemeindehaus von R. Favri beobachtet	
Hohltaube	<i>Columba</i>	<i>oenas</i>	1995	1995	Wiese beim Gemeindehaus, von R. Favri beobachtet	wenig häufig beobachtet
Ringeltaube	<i>Columba</i>	<i>palumbus</i>	1995	1995	11 F 17 E	sehr häufig beobachtet, aber meist nicht registriert
Türkentaube	<i>Streptopelia</i>	<i>decaocto</i>	1995	2005	2 F 2 E Wiese und Rasen Altersheim Brüggli und Wiese beim Gemeindehaus (R.	häufig beobachtet
Kuckuck	<i>Cuculus</i>	<i>canorus</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	früher häufig gehört, aber in letzter Zeit selten geworden
Waldohreule	<i>Asio</i>	<i>otus</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	
Waldkauz	<i>Strix</i>	<i>aluca</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	selten gesehen, aber oft gehört

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Mauersegler	<i>Apus</i>	<i>apus</i>	1995	2005	9 F 17 E	häufig beobachtet
Eisvogel	<i>Alcedo</i>	<i>atthis</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	wenig häufig beobachtet
Grauspecht	<i>Picus</i>	<i>canus</i>	1995	1995	2 F 2 E Auenwald und Kiesbänke an der Aare	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten
Grünspecht	<i>Picus</i>	<i>viridis</i>	1967	2005	23 F 42 E	sehr häufig beobachtet
Schwarzspecht	<i>Dryocopus</i>	<i>martius</i>	1995	2005	2 F 5 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Waldrand Engelberg-Schürli Ost	sehr häufig beobachtet
Buntspecht	<i>Dendrocopos</i> = <i>Dryocopus</i>	<i>major</i>	1995	1995	17 F 25 E	sehr häufig beobachtet
Kleinspecht	<i>Dendrocopos</i> = <i>Dryocopus</i>	<i>minor</i>	1995	2005	erwartet, aber nicht beobachtet	mässig häufig beobachtet
Feldlerche	<i>Alauda</i>	<i>arvensis</i>	1967	1995	2 F 2 E Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Ackerland Engelberg-Felli	früher mässig häufig beobachtet, ist in letzter Zeit seltener geworden
Uferschwalbe	<i>Riparia</i>	<i>riparia</i>	1995	2005	1 F 9 E Kiesgrube Hard	mässig häufig beobachtet
Rauchschwalbe	<i>Hirundo</i>	<i>rustica</i>	1995	2007	15 F 24 E	häufig beobachtet
Mehlschwalbe	<i>Delichron</i>	<i>urbica</i>	1995	2007	16 F 25 E	häufig beobachtet
Bergpieper = Wasserpieper	<i>Anthus</i>	<i>spinoletta</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	im Herbst und Winter wenig häufig beobachtet
Schafstelze	<i>Motacilla</i>	<i>flava</i>	1995	1995	Wiese beim Gemeindehaus von Herrn R. Favri beobachtet (Frühherbst)	selten beobachtet
Gebirgsstelze	<i>Motacilla</i>	<i>cinerea</i>	1995	1995	1 F 3 E an der Aare	häufig beobachtet, aber nur mässig häufig registriert
Bachstelze	<i>Motacilla</i>	<i>alba</i>	1995	1995	16 F 31 E	sehr häufig beobachtet, aber selten registriert
Wasseramsel	<i>Cinclus</i>	<i>cinclus</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	wenig häufig beobachtet
Zaunkönig	<i>Troglodytes</i>	<i>troglodytes</i>	1995	1995	18 F 35 E	sehr häufig beobachtet
Heckenbraunelle	<i>Prunella</i>	<i>modularis</i>	1995	2005	4 F 4 E	häufig beobachtet
Rotkehlchen	<i>Erithracus</i>	<i>rubecula</i>	1967	1995	26 F 48 E	sehr häufig beobachtet
Nachtigall	<i>Luscinia</i>	<i>megarrhynchos</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	wenig häufig beobachtet
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus</i>	<i>ochruros</i>	1995	1995	18 F 31 E	sehr häufig beobachtet

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
						Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus</i>	<i>phoenicurus</i>	1995	2005	3 F 3 E		früher mässig häufig beobachtet, in letzter Zeit nur noch selten
Braunkehlchen	<i>Saxicola</i>	<i>rubetra</i>	1972	1972	1 F 1 E	Ackerland Engelberg-Felli	wenig häufig beobachtet
Amsel	<i>Turdus</i>	<i>merula</i>	1995	1995	42 F 125 E		sehr häufig beobachtet
Wacholderdrossel	<i>Turdus</i>	<i>pilaris</i>	2005	2005	1 F 1 E	Kiesbänke an der Aare	häufig beobachtet, aber in letzter Zeit weniger
Singdrossel	<i>Turdus</i>	<i>philomelos</i>	1995	1995	12 F 16 E		sehr häufig beobachtet
Misteldrossel	<i>Turdus</i>	<i>viscivorus</i>	1995	2005	13 F 17 E		sehr häufig beobachtet
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus</i>	<i>palustris</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet		mässig häufig beobachtet
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus</i>	<i>scirpaceus</i>	1995	2005	2 F 2 E	Kiesgrube Hard und Baumhecke Obere Ei	häufig beobachtet
Dorngrasmücke	<i>Sylvia</i>	<i>communis</i>	2005	2005	1 E 1 E	Wiese Schäfer	wenig häufig beobachtet
Gartengrasmücke	<i>Sylvia</i>	<i>borin</i>	1995	2005	6 F 13 E		häufig beobachtet
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia</i>	<i>atricapilla</i>	1995	1995	37 F 89 E		sehr häufig beobachtet
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus</i>	<i>sibilatrix</i>	1995	1995	4 F 6 E		früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten
Zilpzalp	<i>Phylloscopus</i>	<i>collybita</i>	1995	1995	30 F 61 E		sehr häufig beobachtet
Fitis	<i>Phylloscopus</i>	<i>trochilus</i>	1995	2005	1 F 1 E	Kiesgrube Hard	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus</i>	<i>regulus</i>	1995	2005	3 F 3 E		häufig beobachtet
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus</i>	<i>ignicapillus</i>	1995	1995	6 F 7 E		sehr häufig beobachtet
Grauschnäpper	<i>Muscicapa</i>	<i>striata</i>	1995	2005	4 F 4 E		mässig häufig beobachtet
Trauerschnäpper	<i>Ficedula</i>	<i>hypoleuca</i>	1995	2005	8 F 10 E		häufig beobachtet
Schwanzmeise	<i>Aegitalus</i>	<i>caudatus</i>	1995	2005	8 F 9 E		häufig beobachtet
Meise Gattung	<i>Parus</i>	<i>sp.</i>	1995	1995	6 F 7 E		sehr häufig beobachtet
Nonnenmeise oder Sumpfmeise	<i>Parus</i>	<i>palustris</i>	1967	1995	18 F 23 E		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Haubenmeise	<i>Parus</i>	<i>cristatus</i>	1995	2005	2 F 3 E Wiesenstreifen Schützenhaus und Wiese beim Gemeindehaus (R. Favri)	sehr häufig beobachtet
Kohlmeise	<i>Parus</i>	<i>major</i>	1967	1995	38 F 91 E	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert
Kleiber, Spechtmeise	<i>Sitta</i>	<i>europaea</i>	1967	1995	14 F 31 E	sehr häufig beobachtet
Baumläufer Gattung	<i>Certhia</i>	<i>sp.</i>	1995	2005	4 F 6 E	sehr häufig beobachtet
Waldbaumläufer	<i>Certhia</i>	<i>familiaris</i>	2005	2005	1 F 1 E Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	häufig beobachtet
Gartenbaumläufer	<i>Certhia</i>	<i>brachydactyla</i>	1967	2005	17 F 28 E	sehr häufig beobachtet
Beutelmeise	<i>Remiz</i>	<i>pendulinus</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet	selten beobachtet
Pirol	<i>Oriolus</i>	<i>oriolus</i>	1995	1995	2 F 2 E Baumhecke Obere Ei und Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	wenig häufig beobachtet
Neuntöter, Rotrückiger Würger	<i>Lanius</i>	<i>collurio</i>	1995	1995	1 F 1 E Hecke Untere Ei, von Sven Leutwyler gesehen	häufig beobachtet
Eichelhäher	<i>Garrulus</i>	<i>glandarius</i>	1995	1995	23 F 40 E	sehr häufig beobachtet
Elster	<i>Pica</i>	<i>pica</i>	1995	2005	13 F 15 E	sehr häufig beobachtet
Dohle	<i>Corvus</i>	<i>monedula</i>	2005	2005	1 F 1 E Auenwald an der Aare (ohne Kiesbänke)	häufig beobachtet
Rabenkrähe	<i>Corvus</i>	<i>corone</i>	1995	2005	34 F 103 E	sehr häufig beobachtet
Kolkrabe	<i>Corvus</i>	<i>corax</i>	1995	2005	10 F 20 E	sehr häufig beobachtet
Star	<i>Sturnus</i>	<i>vulgaris</i>	1967	1995	10 F 11 E	sehr häufig beobachtet
Feldsperling	<i>Passer</i>	<i>montanus</i>	1995	2005	3 F 3 E	häufig beobachtet
Bergfink	<i>Fringilla</i>	<i>montifringilla</i>	2005	2005	2 F 2 E Wald Hard und Naturnahe Anlage Neumatt	wenig häufig beobachtet und nur im Winter, aber dann oft in riesigen Schwärmen
Girlitz	<i>Serinus</i>	<i>serinus</i>	1995	1995	17 F 34 E	sehr häufig beobachtet
Grünfink	<i>Carduelis</i>	<i>chloris</i>	1995	1995	13 F 22 E	sehr häufig beobachtet
Stieglitz, Distelfink	<i>Carduelis</i>	<i>carduelis</i>	1995	2005	11 F 23 E	sehr häufig beobachtet
Erlenzeisig	<i>Carduelis</i>	<i>spinus</i>	1995	2005	2 F 3 E Naturnahe Anlage Neumatt und Wiese beim Gemeindehaus (R. Favri)	wenig häufig beobachtet

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen			Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Hänfling	<i>Carduelis</i>	<i>cannabina</i>	1995	1995	Wiese beim Gemeindehaus, von R. Favri beobachtet		wenig häufig beobachtet
Birkenzeisig	<i>Carduelis</i>	<i>flammea</i>	1995	1995	Wiese beim Gemeindehaus, von R. Favri beobachtet		selten beobachtet
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia</i>	<i>curvirostris</i>	1995	1995	Wiese beim Gemeindehaus, von R. Favri beobachtet		mässig häufig beobachtet, vor allem Frassspuren
Gimpel, Dompfaff	<i>Pyrrhula</i>	<i>pyrrhula</i>	1995	1995	Wiese beim Gemeindehaus, von R. Favri beobachtet		häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren seltener
Kernbeisser	<i>Coccothraustes</i>	<i>coccothraustes</i>	1995	1995	3 F 3 E		mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig nachgewiesen
Goldammer	<i>Emberiza</i>	<i>citrinella</i>	1995	2005	20 F 62 E		sehr häufig beobachtet
Rohrammer	<i>Emberiza</i>	<i>schoeniculus</i>	1995	1995	erwartet, aber nicht beobachtet		wenig häufig beobachtet
Maulwurf	<i>Talpa</i>	<i>europaea</i>	1995	2011	29 F 72 E (Hügel)		anhand der Spuren sehr häufig festgestellt
Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus</i>	<i>pipistrellus</i>	1995	1995	1 F 1 E Im Bifang 22, Haus Fam. Schären		im Siedlungsraum am Abend oft zu beobachten
Feldhase	<i>Lepus</i>	<i>europaeus</i>	1995	2005	3 F 5 E		Sichtbeobachtungen mässig häufig, aber anhand der Spuren häufig nachgewiesen
Eichhörnchen	<i>Sciurus</i>	<i>vulgaris</i>	1995	2005	5 F 9 E (einschliesslich Spuren)		häufig beobachtet
Wald- od. Gelbhalsmaus (nicht genau bestimmt)	<i>Apodemus</i>	<i>silvaticus cf. flavicollis</i>	1995	2005	3 F 3 E (Nagespuren)		anhand der Spuren mässig häufig festgestellt
Scherm Maus	<i>Arvicola</i>	<i>terrestris</i>	1995	2005	11 F 24 E (Hügel)		anhand der Spuren sehr häufig festgestellt
Mauslöcher	<i>(Mauslöcher)</i>	<i>non det.</i>	2005	2005	11 F 16 E		sehr häufig gefunden
Mäusespuren	<i>(Mäusespuren)</i>	<i>non det.</i>	2005	2005	11 F 11 E		häufig gefunden
Reh	<i>Capreolus</i>	<i>capreolus</i>	1995	2005	4 F 4 E		häufig beobachtet und anhand der Spuren festgestellt
BLAUALGEN			Auswahl				
Blualgen-Art	<i>Nostoc</i>	<i>commune</i>	2005		1 F Kiesgrube Hard		mässig viele Fundorte
ALGEN			Auswahl				
			1995				
Armleuchteralge Gattung	<i>Chara</i>	<i>sp.</i>	1995		1 F Kiesgrube Hard		in stehenden Gewässern, mässig viele Fundorte
Gemeiner Halimasch	<i>Armilariella</i>	<i>polymyces</i>	1995		1 F Wiese beim Gemeindehaus		viele Fundorte, aber nur selten registriert

		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen			Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region	
FLECHTEN	Auswahl					
Runzelflechte	<i>Parmelia</i>	<i>sulcata</i>	1995	1 F Leimgruben, Bächlein Südwest	viele Fundorte, aber selten registriert	
Schildflechten-, Hundsflechte Gattung	<i>Peltigera</i>	<i>sp.</i>	2005	1 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	wenig Fundorte	
Gelbflechte	<i>Xanthoria</i>	<i>parietina</i>	1995	2 F Leimgruben, Bächlein Südwest und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	sehr viele Fundorte, aber wenig häufig registriert	
MOOSE	Auswahl		1999			
Welliges Katharinenmoos	<i>Atrichum</i>	<i>undulatum</i>	1995	1 F Wald Hard	viele Fundorte, aber selten registriert	
Schönes Frauenhaarmoos oder Widdertonmoos	<i>Polytrichum</i>	<i>formosum</i>	1995	1 F Wald Hard	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Purpur- oder Hornzahnmoos	<i>Ceratodon</i>	<i>purpureus</i>	1995	1 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	viele Fundorte, aber selten registriert	
Drehmoos	<i>Funaria</i>	<i>hygrometrica</i>	1999	5 F	mässig viele Fundorte	
Silber-Birnmoos	<i>Bryum</i>	<i>argenteum</i>	1999	1 F Kiesgrube Hard	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Tannenmoos	<i>Abietinella</i>	<i>abietina</i>	2005	1 F Engelberg, Magerwiese West	viele Fundorte	
Tamarisken-Thujamooos	<i>Thuidium</i>	<i>tamariscinum</i>	2005	1 F Wald Hard	wenig Fundorte, weil wenig häufig registriert	
Echtes Goldmoos	<i>Homalothecium</i>	<i>lutescens</i>	1995	1 F Trockenstandort Schäfer	viele Fundorte	
Sparriges Kranzmoos	<i>Rhytidiadelphus</i>	<i>squarrosus</i>	1995	7 F	viele Fundorte	
FARNPFLANZEN	Auswahl					
Riesen-Schachtelhalm	<i>Equisetum</i>	<i>telmateia</i>	1995	2 F Dorfbach und Weiher Täli Rüti / Leimgruben	mässig vile Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Überwinternder Schachtelhalm	<i>Equisetum</i>	<i>hyemale</i>	1995	3 F	wenig Fundorte, aber an den Fundstellen oft massenauft	
Gelappter Schildfarn	<i>Polystichum</i>	<i>aculeatum = lobatum</i>	2005	1 F Auenwald an der Aare	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Hirschzunge	<i>Phyllitis</i>	<i>scolopendrium</i>	1995	1 F Auenwald an der Aare	wenig Fundorte	
SAMENPFLANZEN	Auswahl ohne häufige Bäume,	Sträucher, Gräser und Fettwiesenpfl.	1995			
Eibe	<i>Taxus</i>	<i>baccata</i>	2005	1 F Wiese beim Gemeindehaus	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Weisse Seerose	<i>Nymphaea</i>	<i>alba</i>	2005	2 F Naturnahe Anlage Neumatt und 1 F Weiher beim Gemeindehaus	wenig Fundorte
Gewöhnliches Hornblatt	<i>Ceratophyllum</i>	<i>demersum</i>	1995	1 F Naturnahe Anlage Neumatt	wenig Fundorte
Sumpfdotterblume	<i>Caltha</i>	<i>palustris</i>	1995	5 F	viele Fundorte
Stinkende Nieswurz	<i>Helleborus</i>	<i>foetidus</i>	2005	2 F Waldrand Boniger und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	viele Fundorte
Gewöhnliche Akelei	<i>Aquilegia</i>	<i>vulgaris</i>	2005	5 F	viele Fundorte
Hahnenfussähnliches Windröschen	<i>Anemone</i>	<i>ranunculoides</i>	1995	2 F Auenwald an der Aare	wenig Fundorte
Buschwindröschen	<i>Anemone</i>	<i>nemorosa</i>	1995	22 F	sehr viele Fundorte
Scharbockskraut	<i>Ranunculus</i>	<i>ficaria</i>	1995	23 F	sehr viele Fundorte
Zungenblättriger Hahnenfuss	<i>Ranunculus</i>	<i>lingua</i>	1995	1 F Weiher beim Gemeindehaus	wenig Fundorte
Gold-Hahnenfuss	<i>Ranunculus</i>	<i>auricomus</i>	2005	1 F Auenwald an der Aare	viele Fundorte
Knolliger Hahnenfuss	<i>Ranunculus</i>	<i>bulbosus</i>	1995	17 F	sehr viele Fundorte
Sauerdorn	<i>Berberis</i>	<i>vulgaris</i>	2005	1 F Waldrand Boniger	mässig viele Fundorte
Klatsch-Mohn	<i>Papaver</i>	<i>rhoeas</i>	1982	5 F	mässig viele Fundorte
Schöllkraut	<i>Chelidonium</i>	<i>majus</i>	2005	2 F Baumhecke Engelberg-Felli und Kiesbänke an der Aare	mässig viele Fundorte
Hohlknolliger Lerchensporn	<i>Corydalis</i>	<i>cava</i>	1995	2 F Auenwald und Kiesbänke an der Aare und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig viele Fundorte
Hopfen	<i>Humulus</i>	<i>lupulus</i>	2005	2 F Auenwald an der Aare und Naturnahe Anlage Neumatt	mässig viele Fundorte
Walnussbaum	<i>Juglans</i>	<i>regia</i>	2005	5 F	viele Fundorte
Stachelbeere	<i>Ribes</i>	<i>uva-crispa</i>	2005	3 F	mässig viele Fundorte
Milder Mauerpfeffer	<i>Sedum</i>	<i>sexangulare</i>	1995	3 F	viele Fundorte
Spanischer Mauerpfeffer	<i>Sedum</i>	<i>hispanicum</i>	2005	1 F Kiesbänke an der Aare	
Weisser Mauerpfeffer	<i>Sedum</i>	<i>album</i>	1995	3 F	mässig viele Fundorte, typisch für felsige Stellen.

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region	
Dreifingriger Steinbrech	<i>Saxifraga</i>	<i>tridactylites</i>	1995		4 F	wenig Fundorte aber hier oft in grosser Dichte, typisch für Kiesflächen.	
Wechselblättriges Milzkraut	<i>Chrysosplenium</i>	<i>alternifolium</i>	2005		2 F Bächlein Niggelisberg und Auenwald an der Aare	mässig viele Fundorte	
Wiesen-Spierstaude, Mähdesüss	<i>Filipendula</i>	<i>ulmaria</i>	1995		11 F	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Odermennig	<i>Agrimonia</i>	<i>eupatoria</i>	1995		3 F	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba</i>	<i>minor</i>	1995		6 F	sehr viele Fundorte	
Gewöhnliche Nelkenwurz	<i>Geum</i>	<i>urbanum</i>	1995		1 F registriert Wald Hard	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Erdbeerähnliches Fingerkraut	<i>Potentilla</i>	<i>sterilis</i>	1995		16 F	sehr viele Fundorte	
Aufrechtes Fingerkraut	<i>Potentilla</i>	<i>erecta</i>	1995		3 F	viele Fundorte	
Silber-Fingerkraut	<i>Potentilla</i>	<i>argentea</i>	1995		1 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug		
Frühlings-Fingerkraut	<i>Potentilla</i>	<i>neumanniana</i>	1995		5 F	viele Fundorte	
Wald-Erdbeere	<i>Fragaria</i>	<i>vesca</i>	1995		11 F	sehr viele Fundorte	
Ackerfrauenmantel	<i>Aphanes</i>	<i>arvensis</i>	1982		1 F Ackerland Schwizeracher		
Gemeines Frauenmantel, Gelbgrüner Frauenmantel	<i>Alchemilla</i>	<i>vulgaris</i>	1995		4 F	viele Fundorte, aber vermutlich oft übersehen	
Feldrose	<i>Rosa</i>	<i>arvensis</i>	2005		1 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig viele Fundorte	
Himbeere	<i>Rubus</i>	<i>idaeus</i>	2005		1 F Waldrand Schwizeracher registriert	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Blaue Brombeere	<i>Rubus</i>	<i>caesius</i>	1995		1 F Wald Hard registriert	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Schlitzblättrige Brombeere	<i>Rubus</i>	<i>laciniatus</i>	1995		3 F Auenwald und Kiesbänke an der Aare und Baumhecke Täli Nordost		
Quitte	<i>Cydonia</i>	<i>oblonga</i>	2005		1 F Wiese Schuhfabrik Hug		
Birnbaum	<i>Pyrus</i>	<i>piraster</i>	2005		1 F Wiesenstreifen Schützenhaus	viele Fundorte	
Apfelbaum	<i>Malus</i>	<i>sylvestris</i>	1995		1 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig viele Fundorte	
Vogelbeerbaum	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	1995		1 F Wald Hard	mässig viele Fundorte	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Mehlbeerbaum	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	2005	6 F		viele Fundorte
Garten-Steinmispel	<i>Cotoneaster</i>	<i>horizontalis</i>	2005	3 F nicht sicher bestimmt		mässig viele Fundorte, unsicher bestimmt
Schwarzdorn, Schlehdorn	<i>Prunus</i>	<i>spinosa</i>	2005	10 F		viele Fundorte
Traubenkirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus padus</i>	2005	7 F		viele Fundorte
Kirschlorbeer	<i>Prunus</i>	<i>laurocerasus</i>	2005	6 F		Neophyt, mässig viele Fundorte
Dornige Hauhechel	<i>Ononis</i>	<i>spinosa</i>	1995	1 F Engelberg, Magerwiese West		mässig viele Fundorte
Kriechende Hauhechel	<i>Ononis</i>	<i>repens</i>	1995	3 F		viele Fundorte
Echter Honigklee	<i>Melilotus</i>	<i>officinalis</i>	1995	2 F Kiesgrube Hard und Wald Hard		viele Fundorte, aber selten registriert
Mittlerer Klee	<i>Trifolium</i>	<i>medium</i>	2005	2 F Wiesenstreifen Schützenhaus und Feldgehölz Engelberg-Felli		viele Fundorte
Feldk-Kee	<i>Trifolium</i>	<i>campestre</i>	1995	1 F Kiesgrube Hard registriert		wenig registrierte Fundorte, weil meist nicht beachtet
Kleiner Klee	<i>Trifolium</i>	<i>dubium</i>	1995	1 F Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik) registriert		viele Fundorte, aber meist nicht beachtet
Echter Wundklee	<i>Anthyllis</i>	<i>vulneraria vulneraria</i>	1995	3 F		viele Fundorte
Sumpf-Schotenklee	<i>Lotus</i>	<i>uliginosus</i>	2005	2 F Leimgruben, Bächlein Nordost und Quellgerinne Rüti		mässig viele Fundorte
Robinie, Falsche Akazie	<i>Robinia</i>	<i>pseudacacia</i>	2005	1 F Trockenstandort Schäfer und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli		Neophyt, mässig viele Fundorte
Bunte Kronwicke	<i>Coronilla</i>	<i>varia</i>	1995	1 F Kiesgrube Hard		viele Fundorte
Hufeisenklee	<i>Hippocrepis</i>	<i>comosae</i>	1995	2 F Engelberg, Magerwiese West und Engelberg, Baumhecke Mitte		viele Fundorte
Saat-Esparsette	<i>Onobrychis</i>	<i>viciifolia</i>	1995	2 F Engelberg, Magerwiese West und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli		viele Fundorte
Rauhhaarige Wicke	<i>Vicia</i>	<i>hirsuta</i>	1995	3 F		wenig Fundorte, aber oft nicht registriert
Viersamige Wicke	<i>Vicia</i>	<i>tetrasperma</i>	1995	1 F registriert		wenig häufig registriert
Hecken-Wicke	<i>Vicia</i>	<i>dumetorum</i>	1995	1 F Waldrand Engelberg-Schürli Ost		
Vogel-Wicke	<i>Vicia</i>	<i>cracca</i>	1995	6 F		viele Fundorte

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Zaun-Wicke	<i>Vicia</i>	<i>sepium</i>	1995		1 F Wald Hard registriert	sehr viele Fundorte, aber selten registriert
Schmalblättrige Wicke	<i>Vicia</i>	<i>sativa ssp. nigra incl. angustifolia</i>	1995		10 F	viele Fundorte
Berg-Platterbse	<i>Lathyrus</i>	<i>linifolius</i>	1995		2 F Wald Hard und Wiese Büchs beim Franziskushaus	
Blut-Weiderich	<i>Lythrum</i>	<i>salicaria</i>	1995		5 F	viele Fundorte
Rosmarinblättriges Weidenröschen	<i>Epilobium</i>	<i>dodonaei</i>	1995		1 F Kiesgrube Hard	wenig Fundorte, fast ausschliesslich in Kiesgruben
Behaartes Weidenröschen	<i>Epilobium</i>	<i>hirsutum</i>	2005		5 F	viele Fundorte
Zweijährige Nachtkerze	<i>Oenothera</i>	<i>biennis</i>	2005		3 F	mässig viele Fundorte
Lamarcks Nachtkerze	<i>Oenothera</i>	<i>glazoviana = erythrosepala</i>	2005		5 F	mässig viele Fundorte
Gewöhnlicher Sanddorn	<i>Hippophae</i>	<i>rhamnoides</i>	1995		1 F Trockenstandort Schäfer	typisch für Sand- und Kiesbänke der subalpin. Flüsse. In der Region aus Gärten verwildert.
Essigbaum	<i>Rhus</i>	<i>typhina</i>	2005		2 F Kiesgrube Hard und Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	Neophyt, wenig Fundorte
Sauerklee, Kuckuckskee	<i>Oxalis</i>	<i>acetosella</i>	1995		1 F Wald Hard	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Aufrechter Sauerklee	<i>Oxalis</i>	<i>fontana = stricta</i>	1967		3 F	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	<i>Linum</i>	<i>catharticum</i>	1995		1 F Engelberg, Magerwiese West	viele Fundorte
Rupprechtskraut, Stinkender Storchenschnabel	<i>Geranium</i>	<i>robertianum</i>	1995		1 F Wald Hard registriert	sehr viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert
Tauben-Storchenschnabel	<i>Geranium</i>	<i>columbinum</i>	1995		3 F	viele Fundorte
Schlitzblättriger Storchenschnabel	<i>Geranium</i>	<i>dissectum</i>	1995		3 F	mässig viele Fundorte
Gewöhnlicher Reiherschnabel	<i>Erodium</i>	<i>cicutarium cicutarium</i>	1995		2 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiesenstreifen vor Recycling AG	
Drüsentragendes Springkraut	<i>Impatiens</i>	<i>glandulifera</i>	1995		2 F Auenwald und Kiesbänke an der Aare	Neophyt, mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Wald-Springkraut	<i>Impatiens</i>	<i>noli-tangere</i>	1995		1 F registriert Waldrand Schwizeracher	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Anzahl
Kornelkirsche	<i>Cornus</i>	<i>mas</i>	1995		3 F	wenig Fundorte, dann aus Gärten verwildert
Efeu	<i>Hedera</i>	<i>helix</i>	1995		1 F registriert Wald Hard	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Europäische Sanikel	<i>Sanicula</i>	<i>europaea</i>	1995		1 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig Fundorte
Taumel-Kerbel	<i>Chaerophyllum</i>	<i>temulum</i>	1995		2 F Baumhecke Engelberg-Felli und Engelberg-Felli, Waldrand West	wenig Fundorte
Goldfrüchtiger Kerbel	<i>Chaerophyllum</i>	<i>aureum</i>	2005		2 F Waldrand Boniger und Waldrand Engelberg-Schürli Ost	viele Fundorte
Langblättriges Hasenohr	<i>Bupleurum</i>	<i>longifolium</i>	1995		1 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord	
Kleine Bibernelle	<i>Pimpinella</i>	<i>saxifraga</i>	1995		4 F	viele Fundorte
Geissfuss, Baumtropfen	<i>Aegopodium</i>	<i>podagraria</i>	1995		10 F	viele Fundorte
Hundspetersilie	<i>Aethusa</i>	<i>cynapium</i>	1982		1 F Ackerland Schwizeracher	wenig Fundorte, weil selten registriert
Wald-Brustwurz	<i>Angelica</i>	<i>sylvestris</i>	2005		2 F Waldrand Schwizeracher und Kiesbänke an der Aare	viele Fundorte
Gewöhnlicher Pastinak	<i>Pastinaca</i>	<i>sativa</i>	1995		1 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	wenig Fundorte, in Brachäckern angesät
Riesen-Bärenklau	<i>Heracleum</i>	<i>mantegazzianum</i>	1995		1 F Kiesgrube Hard	Neophyt, wenig Fundorte
Wilde Möhre	<i>Daucus</i>	<i>carota</i>	2005		12 F	viele Fundorte
Stechpalme	<i>Ilex</i>	<i>aquifolium</i>	1995		13 F	viele Fundorte
Pfaffenhütchen	<i>Euonymus</i>	<i>europaea</i>	1995		11 F	viele Fundorte
Purgier-Kreuzdorn	<i>Rhamnus</i>	<i>cathartica</i>	2005		5 F	viele Fundorte
Buchs	<i>Buxus</i>	<i>sempervirens</i>	2005		2 F Dorfbach und Baumhecke Engelberg-Felli	mässig viele Fundorte in er Natur, hier oft in sehr grosser Dichte
Aufrechte Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>stricta</i>	2005		7 F	mässig viele Fundorte
Süsse Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>dulcis</i>	1995		2 F Wald Hard und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	viele Fundorte
Warzige Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>verrucosa</i>	2005		1 F Engelberg, Baumhecke Mitte	viele Fundorte
Zypressen-Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>cyparissias</i>	2005		1 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	viele Fundorte
Gewöhnliches Johanniskraut	<i>Hypericum</i>	<i>perforatum</i>	1995		18 F	sehr viele Fundorte
Scharfkantiges Johanniskraut	<i>Hypericum</i>	<i>tetrapterum</i>	2005		2 F Wiese Büchs beim Franziskushaus und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	in Feuchtlebensräumen, mässig viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Rauhhaariges Veilchen	<i>Viola</i>	<i>hirta</i>	2005		5 F		sehr viele Fundorte
Wald-Veilchen	<i>Viola</i>	<i>reichenbachiana</i> = <i>sylvestris</i>	1995		10 F		viele Fundorte
Acker-Stiefmütterchen	<i>Viola</i>	<i>arvensis</i>	1967		3 F		in Äckern mässig häufig nachgewiesen, vermutlich häufig
Knoblauchhederich, Lauchkraut	<i>Alliaria</i>	<i>petiolata</i>	1995		11 F		viele Fundorte
Echte Sumpfkresse	<i>Rorippa</i>	<i>palustris</i>	2005		1 F Kiesgrube Hard, unsicher bestimmt		
Wilde Sumpfkresse	<i>Rorippa</i>	<i>sylvestris</i>	2005		1 F Kiesbänke an der Aare , unsicher bestimmt		wenig Fundorte
Wiesen-Schaumkraut	<i>Cardamine</i>	<i>pratensis</i>	2005		17 F		sehr viele Fundorte
Wald-Schaumkraut	<i>Cardamine</i>	<i>flexuosa</i>	2005		1 F Auenwald an der Aare		wenig Fundorte
Fieder-Zahnwurz	<i>Dentaria</i>	<i>heptaphylla</i>	2005		1 F Feldgehölz Engelberg-Felli		mässig viele Fundorte , aber oft in grosser Anzahl
Kahles Turmkrout	<i>Arabis</i>	<i>glabra</i>	2005		2 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord und ev. Trockenstandort Schäfer		wenig Fundorte
Alpen-Gänsekresse	<i>Arabis</i>	<i>alpina</i>	1967		1 F Ackerland Engelberg-Felli		mässig viele Fundorte
Rauhhaarige Gänsekresse	<i>Arabis</i>	<i>hirsuta</i>	2005		1 F Engelberg, Magerwiese West		viele Fundorte
Garten-Monviole, Zweijährige Mondviole, Silberling	<i>Lunaria</i>	<i>annua</i>	1995		1 F Waldrand Engelberg-Schürli Ost, einer von 3 Funden an natürlichen Standorten		Gartenpflanze, wenig Fundorte in der Natur
Frühlings-Hungerblümchen	<i>Erophila</i>	<i>verna</i>	1995		3 F		mässig häufig nachgewiesen, aber vermutlich häufig
Berg-Täschelkraut	<i>Thlaspi</i>	<i>montanum</i>	2005		1 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord		wenig Fundorte
Virginische Kresse	<i>Lepidium</i>	<i>virginicum</i>	2005		3 F		wenig Fundorte, typisch für Sand- und Kiesflächen.
Boden-Kohlrabi, Raps	<i>Brassica</i>	<i>napus</i>	1982		1 F Ackerland Schwizeracher		viele Fundorte, aber in der Natur nur zwei Mal registriert
Hederich	<i>Raphanus</i>	<i>raphanistrum</i>	1982		2 F Ackerland Schwizeracher und Baumhecke Engelberg-Felli		wenig Fundorte
Gelbe Reseda	<i>Reseda</i>	<i>lutea</i>	2005		2 F Kiesgrube Hard und Wiese Schuhfabrik Hug		mässig viele Fundorte, wichtig als Nahrungsquelle für spezialisierte Bienenarten
Korb-Weide	<i>Salix</i>	<i>viminalis</i>	1995		3 F		mässig viele Fundorte
Silberpappel	<i>Populus</i>	<i>alba</i>	2005		1 F Wiese Schuhfabrik Hug		mässig viele Fundorte, aber nur selten registriert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Sigmarskraut	<i>Malva</i>	<i>alcea</i>	1967	6 F	mässig viele Fundorte
Moschusmalve	<i>Malva</i>	<i>moschata</i>	2005	3 F	mässig viele Fundorte
Übersehene Malve	<i>Malva</i>	<i>neglecta</i>	1995	1 F Engelberg, Wiese Mitte	wenig Fundorte
Wilde Malve	<i>Malva</i>	<i>sylvestris</i>	2005	1 F Wald Hard	mässig viele Fundorte
Primel, Stengellose Schlüsselblume	<i>Primula</i>	<i>vulgaris</i>	1995	4 F	mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert
Wald-Schlüsselblume	<i>Primula</i>	<i>elatior</i>	1995	9 F	viele Fundorte
Pfennigkraut	<i>Lysimachia</i>	<i>nummularia</i>	1995	8 F	viele Fundorte
Hainfriedlos	<i>Lysimachia</i>	<i>nemorum</i>	1995	2 F Bächlein Niggelisberg und Wiese Büchs beim Franziskushaus	mässig viele Fundorte
Gewöhnlicher Gilbweiderich	<i>Lysimachia</i>	<i>vulgaris</i>	1995	2 F Dorfbach und Engelberg-Felli, Waldrand Nord	mässig viele Fundorte
Punktierter Gilbweiderich	<i>Lysimachia</i>	<i>punctata</i>	1995	4 F	wenig Fundorte
Acker-Gauchheil	<i>Anagallis</i>	<i>arvensis</i>	1967	2 F Ackerland Engelberg-Felli und Feldgehölz Engelberg-Felli	mässig viele Fundorte
Niederliegendes Mastkraut	<i>Sagina</i>	<i>procumbens</i>	1982	1 F Ackerland Schwizeracher	wenig Fundorte, vermutlich, weil oft nicht beachtet
Quendelblättriges Sandkraut	<i>Arenaria</i>	<i>serpyllifolia</i>	1995	2 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Engelberg, Baumhecke Mitte	mässig viele Fundorte, typisch für sehr magere Stellen.
Mittlere Sternmiere	<i>Stellaria</i>	<i>media</i>	1982	1 F registriert Ackerland Schwizeracher	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Gras-Sternmiere	<i>Stellaria</i>	<i>graminea</i>	1995	2 F registriert Wald Hard und Engelberg, Baumhecke Nord	viele Fundorte, aber nur selten registriert
Gewöhnliches Hornkraut	<i>Cerastium</i>	<i>holosteoides</i>	1982	1 F registriert Ackerland Schwizeracher	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Echtes Seifenkraut	<i>Saponaria</i>	<i>officinalis</i>	2005	1 F Kiesbänke an der Aare	mässig viele Fundorte
Rauhe Nelke	<i>Dianthus</i>	<i>armeria</i>	2005	3 F	wenig Fundorte
Karthäuser-Nelke	<i>Dianthus</i>	<i>carthusianorum</i>	2005	1 F Wiese und Rasen Altersheim Brüggli	mässig viele Fundorte
Rote Waldnelke	<i>Silene</i>	<i>dioeca</i>	2005	1 F Engelberg, Wiese Ost	viele Fundorte
Gewöhnliches Leimkraut	<i>Silene</i>	<i>vulgaris vulgaris</i>	2005	8 F	viele Fundorte

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Jupiternelke	<i>Lychnis</i>	<i>flos-jovis</i>	1995		1 F Kiesgrube Hard	sehr wenig Fundorte
Kuckucks-Lichtnelke	<i>Lychnis</i>	<i>flos-cuculi</i>	1995		7 F	viele Fundorte
Vielsamiger Gänsefuss	<i>Chenopodium</i>	<i>polyspermum</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	viele Fundorte, aber nur drei Mal registriert
Kleiner Sauerampfer	<i>Rumex</i>	<i>acetosella</i>	1995		4 F	wenig Fundorte
Stumpfbblätteriger Ampfer	<i>Rumex</i>	<i>obtusifolius</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	sehr viele Fundorte, aber nurwenig häufig registriert
Vogel-Knöterich, Verschiedenblättriger Knöterich	<i>Polygonum</i>	<i>aviculare</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Pfirsich-Knöterich	<i>Polygonum</i>	<i>persicaria</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Winden-Knöterich	<i>Fallopia = Polygonum)</i>	<i>convolvulus</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	sehr wenig Fundorte registriert
Zugespitzter Knöterich	<i>Reynoutria</i>	<i>japonica</i>	2005		2 F Kiesbänke an der Aare und Wiese Schuhfabrik Hug	Neophyt, mässig viele Fundorte
Bitterklee, Fiebertklee	<i>Menyanthes</i>	<i>trifoliata</i>	1995		2 F Naturnahe Anlage Neumatt und Wiese Büchs beim Franziskushaus	in stehenden Gewässer, wenig Fundorte
Singrün, Kleines Immergrün	<i>Vinca</i>	<i>minor</i>	2005		3 F	mässig viele Fundorte
Schwalbenwurz	<i>Vincetoxicum</i>	<i>hirundinaria</i>	1995		1 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord	viele Fundorte
Echtes Labkraut	<i>Galium</i>	<i>verum</i>	2005		1 F Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	viele Fundorte
Waldmeister	<i>Galium</i>	<i>odoratum</i>	1995		8 F	viele Fundorte
Sumpf-Labkraut	<i>Galium</i>	<i>palustre</i>	1995		1 F Bächlein Niggliisberg	wenig Fundorte
Zwerg-Holunder, Attich	<i>Sambucus</i>	<i>ebulus</i>	1995		5 F	mässig viele Fundorte
Trauben-Holunder	<i>Sambucus</i>	<i>racemosa</i>	2005		1 F Engelberg, Baumhecke Nord	mässig viele Fundorte
Nüsslisalat-Artkomplex	<i>Valerianella</i>	<i>locusta s.l.</i>	1995		11 F	viele Fundorte
Echter Baldrian	<i>Valeriana</i>	<i>officinalis</i>	2005		6 F	viele Fundorte
Zweihäusiger Baldrian	<i>Valeriana</i>	<i>dioeca</i>	2005		4 F	mässig viele Fundorte
Wilde Karde	<i>Dipsacus</i>	<i>fullonum = silvestris</i>	2005		2 F Wald Hard und Kiesgrube Hard	viele Fundorte

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen			Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region	
Acker-Witwenblume	<i>Knautia</i>	<i>arvensis</i>	1995		13 F	sehr viele Fundorte	
Wald-Witwenblume	<i>Knautia</i>	<i>dipsacifolia</i>	1995		3 F	viele Fundorte	
Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa</i>	<i>columbaria</i>	1995		1 F Engelberg, Magerwiese West	viele Fundorte	
Acker-Winde	<i>Convolvulus</i>	<i>arvensis</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher		
Grosse Winde	<i>Calystegia</i>	<i>sepium</i>	2005		5 F	viele Fundorte	
Skorpionskraut	<i>Heliotropium</i>	<i>europaeum</i>	1995		1 F Kiesgrube Hard		
Sumpf-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis</i>	<i>scorpioides</i>	2005		1 F Kiesbänke an der Aare	mässig viele Fundorte	
Wald-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis</i>	<i>sylvatica</i>	2005		4 F	viele Fundorte	
Acker-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis</i>	<i>arvensis</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Gewöhnlicher Natterkopf	<i>Echium</i>	<i>vulgare</i>	1995		2 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Kiesgrube Hard	mässig viele Fundorte	
Dunkelgrünes Lungenkraut	<i>Pulmonaria</i>	<i>obscura</i>	1995		7 F	viele Fundorte	
Echter Wallwurz, Beinwell	<i>Symphytum</i>	<i>officinale</i>	2005		1 F Wiese Büchs beim Franziskushaus	mässig viele Fundorte	
Gewöhnliche Tollkirsche	<i>Atropa</i>	<i>bella-donna</i>	1995		1 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord	wenig Fundorte	
Tomate	<i>Lycopersicum</i>	<i>esculentum</i>	2005		1 F Kiesbänke an der Aare	sehr wenig Fundorte in der Natur	
Bittersüss	<i>Solanum</i>	<i>dulcamara</i>	2005		1 F Kiesbänke an der Aare	wenig Fundorte	
Schwarzer Nachtschatten	<i>Solanum</i>	<i>nigrum</i>	1995		2 F Kiesgrube Hard und Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	wenig Fundorte	
Sommerflieder	<i>Buddleja</i>	<i>davidii</i>	1995		6 F	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Kleinblütige Königskerze	<i>Verbascum</i>	<i>thapsus</i>	2005		3 F	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Grossblütige Königskerze	<i>Verbascum</i>	<i>densiflorum</i>	1995		1 F registriert Wiese Schuhfabrik Hug	wenig häufig nachgewiesen, aber vermutlich häufig	
Knotige Braunwurz	<i>Scrophularia</i>	<i>nodosa</i>	1995		7 F	viele Fundorte	
Leinkraut Gattung	<i>Linaria</i>	<i>sp.</i>	2005		1 F Trockenstandort Schäfer		

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gewöhnliches Leinkraut	<i>Linaria</i>	<i>vulgaris</i>	2005		8 F	viele Fundorte
Zimbelkraut, Mauer-Leinkraut	<i>Cymbalaria</i>	<i>muralis</i>	2005		1 F Kiesbänke an der Aare	wenig Fundorte
Kleines Leinkraut	<i>Chaenorrhinum</i>	<i>minus</i>	2005		1 F Kiesgrube Hard	wenig Fundorte
Grosser Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>teucrium</i>	2005		1 F Engelberg, Baumhecke Mitte	viele Fundorte
Bachungen-Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>beccabunga</i>	2005		2 F Bächlein Niggisberg und Bächlein und Waldrand Rüti /Ischlegli	mässig viele Fundorte
Echter Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>officinalis</i>	1995		5 F	mässig viele Fundorte
Efeublättriger Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>hederifolia</i>	1995		10 F	viele Fundorte
Persischer Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>persica</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Behaarter Klappertopf	<i>Rhinanthus</i>	<i>alectorolophus</i>	2005		1 F Wiese Hardstrasse	viele Fundorte
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago</i>	<i>media</i>	2005		3 F	viele Fundorte
Seetanne	<i>Hippuris</i>	<i>vulgaris</i>	1995		1 F Weiher Büchs beim Franziskushaus	wenig Fundorte
Echtes Eisenkraut	<i>Verbena</i>	<i>officinalis</i>	2005		4 F	viele Fundorte
Gundelrebe	<i>Glechoma</i>	<i>hederacea</i> <i>hederacea</i>	1995		1 F registriert Wald Hard	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Immenblatt, Waldmelisse	<i>Melittis</i>	<i>melissophyllum</i>	1995		2 F Waldrand Boniger und Engelberg, Baumhecke Mitte	viele Fundorte
Schmalblättriger Hohlzahn	<i>Galeopsis</i>	<i>angustifolia</i>	1995		1 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	wenig Fundorte, typisch für Grob-Kiesflächen
Gefleckte Taubnessel	<i>Lamium</i>	<i>maculatum</i>	2005		5 F	viele Fundorte
Berg-Goldnessel	<i>Lamiastrum</i>	<i>montanum</i>	1995		11 F	viele Fundorte
Alpenziest	<i>Stachys</i>	<i>alpina</i>	1995		2 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord und Baumhecke Engelberg-Felli	viele Fundorte
Wald-Ziest	<i>Stachys</i>	<i>sylvatica</i>	2005		7 F	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Wiesensalbei	<i>Salvia</i>	<i>pratensis</i>	1995		5 F	viele Fundorte
Wilder Majoran, Dost	<i>Origanum</i>	<i>vulgare</i>	1995		7 F	viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
					Bemerkungen zur Art in der Gemeinde		Bemerkungen zur Art in der Region
Arznei-Thymian	<i>Thymus</i>	<i>pulegioides</i>	1995		5 F		sehr viele Fundorte
Wasser-Minze	<i>Mentha</i>	<i>aquatica</i>	1995		2 F Quellgerinne Rüti und Weiher Täli Rüti / Leimgruben		in Feuchtlebensräumen, mässig viele Fundorte
Rundblättrige Minze	<i>Mentha</i>	<i>suaveolens</i>	2005		1 F Trockenstandort Schäfer		
Rapunzel-Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>rapunculus</i>	1995		14 F		viele Fundorte , begehrte Nahrungsquelle für spezialisierte Bienenarten
Rundblättrige Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>rotundifolia</i>	1995		5 F		sehr viele Fundorte
Acker-Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>rapunculoides</i>	2005		1 F 1 E Wiese Büchs beim Franziskushaus		viele Fundorte
Nessel-Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>trachelium</i>	2005		6 F		viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Venus-Frauenspiegel	<i>Legousia</i>	<i>speculum-veneris</i>	1982		3 F		wenig Fundorte
Ährige Rapunzel	<i>Phyteuma</i>	<i>spicatum</i>	1995		7 F		viele Fundorte
Gewöhnlicher Wasserdost	<i>Eupatorium</i>	<i>cannabinum</i>	2005		3 F		viele Fundorte
Echte Goldrute	<i>Solidago</i>	<i>virgaurea virgaurea</i>	2005		1 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord		viele Fundorte
Kanadische Goldrute	<i>Solidago</i>	<i>canadensis</i>	2005		5 F		mässig viele Fundorte
Späte Goldrute	<i>Solidago</i>	<i>gigantea</i>	2005		6 F		mässig viele Fundorte
Dürrwurz	<i>Inula</i>	<i>conyza</i>	2005		1 F Wiese Schäfer		mässig viele Fundorte
Echte Kamille	<i>Matricaria</i>	<i>recutita = chamomilla</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher		viele Fundorte, aber wenig häufig registriert
Gewöhnliche Margerite	<i>Leucanthemum</i>	<i>vulgare</i>	1995		9 F		sehr viele Fundorte
Rainfarn	<i>Tanacetum</i>	<i>vulgare</i>	1995		2 F Trockenstandort Schäfer und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli		wenig Fundorte
Mutterkraut	<i>Tanacetum</i>	<i>parthenium</i>	1995		4 F		
Huflattich	<i>Tussilago</i>	<i>farfara</i>	1995		6 F		viele Fundorte
Kriechende Gemswurz	<i>Doronicum</i>	<i>pardalianches</i>	2005		1 F Waldrand Engelberg-Schürli Ost (Gartenflüchtling)		
Gewöhnliches Kreuzkraut	<i>Senecio</i>	<i>vulgaris</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher		viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Klebriges Kreuzkraut	<i>Senecio</i>	<i>viscosus</i>	1995		1 F Wiesenstreifen vor Recycling AG (Radiatorenfabrik)	
Raukenblättriges Kreuzkraut	<i>Senecio</i>	<i>erucifolius</i>	2005		7 F	viele Fundorte
Jakobs-Kreuzkraut	<i>Senecio</i>	<i>jacobaea</i>	2005		10 F	viele Fundorte
Kohldistel	<i>Cirsium</i>	<i>oleraceum</i>	2005		2 F Quellgerinne Rüti und Wiese Büchs beim Franziskushaus	viele Fundorte
Kornblume	<i>Centaurea</i>	<i>cyanus</i>	1995		1 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug	wenig Fundorte
Skabiosen-Flockenblume	<i>Centaurea</i>	<i>scabiosa</i>	1995		1 F Engelberg, Magerwiese West	viele Fundorte
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea</i>	<i>jacea s.l.</i>	1995		8 F	sehr viele Fundorte
Schmalblättrige Flockenblume	<i>Centaurea</i>	<i>jacea angustifolia</i>	1995		1 F Engelberg, Magerwiese West	mässig viele Fundorte
Wegwarte, Zichorie	<i>Cichorium</i>	<i>intybus</i>	2005		1 F Wald Hard	viele Fundorte
Steifhaariger Löwenzahn	<i>Leontodon</i>	<i>hispidus</i>	1995		9 F	sehr sehr viele Fundorte
Habichtskrautartiges Bitterkraut	<i>Picris</i>	<i>hieracioides</i>	1995		1 F registriert Engelberg, Magerwiese West	
Wiesen-Bocksbart	<i>Tragopogon</i>	<i>pratensis</i>	2005		1 F Trockenstandort Schäfer	wenig Fundorte
Ausdauernder Lattich	<i>Lactuca</i>	<i>perennis</i>	2005		2 F Kiesgrube Hard und Wiesenstreifen Schützenhaus	
Kompass-Lattich	<i>Lactuca</i>	<i>serriola</i>	2005		9 F	mässig viele Fundorte
Stinkender Pippau	<i>Crepis</i>	<i>foetida</i>	2005		1 F Kiesgrube Hard	
Gewöhnliches Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>pilosella</i>	1995		5 F	viele Fundorte
Öhrchen-Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>lactucella</i>	2005		2 F Trockenstandort Schäfer und Engelberg, Wiese Mitte	viele Fundorte
Florentiner Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>piloselloides</i>	2005		1 F Trockenstandort Schäfer	wenig Fundorte, unauffällige, aber beachtenswerte Pflanzenart!
Orangerotes Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>aurantiacum</i>	1995		2 F Ruderalgelände Schuhfabrik Hug und Wiese Büchs beim Franziskushaus	wenig Fundorte
Wald-Habichtskraut, Mauer-Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>sylvaticum</i>	1995		1 F registriert Wald Hard	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Doldiges Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>umbellatum</i>	1995		2 F Wiesenstreifen Schützenhaus und Kiesgrube Hard	

			erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Wegerichblättrig Froschlöffel	<i>Alisma</i>	<i>plantago-aquatica</i>	2005		1 F Wiese beim Gemeindehaus	in stehenden Gewässern, mässig viele Fundorte
Kamm-Laichkraut	<i>Potamogeton</i>	<i>pectinatus</i>	2005		1 F Naturnahe Anlage Neumatt	wenig Fundorte
Schwimmendes Laichkraut	<i>Potamogeton</i>	<i>natans</i>	1995		3 F	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte, aber hier oft in grosser Anzahl
Weinberg-Lauch	<i>Allium</i>	<i>vineale</i>	2005		5 F	viele Fundorte
Bärlauch	<i>Allium</i>	<i>ursinum</i>	2005		2 F Feldgehölz Engelberg-Felli und Auenwald an der Aare (ohne	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert
Rosslauch	<i>Allium</i>	<i>oleraceum</i>	1995		3 F	viele Fundorte
Türkenbundlilie	<i>Lilium</i>	<i>martagon</i>	1995		3 F	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt
Blaustern	<i>Scilla</i>	<i>bifolia</i>	1995		8 F	mässig viele Fundorte, hier oft in grosser Anzahl
Doldiger Milchstern	<i>Ornithogalum</i>	<i>umbellatum</i>	1995		2 F Wiese Schuhfabrik Hug und Wiese hinter Recycling AG (Radiatorenfabrik)	mässig viele Fundorte
Bisamhyazinthe Gattung	<i>Muscari</i>	<i>sp.</i>	1995		1 F Auenwald und Kiesbänke an der Aare	sehr viele Fundorte
Traubige Bisamhyazinthe	<i>Muscari</i>	<i>racemosum</i>	1995		6 F	mässig viele Fundorte
Zweiblättrige Schattenblume	<i>Majanthemum</i>	<i>bifolium</i>	1995		1 F Wald Hard	wenig Fundorte
Vielblütige Weisswurz	<i>Polygonatum</i>	<i>multiflorum</i>	1995		10 F	im Wald viele Fundorte
Maiglöckchen, Maienriesli	<i>Convallaria</i>	<i>majalis</i>	2005		1 F Engelberg, Wiese Ost	mässig viele Fundorte, im Kanton Solothurn geschützt.
Vierblättrige Einbeere	<i>Paris</i>	<i>quadrifolia</i>	2005		3 F	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert
Kleines Schneeglöcklein	<i>Galanthus</i>	<i>nivalis</i>	2005		8 F	wenig Fundorte
Märzenglöcklein, Hegerli, Frühlings-Knotenblume	<i>Leucojum</i>	<i>vernum</i>	2005		1 F Bächlein Niggisberg	wenig Fundorte
Gelbe Schwertlilie	<i>Iris</i>	<i>pseudacorus</i>	1995		4 F	mässig viele Fundorte
Sibirische Schwertlilie	<i>Iris</i>	<i>sibirica</i>	1995		2 F Naturnahe Anlage Neumatt und Wiese beim Gemeindehaus (eingepflanzt)	
Deutsche Schwertlilie	<i>Iris</i>	<i>germanica</i>	2005		1 F Baumhecke Engelberg-Felli auf Gartenabfall	Gartenpflanze, sehr wenig Fundorte in der Natur
Männliche Orchis	<i>Orchis</i>	<i>mascula</i>	1995		4 F	viele Fundorte, nach NHV geschützt

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Blaugrüne Binse	<i>Juncus</i>	<i>inflexus</i>	2005		3 F	mässig viele Fundorte
Knäuel-Binse	<i>Juncus</i>	<i>conglomeratus</i>	1995		4 F	wenig Fundorte, aber selten registriert
Behaarte Hainsimse	<i>Luzula</i>	<i>pilosa</i>	2005		1 F Wiesenstreifen Schützenhaus	wenig häufig gefunden, vermutlich oft übersehen
Busch-Hainsimse	<i>Luzula</i>	<i>luzuloides</i>	1995		1 F Wald Hard	mässig viele Fundorte
Feld-Hainsimse	<i>Luzula</i>	<i>campestris</i>	1995		18 F	viele Fundorte
Waldsimse	<i>Scirpus</i>	<i>sylvaticus</i>	1995		7 F	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Tabernaemontanus' Teichbinse	<i>Schoenoplectus</i>	<i>tabernaemontani</i>	2005		1 F Weiher beim Gemeindehaus, eingepflanzt	
Seebinsse	<i>Schoenoplectus</i>	<i>lacustris</i>	2005		2 F Kiesgrube Hard und Weiher beim Gemeindehaus	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte
Gewöhnliche Sumpfbinsse	<i>Eleocharis</i>	<i>palustris</i>	2005		2 F Kiesgrube Hard und Weiher beim Gemeindehaus	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Pairas Segge	<i>Carex</i>	<i>pairaei</i> = <i>muricata</i>	1995		7 F	mässig viele Fundorte
Leers Segge	<i>Carex</i>	<i>leersii</i>	2005		1 F Wiese Schuhfabrik Hug	wenig Fundorte
Entferntährige Segge	<i>Carex</i>	<i>divulsa</i> = <i>muricata</i>	2005		1 F Wiese Schuhfabrik Hug, unsicher bestimmt	wenig Fundorte
Abgerücktährige Segge	<i>Carex</i>	<i>remota</i>	1995		2 F Bächlein Niggisberg und Naturnahe Anlage Neumatt	mässig viele Fundorte, aber oft nicht registriert
Waldsee gras, Zitter gras-Segge	<i>Carex</i>	<i>brizoides</i>	1995		7 F	viele Fundorte, vor allem im Flachland, oft in sehr grosser Dichte
Filzfrüchtige Segge	<i>Carex</i>	<i>tomentosa</i>	2005		1 F Wiese Schuhfabrik Hug	wenig Fundorte
Frühlings-Segge	<i>Carex</i>	<i>caryophylla</i>	1995		5 F	viele Fundorte, typisch für Magerrasen
Bleiche Segge	<i>Carex</i>	<i>pallesens</i>	1995		1 F Wiese Hardstrasse	wenig Fundorte
Hängende Segge	<i>Carex</i>	<i>pendula</i>	2005		3 F	mässig viele Fundorte
Schlaffe Segge	<i>Carex</i>	<i>flacca</i>	2005		2 F Quellgerinne Rüti und Wiese Büchs beim Franziskushaus	viele Fundorte
Hirsensfrüchtige Segge	<i>Carex</i>	<i>panicea</i>	2005		1 F Quellgerinne Rüti	mässig viele Fundorte
Weisse Segge	<i>Carex</i>	<i>alba</i>	1995		4 F	mässig viele Fundorte, hier oft in grosser Dichte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum
				Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gefingerte Segge	<i>Carex</i>	<i>digitata</i>	2005	1 F Engelberg-Felli, Waldrand Nord	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Wald-Segge	<i>Carex</i>	<i>sylvatica</i>	1995	2 F Wald Hard und Wiesenstreifen Schützenhaus	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Behaarte Segge	<i>Carex</i>	<i>hirta</i>	1995	9 F	mässig viele Fundorte registriert
Geschnäbelte Segge	<i>Carex</i>	<i>rostrata</i>	2005	1 F Weiher beim Gemeindehaus	wenig Fundorte
Scharfkantige Segge	<i>Carex</i>	<i>acutiformis</i>	1995	6 F	mässig viele registrierte Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Kleiner Rohrkolben	<i>Typha</i>	<i>minima</i>	1995	1 F Weiher beim Gemeindehaus (eingepflanzt)	
Breitblättriger Rohrkolben	<i>Typha</i>	<i>latifolia</i>	2005	2 F Weiher beim Gemeindehaus und Weiher Büchs beim Franziskushaus	an stehenden Gewässern, mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Verzweigter Igelkolben	<i>Sparganium</i>	<i>erectum</i>	2005	4 F	mässig viele Fundorte
Taube Trespe	<i>Bromus</i>	<i>sterilis</i>	1995	3 F	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Aufrechte Trespe	<i>Bromus</i>	<i>erectus</i>	1995	7 F	sehr viele Fundorte
Rot-Schwingel	<i>Festuca</i>	<i>rubra</i>	1995	15 F	viele Fundorte registriert, wahrscheinlich sehr viele
Schaf-Schwingel	<i>Festuca</i>	<i>ovina</i>	2005	1 F Trockenstandort Schäfer	mässig viele Fundorte
Mäuse-Federschwingel	<i>Vulpia</i>	<i>myuros</i>	2005	1 F Trockenstandort Schäfer	sehr wenig Fundorte, typisch für Sand- und Kiesflächen
Fieder-Zwenke	<i>Brachypodium</i>	<i>pinnatum</i>	2005	1 F Engelberg-Felli, Waldrand West	viele Fundorte
Wald-Zwenke	<i>Brachypodium</i>	<i>sylvaticum</i>	1995	2 F Leimgruben, Bächlein Südwest und Dorfbach	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Grosses Süssgras	<i>Glyceria</i>	<i>maxima</i>	2005	1 F Weiher beim Gemeindehaus (eingepflanzt)	sehr wenig Fundorte
Einjähriges Rispengras	<i>Poa</i>	<i>annua</i>	1982	1 F registriert Ackerland Schwizeracher	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Hain-Rispengras	<i>Poa</i>	<i>nemoralis</i>	1995	1 F Wald Hard	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Mittleres Zittergras	<i>Briza</i>	<i>media</i>	1995	5 F	viele Fundorte
Gewöhnliches Kammgras	<i>Cynosorus</i>	<i>cristatus</i>	1995	2 F Wiese Sandrain und Wiese und Rasen Altersheim Bruggli	viele Fundorte, aber wenig oft registriert
Nickendes Perlgras	<i>Melica</i>	<i>nutans</i>	2005	1 F Wald Hard	mässig viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-	letzte Beob-	F = Fundort	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum	
			acht.	acht.	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kriechende Qucke, Schnürgras	<i>Agropyron</i>	<i>repens</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Schilf	<i>Phragmites</i>	<i>australis</i>	2005		1 F Naturnahe Anlage Neumatt	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Horstbildende Schmieie, Rasenschmieie	<i>Deschampsia</i>	<i>caespitosa</i>	1995		9 F	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert	
Flaum-Wiesenhafer	<i>Avenula</i>	<i>pubescens</i>	1995		3 F	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Kriechender Windhalm	<i>Agrostis</i>	<i>stolonifera</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Gewöhnlicher Windhalm	<i>Apera</i>	<i>spica-venti</i>	1982		1 F registriert Ackerland Schwizeracher	bisher nur zwei Fundorte registriert	
Timothe-Gras	<i>Phleum</i>	<i>pratense</i>	1982		4 F	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Ausgebreitete Waldhirse	<i>Milium</i>	<i>effusum</i>	1995		3 F	viele Fundorte im Wald, aber nur mässig häufig registriert	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	<i>Anthoxanthum</i>	<i>odoratum</i>	2005		17 F	viele Fundorte	
Rohrglanzgras	<i>Phalaris</i>	<i>arundinacea</i>	2005		2 F Kiesbänke an der Aare und Kiesgrube Hard	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Bluthirse	<i>Digitaria</i>	<i>sanguinalis</i>	2005		1 F registriert Kiesgrube Hard	wenig Fundorte, aber vermutlich oft nicht registriert	
Gefleckter Aronstab	<i>Arum</i>	<i>maculatum</i>	1995		21 F	viele Fundorte	
Dreifurchige Wasserlinse	<i>Lemna</i>	<i>trisulca</i>	2005		1 F Weiher Büchs beim Franziskushaus	sehr wenig Fundorte	
Kleine Wasserlinse	<i>Lemna</i>	<i>minor</i>	1995		2 F Naturnahe Anlage Neumatt und Bächlein beim Franziskushaus	an stehenden Gewässern, mässig viele Fundorte	