

Waldweg östlich Riesi – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 616325 241350 Höhe ü. M.: 650 m Expositionen: SSW SW Fläche: 40 a

	BP 1 keine Begehungen	BP2 (2002 bis 2007)	BP3 (2012 - 2016)	alle BP (2002 bis 2016)
Anzahl Begehungen:		07	10	17
Beobachtungsdauer:		9 Std. 05 Minuten	09 Std. 20 Min.	18 Std. 25 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:		BP1	BP2	BP3	alle A	alle B	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle A	alle B	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle A	alle B
Anzahl Ereignisse:			161	166		328			316	416		748			1,96	2,15		2,28
Bewertete Taxa:			115	107	177	222			262	335	505	597		2,28	3,13	2,85	2,69	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------

WEICHTIERE	MOLLUSCA	2002	2014						
Haferkorn (-schnecke)	Chondrina avenacea Art	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 3	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig	2
Wegschneckengattung	Arion Gattung	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	Gattung sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Scharfgerippte Schliessmundschnecke	Clausilia cruciata Art	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht	4

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum. Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.
 Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
 Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
 Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
 Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
 Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
 Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
 Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
 Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

() in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
 & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
 * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
 ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert
 o in dieser Beobachtungsperiode habe ich den Gesang nur noch schwach wahrgenommen
 oo in dieser Beobachtungsperiode habe ich den Gesang nicht mehr wahrgenommen

Schmetterlinge Regio Basiliensis:
 Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
 Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

Seltenheits-Index: Für die bewerteten Taxa gilt: alle A: wenn jedes Taxon für alle Beobachtungsperioden nur 1 Mal berücksichtigt wird
 alle B: wenn jedes Taxon in jeder Beobachtungsperiode gezählt wird

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2			
Weinbergschnecke	Helix	pomatia Art	2002	2014				4	3		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden	1
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus Art	2012	2012					2		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis Art	2012	2012					3		Max. Abundanzstufe 3	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1
Wolfsspinnen-Artengruppe	Pardosa	lugubris- Komplex	2002	2013				1	1*		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 1571	1
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1
Springspinnengattung	Heliophanus Gattung		2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	Gattung häufig gefunden	2
VIELFÜSSER	MYRIAPODA		2002	2002									
Steinläufer	Lithobius Gattung		2002	2002				1	*		Max. Abundanzstufe 1	Gattung häufig gefunden, aber nie auf die Art bestimmt und oft nicht registriert	
SchnurfüsserArt	Tachypodojulus	niger Art	2002	2002				1	*		Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten häufig	2
GLIEDERFÜSSLER			2002	2016									
INSEKTEN	Hexapoda		2002	2016									
Libellen	Odonata		2002	2002									
Blaugrüne Mosaikjungfer	Aeshna	cyanea Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	1
Heuschrecken	Saltatoria		2002	2014									
Gewöhnliche Strauchschrecke	Pholidoptera	griseoptera Art	2002	2013				3	1		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden	1
Waldgrille z.T. nur Gesang	Nemobius	sylvestris Art z.T. nur Gesang	2002	2014				3	1		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Rote Keulenschrecke	Gomphocerus alt und neu:	rufus Art	2002	2002				2			Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden	1
Schnabelkerfe	Heteroptera Homoptera		2002	2014									
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum Art	2002	2002				2			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Rotbeinige Baumwanze	Pentatoma	rufipes Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden, Waldrandbewohner, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Leder- oder Randwanzen-Art	Coreus	marginatus Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Feuerwanze	Pyrrhocoris	apterus Art	2012	2012						1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1
Ritterwanzen-Art	Tropidothorax	leucopterus Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4
Sichelwanzen-Art	Nabis	flavomarginatus Art	2012	2012						1		Max. Abundanzstufe 1	selten gefunden	16
Sichelwanzen-Art	Nabis	rugosus Art	2014	2014						1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	2
Schaumzikade nicht bestimmt	(Cercopidae)	non det. (Nest)	2002	2002						2		Max. Abundanzstufe 2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus	spumarius Art	2012	2012						1		Max. Abundanzstufe 1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Netzflügler Ordnung	Planipennia		2013	2014										
Florfliegen-Art	Diochrysa alt: Mallada	ventralis Art	2013	2013						1		Max. Abundanzstufe 1	wenig häufig gefunden	8
Ameisenjunger-, -löwen-Art	Euroleon	nostras Art	2012	2014						3		Max. Abundanzstufe 3	Larven wenig häufig, Imagines selten gefunden	8
Käfer	Coleoptera		2002	2016										
Pechfarbiger Striemenkäfer	Molops	piceus Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 475	2
Totengräber-Art	Necrophorus	vespilloides Art	2012	2012						1		Max. Abundanzstufe 1	wenig häufig gefunden	8
Weichkäfer-Art	Rhagonycha	lignosa Art	2013	2013						1		Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4
Grüner Warzenkäfer	Malachius	viridis Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4
Prachtkäfer-Art	Anthaxia	helvetica Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 27	2
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1
Waldmistkäfer	Anoplodtrupes alt: Geotrupes	stercorosus Art	2012	2012						1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, besonders im Wald	2
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus Art	2002	2016				1	1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1
Kleiner Rehschröter	Platycerus	caraboides Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4
Gefleckter Schmalbock	Strangalia neu: Rutpela	maculata Art	2002	2016				1	1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3									
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Strangalia neu: Stenurella	melanura Art	2012	2016				2			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1	
Gescheckter oder Hirsch-Glanzrüssler	Polydrusus	cervinus Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als häufig	2	
Seidiger Glanzrüssler	Polydrusus	sericeus Art neu: formosus (Mayer,	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als häufig	2	
Buchen-Springrüssler, Buchenblattrüssler	Orchestes alt: Rhynchaenus	fagi Art	2013	2013					1		Max. Abundanzstufe 5	Frassspuren an Rotbuchen sehr häufig in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1	
Hautflügler	Hymenoptera		2002	2016										
Blattwespen-Art	Rhogogaster	chlorosoma Art	2013	2013					1		Max. Abundanzstufe 1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8	
Blattwespen-Artenkomplex	Tenthredo	marginella- Gruppe Artengruppe	2012	2012					2		Max. Abundanzstufe 2	häufig gefunden, möglicherweise zwei verschiedene Arten	2	
Blattwespen-Art	Tenthredo	vespa Art	2002	2012				1	1		Max. Abundanzstufe 2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2	
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	computatorius Art	2002	2002					1		Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4	
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle) Art	2002	2002					1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Rossameise	Camponotus	ligniperda Art	2013	2013					1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2	
Wegameisen-Art	Lasius	platythorax Art	2002	2002					1		Max. Abundanzstufe 3	mässig häufig gefunden	4	
Grauschwarze Sklavenameise	Formica	fusca Art	2002	2012				2	1*		Max. Abundanzstufe 3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 236	2	
Berg-Waldameise	Formica	lugubris Art	2002	2002					2		Max. Abundanzstufe 3	häufig gefunden	2	
Wiesen-Waldameise	Formica	pratensis Art	2002	2002					1		Max. Abundanzstufe 3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	
Strunkameise, Waldameisen-Art	Formica	truncorum Art	2002	2002					1		Max. Abundanzstufe 3	wenig häufig gefunden	8	
Gescheckte Wegwespe	Dipogon	variegatum Art	2002	2002					1		Max. Abundanzstufe 1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	8	
Grabwespen-Art	Ectemnius (Metacrabro)	lituratus Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2	
Grabwespen-Art	Ectemnius (Hypocrabro)	continuus Art	2012	2012					2		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2	
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus	confusus Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 2	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2	
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum Art	2012	2016					2		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6	BP7	BP8				
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps Art	2016	2016					1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1	
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauxillum Art	2016	2016					1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1	
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum	fulvicorne Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 45	2	
Grünglanz-Schmalbiene	Lasioglossum	nitidulum Art	2002	2012				1	1		Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4	
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum	morio Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 93	1	
Leisten-Zwergsandbiene	Andrena	strohella Art	2002	2016				1			Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2	
Gewöhnliche Zergsandbiene	Andrena	minutula Art	2016	2016					1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2	
Zweifarbige Sandbiene	Andrena	bicolor Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	2	
Glockenblumen- Sägehornbiene	Melitta	haemorrhoidalis Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Rote Mauerbiene	Osmia	rufa Art neu: bicornis	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen	1	
Zweifarbige Schneckenhausbiene	Osmia	bicolor Art	2013	2013					1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Goldene Schneckenhausbiene	Osmia	aurulenta Art	2002	2002				3			Max. Abundanzstufe 2	häufig gefunden	2	
Gelbspornige Stängelbiene	Osmia neu Hoplitis	claviventris Art	2002	2016				1			Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4	
Schwarzbürstige Blattschneiderbiene	Megachile	nigriventris Art	2016	2016					1		Max. Abundanzstufe 1	wenig häufig gefunden	8	
Gelbfleckige Wespenbiene	Nomada	flavoguttata Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2	
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris Art	2002	2014				1	3		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1	
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1	
Wiesenhummel	Bombus	pratorum Art	2002	2014				3	3		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1	
Steinhummel	Bombus	lapidarius Art	2002	2016				2	1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1	
Ackerhummel	Bombus	pascuorum Art	2002	2016				2	3		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1	
Gartenhummel	Bombus	hortorum Art	2002	2016				1	2		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2			
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	bohemicus Art	2002	2012				2	1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	sylvestris Art	2012	2016					2		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1
Honigbiene	Apis	mellifera Art	2002	2016				3	4		Max. Abundanzstufe 4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge	Lepidoptera		2002	2016									
Langfühlermotten-Art	Nematopogon	swammerdamella Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1
Kohlmotte, Schleiermotte	Plutella	xylostella Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden	2
Hufeisenklee-Widderchen	Zygaena	transalpina Art	2004	2004				1			Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 104	2
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Dipleurina	lacustrata Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	wenig häufig gefunden	8
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata Art	2012	2016					1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Perinephela	lancealis Art	2016	2016					1		Max. Abundanzstufe 1	erst 2 Mal gefunden	32
Zünsler-Art	Microstega	hyalinata Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden	2
Wanderzünsler	Nomophila	noctuella Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	1
Nesselzünsler	Pleuroptya	ruralis Art	2012	2012					1		Max. Abundanzstufe 3	häufig gefunden, besonders an Brennnesseln	2
Waldreben- Fensterschwärmerchen	Thyris	fenestrella Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	am Tag 17 Falter gefunden, R.Bas.: 1, 1	8
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Weissling nicht bestimmt	(Pieridae)	non det.	2002	2016				4	4		Max. Abundanzstufe 2	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	1
Tintenfleckweissling Artengruppe	Leptidea	sinapis-Komplex	2002	2012				3	1		Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae Art	2002	2002				1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae Art	2012	2012			1	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1	
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi Art	2002	2016			2 4	Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1	
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines Art	2002	2013			1 2	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1	
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis Art	2002	2002			1 4	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1	
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni Art	2002	2016			2	Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1	
Grosser Schillerfalter	Apatura	iris Art	2000	2000				1 mn vid. H. Wittmer	eigene Funde selten, R.Bas.: 18, 44	16	
Kleiner Eisvogel	Limenitis	camilla Art	2002	2002			3	Max. Abundanzstufe 2	häufig gefunden, R.Bas.: 31, 124	2	
Tagpfauenauge	Inachis	io Art	2002	2002			1	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1	
Admiral	Vanessa	atalanta Art	2002	2012			1 1	Max. Abundanzstufe 1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1	
C-Falter	Polygonia	c-album Art	2002	2002			1	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1	
Landkärtchen	Araschnia	levana Art	2002	2002			1	Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2	
Kaisermantel	Argynnis	paphia Art	2002	2012			1 1	Max. Abundanzstufe 3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531	1	
Kleiner Perlmutterfalter	Issoria	lathonia Art	2002	2002			1	Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 89	2	
Veilchen- Perlmutterfalter	Boloria alt: Clossiana	euphrosyne Art	2002	2012			3 1	Max. Abundanzstufe 2	häufig gefunden, R.Bas.: 21, 143	2	
Waldteufel	Erebia	aethiops Art	2002	2012			1 2	Max. Abundanzstufe 4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 502	1	
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina Art	2002	2016			4 4	Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1	
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus Art	2016	2016			1	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1	
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus Art	2012	2012			1	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1	
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria Art	2002	2016			1 5	Max. Abundanzstufe 2	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1	
Mauerfuchs	Lasiommata	megea Art	2002	2002			1	Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1	
Braunauge	Lasiommata	maera Art	2002	2002			1	Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 175	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Gelbringfalter, Bacchantin	Lopinga achine Art	2002	2012				3	1	Max. Abundanzstufe 2	selber nur wenige Falter an wenigen Orten gesehen, R.Bas.: 3, 8	16
Faulbaum-Bläuling	Celastrina argiolus Art	2004	2012				1	1	Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2
Gelblichweisser Kleinspanner	Scopula floslactata Art	2012	2012					1	Max. Abundanzstufe 1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 5, 5	8
Breitgesäumter Zwergspanner	Idaea biselata Art	2002	2016				1	1	Max. Abundanzstufe 1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 16, 25	–
Breitgebänderter Staudenspanner	Idaea aversata Art	2012	2012					1	Max. Abundanzstufe 1	am Tag 15 schlafende Falter gesehen und 1 Falter in Falle gefangen, R.Bas.: 20, 59	4
Löwenzahnspanner	Camptogramma bilineata Art	2002	2013				1	1	Max. Abundanzstufe 1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
Spanner-Art	Melanthia procellata Art	2002	2002				1		Max. Abundanzstufe 1	am Tag erst wenige Falter gefunden, R.Bas.: 19, 55	4
Pantherspanner	Pseudopanthera macularia Art	2013	2013					1	Max. Abundanzstufe 2	am Tag sehr häufig gefunden gefunden, R.Bas.: 10, 95	1
Weisstirn-Weisspanner	Cabera pusaria Art	2002	2002				1		Max. Abundanzstufe 2	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 16 27	–
Russicher Bär, Spanische Flagge	Euplagia quadripunctaria Art	2002	2012				1	2	Max. Abundanzstufe 3	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 25, 118	2
Eulenfalter-Art	Protodeltode alt: Lithacodia pygarga Art	2002	2002				2		Max. Abundanzstufe 1	am Tag wenig 10 Falter gefunden, R.Bas.: 16, 37	4
Eulenfalter-Art	Mythimna ferrago Art	2012	2012					1	Max. Abundanzstufe 1	am Tag erst 7 Falter gefunden, R.Bas.: 10, 32	4
Schnabelfliegen	Mecoptera	2002	2013								
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa germanica Art	2002	2013				1	3	Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden	1
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa vulgaris Art	2012	2012					1	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1
Zweiflügler	Diptera	2002	2016								
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula lunata Art	2002	2002				1		Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4
Trauermücken-Art	Sciara thomae Art neu: hemerobioides	2012	2012					1	Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Buchenblatt-Gallmücke	Mikiola fagi Art (Gallen)	2016	2016					1	Max. Abundanzstufe 2	Gallen häufig registriert, sehr häufig nicht registriert	1
Waffenfliegen-Art	Sargus iridatus Art	2002	2002				1		Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4
Raubfliegen-Art	Choerades fimbriata Art	2002	2002				1		Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung						letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
		BP1	BP2	BP3											
Raubfliegen-Art	Choerades	marginata Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden	2	
Wollschweber-Art	Bombylius	major Art	2013	2013				1				Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden	1	
Tanzfliegen-Art	Leptopeza	flavipes Art	2013	2013				1				Max. Abundanzstufe 1	erst 1 Mal gefunden	64	
Gemeine Waldschneisenschwebefliege	Dasysyrphus	venustus Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4	
Schwarzhaarige Wiesenschwebefliege	Epistrophe	nitidicollis Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4	
Gemeine Winter- oder Parkschwebefliege	Episyrphus	balteatus Art	2002	2012				2	1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1	
Frühe Blattlauschwebefliege	Parasyrphus	punctulatus Art	2012	2012					1			Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	4	
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta Art	2012	2016					2			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Späte Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	pedissequum Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum Art	2016	2016					1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1	
Heideschwebefliegen-Art	Paragus	haemorrhous Art	2002	2002				1				Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	-	
Trüffel-Erzswebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	rufipes Art alt: soror	2012	2012					1			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1	
Hummel-Waldschwebefliege, Pelzige Hummelschwebefliege	Volucella	bombylans Art	2013	2013					1			Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4	
Gemeine Waldschwebefliege, Gemeine Hummelschwebefliege	Volucella	pellucens Art	2002	2012				2	2			Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1	
Grosse Waldschwebefliege, Riesen-Hummelschwebefliege	Volucella	zonaria Art	2012	2012					1			Max. Abundanzstufe 1	wenig häufig gefunden	8	
Keilfleckschwebefliegen-Art	Eristalis	interrupta Art	2012	2012					2			Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Distel-Bienenenschwebefliege	Eristalis	jugorum Art	2012	2012					2			Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenenschwebefliege	Eristalis	pertinax Art	2002	2012				1	2			Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden	1	
Dunkle Bienenenschwebefliege	Eristalis	rupium Art	2012	2012					1			Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4	
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax Art	2002	2016				3	4			Max. Abundanzstufe 4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1	
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebefliege	Helophilus	parallelus Art alt: trivittata	2012	2012					1			Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea Art	2002	2012		1	2	Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1	
Gemeine Langbauchschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnis Art	2002	2013		1	1	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	1	
Rothaarige oder Rotbraune Ameisenschwebefliege	Microdon	mutabilis Art	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	mässig häufig gefunden	4	
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus Art	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1	
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis Art	2013	2013			1	Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert		
Stubenfliegen-Verwandte	Mesembrina	meridiana Art	2012	2012			2	Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden	2	
Schmeissfliegengattung	Pollenia Gattung		2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Fleischfliegengattung	Sarcophaga Gattung		2002	2002		4	**	Max. Abundanzstufe 1	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1	
Raupenfliegen-Art	Ectophasia	crassipennis Art	2012	2012			2	Max. Abundanzstufe 1	häufig gefunden	2	
WIRBELTIERE	VERTEBRATA		2002	2013							
Eidechse nicht bestimmt	Lacerta cf. Podarcis	non det.	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1	
Mauereidechse	Podarcis	muralis Art	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig gefunden	1	
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus Art	2002	2013		1	1	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig beobachtet	1	
Grünspecht	Picus	viridis Art	2002	2012		1	1	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig beobachtet	1	
Schwarzspecht	Dryocopus	martius Art	2012	2013			2	Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig beobachtet	1	
Heckenbraunelle	Prunella	modularis Art	2013	2013			1	Max. Abundanzstufe 1	häufig beobachtet	2	
Misteldrossel	Turdus	viscivorus Art	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig beobachtet	1	
Berglaubsänger	Phylloscopus	bonelli Art	2002	2013		2	4	Max. Abundanzstufe 1	häufig beobachtet	2	
Wintergoldhähnchen	Regulus	regulus Art	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	häufig beobachtet	2	
Haubenmeise	Parus	cristatus Art	2002	2002		2		Max. Abundanzstufe 1	sehr häufig beobachtet	1	
Waldbaumläufer	Certhia	familiaris Art	2002	2002		1		Max. Abundanzstufe 1	häufig beobachtet	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Kolkrabe	Corvus	corax Art	2002	2013			4	2	Max. Abundanzstufe 2	sehr häufig beobachtet	1
Feldhase	Lepus	europaeus Art	2002	2012					Max. Abundanzstufe 1	Sichtbeobachtungen mässig häufig, aber anhand der Spuren häufig nachgewiesen	2
MOOSE	Bryophyta	Auswahl	2002							Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrassen sind registriert	
Echtes Goldmoos	Homalothecium	lutescens Art	2002						häufig	viele Fundorte	
Grosses Kranzmoos	Rhytidiadelphus	triquetrus Art	2002						lokal häufig	viele Fundorte	
FARNPFLANZEN	Pteridophyta		2002								
Adlerfarn	Pteridium	aquilinum Art	2002						mässig häufig	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Anzahl	
Ruprechtsfarn	Gymnocarpium	robertianum Art	2002						lokal häufig auf Geröll		
Mauerraute	Asplenium	ruta-muraria Art	2002						1 an Felsen	mässig viele Fundorte	
SAMENPFLANZEN	Spermatophyta		2002							Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Stinkende Nieswurz	Helleborus	foetidus Art	2002						vereinzelt	viele Fundorte	
Gewöhnliche Akelei	Aquilegia	vulgaris Art	2002						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Fuchs-Eisenhut	Aconitum	vulparia Art alt: lycoctonum	2002						1 im Wald		
Knolliger Hain-Hahnenfuss	Ranunculus	tuberosus Art alt: nemorosus	2002						lokal mässig häufig am Waldweg	viele Fundorte	
Sauerdorn	Berberis	vulgaris Art	2002						lokak mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Wald-Erdbeere	Fragaria	vesca Art	2002						mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Steinbeere	Rubus	saxatilis Art	2002						1 !	wenig Fundorte	
Birnbaum	Pyrus	piraster Art	2002						J lokal häufig	viele Fundorte	
Mehlbeerbaum	Sorbus	aria Art	2002						lokal häufig	viele Fundorte	
Ovalblättrige Felsenmispel	Amelanchier	ovalis Art	2002						lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Filzige Steinmispel	Cotoneaster	tomentosus Art	2002						lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3								
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa Art	2002								lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Strauchwicke	Hippocrepis alt: Coronilla	emerus Art	2002								häufig	mässig viele Fundorte	
Schopfiger Hufeisenklee	Hippocrepis	comosa Art	2002								häufig	viele Fundorte	
Buchsblättrige Kreuzblume	Polygala	chamaebuxus Art	2002								häufig, lokal sehr häufig	im Thal und am Jura-Südfuss bis Egerkingen häufig, fehlt weiter östlich	
Bittere Kreuzblume	Polygala	amarella Art	2002								lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Sichel-Hasenohr	Bupleurum	falcatum Art	2002								lokal häufig		
Breitblättriges Laserkraut	Laserpitium	latifolium Art	2002								lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Pfaffenhütchen	Euonymus	europaea Art	2002								häufig	viele Fundorte	
Alpen-Kreuzdorn	Rhamnus	alpinus Art	2002								1 Baum im Wald und vereinzelt im Geröll	mässig viele Fundorte	
Faulbaum, Pulverholz	Frangula	alnus Art	2002								lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Alpen-Bergflachs	Thesium	alpinum Art	2002								lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Weisse Mistel	Viscum	album Art	2002								mehrere Büsche	mässig viele Fundorte	
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia	verrucosa Art	2002								vereinzelt, lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Mandelblättrige Wolfsmilch	Euphorbia	amygdaloides Art	2002								lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Zypressen-Wolfsmilch	Euphorbia	cyparissias Art	2002								lokal häufig	viele Fundorte	
Behaartes Johanniskraut	Hypericum	hirsutum Art	2002								lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Turm-Gänsekresse	Arabis	turrita Art	2002								lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Graufilzige Frühlings-Schlüsselblume Unterart	Primula	veris Art columnae alt: veris	2002								cf. ssp. veris lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Gewöhnlicher Gilbweiderich	Lysimachia	vulgaris Art	2002								lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Moos-Nabelmiere	Moehringia	muscosa Art	2002								lokal häufig im Wald	mässig viele Fundorte	
Nickendes Leimkraut	Silene	nutans Art	2002								lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3								
Gefranster Enzian	Gentiana	ciliata Art	2002							lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Schwalbenwurz	Vincetoxicum	hirundinaria Art	2002							lokal häufig	viele Fundorte		
Niedriges Labkraut	Galium	pumilum Art	2002							lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Alpen-Geissblatt	Lonicera	alpigena Art	2002							lokalmässig häufig	mässig viele Fundorte		
Echter Baldrian	Valeriana	officinalis Art	2002							lokal mässig häufig im Wald	viele Fundorte		
Berg-Baldrian	Valeriana	montana Art	2002							lokal häufig im Geröll	wenig Fundorte		
Wald-Witwenblume	Knautia	dipsacifolia Art	2002							mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte		
Gewöhnlicher Natterkopf	Echium	vulgare Art	2002							lokal häufig auf Waldweg	mässig viele Fundorte		
Gelber Fingerhut	Digitalis	lutea Art	2002							mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Heide-Wachtelweizen	Melampyrum	pratense Art	2002							lokal mässig häufig auf Waldweg	mässig viele Fundorte		
Gewöhnliche Sommerwurz	Orobanche	caryophyllacea Art	2002							1 auf Galium album am Waldweg	mässig viele Fundorte		
Gamander-Sommerwurz	Orobanche	teucrii Art	2002							lokal mässig häufig auf Teuc.mon.			
Wald-Gamander	Teucrium	scorodonia Art	2002							lokal häufig	mässig viele Fundorte		
Berg-Gamander	Teucrium	montanum Art	2002							häufig	mässig viele Fundorte		
Echter Gamander	Teucrium	chamaedrys Art	2002							häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Immenblatt, Waldmelisse	Melittis	melissophyllum Art	2002							vereinzelt	viele Fundorte		
Rundblättrige Glockenblume	Campanula	rotundifolia Art	2002							lokall mässig häufig	sehr viele Fundorte		
Wasserdost	Eupatorium	cannabinum Art	2002							häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Gewöhnliches Ochsenauge	Bupthalmum	salicifolium Art	2002							mässig häufig, lokal häufig auf Geröll	mässig viele Fundorte		
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare Art	2002							lokal häufig	sehr viele Fundorte		
Huflattich	Tussilago	farfara Art	2002							lokal mässig häufig	viele Fundorte		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3			
Bergdistel	Carduus	defloratus Art	2002				mässig häufig, lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Ästige Graslilie	Anthericum	ramosum Art	2002				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Türkenbundlilie	Lilium	martagon Art	2002				lokal mässig häufig im Wald	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Echtes Salomonssiegel	Polygonatum	odoratum Art	2002				mässig häufig, lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Maiglöckchen, Maienriesli	Convallaria	majalis Art	2002				häufig, lokal sehr häufig im Wald	mässig viele Fundorte, im Kanton Solothurn geschützt.	
Vierblättrige Einbeere	Paris	quadrifolia Art	2002				mässig häufig im Wald	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert	
Gewöhnliche Schmerwurz	Tamus	communis Art	2002				mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Rotes Waldvögelein	Cephalanthera	rubra Art	2002				1 im Geröll	wenig Fundorte	
Dunkelrote Sumpfwurz	Epipactis	atrorubens Art	2002				3 Pflanzen	wenig Fundorte	
Vogelnestwurz	Neottia	nidus-avis Art	2002				mässig häufig im Wald	mässig viele Fundorte	
Zweiblättriges Breitkölbchen	Platanthera	bifolia Art	2002				lokal mässig im Wald (6 Pflanzen)	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Grünliches Breitkölbchen	Platanthera	chlorantha Art	2002				1 i m Wald	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Mücken-Handwurz	Gymnadenia	conopsea Art	2002				3 Pflanzen	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Berg-Segge	Carex	montana Art	2002				lokal mässig häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Schlaffe Segge	Carex	flacca Art	2002				mässig häufig	viele Fundorte	
Niedrige Segge	Carex	humilis Art	2002				mässig häufig	wenig Fundorte	
Vogelfuss-Segge	Carex	ornithopoda Art	2002				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, aber wahrscheinlich oft übersehen	
Fieder-Zwenke	Brachypodium	pinnatum Art	2002				lokal häufig	viele Fundorte	
Kalk-Blaugras	Sesleria	caerulea Art alt: varia	2002				sehr häufig	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	