

Fuss der Holzfluh Balsthal (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 619850 241175 Höhe ü. M.: 525 m

	BP 1 (1989–1993)	BP2 (2003–2009)	BP3 (2012–2014)	alle BP (1989–2014)
Anzahl Begehungen:	7	8	11	26
Beobachtungsdauer:	14 Std. 05 Min.	12 Std. 50 Min.	12 Std. 35 Min.	39 Std. 30 Min.
Berechnung des Seltenheits-Index der Fauna:	Anzahl: BP1 BP2 BP3 alle BP	Summe der Indices:	BP1 BP2 BP3 alle BP	Durchschn. Index: BP1 BP2 BP3 alle BP
	Ereignisse: 245 246 225 717		850 887 698 2435	3,47 3,61 3,10 3,40
	Arten: 133 150 140 280		480 554 544 1189	3,61 3,69 3,89 4,25

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-Index
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	-------------------

WEICHTIERE

			1993								
Kleine Walddeckelschnecke	Cochlostoma	septemspirale	2003	2003		3		Max. Ab2	häufig gefunden		2
Haferkorn (-schnecke)	Chondrina	avenacea	1993	2003	1	1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig		2
Grosse Turmschnecke	Zebrina	detrita	1993	2013	4	8	1	Max. Ab3	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig		4
Grosse Wegschnecke	Arion	rufus	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, wird neuerdings von der Spanische Wegschnecke verdrängt		4
Weitmündige Glanzschnecke	Aegopinella	nitens	2003	2003		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig		1
Genabelte Strauchschnecke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	2003	2014		3	3	Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1
Seidenhaarschnecke	Trochulus = Trichia	sericeus	1993	2009	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig		1
Gemeine Heideschnecke	Helicella	itala	1993	2014	2	6	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse, Index: 1 mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse, Index: 4 selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse, Index: 16
häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse, Index: 2 wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse, Index: 8 sehr selten gefunden: 1 bis 2 Ereignisse, Index: 32

Regio Basiliensis: Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3			
Rötliche Laubschnecke	Monachoides = Perforatella	incarnatus	2003	2003		1		Max. Ab1	häufig ngefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig	1
Steinpicker	Helicigona	lapicida	2009	2009		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, nach Literatur vor allem im Jura häufig	2
Schwarzmündige Bänderschnecke	Cepaea	nemoralis	1993	2013	1	5	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Fleckenstreifige Bänderschnecke	Cepaea	sylvatica	2003	2003		2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, vor allem in höheren Lagen des Jura	4
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	1993	2014	4	8	6	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
GLIEDERFÜSSLER			1989							
SPINNENTIERE			1993							
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	Alopecosa	pulverulenta	2003	2003		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 585	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	2003	2003		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 219	1
Wolfsspinnen-Artkomplex	Pardosa	lugubris- Komplex	1993	1993	4			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 1571	1
Wolfsspinnen-Art	Xerolycosa	nemoralis	1993	1993	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	2013	2013			1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Glattbauchspinne Gattung	Drassodes	sp.	1993	1993	1			Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4
Glattbauchspinnen-Art	Drassodes	lpidosus	2003	2003		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3 Individuen	8
Springspinnen-Art	Evarcha	arcuata	2009	2009		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Springspinnen-Art	Heliophanus	cupreus	2009	2009		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12	2
Springspinnen-Art	Phlegra	fasciata	2009	2009		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	8
Springspinnen-Art	Aelurillus	v-insignitus	2009	2009		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
VIelfÜSSER			2003							
Steinläufer Gattung	Lithobius	sp.	2003	2003		1		Max. Ab1	Gattung häufig gefunden, aber nie auf die Art bestimmt und oft nicht registriert	-

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3			Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Wanzen			2003							
Kugelwanze	Coptosoma	scutellatum	1993	2009	1	1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7	4
Streifenwanze	Graphosoma	lineatum	1993	2009	2	1		Max. Ab4	häufig gefunden	2
Baumwanzen-Art	Rubiconia	intermedia	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Baumwanzen-Art	Holcostethus	sphacelatus	2003	2013		1	1	Max. Ab1	Gattung wenig häufig gefunden	8
Baumwanzen-Art	Carpocoris	pudicus	2003	2013		2	2	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	1993	2013	4		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	1
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	2013	2013			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	1993	2013	1	2	3	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	1
Ginster-Baumwanze	Piezodorus	lituratus	2003	2013		1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Randwanzen-Art	Enoplops	scava	2003	2013		1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Leder- oder Saumwanzen-Art	Coriomeris	denticulatus	2013	2013			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Westliche Randwanze	Leptoglossus	occidentalis	2013	2013			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, vor wenigen Jahren eingewandert, in Ausbreitung begriffen, nur im	8
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalus	subrufus	2009	2009		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	2
Feuerwanze	Pyrrhocoris	apterus	2003	2014		4	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1
Ritterwanzen-Art	Tropidothorax	leucopterus	1993	2003	3	1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Ritterwanzen-Art	Lygaeus	equestris	1993	2013	2	1	1	Max. Ab4	mässig häufig gefunden	4
Ritterwanzen-Art	Melanocoryphus	albomarginatus	2009	2009		1		Max. Ab1, 1 von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32
Ritterwanzen-Art	Horvathiolus	superbus	2003	2003		1		Max. Ab1, in der Region nur noch 2 weitere Funde	selten gefunden	16
Gespensterwanze, Teufel	Phymata	crassipes	2013	2013			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Weichwanzen-Art	Polymerus	unifasciatus	2013	2013			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			1993	1993	1							
Weichwanzen-Art	Orthops	campestris	1993	1993	1				Max. Ab1	selten gefunden , weil klein und unscheinbar	16	
Kleinzikaden-Art	Reptalus = Pentastiridius	panzeri	1993	1993	1				Max. Ab1	erst 1 Mal gefunden, aber kaum danach gesucht und kaum registriert	-	
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus	spumarius	2013	2013			1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	2013	2013			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Zwergzikaden-Art	Penthimia	nigra	2009	2009		1			Max. Ab1		-	
Käfer			1993									
Berg-Sandläufer	Cicindela	silvicola	2013	2013			3		Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Weichkäfer-Art	Cantharis	nigricans	2013	2013			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Grüner Warzenkäfer	Malachius	viridis	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Warzenkäfer-Art	Clanoptilus = Malachius	geniculatus	2009	2009		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Ameisen-Buntkäfer	Thanasimus	formicarius	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Trichodes	apiarius	2003	2003		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Schnellkäfer-Art	Hemicrepidius = Athous =	niger	2013	2013			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schnellkäfer-Art	Athous	vittatus	2003	2003		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia	nitidula	1993	1993	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 117	2	
Prachtkäfer-Art	Anthaxia	helvetica	2009	2009		1			Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 27	2	
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1993	1993	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Metallgrüner Schenkelkäfer	Chrysanthia	viridissima	1993	1993	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Graugrüner Schenkelkäfer	Oedemera	virescens	2013	2013			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	brevicauda	1993	1993	2				Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schwefelkäfer	Cteniopus	sulfureus = flavus (Scopoli, 1763)	1993	1993	1				Max. Ab4	wenig häufig gefunden	8	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP1	BP2			
Silbriger Purzelkäfer	Hoplia	argentea = farinosa	2009	2009			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	1993	2013	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Rosenkäfer-Verwandter	Tropinota	hirta	2013	2013				1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	1993	2013	1	4	1		Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Bissiger Zangenbock	Rhagium	mordax	2003	2013			1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4	
Feldahornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	Alosterna	tabacicolor	1993	2009	1	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	2	
Blutroter Halsbock	Anastrangalia = Leptura	sanguinolenta	2009	2009				1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2	
Schwarzrandiger oder Zweifelhafter Halsbock	Anastrangalia = Leptura	dubia	2003	2003				1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2	
Gefleckter Schmalbock	Strangalia = Rutpela =	maculata	1993	2009	1	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21	1	
Veränderlicher Schönbock, Veränderlicher Scheibenbock	Phymatodes	testaceus	2013	2013				2	Max. Ab1	selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	16	
Buchen-Widdercock, Echter Widderbock	Clytus	arietis	2009	2013			1	3	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 58	2	
Kirsch-Blatthähnchen	Orsodacne	cerasi	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Zweipunktiger Fallkäfer	Cryptocephalus	bipunctatus	2009	2009				1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Schneeballblattkäfer	Pyrrhalta	viburni	2003	2003				1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Weissdorn-Blattrüssler	Phyllobius	betulinus = betulae	2009	2013				1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig	2
Schlehen-Zweigrüssler	Magdalis	ruficornis	2013	2013					1	Max. Ab1	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig	4
Kleiner Bunter Eschenbastkäfer	Leperisinus	varius	1993	1993	1					Max. Ab1	selten gefunden, nicht inventarisiert	-
Hautflügler			1989									
Halmwespen-Art	Janus	compressus	2013	2013				1	Max. Ab1 1 von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32	
Keulenblattwespen-Art	Corynis	crassicornis	1993	2013	1	3	1		Max. Ab2	wenig häufig gefunden	8	
Blattwespen-Art	Tenthredo	zonula	2009	2009				1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3	Beobachtungsgebiet			
Blattwespen-Art	Macrophya	sanguinolenta = quadrimaculata (2003	2003			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	4
Schlupfwespen-Art	Platylabops	apricus	2003	2003			1		Max. Ab1 einziger Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	Cryptus	minator	2013	2013				1	Max. Ab1		-
Schlupfwespen-Art	Colpotrochia	cincta	2009	2009			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	2013	2013				1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Feuergoldwespen-Art	Chrysis	ignita f. ruddii	2003	2003			1		Max. Ab1	selten gefunden	16
Drüsenameise Artengruppe	Tapinoma	erraticum cf. ambiguum Emery	1993	2003	1	1			Max. Ab3	häufig gefunden	2
Gemeine Rossameise	Camponotus	ligniperda	1993	2003	1	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6	2
Fremde Wegameise	Lasius	alienius	1993	1993	1				Max. Ab3	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 192 Individuen	4
Mauer-Wegameise	Lasius	emarginatus	1993	2003	2	2			Max. Ab3	mässig häufig gefunden	4
Zweifarbige Sklavenameise	Formica	rufibarbis	2003	2003			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 89	1
Rote Waldameise	Formica	rufa	1993	1993	3				Max. Ab3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 3037 Individuen	2
Pillenwespen-Art	Eumenes	subpomiformis	1993	2013	1	2	2		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	oviventris	2003	2003			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	gazella	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	1993	2013	1		3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Feldwespen-Art	Polistes	biglumis	2003	2003			1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Sächsische Wespe	Dolichovespula	saxonica	2013	2013				1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	2
Deutsche Wespe	Vespula	germanica	1993	2003	1	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 83	1
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	2003	2013			1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 359	1
Bienenjagende Knotenwespe	Cerceris	rybiensis	2013	2013				2	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3	Beobachtungsgebiet			
Heuschreckenwespen-Art	Tachysphex	pompiliformis	2003	2003			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Grabwespen-Art	Pemphredon	lugubris	2003	2013			1	1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18	8
Rainfarn-Maskenbiene	Hylaeus	nigritus	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Rotbeinige Furchenbiene	Halictus	rubicundus	1993	1993	1				Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	2
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosae	2013	2013				1	Max. Ab1	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	1993	2013	1			2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 17	1
Langobarden-Furchenbiene	Halictus	langobardicus	2013	2013				1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, war bis vor wenigen Jahren noch selten	8
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	2013	2013				1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 50	1
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	1993	2013	2	1	2		Max. Ab5	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 616	1
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauxillum	1993	1993	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 49	1
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	2013	2013				1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	1
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum	morio	1993	2013	3			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 93	1
Rostfarbene Blutbiene	Sphecodes	ferruginatus	1993	1993	1				Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Leisten-Zwergsandbiene	Andrena	strohella	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	4
Zweifarbige Sandbiene	Andrena	bicolor	2013	2013				1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21	2
Glänzende Düstersandbiene	Andrena	nitida	2013	2013				1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 129	2
Weissdorn-Sandbiene	Andrena	bucephala	2003	2003			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 17	4
Sandbienen-Art	Andrena	dorsata	2013	2013				1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Garten-Wollbiene	Anthidium	manicatum	1989	2013	1	1	3		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Hahnenfuss-Scherenbiene	Chelostoma	florisomne	2009	2009			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 28	4
Glockenblumen-Scherenbiene	Chelostoma	rapunculi = fuliginosum	2013	2013				1	Max. Ab1	häufig gefunden	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			1993	2003	2013	2014	2015	2016	2017				
Rote Mauerbiene	Osmia	bicornis = rufa	1993	2003			2	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen	1
Schimmernde Mauerbiene	Osmia	submicans	2003	2013				2	1		Max. Ab2	wenig häufig gefunden	8
Hufeisenklee-Mauerbiene	Osmia	xanthomelana	2003	2003				1			Max. Ab1	knapp mässig häufig gefunden	4
Zweifarbige Schneckenhausbiene	Osmia	bicolor	1993	2014	1	1	2				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Goldene Schneckenhausbiene	Osmia	aurulenta	2003	2013				4	1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Einhöckerige Mauerbiene	Osmia	niveata = fulviventris	1993	1993	1						Max. Ab1	selten gefunden	16
Rote Schneckenhausbiene	Osmia	andrenoides	2009	2009				1			Max. Ab1, 1 von 2 Funden in der Region	nur 2 Funde in der Region	32
Französische Felsenbiene	Hoplitis = Osmia	ravouxi	2013	2013					1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Platterbsen-Mörtelbiene	Megachile	ericetorum	2013	2013					1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Garten-Blattschneiderbiene	Megachile	willoughbiella	1993	1993	1						Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Bunte Blattschneiderbiene	Megachile	versicolor	2003	2003				1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Vierfleck-Pelzbien	Anthophora	quadrimaculata	2013	2013					1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Frühlings-Pelzbiene	Anthophora	plumipes	2014	2014					1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gewöhnliche Keulenhornbiene	Ceratina	cyanea	1993	2009	1	1					Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Wiesen-Wespenbiene	Nomada	marshamella	2003	2003				1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Gelbfleckige Wespenbiene	Nomada	flavoguttata	1993	2013	1	1	1				Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	2
Rotschwarze Wespenbiene	Nomada	fabriciana	2014	2014					1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	1993	2013	2	1	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 71	1
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum	1989	2013	2				1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 262	1
Bergwaldhummel	Bombus	wurfleini	1993	2013	1						Max. Ab1	häufig gefunden	2
Baumhummel	Bombus	hypnorum	2013	2013					1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			2013	2013			1						
Wiesenhummel	Bombus	pratorum	2013	2013				1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 30	1
Glockenblumenhummel oder Distelhummel	Bombus	soroensis	1989	2013	1			1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1989	2013	3			1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1989	2013	5	2		4			Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	1993	2013	2	1		3			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus	hortorum	1993	2013	1			2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	1
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	Bombus = Psithyrus	sylvestris	2003	2003				1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 19	1
Honigbiene	Apis	mellifera	1993	2013	6	4		4			Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 489	1
Schmetterlinge			1989										
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	1993	1993	1						Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Palpenmotten-Art	Teleiopsis	albifemorella	1993	1993	1						Max. Ab1, erst zweiter Fund in der Schweiz!	erst 1 Mal gefunden	64
Sonnenröschen-Glasflügler	Synansphecia	affinis	1993	2009	1	1					Max. Ab1	3 Falter an 2 Orten gefangen, R.Bas.: 1, 1	16
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	2013	2013				1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
Wickler-Art	Isotrias	stramentana	1993	1993	1						Max. Ab2	erst 1 Mal gefunden	32
Wickler-Art	Pammene	germmana	2013	2013				1			Max. Ab1	erst 1 Mal gefunden	32
Wickler Gattung	Dichrorampha	sp.	1993	1993	1						Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Federgeistchen-Art	Stenoptilia	stigmatodactyla	2013	2013				1			Max. Ab1 unsicher bestimmt	erst 2 Mal gefunden	32
Zünsler-Art	Synaphe	punctalis	2003	2003				1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Fruchtzünsler-Art	Pempelia	palumbella	1993	1993	1						Max. Ab1 einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	32
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	1993	1993	1						Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	1993	2012	1						Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2	BP3							
Zünsler-Art	Scoparia	ambigualis	2013	2013			1		Max. Ab1	selten gefunden	16	
Zünsler-Art	Scoparia	pyralella	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	1993	1993	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Zünsler-Art	Mecyna	lutealis	1993	2009	3	2			Max. Ab3	selten gefunden	16	
Hummelschwärmer	Hemaris	fuciformis	1993	1993	1				Max. Ab1	am Tag 20 Falter gesehen, R.Bas.: 14, 20	8	
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2003	2013			3	3	Max. Ab2	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1	
Schwalbenschwanz	Papilio	machaon	2003	2003			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1	
Segelfalter	Iphiclides	podalirius	1987	2009	1	1			Max. Ab1	selten gefunden, R.Bas.: 15, 50	4	
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1993	2013	3	3	8		Max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	1	
Tintenfleckweissling-Komplex	Leptidea	sinapis-Komplex	1993	2013	2	1	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1	
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae	1993	1993	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1	
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1989	2013	3	1	4		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1	
Karstweissling	Pieris	mannii	2013	2013				1	Max. Ab1	im August 2008 erstmals nachgewiesen, zur Zeit häufig, R.Bas.: 0, 0	2	
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	2012	2013				2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1	
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	1993	2003	2	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1	
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	crocea	2003	2003			1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1	
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	1989	2013	3	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis	2003	2013			2	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1	
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	1993	2014	1	3	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1	
Grosser Schillerfalter	Apatura	iris	1982	1982	1				Max. Ab1, nur von Hans Wittmer beobachtet	selten gefunden, R.Bas.: 18, 44	8	
Kleiner Eisvogel	Limenitis	camilla	1989	1989	1				Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 31, 124	2	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Tagpfauenauge	Inachis	io	2003	2014		1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1	
Distelfalter	Vanessa = Cynthia	cardui	2003	2009		2		Max. Ab2	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	1	
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	2003	2014		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1	
Veilchen- Perlmutterfalter	Boloria = Clossiana	euphrosyne	2003	2004		2		Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 21, 143	2	
Kleiner Waldportier	Hipparchia	genava	2004	2011		5		Max. Ab2, nur von Hans Wittmer beobachtet	mehrere Falter an 4 Orten gesehen, R.Bas.: 6, 29	8	
Weisser Waldportier	Brintesia	circe	2003	2012		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, aber erst (wieder) seit diesem Jahrhundert, R.Bas.: 22, 341	2	
Waldteufel	Erebia	aethiops	1988	2013	4	2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 502	1	
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1989	2013	2		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1	
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria	1993	2009	1	1		Max. Ab2	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1	
Mauerfuchs	Lasiommata	megera	1989	2013	2	5	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1	
Braunauge	Lasiommata	maera	1983	2013	1		1	Max. Ab3	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 175	2	
Kreuzdorn-Zipfelfalter, Schlehen-Zipfelfalter	Satyrium	spini	1993	2013	1	1	1	Max. Ab2	Gattung mässig häufig gefunden, R.Bas.: 16, 52	4	
Kleiner Feuerfalter	Lycaena	phlaeas	2012	2012			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 88	2	
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	2003	2003		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1	
Zwerg-Bläuling	Cupido	minimus	2003	2009		3		Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 332	2	
Kurzschwänziger Bläuling	Cupido	argiades	2012	2012			1	Max. Ab1	häufig gefunden, erst vor wenigen Jahren wieder in der Schweiz nördlich der Alpen,	2	
Südlicher Kurzschwänziger Bläuling	Cupido	alcetas	2013	2013			1	Max. Ab1	selten gefunden, erst seit kurzem in der Schweiz nördlich der Alpen	16	
Faulbaum-Bläuling	Celastrina	argiolus	2004	2004		1		Max. Ab2, nur von Thomas Schwaller beobachtet	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2	
Silbergrüner Bläuling	Polyommatus = Lysandra	coridon	1978	2013	5	2	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416	1	
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra	bellargus	1981	2013	3		5	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1	
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	2012	2013			4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3			
Klee-Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa	clathrata	2013	2013			1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1
Einfarbiger Zwergspanner	Idaea	dilutaria	1993	2013	1		1	Max. Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 3, 24	4
Rotbandspanner	Rhodostrophia	vibicaria	2003	2003		1		Max. Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 9, 36	4
Schwammspinner	Lymantria	dispar	1993	1993	1			Max. Ab1	am Tag 8 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 4, 1	16
Frühlings-Flechtenbär	Eilema	sororcula	2003	2003		1		Max. Ab1	am Tag 24 Falter und mehrere Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 17, 179	2
Russischer Bär, Spanische Flagge	Euplagia	quadripunctaria	2013	2013			1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 25, 118	2
Eulenfalter-Art	Phytometra	viridaria	2003	2013		2	1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 11, 37	2
Schnabelfliegen			1993							
Alpen-Skorpionsfliege	Panorpa	alpina	2013	2013			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Zweiflügler			1989							
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. s.str.	Tipula paludosa	2013	2013			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	2009	2013		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius	major	2003	2003		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius	discolor	2003	2013		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Trauerschweber-Art	Hemipenthes	maurus	1993	1993	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Tanzfliegen-Art	Empis (Eue.)	tesselata	1993	1993	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gestreifte Waldschwebfliege Waldschneisenschwebfliege	Dasysyrphus	albostratus	2013	2013			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6	4
Gemeine Waldschneisenschwebfliege	Dasysyrphus	venustus	2013	2013			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	4
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus	balteatus	1989	2013	2	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 200	1
Gemeine Feldschwebfliege	Eupeodes	corollae	1989	1993	2			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	2
Kurze oder Bogenader-Feldschwebfliege	Eupeodes	lapponicus	2013	2013			1	Max. Ab1	häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			1989	1989	1								
Späte Frühlingsschwebfliege, Gemeine Zartschwebfliege	Meliscaeva	cinctella	1989	1989	1					Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 20	2	
Kugelträger-Art	Sphaerophoria	bavata	2003	2003		1				Max. Ab1	selten gefunden	16	
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebfliege	Sphaerophoria	scripta	1993	1993	3					Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1	
Grosse Schwebfliege, Gemeine Gartenschwebfliege	Syrphus	ribesii	1993	1993	1					Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13	1	
Behaarte Schwebfliege, Grosse Gartenschwebfliege	Syrphus	torvus	2013	2013				1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7	2	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebfliege	Melanostoma	mellinum	2013	2013				1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 58	1	
Breitfusssschwebfliegen-Art	Platycheirus	ambiguus	2009	2009		1				Max. Ab1	selten gefunden	16	
Heideschwebfliegen-Art	Paragus	haemorrhous	1993	2003	1	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Weissfuss-Erzswebfliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	2003	2003		1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Sibirische Taillenschwebfliege	Sphegina	sibirica	2013	2013				1		Max. Ab2	wenig häufig gefunden	8	
Fuchsrote Narzissenschwebfliege	Merodon	rufus	1993	2009	2	1				Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4	
Keilfleckschwebfliegen-Art, Distel-Binenenschwebfliege	Eristalis	jugorum	2013	2013				1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Keilfleckschwebfliege Lange Bienenschwebfliege	Eristalis	pertinax	1993	2013	2			1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1989	2013	3	2	3			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 57	1	
Totenkopfschwebfliege	Myathropa	florea	1989	2013	5	1	2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18	1	
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebfliege, Gemeine	Syritta	pipiens	1993	2013	4			1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	2	
Langbauchschwebfliegen-Art	Xylota	ignava	2013	2013				1		Max. Ab1	selten gefunden	16	
Gemeine Langbauchschwebfliege Gemeine Holzschwebfliege	Xylota	segnis	2013	2013				4		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 160	2	
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atra	1993	1993	1					Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	1989	2003	2	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Stubenfliegen-Verwandte	Mesembrina	meridiana	2003	2003		1				Max. Ab1	häufig gefunden	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index	
			1993	2003	2013	2014	2015	BP1	BP2				BP3
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis	1993	1993				2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	-	
Stubenfliege Gattung	Neomyia = Orthellia	sp.	1993	2003				1	1	Max. Ab2	Gattung sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen	-	
Stubenfliegen-Verwandte	Polietes	lardarius	2003	2003					1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, auf Kuhfladen, im Herbst auch auf Blättern am Waldrand	1	
Schmeissfliege Gattung	Calliphora	sp.	1993	1993				1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig, aber nur mässig häufig registriert	-	
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1993	2014				1		1	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1993	2003				2	5		Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliegen-Art	Eriothrix	rufomaculata	2003	2003					1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1993	1993				1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliegen-Art	Gymnosoma	clavatum	2013	2013						1	Max. Ab1	selten gefunden	16
Raupenfliegen-Art	Cylindromyia = Ocyptera	brassicaria	1993	2013				1		1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
WIRBELTIERE			2003										
Mauereidechse	Podarcis	muralis	1993	2014				3	4	4	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graureiher	Ardea	cinerea	2003	2003					1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Zaunkönig	Troglodytes	trogloodytes	1989	1989				1			Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	-
Gartenrotschwanz	Phoenicurus	phoenicurus	1993	1993				2			Max. Ab1	früher mässig häufig beobachtet, in letzter Zeit nur noch selten	16
Gartengrasmücke	Sylvia	borin	1993	1993				1			Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Berglaubsänger	Phylloscopus	bonelli	1993	2013				4	2	2	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Schwanzmeise	Aegitalus	caudatus	2003	2003					1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Dohle	Corvus	monedula	2013	2013						1	Max. Ab1	mässig häufig beobachtet	4
Goldammer	Emberiza	citrinella	1993	1993				1			Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Reh	Capreolus	capreolus	1993	2003				2		1	Max. Ab1	häufig beobachtet und anhand der Spuren festgestellt	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2	BP3						
MOOSE	Auswahl		2003								
Echtes Goldmoos	Homalothecium	lutescens	2003					lokal häufig	viele Fundorte		
Katzenpfötchen-Moos	Rhytidium	rugosum	1986					sehr häufig	viele Fundorte		
Etagenmoos	Hylocomium	splendens	2003					lokal sehr häufig	viele Fundorte		
SAMENPFLANZEN	Auswahl		1989								
Stinkende Nieswurz	Helleborus	foetidus	2003					häufig	viele Fundorte		
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	2003					lokal häufig	sehr viele Fundorte		
Feldulme	Ulmus	minor = carpinifolia	2003					1 junger Baum	wenig Fundorte		
Weisser Mauerpfeffer	Sedum	album	2003					lokal sehr häufig	mässig viele Fundorte, typisch für felsige Stellen.		
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna = neumanniana	2003					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Wald-Erdbeere	Fragaria	vesca	2003					lokal häufig	sehr viele Fundorte		
Birnbaum	Pyrus	piraster	2003					1 Baum	viele Fundorte		
Apfelbaum	Malus	sylvestris	2003					1 Strauch	mässig viele Fundorte		
Ovalblättrige Felsenmispel	Amelanchier	ovalis	1993					lokal häufig an Felsen	wenig Fundorte		
Garten-Steinmispel	Cotoneaster	horizontalis	2003					vereinzelt	mässig viele Fundorte, unsicher bestimmt		
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa	2003					vereinzelt	viele Fundorte		
Felsenkirsche	Prunus	mahaleb	1993					häufig	in der Region nur wenig Fundorte		
Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis	vulneraria vulneraria	2003					häufig	viele Fundorte		
Strauchwicke	Hippocrepis = Coronilla	emerus	2003					lokal sehr häufig an Felsen	mässig viele Fundorte		
Schopfiger Hufeisenklee	Hippocrepis	comosa	2003					mässig häufig	viele Fundorte		
Lamarcks Nachtkerze	Oenothera	glazoviana = erythrosepala	2003					lokal häufig	mässig viele Fundorte		

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2			
Buchsblättrige Kreuzblume	Polygala	chamaebuxus	1986				häufig	im Thal und am Jura-Südfuss bis Egerkingen häufig, fehlt weiter östlich	
Kornelkirsche	Cornus	mas	2013				1 Strauch	wenig Fundorte, dann aus Gärten verwildert	
Hirschheil-Bergfenchel	Seseli	libanotis	1993				lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Breitblättriges Laserkraut	Laserpitium	latifolium	1993				mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2003				lokal häufig	viele Fundorte	
Alpen-Kreuzdorn	Rhamnus	alpinus	1993				1 Strauch	mässig viele Fundorte	
Faulbaum, Pulverholz	Frangula	alnus	2003				lokal häufig	viele Fundorte	
Alpen-Bergflachs	Thesium	alpinum	1993				lokal mässig häufig an Felsen	mässig viele Fundorte	
Weisse Mistel	Viscum	album	2003				mehrere Büsche	mässig viele Fundorte	
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia	verrucosa	2003				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Echtes Johanniskraut	Hypericum	perforatum	2003				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	2003				1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Ovalblättriges Sonnenröschen	Helianthemum	nummularium ssp. obscurum	2003				lokal häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Hungerblümchen	Erophila	verna	2003				lokal sehr häufig	mässig häufig nachgewiesen, aber vermutlich häufig	
Moos-Nabelmiere	Moehringia	muscosa	1993				1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
Nickendes Leimkraut	Silene	nutans	2009				lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Schildampfer	Rumex	scutatus	1993				häufig, lokal sehr häufig	in der Region nur am Fuss der Holzfluh, und in St. Wolfgang gefunden	
Singrün, Kleines Immergrün	Vinca	minor	2003				lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Hügelmeister, Hundsmeister	Asperula	cynanchica	2003				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Hügel-Baldrian	Valeriana	wallrothii	2003				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, aber icht alle Funde sicher von V. officinalis abgegrenzt	
Gewöhnliches Leinkraut	Linaria	vulgaris	2003				mässig häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			letzte	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2			
Gelber Fingerhut	Digitalis	lutea	1993						mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Herzblättrige Kugelblume	Globularia	cordifolia	2003						lokal häufig an Felsen	mässig viele Fundorte	
Berg-Gamander	Teucrium	montanum	2003						lokal häufig an Felsen	mässig viele Fundorte	
Immenblatt, Waldmelisse	Melittis	melissophyllum	2003						2 Pflanzen	viele Fundorte	
Schmalblättriger Hohlzahn	Galeopsis	angustifolia	1993						sehr häufig im Grobgeröll	wenig Fundorte, typisch für Grob-Kiesflächen	
Aufrechter Ziest	Stachys	recta	1993						mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Gebirgs-Feld-Thymian Alpen-Thymian	Thymus	praecox polytrichus	2003						lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Rundblättrige Glockenblume	Campanula	rotundifolia	2003						lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Berg-Aster	Aster	amellus	2003						lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Silberdistel = Einf. Eberwurz	Carlina	acaulis ssp. caulescens =	2003						1 Pflanze	viele Fundorte	
Bergdistel	Carduus	defloratus	1993						mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Wegwarte, Zichorie	Cichorium	intybus	2003						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Niedriges Habichtskraut	Hieracium	humile	2009						häufig an Felsen	wenig Fundorte	
Ästige Graslilie	Anthericum	ramosum	2003						häufig	mässig viele Fundorte	
Echtes Salomonssiegel	Polygonatum	odoratum	2003						lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Niedrige Segge	Carex	humilis	1986						häufig	wenig Fundorte	
Vogelfuss-Segge	Carex	ornithopoda	2003						lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, aber wahrscheinlich oft übersehen	
Bewimpertes Perlgras	Melica	ciliata	1993						mässig häufig	wenig Fundorte	
Nickendes Perlgras	Melica	nutans	2003						lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Kalk-Blaugras	Sesleria	caerulea = varia	2003						sehr häufig an Felsen	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	