Gemeinde Balsthal zusammenfassende Artenliste der Fauna und Flora Beobachtungen Georg Artmann-Graf

Beobachtungsdauer: BP1: 162 Begehungen, 272 Std. 30 Min. BP2: 226 Begehungen, 330 Std. 50 Min. BP3: 168 Begehungen, 214 Std. 50 Min.

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
WEICHTIERE										
Kleine Walddeckelschnecke	*Cochlostoma*	*septemspirale*	1993	2003	**9**	1	11			häufig gefunden
Spitz-Schlammschnecke	*Lymnaea*	*stagnalis*	1993	2003	**2**	2	4		Fischteich Haulenrain, Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	in stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, stellenweise häufig, gilt nach
Gemeine Bernsteinschnecke	*Succinea*	*putris*	1993	2013	**3**	4	6	1	Bestimmung unsicher	in Feuchtlebensräumen häufig gefunden
Kleine Bernsteinschnecke	*Succinella = Succinea*	*oblonga*	2003	2003	**4**		4			mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Gemeine Achatschnecke	*Cochlicopa*	*lubrica*	1993	2003	**8**	1	8			mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Kleine Achatschnecke	*Cochlicopa*	*lubricella*	2003	2003	**2**		2		Weide Hasenweg, Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden und oft nicht sicher von C. lubrica unterschieden, gilt nach Literatur als
Grosse Fässchenschnecke	*Orcula*	*dolium*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Roggenkorn (-schnecke)	*Abida*	*secale*	1993	2003	**8**	4	6			mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Haferkorn (-schnecke)	*Chondrina*	*avenacea*	1989	2003	**2**	4	3		Ruine Neu Falkenstein, Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Moospuppenschnecke	*Pupilla*	*muscorum*	2003	2003	**5**		4			mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig

BP = Beobachtungsperiode (Zehnjahresperiode) Für Balsthal gilt:

BP 1: 1976 bis 2000, davon 1977 bis 1985 nur, 1986 bis 1992 vorwiegend von Hans Wittmer besucht.

BP2: 2003 bis 2009, sowie 2004 bis 2011 zusätzlich mit Funden von Hans Wittmer, Thomas Schwaller und Marcel Tuin.

BP3: 2012 bis 2015.

F = Fundort

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum. Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
mässig haufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
sehr selten gefunden: 1 bis 2 Ereignisse

Regio Basiliensis: Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gerippte Grasschnecke	*Vallonia*	*costata*	1993	2003	**9**	1	10			mässig häufig gefunden, weil klein, nach Literatur in der Schweiz häufig
Glatte Grasschnecke	*Vallonia*	*pulchella*	2003	2003	**4**		4			mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Schiefe Grasschnecke	*Vallonia*	*excentrica*	2003	2003	**8**		8			häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Kleine Turmschnecke	*Merdigera = Ena*	*obscura*	2003	2013	**6**		6	1		mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig, vor allem im Jura
Grosse Turmschnecke	*Zebrina*	*detrita*	1993	2014	**5**	11	18	7		mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig
Gefleckte Schüsselschnecke	*Discus*	*rotundatus*	1993	2003	**3**	2	4			mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als sehr häufig
Grosse Wegschnecke	*Arion*	*rufus*	1993	2003	**3**	2	1			mässig häufig gefunden, wird neuerdings von der Spanische Wegschnecke verdrängt
Kugelige Glasschnecke	*Vitrina*	*pellucida*	2003	2003	**3**		3			mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig
Ohrförmige Glasschnecke	*Eucobresia*	*diaphana*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	selten gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig
Kleine Glanzzschnecke	*Aegopinella*	*pura*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Süd	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Weitmündige Glanzzschnecke	*Aegopinella*	*nitens*	1993	2003	**16**	6	28			sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Streifen-Glanzschnecke	*Perpolita = Nesovitrea*	*hammonis*	2003	2003	**5**		5			mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Schweizer Glanzschnecke	*Oxychilus*	*helveticus*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide Mitte	selten gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Grosser Schnegel	*Limax*	*maximus*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	selten gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als wenig häufig
Gemeine Blindschnecke	*Cecilioides*	*acicula*	1993	2003	**6**	1	5			mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Glatte Schliessmundschnecke	*Cochlodina*	*laminata*	2003	2003	**1**		2		Waldrand Paradies	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Bleiche Schliessmundschnecke	*Cochlodina*	*fimbriata*	2003	2003	**1**		2		Von Roll Areal	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Bauchige Schliessmundschnecke	*Macrogastra*	*ventricosa*	2003	2003	**1**		2		Von Roll Areal	selten gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur alsmässig häufig
Gefältelte Schliessmundschnecke	*Macrogastra*	*plicatula*	1993	2003	**2**	1	3		Von Roll Areal	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig, vor allem
Kleine Schliessmundschnecke	*Clausilia*	*rugosa*	2003	2003	**1**		1		Ruine Neu Falkenstein	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Scharfgerippte Schliessmundschnecke	*Clausilia*	*cruciata*	2003	2003	**1**		1		Von Roll Areal	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kalkfelsen-Schliessmundschnecke	*Neostyriaca*	*corynodes*	2003	2003	**3**		3			wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig, vor allem
Genabelte Strauchschnecke	*Fruticicola = Bradybaena*	*fruticum*	1989	2014	**16**	22	47	21		sehr häufig gefunden
Riemenschnecke	*Helicodonta*	*obvoluta*	1993	2014	**10**	1	14	1		häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Kartäuserschnecke	*Monacha*	*cartusiana*	2013	2013	**2**			2	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus, Waldrand Paradies	häufig gefunden, kann lokal in grossen Massen auftreten, gilt nach Literatur als wenig häufig
Gemeine Haarschnecke	*Trochulus = Trichia*	*hispidus*	2003	2003	**4**		5			mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig
Seidenhaarschnecke	*Trochulus = Trichia*	*sericeus*	1993	2013	**17**	5	27	2		sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Zottige Haarschnecke	*Trochulus = Trichia*	*villosus*	1993	2003	**6**	1	7			mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur in der Schweiz
Zahnlose Haarschnecke	*Petasina = Trichia*	*edentula*	2003	2003	**1**		1		Von Roll Areal	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig
Quendelschnecke	*Candidula*	*unifasciata*	1993	2014	**6**	1	6	2		häufig gefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz als häufig, aber verletzlich
Gemeine Heideschnecke	*Helicella*	*itala*	1993	2015	**22**	26	49	33		sehr häufig gefunden
Rötliche Laubschnecke	*Monachoides = Perforatella*	*incarnatus*	1993	2013	**12**	3	19	3		häufig ngefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig
Gefleckte Schnirkelschnecke	*Arianta*	*arbustorum*	1993	2013	**8**	1	10	1		in beschatteten und/oder feuchten Lebensräumen häufig gefunden, gilt nach
Steinpicker	*Helicigona*	*lapicida*	1989	2014	**12**	2	17	1		mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, nach Literatur vor allem im Jura häufig
Maskenschnecke	*Isognomostoma*	*isognostomos*	2003	2003	**4**		4			mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig
Schwarzmündige Bänderschnecke	*Cepaea*	*nemoralis*	1993	2014	**20**	21	38	10		sehr häufig gefunden
Weissmündige Bänderschnecke	*Cepaea*	*hortensis*	1993	2013	**12**	9	10	3		häufig gefunden
Fleckenstreifige Bänderschnecke	*Cepaea*	*sylvatica*	2003	2013	**3**		8	2		mässig häufig gefunden, vor allem in höheren Lagen des Jura
Weinbergschnecke	*Helix*	*pomatia*	1989	2015	**31**	54	86	37		sehr häufig gefunden
RINGELWÜRMER										
Pferdeegel	*Haemopis*	*sanguinea*	2003	2003	**1**		1		Goletenkanal	selten gefunden, weil selten danach gesucht

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
GLIEDERFÜSSLER			1993							
SPINNENTIERE			1993							
Weberknechte-, Zimmermann Familie	*(Phalangidae)*	*non det.*	1993	2003	**15**	12			ab BP2 nicht mehr inventarisiert	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert
Streckerspinnen-Art	*Tetragnatha*	*montana*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Streckerspinnen-Art	*Tetragnatha*	*nigrita*	1993	1993	**1**	1			einer von drei Funden in der Region!	**selten gefunden**
Herbstspinnen-Art	*Metellina*	*mengei*	2003	2013	**2**		1	1	Fischteich Haulenrain, Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Herbstspinnen-Art	*Metellina*	*segmentata*	1993	2013	**8**	5		1		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 10
Eichblatt-Radspinne	*Aculepeira*	*ceropegia*	1993	2013	**8**	2		2		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Gartenkreuzspinne	*Araneus*	*diadematus*	1993	2014	**19**	1		9		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7
Kürbiskreuzspinnen-Art	*Araniella*	*cucurbitina*	1993	2013	**4**	1		1		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 10
Wespenspinne, Zebraspinne	*Argiope*	*bruennichi*	1993	2013	**6**	4		2		häufig gefunden
Konische Radspinne, Kreisspinne	*Cyclosa*	*conica*	1993	1993	**1**	1			Hemmet, Wiese Ost	wenig häufig gefunden, weil klein und un-scheinbar, in den Bodenfallen der WSL nur 1
Streifenkreuzspinne	*Mangora*	*acalypha*	1993	1993	**4**	4				mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Baldachinspinnen-Art	*Linyphia*	*hortensis*	2003	2003	**1**		1		Goletenkanal	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14
Baldachinspinnen-Art	*Linyphia*	*triangularis*	1993	2013	**13**	4		6		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 4
Baldachinspinnen-Art	*Microlinyphia*	*pusilla*	1993	1993	**3**	3				häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Baldachinspinnen-Art	*Neriene*	*peltata*	2008	2008	**1**		1		Leberen, Chalch- und Wassergraben	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 6
Kugel- oder Haubennetzspinnen-Art	*Enoplognatha*	*ovata*	1993	2013	**4**	1		2		mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12
Kugel- oder Haubennetzspinnen-Art	*Theridion*	*impressum*	2003	2003	**1**		1		Wiese Klopfackerweg	wenig häufig gefunden, weil klein und unscheinbar, in den Bodenfallen der WSL nur 2
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	*Alopecosa*	*accentuata*	1993	2015	**5**	5		6		häufig gefunden
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	*Alopecosa*	*aculeata*	1993	1993	**2**	2			Schwängimatt, Weide West, Von Roll Areal	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	*Alopecosa*	*cuneata*	1993	2014	**11**	5		2		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 216
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	*Alopecosa*	*pulverulenta*	1993	2003	**13**	3				häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 585
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	*Alopecosa*	*trabalis*	1993	2003	**3**	2				häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 150
Wolfsspinnen-Art	*Pardosa*	*agricola*	2003	2003	**1**		1		Goletenkanal	selten gefunden, entgegen Expertenmeinung scheint mir die Abtrennung von agrestis unklar,
Wolfsspinnen-Art	*Pardosa*	*amentata*	1993	2014	**13**	9		4		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 204
Wolfsspinnen-Art	*Pardosa*	*hortensis*	1993	2013	**19**	14		5		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 219
Wolfsspinnen-Artkomplex	*Pardosa*	*lugubris*- Komplex	1993	2003	**15**	15				sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 1571
Wolfsspinnen-Art	*Pardosa*	*monticola*	1993	2003	**4**	3				häufig gefunden
Wolfsspinnen-Art	*Pardosa*	*palustris*	1993	2003	**8**	3				sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 42
Wolfsspinnen-Art	*Pardosa*	*pullata*	1993	2014	**18**	10		1		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 498
Wolfsspinnen-Art	*Xerolycosa*	*nemoralis*	1993	2003	**2**	3			Fuss der Holzfluh, Oberbergweide Mitte	mässig häufig gefunden
Listspinne	*Pisaura*	*mirabilis*	1993	2015	**22**			11		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9
Labyrinthspinne Gattung	*Agelena*	*sp.*	1993	2015	**33**	41		37		Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica
Labyrinthspinnen-Art	*Agelena*	*gracilens*	1993	1993	**1**	1			Weide Hasenweg	wenig häufig gefunden, weil meist nicht nachgeprüft, in den Bodenfallen der WSL nur 1
Bodentrichterspinnen-Art	*Coelotes*	*terrestris*	1993	2003	**3**	1				mässig häufig gefunden, aber in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig
Bodentrichterspinnen-Art	*Histopona*	*torpida*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide Mitte, einer von 3 Funden in der R.	**selten gefunden**, aber in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig
Winkelspinnen-Art	*Tegenaria*	*agrestis*	2003	2003	**1**		1		Weide Hasenweg, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Bodenspinnen-Art	*Hahnia*	*nava*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Finsterspinne Gattung	*Amaurobius*	*sp.*	1989	2003	**3**	1				Gattung mässig häufig gefunden
Sackspinne Gattung (Feenlämpchen)	*Agroeca*	*sp.*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	Gattung wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig
Sackspinnen-Art	*Phrurolithus*	*minimus*	1993	1993	**1**	1			Wiese Klopfackerweg, einer von drei Funden in der	selten gefunden in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 57

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Glattbauchspinne Gattung	*Drassodes*	*sp.*	1993	1993	**2**	2			Fuss der Holzfluh	Gattung mässig häufig gefunden
Glattbauchspinnen-Art	*Drassodes*	*cupreus*	1993	1993	**2**	2			Roggen, Weide Ost, Von Roll Areal	**selten gefunden**
Glattbauchspinnen-Art	*Drassodes*	*lapidosus*	2003	2003	**3**					wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3 Individuen
Glattbauchspinne Gattung	*Zelotes*	*sp.*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	Gattung mässig häufig gefunden
Glattbauchspinnen-Art	*Zelotes*	*petrensis*	2003	2003	**1**		1		Hauensteinmatt	**selten gefunden**
Laufspinne-, Flachstrecker Gattung	*Philodromus*	*sp.*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	Gattung häufig gefunden
Laufspinnen-, Flachstrecker-Art	*Philodromus*	*dispar*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Paradies	**selten gefunden**, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Laufspinnen-, Flachstrecker-Art	*Thanatus*	*formicinus*	2003	2013	**2**		1	1	Feuchtwiese Paradies, Chalm Oberberg, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Grüne Krabbenspinne	*Diaea*	*dorsata*	2003	2014	**2**		1	1		mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Veränderliche Krabbenspinne	*Misumena*	*vatia*	1993	2015	**7**	3		4		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14
Krabbenspinnen-Art	*Xysticus*	*bifasciatus*	2003	2013	**3**		2	1		mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 59
Krabbenspinnen-Art	*Xysticus*	*cristatus*	1993	2013	**5**	1		2		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14
Krabbenspinnen-Art	*Xysticus*	*kochi*	1993	2013	**8**	3		1		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Krabbenspinnen-Art	*Xysticus*	*lanio*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 9
Springspinnen-Art	*Evarcha*	*arcuata*	1993	2009	**4**	2				häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Springspinnen-Art	*Evarcha*	*falcata*	1993	2003	**2**	1			Schwängimatt, Weide Süd, Oberbergweide West	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Springspinnen-Art	*Heliophanus*	*cupreus*	1993	2009	**6**	5				häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12
Springspinnen-Art	*Heliophanus*	*flavipes*	1993	1993	**1**	1			Weide Hasenweg	**selten gefunden**, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Springspinnen-Art	*Phlegra*	*fasciata*	2009	2009	**1**		1		Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Springspinnen-Art	*Aelurillus*	*v-insignitus*	1993	2009	**3**	2				wenig häufig gefunden
Zebra-Springspinnen-, Harlekinspinnen-Art	*Salticus*	*scenicus*	2003	2003	**1**		1		Ruine Neu Falkenstein	an Mauern und Felsen häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 2 Individuen

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
KREBSTIERE			1993							
Landassel Ordnung	*(Oniscoidea)*	*non det.*	1993	1993	**6**	6				häufig gefunden
Assel-Art	*Ligidium*	*hypnorum*	2003	2003	**1**		1		Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht und nicht inventarisiert
Assel Familie	*(Trichoniscidae)*	*non det.*	2003	2003	**2**		2		Weide Seidenbergweg, Weide Brachhüsliweg	wenig häufig gefunden, weil klein, unscheinbar und versteckt, nicht inventarisiert
Mauerassel	*Oniscus*	*asellus*	2003	2003	**4**		4			häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig
Kellerassel-Art	*Porcellio*	*montanus*	2003	2003	**3**		3			wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht
Assel-Art	*Trachelipus*	*rathkei*	2003	2003	**4**		5			häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig
Rollassel Gattung	*Armadillidium*	*sp.*	1993	1993	**1**	9	12		Wiesenbord Römerstrasse	Gattung mässig häufig gefunden, aber wahrscheinlich häufig
VIELFÜSSER			1993							
Steinläufer Gattung	*Lithobius*	*sp.*	1993	2003	**12**	4	9			Gattung häufig gefunden, aber nie auf die Art bestimmt und oft nicht registriert
Schweizer Saftkugler	*Glomeris*	*helvetica*	2003	2003	**1**		1		Ruine Neu Falkenstein	wenig häufig gefunden
Gesprenkelter Saftkugler	*Glomeris*	*undulata forma conspersa*	1993	1993	**2**	2			Waldrand Oberberg, Von Roll Areal	häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig
Westlicher Sechsstreifen-Saftkugler	*Glomeris*	*intermedia*	2003	2003	**2**		2		Feuchtwiese Paradies, Waldrand Oberberg	mässig häufig gefunden
Gerandeter Saftkugler	*Glomeris*	*marginata*	1993	2003	**3**	1	2			häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig
Tausendfüsser-Art	*Cylindrojulus*	*caeruleocinctus*	1993	2013	**6**	3	2	1		unter Steinen und Totholz am Boden häufig gefunden
Tausendfüsser-Art	*Tachypodojulus*	*niger*	2003	2003	**3**		3			mässig häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten häufig
INSEKTEN										
Felsenspringer			2003							
Felsenspringer Familie	*(Machilidae)*	*non det.*	1993	2003	**3**	1				wenig häufig gefunden, meist nicht inventarisiert
Steinfliegen			1993							
Steinfliegen-Art	*Nemoura*	*marginata*	1993	1993	**1**	1			Oberberg Weide Nordost	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Steinfliegen-Art	*Leuctra*	*inermis*	2003	2003	**1**		1		Fuss der Fluh St. Wolfgang	selten gefunden
Libellen			1993							
Blauflügel-Prachtlibelle	*Calopteryx*	*virgo*	2013	2015	**2**			2	Schwängimatt, Wiese Süd, Schwängimatt, Weide Mitte	an Bächen häufig gefunden
Gemeine Federlibelle	*Platycnemis*	*pennipes*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Paradies	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,
Frühe Adonislibelle	*Pyrrhosoma*	*nymphula*	1993	2013	**3**	1	2	2		an stehenden Gewässern häufig gefunden
Becher-Azurjungfer	*Enallagma*	*cyathigerum*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	an stehenden Gewässern häufig gefunden
Hufeisen-Azurjungfer	*Coenagrion*	*puella*	1993	2013	**2**	1	4	2	Fischteich Haulenrain, Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	an stehenden Gewässern häufig gefunden
Blaugrüne Mosaikjungfer	*Aeshna*	*cyanea*	1993	2013	**9**	5	11	4		sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern
Grosse Königslibelle	*Anax*	*imperator*	2013	2013	**2**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus, Oberbergweide West	häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern
Gemeine Keiljungfer	*Gomphus*	*vulgatissimus*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Weide Mitte	wenig häufig gefunden
Gestreifte Quelljungfer	*Cordulegaster*	*bidentata*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide West	wenig häufig gefunden
Vierfleck	*Libellula*	*quadrimaculata*	2003	2013	**3**		2	2		an stehenden Gewässern häufig gefunden
Plattbauch	*Libellula*	*depressa*	1993	2013	**5**	1	4	2		an stehenden Gewässern häufig gefunden
Gemeine Heidelibelle	*Sympetrum*	*vulgatum*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	wenig häufig gefunden
Grosse Heidelibelle	*Sympetrum*	*striolatum*	1993	2013	**3**	1	2	1		häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst
Ohrwürmer			1993							
Gemeiner Ohrwurm	*Forficula*	*auricularia*	1993	2013	**14**	11	3	2		häufig gefunden
Schaben			1993							
Podas Waldschabe	*Ectobius*	*sylvestris*	1993	2013	**3**	1	2	1		häufig gefunden
Gemeine Waldschabe	*Ectobius*	*lapponicus*	1993	2003	**3**	3	1	1		häufig gefunden
Turtons Waldschabe	*Ectobius*	*pallidus = livens*	2009	2013	**1**		1	1	Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Bernstein-Waldschabe	*Ectobius*	*vittiventris*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	noch wenig häufig gefunden, aber vor allem im Siedlungsraum zunehmend häfiger
Heuschrecken										
Gemeine Sichelschrecke	*Phaneroptera*	*falcata*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide West	früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen und häufig
Laubholz- Säbelschrecke	*Barbitistes*	*serricauda*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden
Punktierte Zartschrecke	*Leptophyes*	*punctatissima*	1993	2013	**7**	1	4	2		häufig gefunden
Grünes Heupferd	*Tettigonia*	*viridissima*	1993	2015	**31**	43	28	25		sehr häufig gefunden
Zwitscherschrecke	*Tettigonia*	*cantans*	1993	2013	**5**	8	5	2		sehr häufig gefunden
Warzenbeisser	*Decticus*	*verrucivorus*	1993	2015	**12**	16	19	9		sehr häufig gefunden
Westliche Beissschrecke	*Platycleis*	*albopunctata albopunctata*	1989	2014	**18**	25	18	18		im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig
Kurzflüglige Beissschrecke	*Metrioptera*	*brachyptera*	1993	1993	**1**	1			Chalm Oberberg, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Roesels Beissschrecke	*Metrioptera*	*roeselii*	1993	2015	**22**	35	33	6		sehr häufig gefunden
Gewöhnliche Strauchschrecke	*Pholidoptera*	*griseoaptera*	1986	2015	**29**	45	32	32		sehr häufig gefunden
Feldgrille	*Gryllus*	*campestris*	1993	2015	**32**	58	99	77		sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland
Waldgrille	*Nemobius*	*sylvestris*	1986	2014	**36**	66	71	33		sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern
Säbeldornschrecke	*Tetrix*	*subulata*	1993	2014	**4**	5	1	1		häufig gefunden
Langfühler-Dornschrecke	*Tetrix*	*tenuicornis*	1993	2014	**15**	15	8	3		sehr häufig gefunden
Alpine Gebirgsschrecke	*Miramella*	*alpina ssp. subalpina*	1993	2012	**3**	2	6	1		mässig häufig gefunden
Rotflüglige Ödlandschrecke	*Oedipoda*	*germanica*	1986	2013	**2**	9	7	2	**einer von 2 Fundorten in der Region,** unter den Flühen!	**mehrmals an 2 benachbarten Orten unter Flühen gefunden**
Lauchschrecke	*Mecostethus = Parapleurus*	*parapleurus = alliaceus*	1993	2015	**12**	5	10	10		sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren
Grosse Goldschrecke	*Chrysochraon*	*dispar*	1993	2003	**3**	7	5			sehr häufig gefunden
Kleine Goldschrecke	*Euthystira = Chrysochraon*	*brachyptera*	1993	2015	**8**	20	15	10		sehr häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Buntbäuchiger Grashüpfer	*Omocestus*	*rufipes = ventralis*	1993	2013	**11**	14	7	5		im Jura häufig gefunden, aber anspruchsvolle Art
Bunter Grashüpfer	*Omocestus*	*viridulus*	1986	2015	**18**	25	26	18		sehr häufig gefunden
Heidegrashüpfer	*Stenobothrus*	*lineatus*	1986	2015	**26**	60	41	24		sehr häufig gefunden
Rote Keulenschrecke	*Gompho-cerippus*	*rufus*	1986	2013	**6**	9	9	4		sehr häufig gefunden
Feld-Grashüpfer	*Chorthippus*	*apricarius*	1993	2013	**5**	4	4	3		häufig gefunden
Nachtigall-Grashüpfer	*Chorthippus*	*biguttulus*	1986	2014	**38**	69	87	53		sehr häufig gefunden
Brauner Grashüpfer	*Chorthippus*	*brunneus*	1986	2015	**21**	16	31	4		sehr häufig gefunden
Wiesengrashüpfer	*Chorthippus*	*dorsatus*	2003	2003	**1**		1		Chalm Oberberg, Wiese Ost	häufig gefunden, aber im Bezirk Thal selten
Gemeiner Grashüpfer	*Chorthippus*	*parallelus*	1993	2015	**37**	73	80	50		sehr häufig gefunden
Wanzen										
Rückenschwimmer Gattung	*Notonecta*	*sp.*	1993	1993	**1**	1			Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	Gattung in stehenden Gewässern häufig gefunden
Wasserläufer-Art	*Gerris*	*lacustris*	1993	2003	**1**	2	2		Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	mässig häufig gefunden, aber vermutlich auf stehenden Gewässern häufig, in den Fallen der
Stoss- od. Bachwasserläufer Gattung	*Velia*	*sp.*	2003	2003	**1**		1		Feuchtwiese Paradies	Gattung wenig häufig gefunden, aber kaum danach gesucht
Gemeiner Teichläufer	*Hydrometra*	*stagnorum*	2003	2003	**1**		2		Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	in stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, aber kaum danach gesucht
Kugelwanze	*Coptosoma*	*scutellatum*	1993	2013	**3**	2	1	1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7
Gras-Schildwanze	*Eurygaster*	*maura*	1993	2013	**2**	1		1	Hemmet, Wiese Ost, Haulen, Wiese Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Schildkrötenwanze	*Eurygaster*	*testudinaria*	2003	2013	**2**		1	1		häufig gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Streifenwanze	*Graphosoma*	*lineatum*	1993	2013	**13**	18	12	8		häufig gefunden
Spitzling, Getreide-Spitzwanze	*Aelia*	*acuminata*	2014	2014	**1**			1	Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden
Kleine Sichelfleck-Baumwanze	*Staria*	*lunata*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang, **einziger Fund in der R.!**	**erst 1 Mal gefunden**
Baumwanzen-Art	*Rubiconia*	*intermedia*	1993	2013	**4**	1	1	2		mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Baumwanzen-Art	*Holcostethus*	*vernalis*	2003	2003	**2**		2		Weide Brachhüsliweg, Südliche Bahnböschung	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Baumwanzen-Art	*Holcostethus*	*sphacelatus*	2003	2013	**3**		3	1		Gattung wenig häufig gefunden
Baumwanzen-Art	*Carpocoris*	*pudicus*	2003	2013	**2**		3	2	Fuss der Holzfluh, Ruine Neu Falkenstein	mässig häufig gefunden
Baumwanzen-Art	*Carpocoris*	*purpureipennis*	1993	2013	**17**	16	12	6		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Baumwanzen-Art	*Carpocoris*	*fuscispinus*	1993	2013	**15**	6	15	4		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Beerenwanze	*Dolycoris*	*baccarum*	1993	2014	**21**	8	21	9		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11
Grüne Stinkwanze	*Palomena*	*prasina*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9
Ginster-Baumwanze	*Piezodorus*	*lituratus*	2003	2013	**1**		1	1	Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Gartenwanze	*Raphigaster*	*nebulosa*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden, vor allem im Siedlungsraum
Kohlwanze	*Eurydema*	*oleraceum*	1993	1993	**2**	2			Roggen, Weide Ost, Von Roll Areal	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Bläuling, Blaugrüne Baumwanze	*Zicrona*	*coerulea*	1993	2013	**4**	1		1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Stachelwanze	*Acanthosoma*	*haemorrhoidale*	1993	1993	**1**	1			Hemmet, Wiese Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Randwanzen-Art	*Enoplops*	*scava*	2003	2013	**2**		2	1	Farisberg, untere Weide West, Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden
Leder- oder Saumwanzen-Art	*Coreus*	*marginatus*	1993	2013	**6**	5	2	5		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Leder- oder Saumwanzen-Art	*Coriomeris*	*denticulatus*	1993	2013	**3**	2		1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Westliche Randwanze	*Leptoglossus*	*occidentalis*	2013	2013	**2**			2	Fuss der Holzfluh, Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden, vor wenigen Jahren eingewandert, in Ausbreitung begriffen
Glasflügelwanzen-Art	*Corizus*	*hyoscyami*	1993	2013	**14**	5	11	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Glasflügelwanzen-Art	*Rhopalus*	*subrufus*	1993	2013	**7**	2	6	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Glasflügelwanzen-Art	*Rhopalus*	*distinctus*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese Ost	**selten gefunden**
Glasflügelwanzen-Art	*Rhopalus*	*parumpunctatus*	1993	1993	**1**	1			Weide Seidenbergweg	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Glasflügelwanzen-Art	*Stictopleurus*	*punctato-nervosus*	2003	2003	**1**		1		Böschung Oberbergweg	häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Glasflügelwanzen-Art	*Stictopleurus*	*abutilon*	1993	2003	**4**	1	3			mässig häufig gefunden
Wolfsmilchwanzen-Art	*Dicranocephalus*	*agilis*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Feuerwanze	*Pyrrhocoris*	*apterus*	1989	2014	**12**	4	19	11		sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden
Rotrückiger Irrwisch	*Alydus*	*calcaratus*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese West	mässig häufig gefunden
Ritterwanzen-Art	*Tropidothorax*	*leucopterus*	1993	2013	**11**	11	10	4		mässig häufig gefunden
Ritterwanzen-Art	*Lygaeus*	*equestris*	1993	2013	**5**	2	3	2		mässig häufig gefunden
Ritterwanzen-Art	*Melano-coryphus*	*albomarginatus*	2009	2009	**1**		1		Fuss der Holzfluh , einer von zwei Funden in der Region!	**erst 2 Mal gefunden**
Ritterwanzen-Art	*Horvathiolus*	*superbus*	2003	2003	**1**		1		Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Bodenwanzen-Art	*Nysius*	*senecionis*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal, einer von zwei Funden in der Region!	**erst 2 Mal gefunden**
Bodenwanzen-Art	*Rhyparo-hromus*	*pini*	1993	2013	**5**	1	3	1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 32
Bodenwanze Gattung	*Megalonotus*	*sp.*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	Gattung wenig häufig gefunden
Gespensterwanze, Teufel	*Phymata*	*crassipes*	1998	2014	**2**	2		1	Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden
Sichelwanzen-Art	*Aptus*	*mirmicoides*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 36
Sichelwanzen-Art	*Nabis*	*flavomarginatus*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide West	**selten gefunden**
Sichelwanzen-Art	*Nabis*	*rugosus*	1993	2013	**3**	1	1	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 28
Weichwanzen-Art	*Deraeocoris*	*ruber*	1993	2013	**4**	4		1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 74
Weichwanzen-Art	*Deraeocoris*	*scutellaris*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	**erst 2 Mal gefunden**
Weichwanzen-Art	*Capsus*	*ater*	1993	2003	**3**	1	2			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6
Weichwanzen-Art	*Polymerus*	*unifasciatus*	1993	2013	**2**	1		1	Haulen, Wiese Ost, Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Weichwanzen-Art	*Orthops*	*basalis*	1993	2013	**3**	3		1		wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 10
Weichwanzen-Art	*Orthops*	*campestris*	1993	2013	**3**	2	1	1		**selten gefunden**, weil klein und unscheinbar

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Behaarte Wiesenwanze	*Lygus*	*rugulipennis*	1993	2003	**3**	1	2			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21
Gemeine Wiesenwanze	*Lygus*	*pratensis*	1993	2013	**7**	2	2	3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 46
Wiesenwanze-Art	*Lygocoris*	*lucorum*	2008	2008	**1**		1		Leberen, Chalch- und Wassergraben, einer von drei	**selten gefunden**
Weichwanzen-Art	*Stenotus*	*binotatus*	1993	2013	**6**	1		5		mässig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	*Hadrodemus*	*M-flavum*	1993	2015	**10**	6	5	5		häufig gefunden
Weichwanzen-Art	*Calocoris*	*pilicornis*	1993	2013	**3**	2		2		wenig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	*Calocoris*	*biclavatus*	2008	2008	**1**		1		Leberen, Chalch- und Wassergraben	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7
Weichwanzen-Art	*Calocoris*	*affinis*	2003	2008	**3**		3			mässig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	*Calocoris*	*norvegicus*	2003	2003	**1**				Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 92
Weichwanzen-Art	*Calocoris*	*roseomaculatus*	1993	2014	**10< 201**	13	8	6		häufig gefunden
Gelbsaum-Zierwanze	*Adelphocoris*	*seticornis*	1993	2013	**6**	3	3	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Gemeine Zierwanze	*Adelphocoris*	*lineolatus*	1993	2013	**6**	2	3	2		häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Weichwanzen-Art	*Capsodes*	*gothicus*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	*Capsodes*	*cingulatus*	1993	2013	**5**	3	4	2		mässig häufig gefunden
Weichwanzen-Art	*Stenodema*	*laevigatum*	1993	2014	**5**	1	4	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 42
Weichwanzen-Art	*Notostira*	*elongata*	1993	1993	**1**	2			Hauensteinmatt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Weichwanzen-Art	*Notostira*	*erratica*	1993	2014	**5**	5		2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 30
Weichwanzen-Art	*Megaloceraea*	*recticornis*	2003	2013	**10**		6	4		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Weichwanzen-Art	*Leptopterna*	*ferrugata*	2003	2013	**2**		2	1	Oberbergweide West, Oberbergweide Mitte	**selten gefunden**
Weichwanzen-Art	*Leptopterna*	*dolobrata*	1993	2013	**15**	4	6	8		häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 24
Weichwanzen-Art	*Heterotoma*	*meriopterum*	1993	1993	**1**	1			Goletenkanal, einer von zwei Funden in der Region!	**erst 2 Mal gefunden**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Weichwanzen-Art	*Orthotylus*	*marginalis*	1993	1993	**1**	1			Hauensteinmatt	**selten gefunden**
Weichwanzen-Art	*Globiceps*	*cruciatus*	2003	2003	**2**		2		Oberbergweide Mitte, Roggen, Weide Ost	**erst 2 Mal gefunden**
Weichwanzen-Art	*Dryophilocoris*	*flavoquadri-maculatus*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Paradies	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Weichwanzen-Art	*Plagiognathus*	*chrysanthemi*	1993	1993	**1**	1			Hauensteinmatt	**selten gefunden**
Gleichflügler										
Kleinzikaden-Art	*Reptalus = Pentastiridius*	*panzeri*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Holzfluh, einziger Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden, aber kaum danach gesucht und kaum registriert
Käferzikaden-Art	*Issus*	*coleoptratus*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Wiesen-Schaumzikade	*Philaenus*	*spumarius*	1993	2015	**13**	7	5	9		Gattung sehr häufig gefunden
Erlen-Schaumzikade	*Aphrophora*	*alni*	1993	2013	**11**	5	2	6		sehr häufig gefunden
Schaumzikaden-Art	*Lepyronia*	*coleoptrata*	1993	2013	**3**	1	5	5		häufig gefunden
Blutzikaden-Art	*Cercopis*	*vulnerata*	1993	2013	**7**	5	2	3		häufig gefunden
Dornzikade, Buckelzikade	*Centrotus*	*cornutus*	2013	2013	**2**			2	Fuss der Fluh St. Wolfgang,Waldrand Alt Berg	mässig häufig gefunden
Zwergzikaden-Art	*Penthimia*	*nigra*	2009	2009	**1**		1		Fuss der Holzfluh	
Zwergzikaden-Art	*Aphrodes*	*bicinctus-Gruppe*	2003	2003	**2**		2		Waldrand Alt Berg,Schwängimatt, Weide	mässig häufig gefunden
Grüne Zwergzikade	*Cicadella*	*viridis*	1993	2003	**1**	1	2		Feuchtwiese Paradies	sehr häufig gefunden, in Feuchtlebensräumen oft massenhaft
Schlammfliegen			2003							
Wasserflorfliegen-Art	*Sialis*	*lutaria*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, aber vermutlich häufig
Wasserflorfliegen-Art	*Sialis*	*fuliginosa*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide West	an fliessenden Gewässern wenig häufig gefunden
Netzflügler										
Blattlauslöwen-Art	*Micromus*	*variegatus*	2013	2013	**1**			1	Chalm Oberberg, Wiese Ost	wenig häufig gefunden
Florfliegen-Art	*Nineta*	*vittata*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Süd, **einer von 2 Funden in der R.**	**erst 2 Mal gefunden**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Florfliegen-Art	*Chrysopa*	*perla*	1993	2003	**2**	2	1		Schwängimatt, Weide Süd,Roggen, Weide West	häufig gefunden
Goldauge, Florfliegen-Art	*Chrysoperla*	*carnea*	1993	2015	**16**	5	11	8		sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern
Ameisenjunger-, -löwen-Art	*Myrmeleon*	*formicarius*	1993	2014	**9**	3	8	2		häufig gefunden
Käfer			1993							
Berg-Sandläufer	*Cicindela*	*silvicola*	1993	2013	**3**	4	4	3		häufig gefunden
Feld-Sandläufer	*Cicindela*	*campestris*	1993	1993	**7**	9				sehr häufig gefunden
Lederlaufkäfer	*Carabus*	*coriaceus*	2003	2014	**2**		1	1	Waldrand Paradies, Schwängimatt, Weide Mitte	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 129
Körnerwarze	*Carabus*	*cancellatus*	2003	2003	**2**		2		Oberbergweide West, Oberbergweide Mitte	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6
Feingestreifter Laufkäfer	*Carabus*	*monilis*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide West	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 80
Hain-Laufkäfer	*Carabus*	*nemoralis*	2003	2003	**1**		2		Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 271
Dammläufer-Art	*Nebria*	*brevicollis*	2003	2003	**4**		4			mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 469
Zweifleckiger Schmuckläufer	*Anisodactylus*	*binotatus*	1993	1993	**1**	1			Wiese Klopfackerweg	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 106
Laufkäfer-Art	*Diachromus*	*germanus*	1993	2003	**1**	1	1		Waldrand Oberberg	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 206
Schnelläufer-Art	*Trichotichnus*	*nitens*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 22
Schnelläufer-Art	*Ophonus*	*ardosianus*	1993	1993	**1**	1			Haulen, Wiese Ost	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Schnelläufer-Art	*Ophonus = Metophonus*	*puncticeps*	1993	2003	**3**	3	1			mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) : 42
Schnelläufer-Art	*Harpalus*	*distinguendus*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14
Schnelläufer-Art	*Harpalus*	*dimidiatus*	1993	2003	**2**	1	1		Hemmet, Wiese Ost, Oberbergweide Mitte	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 86
Schnelläufer-Art	*Harpalus*	*latus*	2003	2003			1			wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 131
Behaarter Schnelläufer	*Harpalus*	*rubripes*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide Mitte	mässig häufig gefunden
Laufkäfer-Art	*Stenolophus*	*teutonus*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 42

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kupferiger Schulterläufer, Listkäfer-Art	*Poecilus*	*cupreus*	1993	2003	**6**	3	3			häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 598
Schulterläufer- oder Listkäfer-Art	*Poecilus*	*versicolor*	1993	2013	**3**	2	1	1		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 71
Grabkäfer-Art	*Pterostichus*	*pumilio*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Süd , einer von 2 Funden in der R.!	**erst 2 Mal gefunden**, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Grabkäfer-Art	*Pterostichus*	*ovoideus*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 17
Frühlings-Grabkäfer	*Pterostichus*	*vernalis*	1993	2003	**3**	1	2			mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 35
Gemeiner Grabkäfer	*Pterostichus*	*melanarius*	1993	1993	**2**	2			Von Roll Areal, Rinderweid	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 466
Grabkäfer-Art	*Pterostichus*	*madidus*	1993	2003	**6**	2	5			häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 975
Metallischer Grabkäfer	*Pterostichus*	*burmeisteri*	2003	2003	**2**		2		Roggen, Weide West, Rinderweid	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 622
Grabkäfer-Art	*Pterostichus*	*selmanni*	2003	2003	**3**		3			mässig häufig gefunden, in der Schweiz nur im Jura, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger)
Grabkäfer-Art	*Pterostichus*	*hagenbachi*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	**selten gefunden**
Pechfarbiger Striemenkäfer	*Molops*	*piceus*	1993	2003	**2**	1	1		Roggen, Weide Ost, Schwängimatt, Weide Süd	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 475
Grosser Breitkäfer	*Abax*	*parallelepipedus*	1993	2003	**1**	1	1		Schwängimatt, Weide Mitte	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 916
Ovaler Breitkäfer	*Abax*	*ovalis*	1993	2003	**3**	2	1			wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 899
Braunfüssiger Breihalsläufer	*Calathus*	*fuscipes*	2003	2003	**2**		2		Oberbergweide Mitte, Schwängimatt, Weide Mitte	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 22
Müllers Putzläufer	*Agonum*	*muelleri*	2003	2003	**2**		2		Waldrand Alt Berg, Schwängimatt, Wiese Nord	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 328
Grüner Putzläufer	*Platynus*	*dorsalis*	1993	2003	**2**	2	2			häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 1225
Gemeiner Kanalkäfer-, Kamelläufer	*Amara Zezea*	*plebeja*	1993	1993	**1**	1			Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückigermässig mässig häufig: 33
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	*Amara s.str.*	*similata*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Ovaler Kanalkäfer-, Kamelläufer	*Amara s.str.*	*ovata*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	*Amara s.str.*	*montivaga*	1998	1998	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Indiduum
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	*Amara s.str.*	*nitida*	1993	1993	**1**	1			Roggen, Weide Ost	selten gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 58

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gewöhnlicher Kanalkäfer-, Kamelläufer	*Amara s.str.*	*communis*	2003	2003	**1**		1		Hauensteinmatt	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	*Amara s.str.*	*aenea*	1993	2013	**2**	1		1	Von Roll Areal, Waldrand Paradies	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 22
Prächtiger Kanalkäfer-, Kamelläufer	*Amara Curtonotus*	*aulica*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide Süd, **enziger Fund in der R.!**	**erst 1 Mal gefunden**
Wanderläufer-Art	*Badister*	*bullatus*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger mässig häufig: 50
Prunkkäfer-, Prunkläufer-Art	*Lebia*	*crux-minor*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang, **einziger Fund in der R.!**	**erst 1 Mal gefunden**
Kleiner Bombardierkäfer	*Brachinus*	*explodens*	1993	1993	**1**	1			Wiese Klopfackerweg	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11
Stutzkäfer-Art	*Margarinotus =Paralister*	*neglectus*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid , einer von 2 funden in der Region.	**erst 2 Mal gefunden**
Schwarzer Schneckenjäger	*Phosphuga*	*atrata*	2003	2014	**3**		2	1		mässig häufig gefunden, im Versteckten sehr wahrscheinlich häufig
Gemeiner Totengräber	*Necrophorus*	*vespillo*	2013	2013	**2**			2	Oberbergweide West, Waldrand Oberberg	wenig häufig gefunden
Vierfleckiger Kahnkäfer	*Scaphidium*	*quadrimaculatum*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden
Schmalräuber-Art	*Stenus*	*bimaculatus*	2003	2003	**1**		1		Goletenkanal	**selten gefunden**
Gemeiner Uferräuber	*Paederus*	*litoralis*	1993	1993	**2**	2			Wiese Klopfackerweg, Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden
Braunfüssiger Uferräuber	*Paederus*	*fuscipes*	2003	2003	**1**		1		Goletenkanal	mässig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	*Xantholinus*	*linearis*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	**selten gefunden**
Kurzflügelkäfer-Art	*Othius*	*punctulatus*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Mitte	**selten gefunden**
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	*Platydracus*	*stercorarius*	1993	1993	**1**	1			Weide Brachhüsliweg	wenig häufig gefunden
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	*Staphylinus*	*dimidiaticornis*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	wenig häufig gefunden
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	*Ocypus*	*olens*	1993	2003	**5**	3	4			mässig häufig gefunden
Kurzflkügelkäfer Gattung	*Gabrius*	*sp.*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	Gattung selten gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	*Philonthus*	*cognatus*	1993	2003	**3**	1	2			mässig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	*Philonthus*	*decorus*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kurzflügelkäfer-Art	*Philonthus*	*laminatus*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide West	**selten gefunden**
Schnellräuber-Art (Kurzflügler)	*Tachinus*	*signatus =*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden
Schnellräuber-Art (Kurzflügler)	*Tachyporus*	*chrysomelinus*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	*Drusilla*	*canaliculata*	2003	2003	**1**		1		Goletenkanal	wenig häufig gefunden
Rotdeckenkäfer-Art	*Pyropterus*	*nigro-ruber*	2003	2003	**1**		1		Weide Brachhüsliweg, einer von 2 Funden in der Region	**erst 2 Mal gefunden**
Gemeiner Weichkäfer	*Cantharis*	*fusca*	1993	2014	**15**	6	8	7		häufig gefunden
Weichkäfer-Art	*Cantharis*	*rustica*	1993	2014	**19**	6	19	14		sehr häufig gefunden
Weichkäfer-Art	*Cantharis*	*obscura*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Mitte	**selten gefunden**
Weichkäfer-Art	*Cantharis*	*nigricans*	1993	2013	**6**	3	3	2		häufig gefunden
Weichkäfer-Art	*Cantharis*	*livida*	1993	2003	**5**	3	2			häufig gefunden
Weichkäfer-Art	*Cantharis*	*rufa*	1993	2013	**1**	1		1	Feuchtwiese Paradies	mässig häufig gefunden
Weichkäfer-Art	*Rhagonycha*	*lutea*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese West	wenig häufig gefunden
Rotgelber Weichkäfer	*Rhagonycha*	*fulva*	1993	2015	**16**	17	11	4		sehr häufig gefunden
Weichkäfer-Art	*Rhagonycha*	*limbata*	2003	2015	**4**		2	3		häufig gefunden
Weichkäfer-Art	*Rhagonycha*	*lignosa*	1993	2013	**3**	2		2		mässig häufig gefunden
Grosser Blasenkäfer	*Malachius*	*aeneus*	2003	2003	**1**		1		Wiese Klopfackerweg	mässig häufig gefunden
Zweifleckiger Warzenkäfer	*Malachius*	*bipustulatus*	1993	2013	**6**	1	2	3		häufig gefunden
Grüner Warzenkäfer	*Malachius*	*viridis*	1993	1993	**2**	2			Waldrand Alt Berg, Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden
Warzenkäfer-Art	*Clanoptilus = Malachius*	*geniculatus*	2009	2009	**1**		1		Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden
Blauer Wollhaarkäfer	*Dasytes*	*caeruleus*	2013	2013	**2**			2	Schwängimatt, Wiese Süd, Schwängimatt, Wiese West	mässig häufig gefunden
Buntkäfer-Art	*Tillus*	*elongatus*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide Süd , **einer von 2 Funden in der R.!**	**erst 2 Mal gefunden**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Ameisen-Buntkäfer	*Thanasimus*	*formicarius*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	*Trichodes*	*apiarius*	1993	2013	**5**	1	3	2		wenig häufig gefunden
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	*Trichodes*	*alvearius*	1993	2013	**13**	1	6	8		häufig gefunden
Buchenwerftkäfer, Bohrkäfer	*Hylecoetus*	*dermestoides*	2003	2003	**1**		1		Oberberg Wiese Nordost	wenig häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	*Ampedus*	*quercicola*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	*Agriotes*	*pilosellus*	1993	2013	**2**	1		1	Fuss der Fluh St. Wolfgang, Hemmet, Wiese West	mässig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	*Agriotes*	*obscurus*	1993	1993	**1**	1			Weide Brachhüsliweg	wenig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	*Agriotes*	*sputator*	1993	1993	**1**	1			Roggen, Weide Ost	Gattung mässig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	*Agriotes*	*gallicus*	1993	2003	**6**	4	3			häufig gefunden
Mausgrauer Schnellkäfer	*Argypnus = Adelocera*	*murinus*	1993	2013	**10**	4	3	3		häufig gefunden
Rindenschnellkäfer-Art	*Ctenicera*	*pectinicornis*	1993	2015	**4**	2	3	3		mässig häufig gefunden
Rindenschnellkäfer-Art	*Ctenicera*	*cuprea*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Mitte, **einziger Fund in der R.**	**erst 1 Mal gefunden**
Rindenschnellkäfer-Art	*Selatosomus*	*aeneus*	2013	2003	**1**			1	Schwängimatt, Wiese West, **einziger Fund in der R.**	**erst 1 Mal gefunden**
Schnellkäfer-Art	*Cidnopus*	*pilosus*	1993	2014	**8**	1	7	1		mässig häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	*Pheletes = Limonius =*	*minutus*	2013	2013	**1**			1	Hauensteinmatt	wenig häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	*Nothodes = Limonius*	*parvulus*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Paradies	**selten gefunden**
Schnellkäfer-Art	*Pheletes = Limonius*	*quercus*	1993	1993	**2**	2			Hemmet, Wiese West, Waldrand Oberberg	mässig häufig gefunden, weil klein, vermutlich häufig
Schnellkäfer-Art	*Hemicrepidius = Athous =*	*niger*	1993	2013	**7**	3	1	4		häufig gefunden
Rauhhaariger Schnellkäfer	*Hemicrepidius = Athous =*	*hirtus*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	*Athous*	*haemorrhoidalis*	2003	2015	**4**		1			häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	*Athous*	*vittatus*	1993	2013	**6**	1	2	3		mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schnellkäfer-Art	*Athous*	*subfuscus*	2003	2008	**1**		2		Leberen, Chalch- und Wassergraben	wenig häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	*Athous*	*bicolor*	2013	2013	**1**			1	Hauensteinmatt	wenig häufig gefunden
Prachtkäfer-Art	*Buprestis*	*octoguttata*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Zierliches Prachtkäferchen	*Anthaxia*	*nitidula*	1993	2013	**9**	3	4	2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 117
Prachtkäfer-Art	*Anthaxia*	*similis*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	**selten gefunden**
Prachtkäfer-Art	*Anthaxia*	*helvetica*	1993	2015	**9**	3	5	6		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 27
Vierpunktprachtkäfer	*Anthaxia*	*quadripunctata*	1993	2013	**2**	1	1	1	Waldrand Alt Berg, Haulen, Wiese West	häufig gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 51
Prachtkäfer-Art	*Agrilus*	*angustulus*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Alt Berg	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9
Wiesenkäfer, Moorweichkäfer	*Dascillus*	*cervinus*	1993	2003	**1**	1	1		Schwängimatt, Weide Süd	wenig häufig gefunden
Veränderlicher Pillenkäfer	*Cytilus*	*sericeus*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	**selten gefunden**
Blütenfresser	*Byturus*	*aestivus*	2013	2003	**1**			1	Waldrand Paradies	häufig gefunden
Glanzkäfer Gattung	*Meligethes*	*sp.*	1993	2013	**16**	13	6	3		Gattung sehr häufig gefunden
Scharlachroter Pilzkäfer	*Endomychus*	*coccineus*	1993	1993	**2**	2			Fuss der Fluh St. Wolfgang, Schwängimatt, Weide West	**selten gefunden**
Vierfleckiger Kugelkäfer	*Exochomus*	*quadripustulatus*	1993	2003	**2**	1	1		Von Roll Areal, Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden
Veränderlicher Marienkäfer	*Adonia*	*variegata*	2003	2003	**3**		4			mässig häufig gefunden
Siebenpunkt	*Coccinella*	*septempunctata*	1993	2014	**31**	49	20	11		sehr häufig gefunden
Marienkäfer-Art	*Harmonia*	*axyridis*	2013	2013	**2**			2	Waldrand Paradies, Waldrand Alt Berg	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig
Zweiundzwanzigpunkt	*Thea*	*vigintiduo-punctata*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Oberberg	mässig häufig gefunden
Marienkäfer-Art	*Calvia*	*decimgutta*	2003	2003	**1**		1		Haulen, Wiese Ost	**selten gefunden**
Vierzehnpunktiger Marienkäfer	*Propylaea*	*quadridecem-punctata*	1993	2013	**6**	2	2	2		häufig gefunden
Marienkäfer-Art	*Subcoccinella*	*vigintiquattro-punctata*	2003	2003	**1**		1		Weide Brachhüsliweg	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Scheinbockkäfer-Art	*Nacerdes = Xanthochroa*	*carniolica*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Scheinbockkäfer-Art	*Anogcodes = Anoncodes =*	*rufiventris*	1993	2013	**2**	1		1	Von Roll Areal, Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	wenig häufig gefunden
Metallgrüner Schenkelkäfer	*Chrysanthia*	*viridissima*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden
Scheinbockkäfer-Art	*Ischnomera*	*coerulea*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Süd	wenig häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	*Oedemera*	*femorata*	1993	2013	**10**	10	4	2		häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	*Oedemera*	*ptysica = subulata*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden
Graugrüner Schenkelkäfer	*Oedemera*	*virescens*	1993	2013	**6**	3		3		häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	*Oedemera*	*lurida*	1993	2013	**5**	1	4	1		häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	*Oedemera*	*tristis*	2013	2013	**1**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	mässig häufig gefunden
Feuerkäfer-Art	*Pyrochroa*	*serraticornis*	1993	2013	**4**	2		3		häufig gefunden
Feuerkäfer-Art	*Schizotus*	*pectinicornis*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden
Gebänderter Stachelkäfer	*Variimorda*	*villosa*	1993	2013	**15**	11	9	3		sehr häufig gefunden
Stachelkäfer-Art	*Mordella*	*brachyura*	2013	2013	**2**			2	Haulen, Wiese Ost, Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	mässig häufig gefunden aber oft nicht registriert
Stachelkäfer-Art	*Mordellistena*	*brevicauda*	1993	1993	**3**	4				häufig gefunden
Stachelkäfer-Art	*Mordellochroa*	*abdominalis*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	mässig häufig gefunden
Gemeiner Wollkäfer	*Lagria*	*hirta*	1993	2013	**1**	1		1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	mässig häufig gefunden
Pflanzenkäfer-Art	*Isomira*	*murina*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	**selten gefunden**
Schwefelkäfer	*Cteniopus*	*sulfureus = flavus*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden
Kotkäfer-Art	*Onthophagus*	*fracticornis*	2003	2013	**2**		1	1	Haulen, Wiese West, Oberbergweide West	mässig häufig gefunden
Kotkäfer-Art	*Onthophagus*	*coenobita*	2003	2003	**1**		1		Wiese Klopfackerweg	**selten gefunden**
Kotkäfer-Art	*Onthophagus*	*medium = vacca*	2014	2014	**1**			1	Farisberg, untere Weide West	**selten gefunden**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Waldmistkäfer	*Anoplodtrupes = Geotrupes*	*stercorosus*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Alt Berg	häufig gefunden, besonders im Wald
Dungkäfer-Art	*Colobopterus = Aphodius*	*erraticus*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	**selten gefunden**
Dungkäfer-Art	*Teuchestes = Aphodius*	*fossor*	2003	2003	**1**		1		Hauensteinmatt	wenig häufig gefunden
Dungkäfer-Art	*Aphodius*	*foetidus = scybalarius*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West, einer von zwei Funden	**erst 2 Mal gefunden**
Dungkäfer-Art	*Calamosterunus = Aphodius*	*granarius*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang	**selten gefunden**
Dungkäfer-Art	*Esymus = Aphodius*	*pusillus = foetidus*	1993	1993	**1**	1			Weide Haulen	**selten gefunden**
Dungkäfer-Art	*Acrossus = Aphodius*	*luridus*	2014	2014	**1**			1	Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden, in Kuhfladen vermutlich häufig
Junikäfer-Art	*Amphimallon*	*solstitiale*	1993	1993	**1**	1			Weide Hasenweg	wenig häufig gefunden, aber gelegentlich in grosser Anzahl
Dunkelbrauner Junikäfer	*Amphimallon*	*atrum*	1993	2013	**4**	1	1	4		mässig häufig gefunden, oaber dann oft in grosser Zahl
Gartenlaubkäfer	*Phyllopertha*	*horticola*	1993	2013	**7**	4	2	4		häufig gefunden
Purzelkäfer-Art	*Hoplia*	*philanthus*	1993	2015	**6**	1	3	2		mässig häufig gefunden
Silbriger Purzelkäfer	*Hoplia*	*argentea = farinosa*	1993	2013	**9**	1	3	6		häufig gefunden
Grüner Edelscharrkäfer	*Gnorimus*	*nobilis*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	**selten gefunden**
Gebänderter Pinselkäfer	*Trichius*	*fasciatus*	1993	2013	**16**	12	9	5		sehr häufig gefunden
Rosenkäfer-Verwandter	*Tropinota*	*hirta*	2013	2014	**8**			10		mässig häufig gefunden
Rosenkäfer-Verwandter	*Oxythyrea*	*funestra*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Paradies	**selten gefunden**
Gemeiner Rosenkäfer	*Cetonia*	*aurata*	1993	2013	**15**	9	6	8		häufig gefunden
Kleiner Rehschröter	*Platycerus*	*caraboides*	2003	2003	**4**		4			mässig häufig gefunden
Hirschkäfer-Art	*Sinodendron*	*cylindricum*	2003	2003	**1**		1		Fuss der Fluh St. Wolfgang, einer von zwei Funden in der	**selten gefunden**
Bissiger Zangenbock	*Rhagium*	*mordax*	1993	2015	**4**	1	1	2		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Schulterbock	*Oxymyrus = Toxotus*	*cursor*	2013	2003	**1**			1	Schwängimatt, Wiese West	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Variabler Stubbenbock	*Stenocorus*	*meridianus*	2013	2013	**2**			2	Waldrand Oberberg, Haulen, Wiese West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Bunter Kugelhalsbock	*Dinoptera = Acmaeops*	*collaris*	1993	2003	**4**	2	2			mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Blaubock	*Gaurotes*	*virginea*	2003	2003	**2**		2		Schwängimatt, Weide Süd, Schwängimatt, Wiese Nord	mässig häufig gefunden
Rothörniger oder Mattschwarzer Blütenbock	*Grammoptera*	*ruficornis*	1993	1993	**3**	3				mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 40
Feldahornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	*Alosterna*	*tabacicolor*	1993	2013	**4**	3	2	1		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Gefleckter Halsbock, Sechsfstreifiger Halsbock	*Anoplodera = Leptura*	*sexguttata*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Paradies	wenig häufig gefunden
Schwarzspitziger Halsboock	*Stictoleptura = Leptura*	*fulva*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Fleckenhörniger Halsbock	*Stictoleptura = Leptura*	*maculicornis*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	mässig häufig gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Roter Schmalbock, Roter Halsbock	*Stictoleptura = Leptura*	*rubra*	1993	2013	**10**	3	3	5		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 36
Blutroter Halsbock	*Anastrangalia = Leptura*	*sanguinolenta*	1993	2013	**10**	4	5	5		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Schwarzrandiger oder Zweifelhafter Halsbock	*Anastrangalia = Leptura*	*dubia*	1993	2013	**4**	2	2	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Gefleckter Schmalbock	*Rutpela = Strangalia =*	*maculata*	1993	2015	**23**	10	12	24		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger	*Stenurella = Strangalia*	*melanura*	1993	2013	**21**	11	8	11		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14
Zweibindiger Halslbock	*Stenurella = Strangalia*	*bifasciata*	1993	1993	**2**	2			Fuss der Fluh St. Wolfgang, Oberbergweide West	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Breiter Halsbock, Gefleckter Blütenbock	*Pachytodes = Judolia*	*cerambyciformis*	1993	2003	**1**	1	1		Waldrand Alt Berg	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Kleiner Eichenbock, Buchenbock, Kleiner	*Cerambyx*	*scopolii*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Roter Spitzdeckenbock	*Stenopterus*	*rufus*	2003	2013	**8**		8	1		mässiug häufig gefunden
Weisslinierter Kurzdeckenbock, Fichten-Kurzdeckenbock	*Molorchus*	*minor*	1993	1993	**1**	1			Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Veränderlicher Schönbock, Veränderlicher Scheibenbock	*Phymatodes*	*testaceus*	2013	2013	**1**			2	Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Buchen-Widdercock, Echter Widderbock	*Clytus*	*arietis*	2003	2013	**7**		2	9		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 58
Metallglänzender Distelbock	*Agapanthia*	*violacea*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schwarzfüssiger Walzenhalsbock	*Phytoecia*	*affinis = nigri pes*	1993	2003	**2**	2	1		Von Roll Areal, Fuss der Fluh St. Wolfgang	**selten gefunden**
Rohrkäfer-Art	*Plateumaris*	*consimilis*	1993	2001 3	**1**	1		1	Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Kirsch-Blatthähnchen	*Orsodacne*	*cerasi*	1993	2003	**4**	2	2			mässig häufig gefunden
Rothalsiges Getreidehähnchen	*Oulema*	*melanopus*	1993	2013	**4**	1	2	1		sehr häufig gefunden, hier handelt es sich um zwei sehr ähnliche Arten
Lilienhähnchen-Art	*Lilioceris*	*lilii*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	**selten gefunden**
Lilienhähnchen-Art	*Lilioceris*	*merdigera*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Oberberg	wenig häufig gefunden
Gemeiner Langbeinkäfer	*Labidostomis*	*longimana*	1993	1993	**1**	1			Wiese Klopfackerweg	wenig häufig gefunden
Blauer Langbeinkäfer	*Smaragdina*	*salina*	1993	2013	**8**	3	4	5		häufig gefunden
Langbeinkäfer-Art	*Smaragdina*	*affinis*	1993	2013	**2**	1	1	1	Fuss der Holzfluh , Hemmet, Wiese Ost	wenig häufig gefunden
Grosskopfblattkäfer-Art	*Coptocephala*	*rubicunda*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden
Ameisen-Blattkäfer-Art	*Clytra*	*quadripunctata*	2003	2013	**1**		1	1	Hemmet, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Zweipunktiger Fallkäfer	*Cryptocephalus*	*bipunctatus*	2009	2009	**1**		1		Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden
Zweifleckiger Fallkäfer	*Cryptocephalus*	*biguttatus*	1993	1993	**3**	4				mässig häufig gefunden
Goldiger Fallkäfer	*Cryptocephalus*	*aureolus*	1993	2015	**24**	21	21	15		auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben
Seidiger Fallkäfer	*Cryptocephalus*	*sericeus*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Oberberg	**selten gefunden**
Fallkäfer-Art	*Cryptocephalus*	*hypochoeridis*	1993	2013	**1**	8	10	4	Waldrand Alt Berg	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben
Fallkäfer-Art	*Cryptocephalus*	*violaceus*	1993	2015	**17**	16	10	9		auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben
Querbindiger Fallkäfer	*Cryptocephalus*	*morei*	2003	2003	**1**		1		Ruine Neu Falkenstein	wenig häufig gefunden
Fallkäfer-Art	*Cryptocephalus*	*vittatus*	1993	1993	**1**	1			Hauensteinmatt	**selten gefunden**
Tatzenkäfer-Art	*Timarcha*	*tenebricosa*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	**selten gefunden**
Tatzenkäfer, Ledriger Blattkäfer	*Timarcha*	*goettingensis*	1993	1993	**2**	2			Waldrand Alt Berg, Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Bunter oder Prächtiger Blattkäfer	*Chrysolina = Dlochrysa*	*fastuosa*	1993	2013	**1**	3	1	1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	häufig gefunden
Blattkäfer-Art	*Chrysolina = Chrysomela*	*haemoptera*	1993	1993	**1**	1			Rinderweid	wenig häufig gefunden
Johanniskraut-Blattkäfer	*Chrysolina = Chrysomela*	*varians*	1993	2003	**7**	6	2			mässig häufig gefunden, an Johanniskraut
Blattkäfer-Art	*Chrysolina = Chrysomela*	*hyperici*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide Mitte	**selten gefunden**
Blattkäfer-Art	*Oreina = Chrysochloa*	*alpestris variabilis*	2003	2003	**1**		1		Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	**selten gefunden**
Blattkäfer Gattung	*Gonioctena = Phytodecta*	*sp.*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Süd	Gattung wenig häufig gefunden
Kahler Sumpfblattkäfer	*Hydrothassa*	*glabra*	2003	2003	**1**		1		Chalm Oberberg, Wiese Ost	**selten gefunden**
Labkraut-Blattkäfer	*Sermylassa*	*halensis*	1993	1993	**3**	3				mässig häufig gefunden
Schneeballblattkäfer	*Pyrrhalta*	*viburni*	2003	2003	**4**		6			sehr häufig gefunden
Blattkäfer-Art	*Luperus*	*longicornis*	1993	1993	**1**	1			Oberbergweide West	wenig häufig gefunden
Blattkäfer-Art	*Luperus*	*flavipes*	2013	2013	**3**			3		wenig häufig gefunden, weil klein, vermutlich häufig
Rainfarnblattkäfer	*Galeruca*	*tanaceti*	1993	2014	**4**	1		3		wenig häufig gefunden
Erdflohkäfer-Art	*Longitarsus*	*tabidus*	1993	1993	**1**	1			Weide Brachhüsliweg, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden, aber meist übersehen oder nicht inventarisiert
Kohlerdfloh Gattung	*Altica*	*sp.*	1993	2013	**4**	8	2	1		Gattung mässig häufig gefunden, aber meist übersehen oder nicht inventarisiert
Kohlerdfloh-Art	*Altica*	*pusilla*	2003	2003	**1**				Farisberg, Weide Süd	erst 1 Mal gefunden, aber kaum inventarisiert
Erdflohkäfer-Art	*Asiorestia*	*transversa*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, Weide Süd	wenig häufig gefunden
Erdflohkäfer-Art	*Derocrepis*	*rufipes*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Oberberg	**selten gefunden**
Wicken-Samenkäfer	*Bruchus*	*atomarius*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang	selten gefunden, aber vermutlich oft übersehen
Samenkäfer Gattung	*Bruchidius*	*sp.*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	Gattung selten gefunden, weil klein und unscheinbar und vermutlich oft übersehen
Rebenstecher, Rebstichler, Zigarrenwickler	*Byctiscus*	*betulae*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden, gilt nach Einschätzung von Ch. Germann als häufig
Haselblattroller, Haselnuss-Dickkopfroller	*Apoderus*	*coryli*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese West	häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kleiner Blattrüssler	*Phyllobius*	*subdentatus = parvulus*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Brauner Schmalbauch, Länglicher Blattrüssler	*Phyllobius*	*oblongus*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Breiter Birnengrünrüssler, Kupfriger Blattrüssler	*Phyllobius*	*pyri*	2003	2014	**2**		1		Waldrand Paradies, Waldrand Oberberg	häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Weissdorn-Blattrüssler	*Phyllobius*	*betulinus = betulae*	1993	2013	**7**	4	5	2		häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig
Runzelstirn-Dickmaulrüssler	*Otiorhynchus*	*rugifrons*	2003	2003	**1**		1		Fuss der Fluh St. Wolfgang, **einer von 2 Funden in der R.**	**erst 2 Mal gefunden,** gilt nach Literatur als selten, an xerothermen Felsen im Jura
Fichten-Glanzrüssler	*Polydrusus*	*impar*	2003	2003	**1**		1		Hauensteinmatt	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3, gilt nach Literatur als
Grauhaariger Glanzrüssler	*Polydrusus*	*aeratus = atomarius*	1993	2013	**3**	1	1	1		wenig häufig gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 10, gilt nach
Mattgrüner Glanzrüssler	*Polydrusus*	*impressifrons*	2013					1		selten gefunden, gilt nach Literatur als wenig häufig
Gescheckter oder Hirsch-Glanzrüssler	*Polydrusus*	*cervinus*	2013	2013	**1**			2	Waldrand Alt Berg	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum, gilt nach
Seidiger Glanzrüssler	*Polydrusus*	*formosus = sericeus*	2013	2013	**2**			2	Waldrand Oberberg, Hemmet, Wiese Ost	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum, gilt nach Literatur
Kupfriger oder Schimmernder Glanzrüssler	*Polydrusus*	*mollis*	2003	2003	**1**		1		Holzfluh	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum, gilt nach
Gewürfelter Staubrüssler, Würfelfleckrüssler	*Liophloeus*	*tesselatus*	2003	2003	**1**		1		Weide Hasenweg	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen, nach Lit. häufig
Gestreifter Blattrandrüssler	*Sitona*	*lineatus*	2003	2003	**3**		3			wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Kratzdistelrüssler	*Larinus*	*turbinatus*	1993	1993	**1**	1			Weide Brachhüsliweg	mässig häufig gefunden, stellenweise in grosser Zahl auf Disteln, gilt nach Literatur als
Kirschkernstecher	*Anthonomus = Furcipus*	*rectirostris*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden, weil unscheinbar, gilt nach Literatur als häufig
Schlehen-Zweigrüssler	*Magdalis*	*ruficornis*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig
Kapuzinerrüssler	*Lepyrus*	*capucinus*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide Mitte, einer von drei Funden in der	selten gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig
Hornklee-Kokonrüssler	*Hypera*	*plantaginis*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese West	selten gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen, gilt nach
Wollkraut-Gallenrüssler	*Rhinusa = Gymnaetron*	*asellus*	1993	1993	**1**	1			Weide Brachhüsliweg, **einziger Fund in der R.!**	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig
Buchen-Springrüssler, Buchenblattrüssler	*Orchestes = Rhynchaenus*	*fagi*	2008	2015	**10**		1	14		Frassspuren an Rotbuchen sehr häufig in den Fallen der WSL wenig häufig: 13
Kleiner Bunter Eschenbastkäfer	*Leperisinus*	*varius*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Holzfluh	selten gefunden, nicht inventarisiert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Hautflügler			1993							
Gespinstblattwespen-Art	*Pamphilius*	*balteatus*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Oberberg,**einziger Fund**	**erst 1 Mal gefunden**
Gespinstblattwespen-Art	*Pamphilius*	*sylvaticus*	2003	2013	**2**		1	1	Roggen, Weide Ost, Hemmet, Wiese West	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Halmwespen-Art	*Janus*	*compressus*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh, **einer von 2 Funden in der Region**	**erst 2 Mal gefunden**
Halmwespen-Art	*Cephus*	*pygmaeus*	2003	2003	**1**		1		Südliche Bahnböschung	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 49
Halmwespen-Art	*Cephus*	*spinipes = cultratus*	2003	2013	**4**		1	3		Gattung mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6
Bürstenhornblattwespen-Art	*Aprosthema*	*melanurum*	1993	2003	**1**	1	1		Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Bürstenhornblattwespen-Art	*Arge*	*berberidis*	2003	2003	**2**		2		Südliche Bahnböschung, Alter Steinbruch Mümliswiler	mässig häufig gefunden
Bürstenhornblattwespen-Art	*Arge*	*ciliaris*	1993	1993	**1**				Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden
Bürstenhornblattwespen-Art	*Arge*	*pagana*	1993	2003	**4**	3	1			mässig häufig gefunden
Bürstenhornblattwespen-Art	*Arge*	*cyanocrocea*	1993	2013	**3**	2		1		mässig häufig gefunden
Gemeine Rosen-Bürstenhornblattwespe	*Arge*	*ochropus*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Keulenblattwespen-Art	*Corynis*	*crassicornis*	1993	2014	**2**	1	3	2	Fuss der Holzfluh, Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden
Keulenblattwespen-Art	*Abia = Zaraea*	*mutica*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	**selten gefunden**
Blattwespen-Art	*Selandria*	*serva*	1993	2013	**3**	2	1	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 82
Blattwespen-Art	*Dolerus*	*germanicus*	2003	2013	**2**		1	1	Südliche Bahnböschung, Waldrand Paradies	mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Dolerus*	*gonager*	1993	2013	**2**	1		1	Waldrand Oberberg, Chalm Oberberg, Wiese Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Blattwespen-Art	*Dolerus*	*puncticollis*	2003	2003	**1**		1		Farisberg, untere Weide West	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 23
Blattwespen-Art	*Dolerus*	*aeneus*	2003	2003	**2**		2		Hauensteinmatt, Rinderweid	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Blattwespen-Art	*Dolerus*	*nigratus*	2003	2015	**4**		1	4		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6
Blattwespen-Art	*Dolerus*	*picipes*	1993	2013	**2**	2		1	Roggen, Weide Ost, Schwängimatt, Weide West	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Blattwespen-Art	*Athalia*	*circularis*	1993	2013	**4**	1	2	2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14
Blattwespen-Art	*Athalia*	*cordata*	2003	2013	**2**		1	1	Weide Brachhüsliweg, Roggen, Weide Ost	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13
Blattwespen-Art	*Athalia*	*liberta*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Alt Berg	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Blattwespen-Art	*Athalia*	*paradoxa*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang, **einziger Fund in der R.!**	**erst 1 Mal gefunden**
Kohlrübsenblattwespe	*Athalia*	*rosae*	1993	2003	**3**	1	2			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 23
Blattwespen-Art	*Athalia*	*rufoscutellata*	2003	2003	**1**		1		Weide Haulen	wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Empria*	*sexpunctata = klugii*	2003	2003	**1**		1		Weide Seidenbergweg	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Blattwespen-Art	*Empria*	*liturata*	2015	2015	**1**			1	Schwängimatt, Weide Mitte	wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Empria*	*longicornis*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden
Weissgürtelige Rosensägewespe	*Allantus*	*cinctus*	1993	1993	**1**	1			Hauensteinmatt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 51
Blattwespen-Art	*Allantus*	*truncatus*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide West	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Blattwespen-Art	*Allantus*	*didymus*	1993	1993	**1**	1			Oberbergweide West	wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Eutomostethus = Atomostethus*	*ephippium*	2013	2013	**1**			1	Rinderweid	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12
Blattwespen-Art	*Stethomostus*	*fuliginosus*	2013	2013	**1**			1	Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 24
Blattwespen-Art	*Rhadinoceraea*	*micans*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Monophadnus*	*pallescens*	1993	2003	**4**	1	3			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 54
Blattwespen-Art	*Claremontia*	*brevicornis = confusa*	1993	2003	**4**	2	4			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7
Blattwespen-Art	*Claremontia*	*waldheimii*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Blattwespen-Art	*Aglaostigma*	*aucupariae*	2015	2015	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Süd	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 176
Blattwespen-Art	*Aglaostigma*	*fulvipes*	1993	2013	**2**	1		1	Roggen, Weide Ost, Hemmet, Wiese West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 24
Blattwespen-Art	*Tenthredopsis*	*nassata*	1993	2003	**3**	1	2			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 37

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Blattwespen-Art	*Tenthredopsis*	*scutellaris*	2003	2003	**1**		1		Hauensteinmatt, einer von drei Funden in der Region!	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Blattwespen-Art	*Tenthredopsis*	*sordida*	2003	2015	**2**		1	1	Roggen, Weide West, Schwängimatt, Wiese Süd	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 40
Blattwespen-Art	*Tenthredopsis*	*stigma*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Wiese West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11
Blattwespen-Art	*Tenthredopsis*	*ornata = excisa*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Blattwespen-Art	*Sciapteryx*	*consobrina*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	**selten gefunden**
Blattwespen-Art	*Rhogogaster*	*chlorosoma*	2003	2003	**1**		1		Goletenkanal	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*maculata*	2003	2013	**2**		1	1	Schwängimatt, Weide Mitte, Schwängimatt, Wiese Süd	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*temula*	1993	2003	**4**	3	1			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*mesomela*	1993	2003	**2**	1	1		Von Roll Areal, Schwängimatt, Weide West	häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*obsoleta*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide Süd , einer von drei Funden in der	**selten gefunden**
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*solitaria*	1993	2013	**4**	3	3	1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*crassa = albicornis*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Oberberg	**selten gefunden**
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*scrophulariae*	1993	2003	**2**	1	2		Von Roll Areal, Leberen, Chalch- und Wassergraben	wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*amoena*	1993	1993	**2**	2			Von Roll Areal, Waldrand Oberberg	mässig häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*zonula*	1993	2013	**9**	3	5	2		mässig häufig gefunden
Blattwespen-Artkomplex	*Tenthredo*	*marginella*-Komplex	1993	2013	**4**	1	2	2		häufig gefunden, möglicherweise zwei verschiedene Arten
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*vespa*	1993	2013	**8**	7	2	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*arcuata*	1993	2013	**9**	3	8	1		häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*notha*	1993	2013	**7**	3	1	3		häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*brevicornis*	1993	2013	**4**	1	3	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Blattwespen-Art	*Tenthredo*	*bifasciata rossi*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Oberberg	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Blattwespen-Art	*Tenthredo = Elinora =*	*koehleri*	2003	2013	**4**		2	2		wenig häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Pachyprotasis*	*variegata*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide Süd, **einziger Fund in der R.!**	**erst 1 Mal gefunden**
Blattwespen-Art	*Macrophya*	*punctumalbum*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Blattwespen-Art	*Macrophya*	*sanguinolenta = quadrimaculata*	2003	2003	**3**		1			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Blattwespen-Art	*Macrophya*	*annulata = ligata*	1993	2013	**12**	5	7	3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18
Blattwespen-Art	*Macrophya*	*duodecim-punctata*	1993	1993	**1**	1			Feuchtwiese Paradies	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Blattwespen-Art	*Macrophya*	*montana*	1993	2013	**10**	7	6	7		häufig gefunden
Blattwespen-Art	*Macrophya*	*alboannulata*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Blattwespen-Art	*Cladius*	*pectinicornis*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide Mitte	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 54
Blattwespen-Art	*Pristiphora*	*punctifrons*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	**selten gefunden**
Blattwespen-Art	*Pristiphora*	*ruficornis*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Oberberg	**selten gefunden**
Blattwespen-Art	*Pachynematus*	*clitellatus*	1993	1993	**1**	1			Weide Hasenweg	**selten gefunden**
Brackwespe Unterfamilie	*(Alysiinae)*	*non det.*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Süd	**selten gefunden**
Brackwespe Unterfamilie	*(Microgaste-rinae)*	*non det.*	2013	2013	**2**			2	Oberbergweide Mitte, Fuss der Fluh St. Wolfgang	Unterfamilie häufig gefunden
Brackwespe Gattung (Puppenkokon)	*Apanteles*	*sp.* (Puppenkokon)	1993	2015	**9**	1	2	6		Gattung häufig gefunden
Brackwespen-Art	*Chelonus*	*oculator*	2003	2003	**1**		1		Farisberg, Weide Süd	wenig häufig gefunden
Brackwespe Unterfamilie	*(Helconinae)*	*non det.*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese West	Unterfamilie mässig häufig gefunden, bes. an Holzstapeln
Brackwespen-Art	*Helcon*	*angustator*	2013	2013	**2**			3	Waldrand Alt Berg, Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden, bes. an Holzstapeln
Brackwespen-Art (nicht bestimmt)	*Helcon*	*sp. C*	2013	2013	**1**			1	Roggen, Weide Ost, einer von 2 Funden in der Region	**erst 2 Mal gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Virgichneumon*	*albosignatus*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Oberberg	**selten gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Virgichneumon*	*tergenus*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide Mitte	**selten gefunden**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schlupfwespen-Art	*Cratichneumon*	*flavifrons = fabricator*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Alt Berg	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Platylabops*	*apricus*	2003	2003	**1**		1		Fuss der Holzfluh, **einziger Fund in der Region**	**erst 1 Mal gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Ichneumon*	*ligatorius*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Weide Mitte	**selten gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Ichneumon*	*computatorius*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, Weide Süd	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Ichneumon*	*terminatorius*	2013	2015	**2**			2	Schwängimatt, Wiese Süd , Chalm Oberberg, Wiese Ost	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Ichneumon*	*melanotis*	2013	2013	**1**				Waldrand Paradies	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Ichneumon*	*bucculentus*	1998	2014	**3**	1	1	2		häufig gefunden
Schlupfwespe Artenkomplex	*Ichneumon*	*albiger-Komplex*	2003	2003	**6**		7			häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Ichneumon*	*albiger s.str.*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Weide Mitte	häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Ichneumon*	*affector*	2013	2015	**3**			3		wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Patrocloides = Patroclus*	*sputator*	1993	2013	**6**	1	2	3		häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Amblyteles*	*armatorius*	1993	2014	**15**	3	17	5		sehr häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Diphyus*	*quadripunctorius*	2003	2013	**2**		1	1	Oberbergweide West, Feuchtwiese Paradies	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Diphyus*	*castanopyga*	2014	2014	**1**			1	Waldrand Oberberg	**erst 2 Mal gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Eutanyacra*	*glaucatoria*	2015	2015	**1**			1	Waldrand Oberberg	**erst 2 Mal gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Coelichneumon*	*cyaniventris*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Coelichneumon*	*biannulatus*	2003	2003	**1**		1		Ruine Neu Falkenstein	**selten gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Amblyjoppa*	*fuscipennis*	1993	2013	**2**	1		1	Hemmet, Wiese Ost, Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Eurylabus*	*torvus*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide West	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Phaeogenes*	*planifrons*	2014	2014	**1**			1	Farisberg, Weide Süd	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Alomya*	*debellator*	1993	2003	**2**	1	1			wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schlupfwespen-Art	*Alomya*	*punctalata = ripulator*	2003	2003	**1**		1		Hauensteinmatt	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Tribus	*(Phygadeuon-tini)*	*non det.*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese West	Tribus häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	*Polytribax*	*sp.*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide Mitte	Gattung mässig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	*Plectocryptus*	*sp.*	2014	2014	**1**			1	Farisberg, untere Weide West	Gattung wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Aptesis*	*nigrocincta*	2014	2014	**1**			1	Schwängimatt, Weide Mitte	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Aritranis = Pycnocryptus*	*director*	2003	2014	**4**		1	3		wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Idiolispa*	*analis*	2003	2013	**3**		1	1		wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	*Trychosis*	*sp.*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Weide Mitte	Gattung mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Enclisis*	*sp.*	2013	2013	**1**			1	Roggen, Weide Ost	Gattung selten gefunden
Schlupfwespen-Art	*Enclisis*	*vindex*	2013	2013	**1**			2	Roggen, Weide Ost	**selten gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Cryptus*	*minator*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Cryptus*	*spinosus*	2003	2003	**1**		1		Ruine Neu Falkenstein, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Nematopodius*	*formosus*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Alt Berg	**selten gefunden**
Schlupfwespe Gattung	*Ophion*	*sp.*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese West	Gattung mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Ophion*	*ventricosus*	2003	2013	**2**		1	1	Leberen, Chalch- und Wasser- graben, Hemmet,	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Eremotylus*	*marginatus*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Oberberg	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Hellwigia*	*obscura*	2003	2003	**1**		1		Von Roll Areal	**selten gefunden**
Sichelwespen-Art	*Therion*	*circumflexum*	1993	2014	**20**	10	17	3		sehr häufig gefunden
Sichelwespen-Art	*Heteropelma*	*megarthrum*	2013	2013	**2**			2	Oberbergweide West, Hemmet, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Sichelwespen-Art	*Erigorgus*	*cerinops*	1993	2003	**4**	2	3			häufig gefunden
Sichelwespen-Art	*Trichomma*	*fulvidens*	2013	2013	**1**			1	Weide Hasenweg, **einer von 2 Funden in der Region**	**erst 2 Mal gefunden**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schlupfwespen-Art	*Campoletis*	*varians*	2013	2013	**2**			2	Hemmet, Wiese Ost, Oberbergweide Mitte	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Campoletis*	*"zonata"*	2003	2003	**1**		1		Weide Seidenbergweg	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Rhimphoctona*	*megacephalus*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Alt Berg	**selten gefunden**
Schlupfwespe Gattung	*Cymodusa*	*sp.*	2003	2014	**4**		1	3		Gattung wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Apophua*	*genalis*	2003	2013	**1**		1	1	Chalm Oberberg, Wiese Ost	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Lissonota*	*fundator*	2003	2003	**2**		2		Roggen, Weide West, Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Lissonota*	*coracina = bellator*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese West	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Alloplasta*	*piceator*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Stilbops*	*ruficornis*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide West	mässig häufig gefunden
Schwarze Schlupfwespe	*Pimpla*	*rufipes*	2003	2013	**3**		2	1		häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Itoplectis*	*maculator*	2013	2013	**2**			2		wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Theronia*	*atalantae*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	**selten gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Dolichomitus*	*imperator*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese West	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Scambus = Ateleophadnus*	*cincticarpus*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	**selten gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Xorides*	*praecatorius*	2013	2013	**1**			2	Waldrand Alt Berg	mässig häufig gefunden, parasitiert Totholz bewohnende Käfer
Schlupfwespen-Art	*Colpotrochia*	*cincta*	2003	2009	**5**		5			häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Scolobates*	*auriculatus*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese West	**selten gefunden**
Schlupfwespen-Art	*Lagarotis*	*debitor*	2014	2014	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Nord	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Lagarotis*	*semicaligata*	2013	2013	**1**			1	Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	*Alexeter*	*sp.*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	Gattung wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	*Hadrodactylus*	*sp.*	2003	2003	**4**		3			Gattung mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schlupfwespe Gattung	*Euryproctus*	*sp.*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	Gattung wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Netelia*	*testacea*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Cosmoconus*	*nigriventris*	2014	2014	**1**			1	Schwängimatt, Weide Mitte	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Tryphon*	*signator*	2003	2013	**1**		1	1	Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Tryphon*	*rutilator*	2013	2013	**2**			2	Hemmet, Wiese Ost, Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	*Tryphon*	*trochanteratus*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese West	mässig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	*Megastylus*	*sp.*	2013	2013	**1**			1	Roggen, Weide Ost, einziger Fund in der Region	Gattung erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	*Stephanus*	*serrator*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese West	**selten gefunden**
Schmalbauchwespen-Art	*Gasteruption*	*assectator*	1993	2013	**3**	1	1	2		mässig häufig gefunden
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	*Diplolepis*	*rosae (Galle)*	1993	2013	**16**	14	12	11		sehr häufig gefunden
Ahorn-Gallwespe	*Pediaspis*	*aceris*	2003	2013	**5**		3	5		Gallen überall häufig, wo Bergahorn wächst
Goldwespen-Art	*Holopyga*	*generosa*	1993	2003	**2**	1	1		Roggen, Weide West, Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Goldwespen-Art	*Hedychrum*	*gerstäckeri*	1993	1993	**1**	1			Weide Brachhüsliweg	wenig häufig gefunden
Goldwespen-Art	*Chrysis*	*dichroa*	2003	2003	**1**		1		Fuss der Fluh St. Wolfgang, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Schnbeckenhaus-Goldwespe	*Chrysis*	*trimaculata*	2003	2014	**1**		1	1	Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden
Goldwespen-Art	*Chrysis*	*cyanea*	2013	2013	**2**			2	Roggen, Weide Ost, Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 16, an Totholz
Feuergoldwespe, Gemeine Goldwespe	*Chrysis*	*ignita*	2013	2014	**2**			2	Waldrand Alt Berg, Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 16, an Totholz
Feuergoldwespen-Art	*Chrysis*	*ignita forma angustula gracilis*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese West	**selten gefunden**
Feuergoldwespen-Art	*Chrysis*	*ignita f. ruddii*	2003	2003	**1**		1		Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Dolchwespen-Verwandte	*Sapygina*	*decemguttata*	1993	1993	**1**	1			Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Gemeine Keulenwespe	*Sapyga*	*clavicornis*	2013	2003	**1**			1	Haulen, Wiese West	mässig häufig gefunden, an Totholz , den Fallen der WSL nur 2 Individuen

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gemeine Rollwespe	*Tiphia*	*femorata*	2013	2013	**3**			3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Knotenameisen-Art	*Manica*	*rubida*	1993	2013	**2**	1		1	Schwängimatt, Weide Süd, Waldrand Alt Berg	mässig häufig, auf Sandböden lokal sehr häufig
Knotenameisen-Art	*Myrmica*	*rubra*	1993	2003	**9**	21	6			häufig gefundenin, den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 243 Individuen
Knotenameisen-Art	*Myrmica*	*ruginodis*	1993	2008	**7**	4	6			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 1799 Individuen
Knotenameisen-Art	*Myrmica*	*sabuleti*	1993	2003	**8**	5	4			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 1091 Individuen
Trockenrasen-Knotenameise	*Myrmica*	*scabrinodis*	2003	2003	**5**		5			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 3906 Individuen
Gemeine Rasenameise	*Tetramorium*	*caespitum*	1993	1993	**4**	4				häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3 Individuen
Drüsenameise Artengruppe	*Tapinoma*	*erraticum cf. ambiguum*	1993	2014	**14**	14	12	1		häufig gefunden
Gemeine Rossameise	*Camponotus*	*ligniperda*	1989	2003	**8**	9	3			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6
Schwarzgraue Wegameise	*Lasius*	*niger*	1993	2015	**16**	18	9	4		sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 1248 Individuen
Fremde Wegameise	*Lasius*	*alienius*	1993	2003	**5**	4	1			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 192 Individuen
Mauer-Wegameise	*Lasius*	*emarginatus*	1993	2003	**3**	2	5			mässig häufig gefunden
Gelbe Wegameise	*Lasius*	*flavus*	1993	2014	**15**	15	11	2		sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 495 Individuen
Glänzendschwarze Holzameise	*Lasius*	*fuliginosus*	2003	2003	**1**		1		Goletenkanal	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 54 Individuen
Grauschwarze Sklavenameise	*Formica*	*fusca*	1993	2015	**12**	9	11	2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 236
Sklavenameisen-Art	*Formica*	*lemani*	1993	2003	**2**	1	3		Von Roll Areal, Schwängimatt, Weide West	wenig häufig gefunden, nur in hohen Lagen des Juras
Gewöhnliche Sklavenameise	*Formica*	*cunicularia*	1993	2014	**22**	31	21	9		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 271
Zweifarbige Sklavenameise	*Formica*	*rufibarbis*	1993	2014	**16**	10	14	6		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 89
Berg-Waldameise	*Formica*	*lugubris*	1993	2013	**4**	1	6	2		häufig gefunden
Wiesen-Waldameise	*Formica*	*pratensis*	1993	2015	**21**	35	40	16		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Rote Waldameise	*Formica*	*rufa*	1989	2014	**11**	14	11	3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 3037 Individuen

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kahlrückige Waldameise	*Formica*	*polyctena*	1993	2013	**8**	10	13	6		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Blutrote Raubameise	*Formica*	*sanguinea*	1993	2014	**9**	12	12	7		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuumk
Pillenwespen-Art	*Eumenes*	*coronatus*	1993	2003	**3**	2	2			mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Pillenwespen-Art	*Eumenes*	*subpomiformis*	1993	2013	**2**	1	3	2	Fuss der Holzfluh, Ruine Neu Falkenstein	wenig häufig gefunden
Gemeine Schornsteinwespe	*Odynerus*	*spinipes*	2003	2013	**2**		1	1		wenig häufig gefunden
Lehmwespen-Art	*Allodynerus*	*rossi*	2003	2003	**1**		1		Südliche Bahnböschung	wenig häufig gefunden
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	*Ancistrocerus*	*nigricornis*	1993	2014	**5**	3	1	2		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	*Ancistrocerus*	*oviventris*	1998	2003	**2**	1	1		Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	*Ancistrocerus*	*trifasciatus*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	*Ancistrocerus*	*gazella*	1993	2003	**4**	2	2			mässig häufig gefunden
Lehmwespen-Art	*Symmorphus*	*bifasciatus*	1993	1003	**1**	1			Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden
Lehmwespen-Art	*Symmorphus*	*gracilis*	1993	2013	**4**	2	1	1		mässig häufig gefunden
Französische Feldwespe	*Polistes*	*dominulus*	1993	2013	**23**	27	32	7		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern
Feldwespen-Art	*Polistes*	*nimpha*	1993	1003	**1**	1			Schwängimatt, Weide Süd	wenig häufig gefunden
Feldwespen-Art	*Polistes*	*biglumis*	2003	2003	**2**		5		Fuss der Holzfluh , Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden
Hornisse	*Vespa*	*crabro*	2003	2015	**14**		13	5		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Waldwespe	*Dolichovespula*	*sylvestris*	1993	2015	**14**	3	12	3		häufig gefunden
Sächsische Wespe	*Dolichovespula*	*saxonica*	2003	2014	**8**		10	2		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11
Rote Wespe	*Vespula*	*rufa*	1993	2003	**8**	4	6			häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 35
Österreichische Kuckuckswespe	*Vespula*	*austriaca*	1993	2003	**3**	1	2			wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Deutsche Wespe	*Vespula*	*germanica*	1993	2013	**12**	3		6		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 83

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gemeine Wespe	*Vespula*	*vulgaris*	1993	2015	**26**	5	18	20		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 359
Wegwespen-Art	*Priocnemis*	*coriacea*	1993	1993	**1**	1			Chalm Oberberg, Wiese Ost	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Wegwespen-Art	*Priocnemis*	*perturbator*	1993	1993	**2**	2			Feuchtwiese Paradies, Roggen, Weide Ost	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 63
Wegwespen-Art	*Priocnemis*	*gracilis*	2003	2003	**1**		2		Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden
Wegwespen-Art	*Priocnemis*	*parvula*	2003	2003	**3**		3			mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Wegwespen-Art	*Caliadurgus*	*fasciatellus*	1993	2003	**1**	1			Oberbergweide Mitte	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Tönnchen-Wegwespe	*Auplopus*	*carbonarius*	1993	2003	**2**	1	1		Fuss der Holzfluh, Ruine Neu Falkenstein	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 19
Wegwespen-Art	*Aporus*	*unicolor*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21
Wegwespen-Art	*Arachnospila*	*anceps*	1993	2003	**2**	1	1		Oberbergweide Mitte, Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Wegwespen-Art	*Arachnospila*	*trivialis*	2013	2013	**1**				Hemmet, Wiese West	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Wegwespen-Art	*Arachnospila*	*hedickei = pseudabnormis*	2003	2003	**1**		1		Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	erst 2 Mal gefunden, aber nicht sicher bestimmt
Wegwespen-Art	*Arachnospila*	*spissa*	1993	2013	**6**	3	3	3		mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 70
Wegwespen-Art	*Arachnospila*	*minutula*	1993	1993	**2**	2			Oberbergweide Mitte, Weide Seidenbergweg	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Wegwespen-Art	*Anoplius*	*nigerrimus*	1998	2003	**5**	1	4			mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Mexikanischer Heuschreckenjäger	*Isodontia*	*mexicana*	2013	2013	**1**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	wenig häufig gefunden, erst seit wenigen Jahren in die Schweiz nördlich der Alpen
Bienenwolf (Grabwespe)	*Philanthus*	*triangulum*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Bienenjagende Knotenwespe	*Cerceris*	*rybiensis*	2003	2013	**4**		3	2		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Knotenwepsen-Art	*Cerceris*	*hortivaga*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang, einer von drei Funden in der	**selten gefunden**
Grabwespen-Art	*Gorytes*	*laticinctus*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden
Grabwespen-Art	*Gorytes (s.s.)*	*quinquecinctus*	2003	2003	**2**		2		Wiese Klopfackerweg, Südliche Bahnböschung	mässig häufig gefunden
Grabwespen-Art	*Argogorytes*	*mystaceus*	2013	2013	**1**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kotwespen-Art (Grabwespe)	*Mellinus*	*arvensis*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Heuschreckenwespen-Art	*Tachysphex*	*pompiliformis*	1993	2003	**3**	1	2			mässig häufig gefunden
Holzbohrwespen-Art oder Töpfergrabwespe	*Trypoxylon*	*figulus*	1993	2013	**2**	2		2	Roggen, Weide Ost, Fuss der Fluh St. Wolfgang	mässig häufig gefunden
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	*Trypoxylon*	*minus*	2003	2003	**2**		2		Waldrand Alt Berg, Rinderweid	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36, nistet an Totholz
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	*Trypoxylon*	*attenuatum*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	*Trypoxylon*	*clavicerum*	2013	2013	**1**			2	Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13, nistet an Totholz
Grabwespen-Art	*Psen (Mimumesa)*	*dahlbomi*	1993	2003	**2**	1	2		Rinderweid, Oberbergweide West	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Grabwespen-Art	*Psenulus*	*fuscipennis*	2013	2013	**1**			1	Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Grabwespen-Art	*Psenulus*	*pallipes*	2013	2013	**1**			1	Roggen, Weide Ost	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Grabwespen-Art	*Pemphredon*	*lugubris*	2003	2013	**1**		1	1	Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18
Grabwespen-Art	*Pemphredon*	*lugens*	2013	2013	**1**			1	Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Grabwespen-Art	*Pemphredon*	*rugifera*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Grabwespen-Art	*Pemphredon*	*inornata*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Oberberg	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6
Grabwespen-Art	*Pemphredon*	*lethifera*	1993	2013	**2**	1		1	Weide Brachhüsliweg, Fuss der Fluh St. Wolfgang	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Grabwespen-Art	*Passaloecus*	*corniger*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 20
Grabwespen-Art	*Ectemnius (Metacrabro)*	*cephalotes*	2003	2003	**1**		1		Wiese Klopfackerweg	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Grabwespen-Art	*Ectemnius (Metacrabro)*	*lituratus*	1993	2003	**6**	5	2			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11
Grabwespen-Art	*Ectemnius (Clytochrysus)*	*ruficornis = nigrifrons*	2013	2013	**1**			1	Hauensteinmatt	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Grabwespen-Art	*Ectemnius (Clytochrysus)*	*lapidarius*	2003	2003	**2**		3		Alter Steinbruch Mümliswiler Klus, Farisberg, untere	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Grabwespen-Art	*Ectemnius (Hypocrabro)*	*continuus*	1993	2003	**6**	4	3			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Grabwespen-Art	*Ectemnius (s.str.)*	*dives*	1993	2003	**5**	2	5			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Grabwespen-Art	*Ectemnius* (s.str.)	*borealis = nigrinus*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Nord	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Silbermundwespen-Art (Grabwespe)	*Lestica*	*clypeata*	2003	2015	**2**		1	2	Farisberg, untere Weide West, Waldrand Oberberg	mässig häufig gefunden
Grabwespen-Art	*Crossocerus (Coelocrabro)*	*annulipes = ambiguus*	1993	1993	**1**	1			Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mäsig häufig: 27
Grabwespen-Art	*Crossocerus (Coelocrabro)*	*barbipes*	2013	2013	**2**			2	Oberbergweide Mitte, Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Fliegenspiesswespen-Art (Grabwespe)	*Oxybelus*	*bipunctatus*	2003	2003	**1**		1		Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	mässig häufig gefunden
Geringelte oder Rundfleck-Maskenbiene	*Hylaeus*	*dilatatus = annularis*	1993	2003	**1**	1	1		Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden
Rainfarn-Maskenbiene	*Hylaeus*	*nigritus*	1993	2013	**7**	6	1	1		mässig häufig gefunden
Tiroler Maskenbiene	*Hylaeus*	*tyrolensis*	1993	1993	**1**	1			Hemmet, Wiese Ost, **einer von zwei Funden in der Reg.**	**erst 2 Mal gefunden**
Gewöhnliche Maskenbiene	*Hylaeus*	*communis*	1993	2013	**9**	1	8	2		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 26
Mauer-Maskenbiene	*Hylaeus*	*hyalinatus*	2003	2013	**1**		1	1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Grobpunktierte Maskenbiene	*Hylaeus*	*punctatus*	2003	2003	**1**		1		Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Reseden-Maskenbiene	*Hylaeus*	*signatus*	2003	2003	**1**		2		Von Roll Areal	mässig häufig gefunden, fliegen an Gelber Resede, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur
Verkannnte Maskenbiene	*Hylaeus*	*confusus*	1993	2013	**4**	2	3	2		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 16
Gredlers Maskenbiene	*Hylaeus*	*gredleri*	2003	2013	**2**		4	1	Fuss der Fluh St. Wolfgang, Alter Steinbruch Mümliswiler	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Steirische Maskenbiene	*Hylaeus*	*styriacus*	2013	2013	**1**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Frühlings-Seidenbiene	*Colletes*	*cunicularius*	2014	2014	**1**			1	Weide Hasenweg	bisher wenig häufig gefunden, aber in Ausbreitung begriffen
Rotbeinige Furchenbiene	*Halictus*	*rubicundus*	1993	2013	**9**	4	2	3		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Gelbbindige Furchenbiene	*Halictus*	*scabiosae*	2003	2013	**9**		5	11		die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig
Gewöhnliche Furchenbiene	*Halictus*	*simplex*	1993	2143	**21**	23	25	31		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 17
Langobarden-Furchenbiene	*Halictus*	*langobardicus*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden, war bis vor wenigen Jahren noch selten
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	*Halictus*	*tumulorum*	1993	2014	**23**	24	25	16		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 29

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Weissbinden-Schmalbiene	*Lasioglossum*	*leucozonium*	2003	2015	**15**		7	11		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Bezahnte Schmalbiene	*Lasioglossum*	*laevigatum*	2003	2013	**1**		1	1	Farisberg, untere Weide West	**selten gefunden**, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Breitbindige Schmalbiene	*Lasioglossum*	*zonulum*	1993	2013	**4**	2	2	1		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Breitbauch-Schmalbiene	*Lasioglossum*	*lativentre*	1993	2013	**3**	3		1		mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Gewöhnliche Schmalbiene	*Lasioglossum*	*calceatum*	1993	2015	**32**	30	16	37		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 50
Weissbeinige Schmalbienene	*Lasioglossum*	*albipes*	1993	2013	**13**	5	11	4		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Feldweg-Schmalbiene	*Lasioglossum*	*malachurum*	1993	2013	**5**	1	2	3		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 76
Breitkopf-Schmalbiene	*Lasioglossum*	*laticeps*	1993	2014	**18**	20	6	11		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 616
Acker-Schmalbiene	*Lasioglossum*	*pauxillum*	1993	2013	**18**	17	6	4		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 49
Braunfühler-Schmalbiene	*Lasioglossum*	*fulvicorne*	1993	2014	**16**	12	3	4		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 45
Dickkopf-Schmalbiene	*Lasioglossum*	*glabriusculum*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Paradies	häufig gefunden
Runzelwangige Schmalbiene	*Lasioglossum*	*puncticolle*	2003	2014	**3**		1	3		mässig häufig gefunden
Zottige Schmalbiene	*Lasioglossum*	*villosulum*	1993	2014	**19**	12	16	15		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Rotfuss-Schmalbiene	*Lasioglossum*	*rufitarse*	1993	1993	**1**	1			Rinderweid	wenig häufig gefunden
Mittlere Schmalbiene	*Lasioglossum*	*intermedium*	2013	2013	**1**			1	Weide Hasenweg, **einer von 2 Fundorten in der Region**	**erst 5 Mal an 2 Orten gefunden gefunden**
Grünglanz-Schmalbiene	*Lasioglossum*	*nitidulum*	1993	2003	**2**	1	1		Von Roll Areal, Ruine Neu Falkenstein	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Dunkelgrüne Schmalbiene	*Lasioglossum*	*morio*	1993	2013	**19**	19	14	7		sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 93
Riesen-Blutbiene	*Sphecodes*	*albilabris*	2014	2014	**1**			1	Weide Hasenweg	wenig häufig gefunden, aber in letzter Zeit häuiger geworden
Schencks Blutbiene	*Sphecodes*	*schenckii*	2013	2013	**3**			4		wenig häufig gefunden, aber in letzter Zeit häufiger geworden
Buckel-Blutbiene	*Sphecodes*	*gibbus*	2003	2013	**6**		4	2		mässig häufig gefunden
Gewöhnliche Blutbiene	*Sphecodes*	*ephippius*	1993	2013	**7**	7	4	2		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Rostfarbene Blutbiene	*Sphecodes*	*ferruginatus*	1993	2013	**9**	7	6	2		häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Durchscheinende Blutbiene	*Sphecodes*	*hyalinatus*	1993	2003	**1**	2	1		Fuss der Fluh St. Wolfgang	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Schwarze Blutbiene	*Sphecodes*	*niger*	1993	1993	**2**	2			Weide Brachhüsliweg, Oberbergweide Mitte	mässig häufig gefunden
Dichtpunktierte Blutbiene	*Sphecodes*	*crassus*	1993	2013	**4**	3	1	1		mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Braune Schuppensandbiene	*Andrena*	*curvungula*	1993	2013	**4**	1	4	1		wenig häufig gefunden
Fingerkraut-Zwergsandbiene	*Andrena*	*falsifica*	2015	2015	**2**			2	Schwängimatt, Wiese West, Schwängimatt, Weide Mitte	wenig häufig gefunden
Leisten-Zwergsandbiene	*Andrena*	*strohmella*	1993	2013	**6**	3	2	1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Glanzlose Zergsandbiene	*Andrena*	*subopaca*	1993	2015	**10**	8	4	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 24
Gewöhnliche Zergsandbiene	*Andrena*	*minutula*	1993	2014	**7**	2	3	3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13
Glanzrücken Zergsandbiene	*Andrena*	*minutuloides*	2003	2003	**2**		2		Hemmet, Wiese Ost, Haulen, Wiese West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Blaue Ehrenpreis-Sandbiene	*Andrena*	*viridescens*	1993	2003	**7**	4	3			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Grauschwarze Düstersandbiene	*Andrena*	*cineraria*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Rotschopfige Sandbiene	*Andrena*	*haemorrhoa*	1993	2014	**7**	3	3	3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 234
Fuchsrote Locknsandbiene	*Andrena*	*fulva*	2013	2013	**1**			1	Chalm Oberberg, Wiese Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13
Pippau-Sandbiene	*Andrena*	*fulvago*	1993	2015	**3**	1	1	2		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Gewöhnliche Dörnchensandbiene	*Andrena*	*humilis*	1993	2014	**10**	2	4	5		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14
Zweifarbige Sandbiene	*Andrena*	*bicolor*	1993	2013	**9**	1	8	2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21
Östliche Zangensandbiene	*Andrena*	*fulvata*	1993	2013	**9**	5	1	2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 242
Rote Ehrenpreis-Sandbiene	*Andrena*	*labiata*	1993	1993	**1**	1			Weide Brachhüsliweg	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Glänzende Düstersandbiene	*Andrena*	*nitida*	1993	2014	**15**	9	4	4		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 129
Schlehen-Lockensandbiene	*Andrena*	*helvola*	2003	2014	**2**		1	1	Schwängimatt, Weide Süd , Hauensteinmatt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 427

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gesellige Sandbiene	*Andrena*	*carantonica = jacobi*	1993	2003	**4**	1	3			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11
Weisse Bindensandbiene	*Andrena*	*gravida*	1993	2014	**11**	4		4		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 35
Gewöhnliche Bindensanbiene	*Andrena*	*flavipes*	1993	2013	**3**	4		1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9
Weissdorn-Sandbiene	*Andrena*	*bucephala*	2003	2003	**4**		4			mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 17
Dichtpunktierte Körbchensandbiene	*Andrena*	*combinata*	1993	2003	**2**	1	1		Von Roll Areal, Fuss der Fluh St. Wolfgang	**selten gefunden**
Sandbienen-Art	*Andrena*	*dorsata*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden
Grobpunktiere Kleesandbiene	*Andrena*	*wilkella*	1993	2013	**3**	1	1			mässig häufig gefunden, an Schmetterlingsblüten, in den Fallen der WSL
Ovale Klee-Sandbiene	*Andrena*	*ovatula*	2003	2013	**3**		2	2		mässig häufig gefunden
Frühe Doldensandbiene, Giersch-Sandbiene	*Andrena*	*proxima*	1993	2013	**6**	2	4	2		mässig häufig gefunden
Witwenblumen-Sandbiene	*Andrena*	*hattorfiana*	1993	2013	**2**	1		1	Hemmet, Wiese Ost, Waldrand Paradies	wenig häufig gefunden, an Wittwenblumen
Gelbbeinige Kieselsandbiene	*Andrena*	*chrysosceles*	1993	2014	**13**	10	7	2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Zweizellige Sandbiene	*Andrena*	*lagopus*	1993	1993	**1**	1			Rinderweid	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Glockenblumen-Sägehornbiene	*Melitta*	*haemorrhoidalis*	1993	2013	**5**	2	3	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Auen-Schenkelbiene	*Macropis*	*europaea*	2013	2013	**1**			2	Fuss der Fluh St. Wolfgang	mässig häufig gefunden, in letzter Zeit seltener geworden
Wald-Schenkelbiene	*Macropis*	*fulvipes*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	mässig häufig gefunden, in letzter Zeit häufiger geworden
Grosse Harzbiene, Bastardbiene	*Anthidium = Trachusa*	*byssinum*	1993	2013	**9**	4	7	2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Garten-Wollbiene	*Anthidium*	*manicatum*	1989	2013	**7**	4	3	4		häufig gefunden
Felsspalten-Wollbiene	*Anthidium*	*oblongatum*	1993	2003	**5**	5	3			mässig häufig gefunden
Zwergharzbiene	*Anthidiellum = Anthidium*	*strigatum*	2003	2013	**3**		2	2		mässig häufig gefunden
Stengel-Düsterbiene	*Stelis*	*ornatula*	1993	1993	**2**	2			Roggen, Weide Ost, Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Gewöhnliche Löcherbiene	*Heriades*	*truncorum*	2003	2013	**3**		2	1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 15

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Hahnenfuss-Scherenbiene	*Chelostoma*	*florisomne*	2009	2014	**4**		1	5		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 28
Glockenblumen-Scherenbiene	*Chelostoma*	*rapunculi = fuliginosum*	1993	2013	**5**	1	3	2		häufig gefunden
Langfransige Scherenbiene	*Chelostoma*	*distinctum*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Rote Mauerbiene	*Osmia*	*bicornis = rufa*	1993	2013	**9**	8	2	2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen
Gehörnte Mauerbiene	*Osmia*	*cornuta*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	**selten gefunden**, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Schimmernde Mauerbiene	*Osmia*	*submicans*	2003	2013	**1**		2	1	Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden
Waldrand-Mauerbiene	*Osmia*	*parietina*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Rinden-Mauerbiene	*Osmia*	*uncinata*	1993	2003	**2**	1	1		Roggen, Weide Ost, Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden, fast mässig häufig, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2
Hufeisenklee-Mauerbiene	*Osmia*	*xanthomelana*	2003	2015	**5**		2	3		knapp mässig häufig gefunden
Lungenkraut-Mauerbiene	*Osmia*	*pilicornis*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	**selten gefunden**
Zweifarbige Schneckenhausbiene	*Osmia*	*bicolor*	1993	2014	**12**	8	8	12		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Goldene Schneckenhausbiene	*Osmia*	*aurulenta*	1993	2014	**14**	9	12	6		häufig gefunden
Rotborstige Schneckenhausbiene	*Osmia*	*rufohirta*	1993	2013	**4**	2	2	4		mässig häufig gefunden
Zweihöckerige Mauerbiene	*Osmia*	*leaiana*	1993	2003	**2**	1	1		Weide Brachhüsliweg, Haulen, Wiese West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Schöterich-Mauerbiene	*Osmia*	*brevicornis*	1993	1993	**1**	1			1 F 1 E Weide Seidenbergweg, einer von	**erst 2 Mal gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) 2 Individuen
Einhöckerige Mauerbiene	*Osmia*	*niveata = fulviventris*	1993	2013	**3**	1	1	1		**selten gefunden**
Rote Schneckenhausbiene	*Osmia*	*andrenoides*	2009	2009	**1**		1		Fuss der Holzfluh , **einer von 2 Funden in der Region**	**erst 2 Mal gefunden**
Gelbspornige Stängelbiene	*Hoplitis = Osmia*	*claviventris*	1993	2013	**3**	2	1	1		mässig häufig gefunden
Französische Felsenbiene	*Hoplitis = Osmia*	*ravouxi*	1993	2013	**5**	4	1	2		wenig häufig gefunden
Platterbsen-Mörtelbiene	*Megachile*	*ericetorum*	1993	2013	**6**	1	2	4		mässig häufig gefunden
Garten-Blattschneiderbiene	*Megachile*	*willoughbiella*	1993	2013	**8**	4	3	3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Bunte Blattschneiderbiene	*Megachile*	*versicolor*	2003	2003	**2**		2		Weide Hasenweg, Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden
Langschwanz-Kegelbiene	*Coelioxys*	*elongata*	2003	2003	**2**		2		Hemmet, Wiese Ost, Oberbergweide Mitte	**selten gefunden**, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Vierfleck-Pelzbien	*Anthophora*	*quadrimaculata*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden
Frühlings-Pelzbiene	*Anthophora*	*plumipes*	2003	2014	**6**		4	2		häufig gefunden
Wald-Pelzbiene	*Anthophora*	*furcata*	2003	2003	**1**		2		Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden
Gesbänderte Pelzbiene	*Anthophora*	*aestivalis*	2003	2013	**3**		2	1		wenig häufig gefunden
Gewöhnliche Trauerbiene	*Melecta*	*albifrons = punctata*	1993	1993	**1**	1			Weide Brachhüsliweg	wenig häufig gefunden, "Kuckuck" der Frühlings-Pelzbiene
Juni-Langhornbiene	*Eucera*	*longicornis*	1993	2003	**3**	2				häufig gefunden
Mai-Langhornbiene	*Eucera*	*nigrescens = tuberculata*	1993	2013	**14**	2	7	7		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Blauschwarze Holzbiene	*Xylocopa*	*violacea*	1993	2013	**3**	2		1		mässig häufig gefunden
Gewöhnliche Keulenhornbiene	*Ceratina*	*cyanea*	1993	2009	**7**	6	3			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Feld-Wespenbiene	*Nomada*	*goodeniana = succincta*	1993	2015	**11**	9	2	4		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Wiesen-Wespenbiene	*Nomada*	*marshamella*	1993	2013	**12**	8	4	1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Gelbe Wespenbiene	*Nomada*	*flava*	1993	2013	**7**	4	6	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14
Panzers Wespenbiene	*Nomada*	*panzeri*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Paradies	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 20
Rauhfüssige Wespenbiene	*Nomada*	*hirtipes*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Rotfühler- oder Gespaltene Wespenbiene	*Nomada*	*ruficornis = bifida*	1993	2015	**4**	1		3		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Indiciduum
Rotbäuchige Wespenbiene	*Nomada*	*bifasciata lepeletieri*	1993	1993	**1**	1			Weide Haulen	mässig häufig gefunden
Gelbfleckige Wespenbiene	*Nomada*	*flavoguttata*	1993	2014	**10**	5	3	4		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9
Ehrenpreis-Wespenbiene	*Nomada*	*atroscutellaris*	1993	2014	**4**	3		1		mässig häufig gefunden
Rotschwarze Wespenbiene	*Nomada*	*fabriciana*	1993	2015	**11**	7		5		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Dunkle Erdhummel	*Bombus*	*terrestris*	1993	2015	**35**	35	20	36		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 71
Helle Erdhummel	*Bombus*	*lucorum*	1989	2014	**31**	25	40	18		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 262
Bergwaldhummel	*Bombus*	*wurfleini*	1993	2015	**17**	17	14	13		häufig gefunden
Baumhummel	*Bombus*	*hypnorum*	2003	2015	**13**		6	12		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11
Wiesenhummel	*Bombus*	*pratorum*	1993	2015	**27**	12	31	14		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 30
Glockenblumenhummel oder Distelhummel	*Bombus*	*soroeensis*	1989	2013	**12**	5		13		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Steinhummel	*Bombus*	*lapidarius*	1989	2015	**34**	46	28	60		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9
Sandhummel	*Bombus*	*veteranus*	1993	1993	**2**	2			Fuss der Fluh St. Wolfgang, Wiese Klopfackerweg	**selten gefunden**
Waldhummel oder Bunte Hummel	*Bombus*	*sylvarum*	2003	2013	**3**		1	2		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Ackerhummel	*Bombus*	*pascuorum*	1989	2015	**41**	89	103	87		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 96
Veränderliche Hummel	*Bombus*	*humilis*	1993	2015	**26**	23	22	41		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Gartenhummel	*Bombus*	*hortorum*	1993	2014	**31**	19	22	39		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	*Bombus* = *Psithyrus*	*barbutellus*	1993	2014	**15**	3	13	13		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	*Bombus* = *Psithyrus*	*bohemicus*	1993	2015	**21**	6	23	9		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	*Bombus* = *Psithyrus*	*campestris*	1993	2013	**12**	7	6	9		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Rotschwarze oder Felsen-Kuckuckshummel	*Bombus* = *Psithyrus*	*rupestris*	1993	2015	**12**		12	13		häufig gefunden
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	*Bombus* = *Psithyrus*	*sylvestris*	1993	2015	**25**	7	35	11		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 19
Honigbiene	*Apis*	*mellifera*	1993	2015	**40**	111	94	68		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 489
Köcherfliegen			1993							
Köcherfliegen-Art	*Odontocerum*	*albicorne*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	mässig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 60 Quadrate
Köcherfliegen-Art	*Oecismus*	*monedula*	1993		**1**	1			einziger, aber unsicher bestimmter Fund in der Reg.!	erst 1 Mal gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 0 Quadrate

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schmetterlinge			1989							
Urmotten-Art	*Micropteryx*	*aruncella*	1993	1993	**2**	2			Roggen, Weide Ost, Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Urmotten-Art	*Micropteryx*	*rothenbachi*	2008	2008	**1**		1		Leberen, Chalch- und Wassergraben	wenig häufig gefunden
Urmotten-Art	*Micropteryx*	*calthella*	2003	2003	**2**		2		Roggen, Weide West, Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Ampfer-Wurzelbohrer, Salat-Wurzelbohrer	*Triodia*	*sylvina*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese Ost	am Tag mässig häufig gefunden, vor allem im Siedlungsraum, R.Bas.: 21, 53
Langfühlermotten-Art	*Nematopogon*	*adansoniella*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Oberberg	mässig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	*Nematopogon*	*swammerdamella*	1993	2013	**3**	2		1		mässig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	*Nematopogon*	*robertella*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Süd	**selten gefunden**
Langfühlermotten-Art	*Nemophora*	*metallica*	1993	2013	**18**	16	10	16		sehr häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	*Nemophora*	*minimella*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	**selten gefunden**
Grüne Langfühlermotte	*Adela*	*reaumurella*	1993	2015	**3**	1		2		mässig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	*Cauchas*	*violella*	1993	1993	**1**	3			Von Roll Areal	mässig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	*Cauchas*	*violella*	1993	1993	**3**					mässig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	*Cauchas*	*fibulella*	2003	2013	**2**		1	1	Rinderweid, Schwängimatt, Weide Mitte	wenig häufig gefunden
Langfühlermotten-Art	*Cauchas*	*rufimitrella*	1993	2015	**7**	4	1	4		häufig gefunden
Sackträger-Art	*Psyche*	*casta*	1993	1993	**3**	3				Säcke sehr häufig, männliche Falter aber selten gefunden, R.Bas.: 25, 95
Weichgras-Sackträger-Art	*Epichnopteryx*	*plumella*	1993	2003	**3**	3	2			mässig häufig gefunden, R.Bas.: 7, 6
Weichgras-Sackträger-Art	*Epichnopteryx*	*sieboldi*	1993	2014	**6**	6	1	2		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 12, 46
Motten-Art	*Tinagma*	*perdicellla*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal, einer von 3 Funden in der Region!	**selten gefunden**
Miniermotten-, Blattütenmotte Gattung	*Phyllonorycter*	*sp.*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Oberberg	Gattung selten gefunden, weil klein
Silbermotten-Art	*Argyresthia*	*spinosella*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kleinschmetterlings-Art	*Ypsolopha*	*nemorella*	2003	2003	**1**		1		Alter Steinbruch Mümliswiler Klus, **einziger Fund in der R.!**	**erst 1 Mal gefunden**
Motten-Art	*Ypsolopha*	*parenthesella*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Kohlmotte, Schleiermotte	*Plutella*	*xylostella*	2003	2003	**3**		3			häufig gefunden
Rundstirnmotten-, Wippmotten-Art	*Glyphipterix*	*thrassonella*	1993	1993	**1**	1			Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Sackträgermotte Gattung	*Coleophora*	*sp.*	1993							Gattung häufig gefunden
Sackträgermotten-Art	*Coleophora*	*deauratella*	2003	2003	**1**		1		Oberberg Wiese Nordost	selten gefunden, nicht sicher bestimmt
Sackträgermotten-Art	*Coleophora*	*auricella*	1993	1993	**2**	2			Farisberg, Weide Süd, Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden
Sackträgermotten-Art	*Coleophora*	*ornatipenella*	1993	2014	**6**	5	1	2		häufig gefunden
Grasminiermotten-Art	*Elachista*	*argentella*	2003	2013	**2**		1	1	Oberbergweide Mitte, Schwängimatt, Wiese Süd	mässig häufig gefunden
Grasminiermotten-Art	*Elachista*	*lastrella*	1993	2003	**3**	1	2			wenig häufig gefunden
Grasminiermotten-Art	*Depressaria*	*douglasella*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Oberberg	wenig häufig gefunden
Grasminiermotten-Art	*Diurnea*	*lipsiella = phryganella*	2003	2013	**2**		1	2	Schwängimatt, Wiese Nord, Feuchtwiese Paradies	mässig häufig gefunden, fliegt nur im Spätherbst
Ziermotten-Art	*Scythris*	*picaepennis*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	**selten gefunden**
Ziermotten-Art	*Scythris*	*laminella*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide W. , **einer von 2 Funden in der R!**	**erst 2 Mal gefunden**
Kleinschmetterlings-Art	*Pancalia*	*leuwenhoekella*	1998	2003	**2**	1	2		Fuss der Holzfluh, Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden, weil klein
Palpenmotten-Art	*Bryotropha*	*terrella*	1993	2013	**7**	5	1	2		mässig häufig gefunden
Palpenmotten-Art	*Teleiodes*	*sequax*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide W. , **einer von 2 Funden in der R!**	**erst 2 Mal gefunden**
Palpenmotten-Art	*Teleiopsis*	*albifemorella*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Holzfluh, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Palpenmotten-Art	*Syncopagma*	*cinctella*	1993	2003	**2**	1	1		Von Roll Areal, Oberbergweide Mitte	**selten gefunden**
Palpenmotten-Art	*Dichomeris*	*derasella = fasciella*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Paradies	wenig häufig gefunden
Tannen-Glasflügler	*Synanthedon*	*cephiformis*	2008	2008	**1**		1		Leberen, Chalch- und Wassergraben	**erst 1 Falter gefangen, R.Bas.: 0, 0**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schlupfwespen-Glasflügler	*Bembecia*	*ichneumoni-formis*	2003	2015	**4**		2	2		mässig häufig gefunden, R.Bas.: 10, 5
Sonnenröschen-Glasflügler	*Synansphecia*	*affinis*	1993	2009	**1**	1	1		Fuss der Holzfluh	**3 Falter an 2 Orten gefangen, R.Bas.: 1, 1**
Beilfleck-Widderchen, Tragant-Widderchen	*Zygaena*	*loti*	1993	1993	**3**	3				mässig häufig gefunden, R.Bas.: 24, 162
Hufeisenklee- Widderchen	*Zygaena*	*transalpina*	1980	2011	**3**	2	1			mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 104
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	*Zygaena*	*filipendulae*	1990	2013	**23**	21	10	19		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142
Grosses Fünffleck-Widderchen	*Zygaena*	*lonicerae*	1986	2004	**5**	8	4			mässig häufig gefunden, R.Bas.: 8, 66
Ampfer-Grünwidderchen	*Adscita*	*statices*	1993	2013	**9**	5	8	2		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 23, 255
Kleinschmetterlings-Art	*Anthophila*	*fabriciana*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Isotrias*	*stramentana*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Holzfluh, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Wickler-Art	*Aethes*	*tesserana*	2003	2003	**2**		3		Feuchtwiese Paradies, Waldrand Oberberg	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Cochylis*	*dubitana*	2015	2015	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Nord	wenig häufig gefunden
Wickler-Art	*Acleris*	*aspersana*	2003	2013	**2**		1	2	Schwängimatt, Weide West, Schwängimatt, Wiese Nord	wenig häufig gefunden
Wickler-Art	*Eana*	*argentana*	1993	2013	**4**	4	2	2		wenig häufig gefunden, in den Alpen häufig
Wickler-Art	*Cnephasia*	*incertana*	1993	1998	**3**	3				mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Cnephasia*	*stephensiana*	1993	1993	**1**	1			Oberbergweide West	**selten gefunden**
Wickler-Art	*Aphelia*	*viburnana*	1993	2003	**3**	3	1			mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Clepsis*	*senecionana*	1993	2015	**5**	4	2	5		mässig häufig gefunden
Wickler Gattung	*Bactra*	*sp.*	1993	1993	**1**	1			Roggen, Weide West	Gattung mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Endothenia*	*marginana*	1993	2003	**3**	2	1			mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Selenodes*	*karelica*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide West	wenig häufig gefunden
Wickler-Art	*Celypha*	*rufana*	2003	2003	**1**		1		Von Roll Areal	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Wickler-Art	*Celypha*	*striana*	1993	2015	**12**	8	4	1		häufig gefunden
Wickler-Art	*Celypha*	*lacunana*	1993	2013	**17**	11	16	4		sehr häufig gefunden
Wickler-Art	*Phiaris = Olethreutes*	*olivana*	1993	1993	**2**	3			Roggen, Weide West, Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Lobesia*	*reliquana*	2003	2003	**1**		1		Hemmet, Wiese Ost, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Wickler-Art	*Rhopobota = Griselda*	*stagnana*	1993	2003	**1**	2	1		Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Epinotia*	*pygmaeana*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide Süd , einziger unsicherer Fund	erst 1 Mal gefunden, nicht sicher bestimmt
Wickler-Art	*Eucosma*	*aemulana*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Süd, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Wickler-Art	*Epiblema*	*sticticana*	1993	2008	**4**	3	2			mässig häufig gefunden, Raupen an Huflattich
Wickler-Art	*Epiblema*	*cirsiana*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Weide Mitte, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Brombeertriebwickler	*Notocelia = Epiblema*	*uddmanniana*	2013	2013	**1**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	**selten gefunden**
Wickler-Art	*Ancylis*	*comptana*	1993	2003	**4**	4	2			mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Cydia*	*compositella*	2003	2003	**2**		2		Hemmet, Wiese Ost, Haulen, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Lathronympha*	*strigana*	1993	2013	**9**	6	5	2		mässig häufig gefunden
Wickler-Art	*Pammene*	*germmana*	2013	2013	**1**				Fuss der Holzfluh , **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Wickler-Art	*Dichrorampha*	*plumbana*	1993	2003	**4**	3	2			wenig häufig gefunden
Wickler-Art	*Dichrorampha*	*aeratana*	1993	2013	**10**	4	7	2		häufig gefunden
Wickler-Art	*Dichrorampha*	*consortana*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide Mitte, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Wickler-Art	*Dichrorampha*	*gueneeana*	1993	1993	**1**	1			Hauensteinmatt	selten gefunden, unsicher bestimmt
Wickler-Art	*Dichrorampha*	*flavidorsana*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	erst 2 Mal gefunden, aber nicht sicher bestimmt
Wickler-Art	*Dichrorampha*	*petiverella*	1993	1993	**1**	1			Weide Brachhüsliweg	mässig häufig gefunden
Federgeistchen-Art	*Oxyptilus*	*pilosellae*	1993	2013	**3**	4	2	2		mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Federgeistchen-Art	*Oxyptilus*	*parvidactyla*	2003	2003	**2**		2		Oberbergweide West, Oberbergweide Mitte	**selten gefunden**
Federgeistchen-Art	*Platyptilia*	*gonodactyla*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	mässig häufig gefunden, an Huflattich
Federgeistchen-Art	*Stenoptilia*	*pterodactyla*	1993	2003	**8**	9	4			mässig häufig gefunden
Skabiosen-Federgeistchen	*Stenoptilia*	*bipunctidactyla*	1993	2015	**6**	1		9		häufig gefunden
Federgeistchen-Art	*Stenoptilia*	*annadactyla*	1993	1993	**1**	2			Schwängimatt, Weide West, **einziger Fundort in der Reg.!**	**selten gefunden**
Federgeistchen-Art	*Stenoptilia*	*coprodactyla*	1993	2013	**1**	1	2	2	Von Roll Areal	mässig häufig gefunden
Federgeistchen-Art	*Stenoptilia*	*stigmatodactyla*	2013	2013	**1**				Fuss der Holzfluh, **einer von 2 Funden in der Region**	**erst 2 Mal gefunden**
Federgeistchen-Art	*Marasmarcha*	*lunaedactyla*	2003	2013	**1**		1	1	Oberbergweide Mitte	mässig häufig gefunden
Schlehengeistchen, Winden-Federgeistchen	*Pterophorus*	*pentadactyla*	1993	1993	**1**	1			Goletenkanal	mässig häufig gefunden
Federgeistchen-Art	*Merrifieldia*	*leucodactyla*	1993	2013	**1**	1	1	1	Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden
Federgeistchen-Art	*Merrifieldia*	*baliodactyla*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide Süd	wenig häufig gefunden
Federgeistchen-Art	*Emmelina*	*monodactyla*	1993	2003	**2**	1	1		Haulen, Wiese Ost, Fuss der Fluh St. Wolfgang	mässig häufig gefunden
Zünsler-Art	*Synaphe*	*punctalis*	1993	2013	**14**	10	3	6		häufig gefunden
Fruchtzünsler-Art	*Oncocera*	*semirubella*	1993	2015	**11**	6	12	6		sehr häufig gefunden
Fruchtzünsler-Art	*Pempelia*	*palumbella*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Holzfluh, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Rispengraszünsler	*Chrysoteuchia*	*culmella*	1993	2015	**25**	20	18	19		sehr häufig gefunden
Graszünsler-Art	*Crambus*	*pascuellus*	1993	1993	**3**	3				mässig häufig gefunden
Graszünsler-Art	*Crambus*	*pratellus*	1993	2013	**3**	3	1	2		mässig häufig gefunden
Graszünsler-Art	*Crambus*	*lathoniellus*	1993	2013	**19**	18	15	15		sehr häufig gefunden
Weisser Graszünsler	*Crambus*	*perlellus*	1993	2015	**16**	19	12	7		sehr häufig gefunden
Graszünsler-Art	*Agriphila*	*tristella*	1993	2013	**27**	26	30	24		sehr häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Graszünsler-Art	*Agriphila*	*inquinatella*	1993	2013	**21**	15	10	13		sehr häufig gefunden
Graszünsler-Art	*Agriphila*	*selasella*	1993	2003	**1**	2	1		Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Graszünsler-Art	*Agriphila*	*straminella*	1993	2015	**35**	28	33	14		sehr häufig gefunden
Graszünsler-Art	*Catoptria*	*pinella*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide West	**selten gefunden**
Graszünsler-Art	*Catoptria*	*falsella*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden
Graszünsler-Art	*Thisanotia*	*chrysonuchella*	1993	2013	**8**	8	6	6		häufig gefunden
Zünsler-Art	*Scoparia*	*basistrigalis*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Alt Berg, einer von drei Fundorten in der Region!	**selten gefunden**
Zünsler-Art	*Scoparia*	*ambigualis*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Zünsler-Art	*Scoparia*	*pyralella*	1993	2003	**6**	5	1			mässig häufig gefunden
Zünsler-Art	*Evergestis*	*pallidata*	1993	1993	**1**	1			Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Zünsler-Art	*Hellula*	*undalis*	2003	2003	**1**		1		Haulen, Wiese Ost, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Goldzünsler	*Pyrausta*	*aurata*	1993	2013	**8**	5	7	2		häufig gefunden
Purpurroter Zünsler	*Pyrausta*	*purpuralis*	1993	2015	**20**	20	24	27		sehr häufig gefunden
Olivbrauner Zünsler	*Pyrausta*	*despicata*	1993	2014	**27**	19	61	25		sehr häufig gefunden
Zünsler-Art	*Pyrausta*	*nigrata*	1993	2003	**6**	4	5			mässig häufig gefunden
Zünsler-Art	*Sitochroa*	*palealis*	1993	2003	**3**	1	2			mässig häufig gefunden
Zünsler-Art	*Microstega*	*pandalis*	1993	2014	**23**	9	24	23		sehr häufig gefunden
Zünsler-Art	*Microstega*	*hyalinata*	1993	2003	**5**	4	1			häufig gefunden
Brennesselzünsler	*Eurrhypara*	*hortulata*	2013	2013	**1**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	mässig häufig gefunden
Zünsler-Art	*Anania*	*verbascalis*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide Mitte	mässig häufig gefunden
Zünsler-Art	*Udea*	*lutealis*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide Süd	**selten gefunden**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Zünsler-Art	*Udea*	*nebulalis*	1993	2013	**3**	1	1	1		**selten gefunden**
Zünsler-Art	*Udea*	*ferrugalis*	1993	1993	**3**	3				mässig häufig gefunden, besonders im Herbst
Zünsler-Art	*Mecyna*	*lutealis*	1993	2003	**1**	3	2		Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Wanderzünsler	*Nomophila*	*noctuella*	1993	2003	**25**	1	40			Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden
Gewöhnlicher Ringelspinner	*Malacosoma*	*neustria*	2015	2015	**1**			2	Schwängimatt, Weide Mitte	**Raupen selten gefunden, R.Bas.: 2, 1**
Eichenspinner, Quittenvogel	*Lasiocampa*	*quercus*	2003	2003	**1**		2		Roggen, Weide West	erst 1 Raupe gefunden und mehrere, unsichere Falter-Nachweise, R.Bas.: 7, 25
Kleespinner	*Lasiocampa*	*trifolii*	2003	2003	**1**		2		Farisberg, untere Weide West	**Raupen selten gefunden, R.Bas.: 1,1**
Brombeerspinner	*Macrothylacia*	*rubi*	1987	1987	**1**	1			Oberbergmatten	erst 2 Falter und mehrere Raupen gefunden, R.Bas.: 7, 31
Skabiosenschwärmer	*Hemaris*	*tityus*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese West	**am Tag 20 Falter gesehen, R.Bas.: 1, 1**
Hummelschwärmer	*Hemaris*	*fuciformis*	1987	2013	**3**	3		1		am Tag 20 Falter gesehen, R.Bas.: 14, 20
Taubenschwänzchen	*Macroglossum*	*stellatarum*	1993	2015	**27**	4	58	22		Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114
Nagelfleck	*Aglia*	*tau*	1993	2015	**16**	7	5	8		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 17, 49
Gelbwürfliger Dickkopffalter	*Cartero-cephalus*	*palaemon*	1987	2013	**12**	6	4	6		häufig gefunden, R.Bas.: 32, 183
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	*Thymelicus*	*sylvestris*	1989	2015	**25**	20	15	24		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243
Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter	*Thymelicus*	*acteon*	1987	1993	**6**	6				mässig häufig gefunden, in den letzten Jahren kaum mehr, R.Bas.: 14, 51
Weissfleckiger Kommafalter	*Hesperia*	*comma*	1989	2014	**11**	10	4	8		häufig gefunden, R.Bas.: 26, 370
Mattfleckiger Kommafalter	*Ochlodes*	*venata*	1989	2015	**22**	19	10	22		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516
Dunkler Dickkopffalter	*Erynnis*	*tages*	1989	2015	**12**	16	6	8		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631
Malven-Dickkopffalter, Eibischfalter	*Carcharodus*	*alceae*	2003	2013	**5**		4	2		mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 19
Roter Würfelfalter	*Spialia*	*sertorius*	1989	2014	**18**	15	20	17		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438
Kleiner Nördlicher Würfelfalter	*Pyrgus*	*malvae*	1987	2015	**12**	11	6	5		häufig gefunden, R.Bas.: 30, 338

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Zweibrütiger Würfelfalter	*Pyrgus*	*armoricanus*	2003	2014	**7**		1	9		häufig gefunden, R.Bas.: 12, 104
Schwalbenschwanz	*Papilio*	*machaon*	1993	2015	**26**	20	28	11		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340
Segelfalter	*Iphiclides*	*podalirius*	1986	2013	**5**	8	2	1		**selten gefunden, R.Bas.: 15, 50**
Tintenfleckweissling-Komplex	*Leptidea*	*sinapis*-Komplex	1993	2015	**27**	29	25	53		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53
Grosser Kohlweissling	*Pieris*	*brassicae*	1993	2015	**22**	22	19	3		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482
Kleiner Kohlweissling	*Pieris*	*rapae*	1989	2013	**32**	32	47	17		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043
Karstweissling	*Pieris*	*mannii*	2013	2014	**7**			7		im August 2008 erstmals nachgewiesen, zur Zeit häufig, R.Bas.: 0, 0
Grünaderweissling, Rapsweissling	*Pieris*	*napi*	1993	2015	**30**	43	32	34		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549
Bergweissling	*Pieris*	*bryoniae*	2013	2013	**3**			3	unsicher bestimmt, weil nur Männchen beobachtet	**selten und nur in hohen Lagen gefunden, R.Bas.: 1, 1**
Aurorafalter	*Anthocaris*	*cardamines*	1989	2015	**34**	29	37	29		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757
Postillon, Wandergelbling, Achter	*Colias*	*crocea*	2003	2014	**20**		22	16		Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	*Colias*	*hyale Komplex*	1989	2013	**21**	10	16	10		sehr häufig gefunden
Goldene Acht, Gemeiner Heufalter	*Colias*	*hyale*	2003	2013	**5**		3	2		mässig häufig gefunden, R.Bas.: 22, 82
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	*Colias*	*alfacariensis*	1993	2014	**10**	12	8	13		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628
Zitronenfalter	*Gonepteryx*	*rhamni*	1989	2015	**35**	30	45	51		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845
Grosser Schillerfalter	*Apatura*	*iris*	1982	2004	**5**	5	3			**selten gefunden, R.Bas.: 18, 44**
Kleiner Schillerfalter	*Apatura*	*ilia*	2011	2011	**1**		1		Wald Haulenrain West, **1 von Hans Wittmer gefunden**	**selber noch nie gefunden, R.Bas.: 3, 9**
Kleiner Eisvogel	*Limenitis*	*camilla*	1989	2013	**12**	2	8	3		häufig gefunden, R.Bas.: 31, 124
Grosser Eisvogel	*Limenitis*	*populi*	2013	2013	**1**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus, Nachweis unsicher	**in der Region selber noch nie sicher nachgewiesen, R.Bas.: 3, 3**
Grosser Fuchs	*Nymphalis*	*polychloros*	1986	2015	**6**	6	1	1		mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 33
Trauermantel	*Nymphalis*	*antiopa*	1987	2004	**5**	4	1		**3 Falter von Hans Wittmer gesehen**	**selten gefunden, zuletzt 1994, R.Bas.: 21, 44**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Tagpfauenauge	*Inachis io*	1993	2014	**23**	12	17	12		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734
Admiral	*Vanessa atalanta*	1993	2014	**16**	1	12	8		Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224
Distelfalter	*Vanessa = Cynthia cardui*	2003	2015	**28**		46	6		sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483
Kleiner Fuchs	*Aglais urticae*	1993	2015	**37**	18	56	35		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238
C-Falter	*Polygonia c-album*	1989	2015	**14**	7	5	9		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185
Landkärtchen	*Araschnia levana*	1993	2013	**14**	9	9	5		häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261
Kaisermantel	*Argynnis paphia*	1993	2013	**17**	13	9	9		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531
Grosser Perlmutterfalter	*Argynnis = Mesoacidalia aglaja*	1986	2004	**12**	9	7			häufig gefunden, R.Bas.: 23, 153
Märzveilchenfalter	*Argynnis = Fabriciana adippe*	2013	2014	**2**			2	Chalm Oberberg, Wiese Ost, Farisberg, untere Weide	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 7, 13
Stiefmütterchen-Perlmutterfalter	*Argynnis = Fabriciana niobe*	1986	1993	**2**	2			Oberbergweide West, Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 18
Kleiner Perlmutterfalter	*Issoria lathonia*	1993	2003	**4**	1	4			mässig häufig gefunden, R.Bas.: 30, 89
Brombeer-Perlmutterfalter	*Brenthis daphne*	2013	2013	**2**			1	Oberbergweide West, Hemmet, Wiese West	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 41
Veilchen-Perlmutterfalter	*Boloria = Clossiana euphrosyne*	1989	2015	**14**	2	13	4		häufig gefunden, R.Bas.: 21, 143
Hainveilchen-Perlmutterfalter	*Boloria = Clossiana dia*	1993	2015	**11**	2	7	18		häufig gefunden, R.Bas.: 22, 977
Wegerich-Scheckenfalter	*Melitaea cinxia*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide Mitte	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 64
Wachtelweizen-Scheckenfalter	*Melitaea = Mellicta athalia*	1986	2014	**10**	11		3		häufig gefunden, R.Bas.: 35, 337
Westlicher Scheckenfalter Mähwiesen-Scheckenfalter	*Melitaea = Mellicta parthenoides*	1990	2015	**5**	8	4	7		häufig gefunden, R.Bas.: 25, 510
Skabiosen-Scheckenfalter	*Euphydrias = Eurodryas aurinia aurinia*	1986	1993	**3**	6				früher mässig häufig gefunden, **neuerdings selten, R.Bas.: 13, 154**
Schachbrettfalter	*Melanargia galathea*	1993	2015	**23**	23	21	33		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065
Kleiner Waldportier	*Hipparchia genava*	1977	2011	**6**	19	9		**die meisten von H. Wittmer, 1 von T. Schwaller gesehen**	**mehrere Falter an 4 Orten gesehen, R.Bas.: 6, 29**
Weisser Waldportier	*Brintesia circe*	2003	2015	**11**		2			häufig gefunden, aber erst (wieder) seit diesem Jahrhundert, R.Bas.: 22, 341

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Milchfleck, Wald-Mohrenfalter	*Erebia*	*ligea*	1993	2013	**11**	4	10	5		häufig gefunden, R.Bas.: 25, 195
Waldteufel	*Erebia*	*aethiops*	1981	2013	**21**	17	14	16		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 502
Rundaugen-Mohrenfalter	*Erebia*	*medusa*	1986	1993	**3**	3				mässig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 177
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	*Maniola*	*jurtina*	1989	2015	**39**	55	69	54		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476
Brauner Waldvogel	*Aphantopus*	*hyperantus*	1993	2015	**24**	15	12	15		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287
Kleines Wiesenvögelchen	*Coenonympha*	*pamphilus*	1993	2015	**34**	28	91	61		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818
Waldbrettspiel, Laubfalter	*Pararge*	*aegeria*	1993	2014	**17**	5	26	7		im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688
Mauerfuchs	*Lasiommata*	*megera*	1982	2014	**36**	16	70	30		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139
Braunauge	*Lasiommata*	*maera*	1983	2013	**9**	8	5	2		häufig gefunden, R.Bas.: 26, 175
Gelbringfalter, Bacchantin	*Lopinga*	*achine*	1986	1988	**1**	2			Wald Haulen	wenige Falter an 4 benachbarten Orten gesehen, R.Bas.: 3, 8
Frühlings-Scheckenfalter, Perlbinde	*Hamearis*	*lucina*	1987	2013	**2**	2		1	Oberbergweide West, Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 107
Brombeer-Zipfelfalter	*Callophrys*	*rubi*	1993	1003	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 16, 97
Nierenfleck, Birken-Zipfelfalter	*Thecla*	*betulae*	1987	1998	**2**	2			Wald Haulen, Fuss der Holzfluh	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 23, 68
Ulmen-Zipfelfalter	*Satyrium*	*w-album*	1983	2008	**4**	2	3			mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 42
Kreuzdorn-Zipfelfalter, Schlehen-Zipfelfalter	*Satyrium*	*spini*	1983	2013	**7**	10	4	1		Gattung mässig häufig gefunden, R.Bas.: 16, 52
Brauner Eichen-Zipfelfalter	*Satyrium*	*ilicis*	1983	1987	**1**	2			Holzfluh, **2 Falter von Hans Wittmer gesehen**	**noch nie selber gefunden, R.Bas.: 4, 10**
Kleiner Feuerfalter	*Lycaena*	*phlaeas*	1987	2013	**3**	1		2		häufig gefunden, R.Bas.: 23, 88
Brauner Feuerfalter	*Lycaena*	*tityrus*	1987	2014	**30**	15	41	20		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627
Kleiner Ampferfeuerfalter	*Lycaena*	*hippothoe*	1993	1993	**2**	2			Oberbergweide West, Waldrand Oberberg	**selten gefunden, R.Bas.: 13, 45**
Geschwänzter Blasenstrauch-Bläuling	*Lampides*	*boeticus*	2003	2003	**1**		1		Holzfluh	**selten gefunden, R.Bas.: 1, 0**
Zwerg-Bläuling	*Cupido*	*minimus*	1986	2015	**12**	7	14	12		häufig gefunden, R.Bas.: 26, 332

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kurzschwänziger Bläuling	*Cupido*	*argiades*	2012	2013	**2**			3	Fuss der Holzffluh, Schwängimatt, Wiese Nord	häufig gefunden, erst vor wenigen Jahren wieder in der Schweiz nördlich der Alpen,
Südlicher Kurzschwänziger Bläuling	*Cupido*	*alcetas*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	**selten gefunden, erst seit kurzem in der Schweiz nördlich der Alpen**
Faulbaum-Bläuling	*Celastrina*	*argiolus*	1987	2013	**10**	7	2	4		häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82
Schwarzfleckiger Ameisen-Bläuling	*Maculinea*	*arion*	1993	2013	**2**	1	1	1	Fuss der Holzfluh, Oberbergweide West	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 16, 72
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	*Aricia*	*agestis*	1987	2014	**5**	1	9	4		häufig gefunden, R.Bas.: 27, 250
Violetter Wald-Bläuling	*Polyommatus = Cyaniris*	*semiargus*	1986	2014	**31**	45	28	25		sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904
Wundklee-Bläuling, Steinklee-Bläuling	*Polyommatus = Plebicula*	*dorylas*	1986	2013	**7**	10	2	4		mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 202
Esparsetten-Bläuling	*Polyommatus = Plebicula*	*thersites*	1993	2013	**2**	1		1	Wiese Klopfackerweg, Hemmet, Wiese Ost	häufig gefunden, R.Bas.: 16, 102
Silbergrüner Bläuling	*Polyommatus = Lysandra*	*coridon*	1978	2014	**32**	40	45	17		sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416
Himmelblauer Bläuling	*Polyommatus = Lysandra*	*bellargus*	1981	2014	**27**	22	29			sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142
Hauhechel-Bläuling	*Polyommatus*	*icarus*	1990	2014	**39**	39	89	57		sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315
Buchen-Sichelflügler	*Watsonalla = Drepana*	*cultraria*	2003	2014	**3**		1			am Tag wenig häufig gesehen, R.Bas.: 19, 92
Klee-Gitterspanner	*Chiasmia = Semiothisa*	*clathrata*	1993	2015	**28**	16	18	21		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122
Pantherspanner	*Pseudo-panthera*	*macularia*	1993	2003	**8**	2	8			am Tag sehr häufig gefunden gefunden, R.Bas.: 10, 95
Zackenbindiger Rindenspanner	*Ectropis*	*crepuscularia = bistortata*	1993	2003	**2**	1	1		Weide Hasenweg, Waldrand Oberberg	am Tag erst 8 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 18, 59
Heidespanner	*Ematurga*	*atomaria*	1993	2015	**14**	6	6	21		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206
Braunstirn-Weisspanner	*Cabera*	*exanthemata*	2003	2003	**1**		2		Weide Haulen	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 23
Zweifleck-Weissspanner	*Lomographa*	*bimaculata*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Oberberg	am Tag nur selten gefunden, R.Bas.: 14, 34
Trockenrasen--Steinspanner	*Charissa = Gnophos*	*obscurata*	1993	2003	**1**	1	1		Farisberg, untere Weide West	am Tag erst 6 Falter gefunden, R.Bas.: 6, 22
Lichtgrauer Bergwald-Steinspanner	*Elophos = Gnophos*	*dilucidaria*	2013	2013	**1**			1	Rinderweid	**am Tag erst 1 Männchen gefangen, R.Bas.: 3, 6**
Einstreifiger Trockenranspanner	*Aspitates = Aspilates*	*gilvaria*	1993	2003	**2**	1	2		Fuss der Holzfluh, Hauensteinmatt	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 144

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Marmorierter Kleinspanner	*Scopula*	*immorata*	1993	2014	**16**	11	13	9		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118
Schmuck- Kleinspanner	*Scopula*	*ornata*	1993	2014	**12**	7	13	9		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 111
Schneeweisser Kleinspanner	*Scopula*	*subpunctaria*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 10, 33
Rostgelber Magerrasen-Zwergspanner	*Idaea*	*serpentata*	1993	2015	**2**	2		2	Chalm Oberberg, Wiese Ost , Waldrand Oberberg	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 4, 35
Breitgesäumter Zwergspanner	*Idaea*	*biselata*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 16, 25
Einfarbiger Zwergspanner	*Idaea*	*dilutaria*	1993	2013	**2**	1	1	1	Fuss der Holzfluh , Holzfluh	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 3, 24
Braunrandiger Zwergspanner	*Idaea*	*humiliata*	1993	2015	**11**	10	2	5		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 338
Rotbuchen-Gürtelpuppenspanner	*Cyclophora*	*linearia*	2015	2015	**1**			1	Chalm Oberberg, Wiese West	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 20. 62
Ampferspanner	*Timandra = Calothysanis*	*comae = griseata*	2003	2013	**2**		1	1	euchtwiese Paradies, Fuss der Fluh St. Wolfgang	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 7
Rotgestreifter Wanderspanner	*Rhodometra*	*sacraria*	1993	2003	**2**	1	1		Hemmet, Wiese Ost, Farisberg, Weide Süd	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 10
Rotbandspanner	*Rhodostrophia*	*vibicaria*	1993	2013	**4**	3	1	2		am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 9, 36
Spanner-Art	*Scotopteryx*	*bipunctaria*	1993	2015	**13**	15	4	13		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 433
Spanner-Art	*Scotopteryx*	*chaenopodiata*	1993	2013	**18**	22	4	9		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 155
Spanner-Art	*Xanthorhoe*	*spadicearia*	1993	2015	**9**	4	8	3		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 57
Spanner-Art	*Xanthorhoe*	*montanata*	1993	2013	**2**	1		1	Von Roll Areal, Rinderweid	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 13, 83
Spanner-Art	*Epirrhoe*	*tristata*	1993	2014	**5**	1	3	1		häufig gefunden, R.Bas.: 14, 122
Spanner-Art	*Epirrhoe*	*alternata*	1993	2013	**14**	5	12	3		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69
Löwenzahnspanner	*Camptogramma*	*bilineata*	1993	2015	**25**	39	14	14		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270
Spanner-Art	*Rheumaptera*	*cervinalis*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese Ost	**am Tag erst 1 Falter gefangen, R.Bas.: 5, 13**
Spanner-Art	*Epirrita*	*christyi*	2003	2003	**2**		2		Schwängimatt, Weide West, Schwängimatt, Wiese Nord	am Tag nur wenige Falter, 2 in Falle und 2 am Licht, R.Bas.: 9, 26
Spanner-Art	*Perizoma*	*albulata*	2003	2013	**7**		8	7		am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 9, 121

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Grauspanner	*Aplocera*	*plagiata*	2003	2013	**2**		1	1	sberg, untere Weide West, Oberbergweide Mitte	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 45
Mohren- oder Schwarzspanner	*Odezia*	*atrata*	1993	2003	**8**	7	2			am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 11, 27
Spanner-Art	*Asthena*	*albulata*	2003	2003	**1**		1		Weide Haulen	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 14, 21
Mausspanner	*Minoa*	*murinata*	1993	2013	**7**	10	2	1		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 41
Schwammspinner	*Lymantria*	*dispar*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Holzfluh	**am Tag 8 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 4, 1**
Laubholz-Flechtenbär	*Eilema*	*lurideola*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang	am Tag 26 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 18, 140
Frühlings-Flechtenbär	*Eilema*	*sororcula*	2003	2003	**2**		2		Fuss der Holzfluh, Waldrand Alt Berg	am Tag 24 Falter und mehrere Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 17, 179
Rostbär, Zimtbär	*Phragmatobia*	*fuliginosa*	2003	2003	**1**		1		Feuchtwiese Paradies	am Tag10 Falter und 2 Raupen gesehen, R.Bas.: 18. 75
Wegerichbär	*Parasemia*	*plantaginis*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide West	**am Tag 3 Falter gesehen, R.Bas.: 1, 3**
Rotrandbär	*Diacrisia*	*sannio*	2013	2014	**6**			7		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 45
Russicher Bär, Spanische Flagge	*Euplagia*	*quadripunctaria*	1990	2013	**16**	10	8	7		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 25, 118
Gescheckte Tageule	*Callistege*	*mi*	1991	2015	**15**	3	14	7		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 70
Braune Tageule	*Euclidia*	*glyphica*	1993	2015	**33**	41	50	45		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495
Seideneulchen	*Rivula*	*sericealis*	1993	2013	**9**	3	8	4		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 104
Eulenfalter-Art	*Phytometra*	*viridaria*	1993	2015	**9**	8	13	8		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 11, 37
Messingeule	*Diachrysia*	*chrysitis*	2013	2013	**1**			1	Roggen, Weide Ost	am Tag erst 8 Falter gefunden, R.Bas.: 11, 9
Eulenfalter-Art	*Macdunnoughia*	*confusa*	1993	2013	**5**	5		1		am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 16
Gammaeule	*Autographa*	*gamma*	1993	2014	**33**	12	42	31		am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776
Eulenfalter-Art	*Panemeria*	*tenebrata*	2003	2003	**8**		9			am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 2, 8
Eulenfalter-Art	*Hada*	*plebeja = nana*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Mitte	am Tag 5 Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 9, 28
Eulenfalter-Art	*Hoplodrina*	*blanda*	2013	2013	**1**			1	Farisberg, Weide Süd	am Tag erst 6 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 11, 31

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Weissfleckige Schilfgraseule	*Mythimna*	*albipuncta*	2003	2003	**1**		1		Hemmet, Wiese Ost	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 81
Dreizack-Graseule	*Cerapteryx*	*graminis*	1993	1993	**2**	2			Roggen, Weide West, Von Roll Areal	am Tag erst 10 Falter gefunden, R.Bas.: 2, 10
Eulenfalter-Art	*Chersotis*	*cuprea*	1993	1993	**1**	1			Schwängimatt, Weide West, einer von zwei aktuellen	**am Tag 1 Falter gefangen, R.Bas.: 1, 2**
Gemeine Graseule	*Agrotis*	*exclamationis*	1993	1993	**3**	3				am Tag mässig häufig gefunden und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 24, 108
Saateule	*Agrotis*	*segetum*	1993	1993	**1**	1			Hauensteinmatt	am Tag 7 Falter gefangen, R.Bas.: 13, 24
Schnabelfliegen			1993							
Alpen-Skorpionsfliege	*Panorpa*	*alpina*	1993	2013	**3**	2		1		mässig häufig gefunden
Deutsche Skorpionsfliege	*Panorpa*	*germanica*	1993	2015	**12**	3	7	8		sehr häufig gefunden
Gewöhnliche Skorpionsfliege	*Panorpa*	*communis*	2013	2013	**3**			3		sehr häufig gefunden
Gemeine Skorpionsfliege	*Panorpa*	*vulgaris*	1993	2015	**13**	6				sehr häufig gefunden
Zweiflügler			1989							
Wintermücke Gattung	*Trichocera*	*sp.*	1993	2003	**2**	1	1		Schwängimatt, Weide Süd , Feuchtwiese Paradies	Gattung im Winter sehr häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Yamatotipula*	*caesia*	1993	1993	**1**	1			Feuchtwiese Paradies	**selten gefunden**
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Yamatotipula*	*lateralis*	1993	2003	**2**	2	1		Goletenkanal, Fuss der Holzfluh	häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Yamatotipula*	*pruinosa*	2013	2013	**1**			1	Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Acutipula*	*luna*	2013	2013	**1**			1	Feuchtwiese Paradies	häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Acutipula*	*maxima*	1993	2003	**6**	2	5			häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Acutipula*	*vittata*	2014	2014	**1**			1	Farisberg, untere Weide West	**selten gefunden**
Kohlschnake	*Tipula U.g. Tipula*	*oleracea*	2013	2014	**3**			3		häufig gefunden
Gemeine Wiesenschnake	*Tipula U.g. Tipula s.str.*	*paludosa*	1993	2013	**20**	7	17	14		sehr häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Savtshenkia*	*pagana*	1993	2014	**5**	3	1	1		häufig gefunden, Männchen oft lokal massenhaft

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Pterelachisus*	*neurotica*	1993	2013	**2**	2		1	Von Roll Areal	mässig häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Pterelachisus*	*pabulina*	1993	2003	**2**	1	1		Roggen, Weide Ost, Roggen, Weide West	mässig häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Pterelachisus*	*varipennis*	1993	2003	**2**	1	2		Roggen, Weide Ost, Roggen, Weide West	häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Vestiplex*	*hortorum*	2003	2003	**1**		1		Ruine Neu Falkenstein	**selten gefunden**
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Vestiplex*	*nubeculosa*	2003	2003	**1**		2		Leberen, Chalch- und Wassergraben	**selten gefunden**
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Lunatipula*	*fascipennis*	1993	2013	**3**	3		1		mässig häufig gefunden
Schnaken-Art	*Tipula U.g. Lunatipula*	*vernalis*	1993	2015	**31**	19	28	21		sehr häufig gefunden
Krähenschnaken-Art	*Nephrotoma*	*appendiculata*	1993	2013	**12**	6	4	3		häufig gefunden
Krähenschnaken-Art	*Nephrotoma*	*cornicina*	1993	1993	**4**	4				mässig häufig gefunden
Krähenschnaken-Art	*Nephrotoma*	*flavescens*	1993	2013	**19**	18	11	4		sehr häufig gefunden
Krähenschnaken-Art	*Nephrotoma*	*scurra*	1993	1993	**1**	2			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden, vor allem in Kiesgruben
Kammschnaken-Art	*Tanyptera*	*atrata*	2003	2013	**4**		3	1		mässig häufig gefunden
Stelzmücken-Art	*Epiphragma*	*ocellare*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Stelzmücken-Art	*Limnophila*	*schranki*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	wenig häufig gefunden
Stelzmücken-Art	*Prionolabis*	*hospes = platyptera*	2015	2015	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Süd	wenig häufig gefunden, aber wahrscheinlich oft übersehen oder nicht beachtet
Stelzmücken-Art	*Dicranomyia*	*mitis*	1993	2013	**8**	6	1	1		mässig häufig gefunden, aber nicht inventarisiert
Stelzmücken-Art	*Limonia*	*hercegovinae*	1993	2014	**1**	1		1	Von Roll Areal	mässig häufig gefunden
Stelzmücken-Art	*Limonia*	*nigropunctata*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden
Stelzmücken-Art	*Limonia*	*phragmitidis = tripunctata*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	häufig gefunden
Stelzmücken-Art	*Pedicia*	*litoralis*	1993	2013	**1**	1	1	1	Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Zuckmücke Familie	*(Chironomidae)*	*non det.*	1993							mässig häufig gefunden, aber selten registriert

F = Fundort E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kriebelmücke Familie	*(Simuliidae)*	*non det.*	1993	2014	**11**	4	1	10		sehr häufig gefunden
Trauermücken-Art	*Sciara*	*hemerobioides = thomae*	1993	1993	**4**	4				mässig häufig gefunden, aber oft nicht registriert
Buchenblatt-Gallmücke	*Mikiola*	*fagi* (Gallen)	2013	2014	**1**			2	Schwängimatt, Wiese Süd	Gallen häufig registriert, sehr häufig nicht registriert
Haarmücken-Art	*Bibio*	*clavipes*	2003	2014	**2**		1	1	Schwängimatt, Weide Mitte, Schwängimatt, Wiese Süd	wenig häufig gefunden
Johannismücke	*Bibio*	*johannis*	1989	2015	**24**	17	4	9		häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl
Haarmücken-Art	*Bibio*	*nigriventris*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese West, **einer von 2 Funden in der Region**	**erst 2 Mal gefunden**
Märzmücke	*Bibio*	*marci*	1993	2013	**9**	6	2	2		häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl
Haarmücken-Art	*Bibio*	*varipes*	1993	2013	**2**	1		1	Roggen, Weide West, Schwängimatt, Wiese West	mässig häufig gefunden
Haarmücken-Art	*Dilophus*	*febrilis*	2003	2015	**3**		2	1		häufig gefunden
Schnepfenfliegen-Art	*Rhagio*	*vitripennis*	2003	2013	**3**		2	2		häufig gefunden
Schnepfenfliegen-Art	*Rhagio*	*strigosus*	2013	2003	**1**			1	Schwängimatt, Weide Mitte	wenig häufig gefunden
Schnepfenfliegen-Art	*Rhagio*	*maculatus*	2013	2003	**1**			1	Waldrand Alt Berg	**selten gefunden**
Schnepfenfliegen-Art	*Chrysopilus*	*auratus*	2003	2013	**2**		1	3	Feuchtwiese Paradies, Schwängimatt, Weide Mitte	mässig häufig gefunden
Käsefliege, Stinkfliege	*Coenomyia*	*ferruginea*	1993	2013	**2**	1		1	Chalm Oberberg, Wiese Ost, Schwängimatt, Wiese West	wenig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	*Actina*	*chalybea*	1993	2013	**3**	1	1	1		mässig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	*Chloromyia*	*formosa*	1993	2013	**12**	7	8	2		häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	*Microchrysa*	*cyaneiventris*	1993	1993	**1**	1			Rinderweid, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Waffenfliegen-Art	*Sargus*	*bipunctatus*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	mässig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	*Sargus*	*flavipes*	2003	2003	**2**		2		Alter Steinbruch Mümliswiler Klus, Hauensteinmatt	mässig häufig gefunden
Waffenfliegen-Art	*Oplodontha*	*viridula*	2013	2013	**1**			1	Weide Hasenweg	wenig häufig gefunden
Bremsen-Art	*Silvius*	*alpinus*	2003	2003	**1**		1		Hauensteinmatt	wenig häufig gefunden

F = Fundort E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Regenbremsen-Art	*Haematopota = Chrysozona*	*pluvialis*	1993	2015	**21**	20	15	14		sehr häufig gefunden
Bremsen-Art	*Dasyrhamphis*	*ater*	1993	1993	**2**	2			Fuss der Fluh St. Wolfgang, Waldrand Alt Berg	**selten gefunden**
Bremsen-Art	*Tabanus*	*bovinus*	2003	2003	**2**		3		Goletenkanal, Weide Haulen	mässig häufig gefunden
Bremsen-Art	*Tabanus*	*bromius*	2003	2013	**6**		2	5		häufig gefunden
Raubfliegen-Art	*Choerades*	*fimbriata*	2013	2013	**2**			2	Oberbergweide Mitte, Hauensteinmatt	häufig gefunden
Raubfliegen-Art	*Choerades*	*marginata*	1993	2008	**4**	2	2			mässig häufig gefunden
Raubfliegen-Art	*Laphria*	*flava*	2013	2013	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Nord	**selten gefunden**
Raubfliegen-Art	*Dioctria*	*rufipes*	1993	2013	**10**	5	1	7		häufig gefunden
Raubfliegen-Art	*Leptarthrus*	*brevirostris*	2003	2013	**2**		1	2	Schwängimatt, Weide Süd , Schwängimatt, Wiese West	**selten gefunden**
Raubfliegen-Art	*Leptogaster*	*cylindrica*	1993	2013	**4**	3		1		häufig gefunden
Raubfliegen-Art	*Leptogaster*	*guttiventris*	2013	2013	**2**			2	Schwängimatt, Weide Mitte und Wiese Süd	**erst 2 Mal gefunden**
Raubfliegen-Art	*Eutolmus*	*rufibarbis*	2013	2013	**2**			2	Hemmet, Wiese Ost, Weide Hasenweg	mässig häufig gefunden
Raubfliegen-Art	*Neoitamus*	*cyanurus*	2013	2013	**2**			2	Haulen, Wiese West, Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden
Raubfliegen-Art	*Tolmerus*	*atricapillus*	1993	2013	**13**	9	11			häufig gefunden
Stilett- od. Luchsfliegen-Art	*Thereva*	*handlirschi*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	**selten gefunden**
Wollschweber-Art	*Bombylius*	*major*	1993	2015	**28**	10	24	26		sehr häufig gefunden
Wollschweber-Art	*Bombylius*	*discolor*	1993	2014	**14**	7	5	16		häufig gefunden
Wollschweber-Art	*Bombylius*	*cinerascens*	2003	2014	**7**		1	9		häufig gefunden
Trauerschweber-Art	*Anthrax*	*anthrax*	2013	2013	**2**			2	Schwängimatt, Wiese West, Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden
Trauerschweber-Art	*Hemipenthes*	*maurus*	1993	2003	**4**	1	2	1		mässig häufig gefunden
Trauerschweber-Art	*Villa*	*hottentota*	2013	2013	**1**				Farisberg, Weide Süd	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Trauersschweber-Art	*Villa*	*cingulata*	1993	2015	**11**	1	3	8		häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Platypalpus*	*cruralis*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Empis*	*pseudonuntia*	1993	2013	**4**	1	2	1		häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Empis*	*genualis*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese Ost	**selten gefunden**
Tanzfliegen-Art	*Empis*	*tesselata*	1993	2013	**22**	23	16	7		sehr häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Empis*	*livida*	1993	2013	**4**	2	2	1		häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Empis*	*confusa*	2003	2003	**1**		1		Waldrand Paradies	mässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Empis*	*dimidiata*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Tanzfliegen-Art	*Empis*	*nigritarsis*	1993	2003	**4**	3	2			wenig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Empis*	*stercorea*	2003	2003	**1**		1		Rinderweid	mässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Empis*	*trigramma*	1993	2013	**4**	2	1	1		häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Rhamphomyia*	*sulcata*	1993	2003	**4**	1	3			mässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Rhamphomyia*	*sulcatina*	2003	2014	**2**		1	1	Feuchtwiese Paradies, Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden
Tanzfliegen-Art	*Rhamphomyia*	*tibialis*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Langbeinfliegen-Art	*Dolichopus*	*ungulatus*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Mitte	mässig häufig gefunden
Langbeinfliegen-Art	*Nodicornis = Sybistroma*	*nodicornis*	1993	1993	**1**	1			Feuchtwiese Paradies	**selten gefunden**
Gestreifte Waldschwebfliege Waldschneisenschwebfliege	*Dasysyrphus*	*albostriatus*	2013	2013	**5**			5		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6
Posthorn-Waldschwebfliege Waldschneisenschwebfliege	*Dasysyrphus*	*friuliensis*	1993	1993	**1**	1			Chalm Oberberg, Wiese Ost	wenig häufig gefunden
Waldschneisenschwebfliegen-Art	*Dasysyrphus*	*hilaris*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide West	**selten gefunden**
Breitband-Waldschneisenschwebfliege	*Dasysyrphus*	*tricinctus*	2013	2013	**1**			1	Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Gemeine Waldschneisenschwebfliege	*Dasysyrphus*	*venustus*	2013	2015	**2**			2	Fuss der Holzfluh, Schwängimatt, Wiese Süd	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gelbe Breitbauchschwebfliege	*Didea*	*fasciata*	1993	2003	**2**	1	1		Von Roll Areal, Oberbergweide Mitte	wenig häufig gefunden
Schmale Breitbauchschwebfliege	*Didea*	*intermedia*	2003	2003	**2**		2		Haulen, Wiese West, Hauensteinmatt	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Grosse Breitbauchschwebfliege	*Didea = Megasyrphus*	*erratica*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Zweiband-Wiesenschwebfliege, Zweiband-Heckenschwebfliege	*Epistrophe*	*eligans*	1993	2008	**2**	1	1		Von Roll Areal, Leberen, Chalch- und Wassergraben	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Grosse Wiesenschwebfliege, Grosse Heckenschwebfliege	*Epistrophe*	*grossulariae*	2003	2013	**5**		1	5		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Wiesenschwebfliegen-Art	*Epistrophe*	*flava = melanostomoide*	2003	2013	**3**		2			wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Schwarzhaarige Wiesenschwebfliege	*Epistrophe*	*nitidicollis*	1993	2003	**3**	2	1			mässig häufig gefunden
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	*Episyrphus*	*balteatus*	1989	2014	**32**	42	26	31		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 200
Gemeine Feldschwebfliege	*Eupeodes*	*corollae*	1989	2013	**17**	11	19	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9
Breitband-Feldschwebfliege	*Eupeodes*	*latifasciatus*	1993	2013	**6**	1	3	2		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Feldschwebfliegen-Art	*Eupeodes*	*luniger*	2003	2003	**1**		1		Chalm Oberberg, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Feldschwebfliegen-Art	*Eupeodes*	*nielseni*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	wenig häufig gefunden
Kurze oder Bogenader-Feldschwebfliege	*Eupeodes*	*lapponicus*	1993	2013	**16**	3	12	4		häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark
Wald-Weissbandschwebfliege	*Leucozona*	*lucorum*	2003	2003	**2**		2		Roggen, Weide Ost, Schwängimatt, Weide Süd	mässig häufig gefunden
Frühe Frühlingsschwebfliege	*Melangyna*	*lasiophthalma*	1993	2003	**2**	1	1		Von Roll Areal, Roggen, Weide West	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5
Späte Frühlingsschwebfliege, Gemeine Zartschwebfliege	*Meliscaeva*	*cinctella*	1989	2008	**8**	7	1			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 20
Frühe Blattlausschwebfliege	*Parasyrphus*	*punctulatus*	2008	2008	**1**				Leberen, Chalch- und Wassergraben	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Späte Grossstirnschwebfliege, Weisse Dickkopfschwebfliege	*Scaeva*	*pyrastri*	1993	2014	**13**	10	4	6		häufig gefunden
Frühe Grossstirnschwebfliege, Gelbe Dickkopfschwebfliege	*Scaeva*	*selenitica*	1993	2013	**6**	1	4	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Kugelträger-Art	*Sphaerophoria*	*bavata*	1993	2003	**2**	1	1		Haulen, Wiese West, Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Kugelträger-Art	*Sphaerophoria*	*interrupta*	1993	2013	**6**	1	5	1		häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebfliege	*Sphaerophoria*	*scripta*	1993	2015	**35**	57	34	23		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Kugelträger-Art	*Sphaerophoria*	*taeniata*	1993	1993	**2**	2			Waldrand Alt Berg, Wiese Klopfackerweg	häufig gefunden
Grosse Schwebfliege, Gemeine Gartenschwebliege	*Syrphus*	*ribesii*	1993	2014	**19**	6	12	15		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13
Behaarte Schwebfliege, Grosse Gartenschwebfliege	*Syrphus*	*torvus*	2003	2014	**7**		5	7		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7
Kleine Gartenschwebfliege	*Syrphus*	*vitripennis*	1993	2013	**12**	10	2	10		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Frühe Gelbrandschwebfliege	*Xanthogramma*	*festivum*	1993	2015	**4**	2	1	1		mässig häufig gefunden
Späte Gelbrandschwebfliege	*Xanthogramma*	*pedissequum*	1993	2015	**5**	1	2	3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Zweiband-Wespenschwebfliege	*Chrysotoxum*	*bicinctum*	1993	2013	**9**	3	5	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Frühlings-Wespenschwebfliege	*Chrysotoxum*	*vernale*	2003	2003	**2**		2		Weide Haulen, Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden
Elegante Wespenschwebfliege	*Chrysotoxum*	*elegans*	1993	2013	**10**	7	4	1		häufig gefunden
Kahle oder Südliche Wespenschwebfliege	*Chrysotoxum*	*intermedium*	1993	2013	**8**	1	4	5		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) slten: 3
Gemeine Wespenschwebfliege	*Chrysotoxum*	*cautum*	1993	2013	**4**	2		2		häufig gefunden
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebfliege	*Melanostoma*	*mellinum*	1993	2014	**24**	30	8	13		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 58
Matte Schwarzkopfschwebfliege, Lange Grasschwebfliege	*Melanostoma*	*scalare*	2003	2015	**8**		7	3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 34
Breitfussschwebfliegen-Art	*Platycheirus*	*ambiguus*	2009	2006 9	**1**		1		Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Graue oder Schwarze Breifussschwebfliege	*Platycheirus*	*albimanus*	1993	2014	**11**	4	6	4		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6
Gemeine Breitfussschwebliege	*Platycheirus*	*clypeatus*	2003	2013	**2**		1	1	Feuchtwiese Paradies, Schwängimatt, Wiese Süd	häufig gefunden
Europäische Breitfussschwebfliege	*Platycheirus*	*europaeus*	2003	2013	**6**		4	2		häufig gefunden
Breitfussschwebfliegen-Art	*Platycheirus*	*manicatus*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	mässig häufig gefunden
Breitfussschwebfliegen-Art	*Platycheirus*	*parmatus*	2003	2003	**1**		1		Hauensteinmatt	wenig häufig gefunden
Wald-Breitfussschwebfliege	*Platycheirus*	*scutatus*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Breitfussschwebfliegen-Art	*Platycheirus*	*tarsalis*	1993	1993	**1**	1			Roggen, Weide Ost	**selten gefunden**
Schwebfliegen-Art	*Pyrophaena*	*rosarum*	1993	1993	**1**	1			Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Heideschwebfliegen-Art	*Paragus*	*haemorrhous*	1993	2003	**4**	2	3			mässig häufig gefunden
Weisstirnige Heideschwebfliege	*Paragus*	*albifrons*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	**selten gefunden**
Heideschwebfliegen-Art	*Paragus*	*finitimus*	1993	2003	**2**	1	1		Fuss der Holzfluh, Oberbergweide Mitte	wenig häufig gefunden
Kleinschwebfliege Gattung	*Neocnemodon*	*sp.*	2013	2013	**1**			1	Hemmet, Wiese Ost	Gattung mässig häufig gefunden
Kleinschwebfliegen-Art	*Neocnemodon*	*latitarsis*	1993	1993	**1**	1			Hemmet, Wiese Ost, einer von drei Funden in der	**selten gefunden**
Keulen-Waldrandschwebfliege	*Pipiza*	*austriaca*	2003	2003	**1**		1		Farisberg, untere Weide West	wenig häufig gefunden
Waldrandschwebfliege, Mondschwebfliegen-Art	*Pipiza*	*noctiluca*	2003	2015	**2**		1	2	Weide Seidenbergweg, Schwängimatt, Wiese Süd	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Vierfleck-Waldrand- oder Mondschwebfliege	*Pipiza*	*quadrimaculata*	1993	1993	**1**	1			Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Gemeine Zwergschwebfliege	*Pipizella*	*viduata*	1993	2013	**15**	8	10	6		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Gemeine oder Lange Erzschwebfliege	*Cheilosia*	*variabilis*	1993	2013	**7**	2	4	1		häufig gefunden
Erzschwebfliegen-Art Variabilis-Gruppe	*Cheilosia*	*rhynchops*	1993	2013	**2**	1		1	Schwängimatt, Weide Süd, Schwängimatt, Weide Mitte	wenig häufig gefunden
Bärlauch- Erzschwebfliege Impressa-Gruppe	*Cheilosia*	*fasciata*	2003	2014	**3**		1			mässig häufig gefunden
Schwarze Erzschwebfliege Impressa-Gruppe	*Cheilosia*	*impressa*	1993	2003	**8**	5	7			häufig gefunden
Weissfuss-Erzschwebfliege Antigua-Gruppe	*Cheilosia*	*albitarsis*	1993	2015	**23**	5	18	11		sehr häufig gefunden
Erzschwebfliegen-Art Antigua-Gruppe	*Cheilosia*	*personata*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	**selten gefunden**
Erzschwebfliegen-Art Antigua-Gruppe	*Cheilosia*	*impudens*	1993	2003	**2**	1	2		Hauensteinmatt, Farisberg, Weide Süd	mässig häufig gefunden
Erzschwebfliegen-Art Antigua-Gruppe	*Cheilosia*	*pubera*	2003	2003	**1**		1		Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Erzschwebfliegen-Art Antigua-Gruppe	*Cheilosia*	*ahenea*	1993	2003	**4**	1	3			wenig häufig gefunden
Kerbel-Erzschwebfliege Pagana-Gruppe	*Cheilosia*	*pagana*	1993	2013	**5**	4		1		häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Trüffel-Erzschwebfliege Pagana-Gruppe	*Cheilosia*	*rufipes = soror*	1993	2013	**12**	4	8	4		häufig gefunden
Pilz-Erzschwebfliege Pagana-Gruppe	*Cheilosia*	*scutellata*	1993	2003	**2**	2	1		Waldrand Alt Berg, Haulen, Wiese West	mässig häufig gefunden
Erzschwebfliegen-Art Pagana-Gruppe	*Cheilosia*	*caerulescens*	2003	2003	**1**		1		Südliche Bahnböschung	wenig häufig gefunden
Grauschimmer-Erzschwebfliege Variabilis-Gruppe	*Cheilosia*	*lasiopa = honesta*	2003	2003	**2**		2		Oberbergweide West, Roggen, Weide Ost	mässig häufig gefunden
Bärtige Erzschwebfliege Illustrata-Gruppe	*Cheilosia*	*barbata*	1993	2003	**3**	2	2			mässig häufig gefunden
Erzschwebfliegen-Art , wb Angustigenis-Gruppe, mn	*Cheilosia*	*latifrons = intonsa*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Pelzige oder Fuchsrote Erzschwebfliege	*Cheilosia*	*chrysocoma*	2014	2014	**1**			1	Roggen, Weide Ost	**selten gefunden**
Weiden-Erzschwebfliege Canicularis-Gruppe	*Cheilosia*	*albipila*	1993	1993	**1**	1			Roggen, Weide Ost	**selten gefunden**
Erzschwebfliegen-Art Canicularis-Gruppe	*Cheilosia*	*himantopa*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Wiese Nord	wenig häufig gefunden
Korbblüten-oder Bienen-Erzschwebfliege Canicularis-Gr.	*Cheilosia*	*canicularis*	1993	2014	**3**	1	2	3		mässig häufig gefunden
Gelbfüssige Erzschwebfliege mn: Canicularis-Gr. wb:	*Cheilosia*	*flavipes*	1993	2003	**3**	2	2			**selten gefunden**
Grüne Erzschwebfliege Canicularis Gruppe	*Cheilosia*	*chloris*	1993	2014	**2**	1		1	Waldrand Paradies, Hauensteinmatt	mässig häufig gefunden
Erzschwebfliegen-Art Proxima-Gruppe	*Cheilosia*	*proxima*	1993	2013	**3**	1		2		wenig häufig gefunden
Erzschwebfliegen-Art Proxima-Gruppe	*Cheilosia*	*aerea*	1993	1993	**3**	3				wenig häufig gefunden
Erzschwebfliegen Artengruppe Bergenstammi-Gruppe	*Cheilosia*	*bergenstammi*	2003	2015	**3**		1	2		mässig häufig gefunden
Dunkle Erzschwebfliege Bergenstammi-Gruppe Impressa-	*Cheilosia*	*carbonaria*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	**selten gefunden**
Frühlings- oder Aster-Erzschwebfliege Bergenstammi-	*Cheilosia*	*vernalis*	1993	2013	**10**	8		3		häufig gefunden
Frühe Erzschwebfliege Bergenstammi-Gruppe	*Cheilosia*	*praecox*	1993	2015	**4**	2		2		mässig häufig gefunden
Erzschwebfliegen-Art Bergenstammi-Gruppe	*Cheilosia*	*mutabilis*	1993	2003	**3**	2	1			wenig häufig gefunden
Gefleckte Erzschwebfliege, Gefleckte Lauchschwebfliege	*Portevinia*	*maculata*	1993	2003	**1**	1	1		Von Roll Areal	mässig häufig gefunden
Gemeine Schnauzenschwebfliege,	*Rhingia*	*campestris*	1993	2015	**25**	25	18	9		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Hummel-Waldschwebfliege, Pelzige Hummelschwebliege	*Volucella*	*bombylans*	2013	2013	**1**			2	Waldrand Oberberg	mässig häufig gefunden
Gebänderte Waldschwebfliege, Gelbe Hummelschwebfliege	*Volucella*	*inanis*	1993	2003	**4**	3	2			mässig häufig gefunden
Gelbfleck-Waldschwebfliege, Zweifleck-Hummelschwebfliege	*Volucella*	*inflata*	1993	2013	**1**	1		1	Hemmet, Wiese Ost	wenig häufig gefunden
Gelbfleck-Waldschwebfliege, Zweifleck-Hummelschwebfliege	*Volucella*	*inflata*	2013	2013	**1**				Hemmet, Wiese West	wenig häufig gefunden
Gemeine Waldschwebfliege, Gemeine Hummelschwebfliege	*Volucella*	*pellucens*	1993	2008	**9**	5	10			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Grosse Waldschwebfliege, Riesen-Hummelschwebfliege	*Volucella*	*zonaria*	2013	2013	**1**			1	Weide Hasenweg	wenig häufig gefunden
Gemeine Smaragd- oder Gelbbauch-Schwebfliege	*Chrysogaster*	*solstitialis*	1993	2003	**3**	2	1			häufig gefunden
Glänzende Smaragdschwebfliege, Kleine	*Melanogaster*	*nuda = lucida*	1993	2003	**2**	1	1		Oberbergweide Mitte, Farisberg, Weide Süd	mässig häufig gefunden
Schwebfliegen-Art	*Orthonevra*	*nobilis*	1993	2013	**3**	2		1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Gemeine Keulenschwebfliege	*Neoascia*	*podagrica*	2014	2014	**1**			1	Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Sibirische Taillenschwebfliege	*Sphegina*	*sibirica*	1993	2013	**2**	1		1	Von Roll Areal, Fuss der Holzfluh	wenig häufig gefunden
Hummel-Gebirgsschwebfliege, Gelbe Bärenschwebfliege	*Arctophila*	*bombiformis*	1993	2013	**3**	1		2		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Braune Bärenschwebfliege	*Arctophila*	*superbiens*	2013	2013	**1**			1	Farisberg, untere Weide West	mässig häuig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten:4
Grosskopf-Zwiebelschweb-fliege	*Eumerus*	*ornatus*	1993	1993	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12
Dreifarbige Zwiebelschwebfliege	*Eumerus*	*tricolor*	2013	2013	**1**			1	Weide Hasenweg	wenig häufig gefunden
Zwiebelschwebfliegen-Art	*Eumerus*	*grandis*	2003	2003	**1**		1		Fuss der Fluh St. Wolfgang, **einer von 2 Funden in der R.**	**erst 2 Mal gefunden**
Höcker-Zwiebelschwebfliege	*Eumerus*	*tuberculatus*	2003	2003	**3**		3			mässig häufig gefunden
Narzissenschwebfliegen-Art	*Merodon*	*aberrans*	2013	2013	**1**			2	Schwängimatt, Wiese Süd	wenig häufig gefunden
Narzissenschwebfliegen-Art	*Merodon*	*avidus*	2013	2013				1		**selten gefunden**
Gemeine Narzissenschwebfliege,	*Merodon*	*equestris*	1993	2013	**9**	3	5	1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Fuchsrote Narzissenschwebfliege	*Merodon*	*rufus*	1993	2013	**5**	2	3	2		mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Matte Faulschlammschwebfliege, Schwarze	*Eristalinus*	*sepulchralis*	1993	1993	**1**	1			Rinderweid	mässig häufig gefunden
Glänzende Faulschlammschwebfliege,	*Eristalinus*	*aeneus*	1993	2003	**2**	3	1		Von Roll Areal, Ruine Neu Falkenstein	mässig häufig gefunden
Kleine Keilfleckschwebfliege, Kleine Bienenschwebfliege	*Eristalis*	*arbustorum*	1993	2013	**21**	27	1	11		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum
Keilfleckschwebfliegen-Art	*Eristalis*	*interrupta*	1993	2013	**24**	20	2	25		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Keilfleckschwebfliegen-Art, Distel-Binenenschwebfliege	*Eristalis*	*jugorum*	1993	2014	**29**	33	18	20		sehr häufig gefunden
Gemeine Keilfleckschwebfliege Lange Bienenschwebfliege	*Eristalis*	*pertinax*	1993	2015	**22**	15	18	10		sehr häufig gefunden
Schwarze Bienenschwebfliege, Keilfelckschwebfliegen-Art	*Eristalis*	*pratorum*	2013	2014	**3**			3		mässig häufig gefunden
Dunkle Bienenschwebfliege, Keilfelckschwebfliegen-Art	*Eristalis*	*rupium*	1993	2013	**4**	1		3		mässig häufig gefunden
Grosse “Mistbiene”, Wanderer	*Eristalis*	*tenax*	1989	2015	**39**	62	78	60		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 57
Grosse Sumpfschwebfliege, Grosse Sonnenschwebfliege	*Helophilus*	*parallelus*	1993	2003	**6**	6	1			häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Gemeine Sumpfschwebfliege, Gemeine Sonnenschwebfliege	*Helophilus*	*pendulus*	1993	2013	**11**	5	3	5		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8
Totenkopfschwebfliege	*Myathropa*	*florea*	1989	2015	**38**	47	58	39		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18
Gelbhaarige Hummelschwebfliege	*Brachymyia = Criorhina*	*berberina*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Schmale Hummelschwebfliege, Bienen-Pelzschwebfliege	*Criorhina*	*asilica*	2015	2015	**1**			1	Schwängimatt, Wiese Süd	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen
Kleine “Mistbiene”, Gemeine Keulenschwebfliege, Gemeine	*Syritta*	*pipiens*	1993	2013	**12**	15	6	2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4
Langbauchschwebfliegen-Art, Hahnenfuss-Holzschwebfliege	*Xylota*	*jacutorum = coeruleiventris*	2003	2003	**1**		1		Haulen, Wiese West	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) 2 Individuen
Langbauchschwebfliegen-Art	*Xylota*	*ignava*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Gemeine Langbauchschwebfliege	*Xylota*	*segnis*	1993	2014	**13**	5	3	10		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 160
Langbauchschwebfliegen-Art	*Xylota*	*semulatra = abiens*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese Ost, **einer von 2 Funden in der Region**	**erst 2 Mal gefunden**
Goldhaar-Langbauchschwebfliege, Goldhaar-Holzschwebfliege	*Xylota*	*sylvarum*	2008	2008	**1**		1		Leberen, Chalch- und Wassergraben	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 19
Braune Ameisenschwebfliege	*Microdon*	*devius*	2003	2013	**3**		1	2		wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Ameisenschwebfliegen-Art	*Microdon*	*analis = eggeri*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3
Rothaarige oder Rotbraune Ameisenschwebfliege	*Microdon*	*mutabilis*	1993	2013	**2**	1		1	Fuss der Holzfluh , Oberbergweide West	mässig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Physocephala*	*rufipes*	1993	2013	**11**	5	7	2		häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Physocephala*	*vittata*	2013	2013	**1**			1	Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Conops*	*quadrifasciatus*	1993	2003	**5**	4	2			mässig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Conops*	*flavipes*	1993	2008	**4**	2	4			häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Conops*	*scutellatus*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	mässig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Conops*	*strigatus*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Alt Berg	wenig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Myopa*	*extricata*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Paradies	wenig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Thecophora*	*fulvipes*	1993	1993	**3**	3				wenig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Thecophora*	*atra*	1993	2013	**10**	8	1	3		häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Thecophora*	*pusilla*	2013	2014	**3**			2		mässig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Thecophora*	*distincta*	1993	2013	**3**	1		2		mässig häufig gefunden
Dickkopffliegen-Art	*Sicus*	*ferrugineus*	1989	2013	**21**	14	15	11		sehr häufig gefunden
Stelzfliegen-Art	*Rainieria*	*calceata*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig häufig gefunden
Nacktfliegen-Art	*Psila*	*fimetaria*	1993	1993	**1**	1			Roggen, Weide West	wenig häufig gefunden
Nacktfliegen-Art	*Chyliza*	*extenuata*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang, einer von 3 Funden in der R.!	selten gefunden, weil unscheinbar
Schmuckfliegen-Art	*Herina*	*frondescentiae*	2003	2003	**1**		1		Chalm Oberberg, Wiese Ost, **einer von 2 Funden in der R.**	**erst 2 Mal gefunden**
Schmuckfliegen-Art	*Herina*	*germinationis*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide Mitte	wenig häufig gefunden, nur im Chilpen-Reservat Diegten häufig
Fruchtfliegen-Art	*Acanthiophilus*	*helianthi*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide West, **einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**
Fruchtfliegen-Art	*Ictericodes*	*zelleri*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang, **einer von 2 Funden in der R.!**	**erst 2 Mal gefunden**, weil klein

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Fruchtfliegen-Art	*Oxyna*	*flavipennis*	1993	2013	**6**	2	4	2		mässig häufig gefunden
Fruchtfliegen-Art	*Tephritis*	*conura*	2014	2014	**1**			1	Farisberg, untere Weide West	**selten gefunden**
Fruchtfliegen-Art	*Tephritis*	*crepidis*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide Ost	wenig häufig gefunden
Fruchtfliegen-Art	*Tephritis*	*neesii*	2013	2013	**1**			1	Oberbergweide Mitte	wenig häufig gefunden
Fruchtfliegen-Art	*Tephritis*	*ruralis*	1993	1993	**1**	1			Böschung Oberbergweg	selten gefunden, weil klein
Fruchtfliegen-Art	*Tephritis*	*vespertina*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	**selten gefunden**
Fruchtfliegen-Art	*Chaetostomella*	*cylindrica*	2013	2013	**1**			1	Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden, weil klein, vermutlich häufig
Schwingfliege Gattung	*Sepsis*	*sp.*	1993							Gattung häufig gesehen, aber meist nicht registriert
Schwingfliege Gattung	*Sepsis*	*sp.*	1993	1993	**1**	1			Hauensteinmatt	Gattung häufig gesehen, aber meist nicht registriert
Netzfliegen-Art	*Pherbellia*	*cinerella*	1993	1993	**2**	2			Oberberg Weide Nordost, Feuchtwiese Paradies	mässig häufig gefunden, unscheinbar und oft übersehen oder nicht registriert, vermutlich
Netzfliegen-Art	*Dichetophora*	*obliterata*	1993	1993	**1**	1			einziger sicherer Fund in der Region, kann von mir nicht	wenig häufig gefunden
Netzfliegen-Art	*Tetanocera*	*arrogans*	2003	2003	**1**		1		Feuchtwiese Paradies	wenig häufig gefunden
Netzfliegen-Art	*Trypetoptera*	*punctulata*	2013	2013	**1**			1	Waldrand Alt Berg	mässig häufig gefunden
Netzfliegen-Art	*Pherbina*	*coryleti*	1993	1993	**1**	2			Feuchtwiese Paradies	**selten gefunden**
Netzfliegen-Art	*Coremacera*	*halensis*	2003	2003	**1**		1		Roggen, Weide West	**selten gefunden**
Netzfliegen-Art	*Coremacera*	*marginata*	2003	2003	**1**		1		Haulen, Wiese West	wenig häufig gefunden
Netzfliegen-Art	*Limnia*	*unguicornis*	1993	2015	**12**	3	7	10		häufig gefunden
Saft- od. Wiesenfliegen-Art	*Geomyza*	*venusta*	1993	1993	**1**	1			Weide Hasenweg, einer von drei Funden in der Region!	selten gefunden, weil klein und unscheinbar und vermutlich oft übersehen
Dungfliege Familie	*(Sphaeroc-eridae)*	*non det.*	2003	2003	**1**		1		Schwängimatt, Weide Mitte	Familie selten gefunden, und meist nicht registriert
Halmfliege Gattung	*Chlorops*	*sp.*	1993	1993	**2**	3			Chalm Oberberg, Wiese Ost , Goletenkanal	Gattung mässig häufig gefunden, aber oft übersehen und kaum registriert
Halmfliegen-Art	*Chlorops*	*strigulus*	1993	2013	**3**	1		2		wenig häufig gefunden, aber vermutlich oft übersehen

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Kotfliegen-Art	*Scatophaga*	*lutaria*	2003	2003	**3**		3			mässig häufig gefunden
Kotfliegen-Art	*Scatophaga*	*stercoraria*	1993	2014	**8**	3	1	5		sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert
Stubenfliegen-Verwandte	*Mesembrina*	*meridiana*	1993	2014	**10**	6	3	2		häufig gefunden
Herbst-Stubenfliege	*Musca*	*autumnalis*	1993	2013	**11**	11	7	4		sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert
Gemeine Stubenfliege	*Musca*	*domestica*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang, unsicher bestimmt	in der freien Natur selten registriert
Stubenfliege Gattung	*Neomyia = Orthellia*	*sp.*	1993	2003	**13**	16	2			Gattung sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen
Stubenfliegen-Verwandte	*Polietes*	*lardarius*	1993	2013	**8**	2	4	2		sehr häufig gefunden, auf Kuhfladen, im Herbst auch auf Blättern am Waldrand
Stubenfliegen-Verwandte	*Graphomyia*	*maculata*	1993	1993	**3**	3				mässig häufig gefunden
Hirschlausfliege	*Lipoptena*	*cervi*	1993	1993	**1**	1			Chalm Oberberg, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
Schmeissfliegen-Art	*Calliphora*	*vomitoria (?) sp.* E	1993							nur wenig häufig registriert, vermutlich sehr häufig
Schmeissfliegen-Art	*Cynomyia*	*mortuorum*	1993	2015	**9**	4	2	8		häufig gefunden
Kaisergoldfliege	*Lucilia*	*caesar*	1993	1993	**3**	4				vermutlich sehr häufig, aber nur selten registriert
Schmeissfliege Gattung	*Pollenia*	*sp.*	1993	2014	**34**	35	24	15		Gattung sehr häufig gefunden
Fleischfliege Gattung	*Sarcophaga*	*sp.*	1993	2003	**40**	80	105			Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert
Raupenfliegen-Art	*Eriothrix*	*rufomaculata*	1993	2013	**22**	25	3	1		häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	*Gymnosoma*	*clavatum*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Holzfluh	**selten gefunden**
Raupenfliegen-Art	*Gymnosoma*	*costatum*	2013	2013	**1**			1	Fuss der Fluh St. Wolfgang	**selten gefunden**
Raupenfliegen-Art	*Phasia*	*aurigera*	2003	2013	**1**		1		Von Roll Areal	wenig häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	*Phasia = Alophora*	*hemiptera*	1993	2008	**3**	1	3			häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	*Ectophasia*	*crassipennis*	2013	2013	**1**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	*Cylindromyia = Ocyptera*	*brassicaria*	1993	2013	**8**		1	4		mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Raupenfliegen-Art	*Tachina = Echinomyia*	*fera*	2013	2014	**2**			4	Farisberg, untere Weide West	häufig gefunden, aber oft nicht registriert
Raupenfliegen-Art	*Nowickia*	*ferox*	2013	2013	**1**				Chalm Oberberg, Wiese Ost	mässig häufig gefunden
WIRBELTIERE			1989							
Goldfisch, Giebel	*Carassius*	*auratus*	1993	1993	**1**	1			Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	wenig häufig beobachtet, nicht inventarisiert, Goldfische werden leider oft aus Aquarien in
Alet, Döbel	*Squalius*	*cephalus*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	selten beobachtet, weil nicht danach gesucht, nicht inventarisert
Feuersalamander	*Salamandra*	*salamandra*	1989	1989	**1**	1			Ruine Neu Falkenstein	wenig häufig gefunden
Bergmolch	*Triturus*	*alpestris*	1993	2013	**2**	1	1	2	Fischteich Haulenrain, Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	in stehenden Gewässern mässig häufig gefunden
Fadenmolch	*Triturus*	*helveticus*	2013	2013	**1**			1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	wenig häufig gefunden, aber selten danach gesucht
Geburtshelferkröte	*Alytes*	*obstetricans*	2003	2003	**2**		3		Alter Steinbruch Mümliswiler Klus,	mässig häufig gefunden
Erdkröte	*Bufo*	*bufo*	1993	2014	**2**	1	1	3	Fischteich Haulenrain , Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	häufig gefunden
Grasfrosch	*Rana*	*temporaria*	1993	2014	**6**	4	4	4		häufig gefunden
Blindschleiche	*Anguis*	*fragilis*	1989	2013	**5**	3	1	1		häufig gefunden
Mauereidechse	*Podarcis*	*muralis*	1989	2014	**10**	16	10	8		sehr häufig gefunden
Zauneidechse	*Lacerta*	*agilis*	1993	2015	**17**	30	12	4		sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)
Berg- od. Waldeidechse	*Lacerta*	*vivipara*	1993	2013	**2**	1		1	Schwängimatt, Weide Süd , Schwängimatt, Weide Mitte	mässig häufig gefunden
Juraviper	*Vipera*	*aspis*	1993	2003	**1**	2	1		Fuss der Fluh St. Wolfgang, **einziger Fundort in der Reg.!**	**selten gefunden**
Graureiher	*Ardea*	*cinerea*	1993	2003	**2**	1	1		Von Roll Areal, Fuss der Holzfluh	häufig beobachtet
Stockente	*Anas*	*platyrhynchus*	2003	2013	**2**		1	1	Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	häufig beobachtet
Wespenbussard	*Pernis*	*apivorus*	1993	1993	**1**	1			Oberbergweide West, von E. Grütter bestimmt	ich kann die Art nicht vom Mäusebussard abgrenzen, nicht inventarisiert
Schwarzer Milan (Schwarzmilan)	*Milvus*	*migrans*	1998	2013	**5**	1	3	5		häufig beobachtet
Roter Milan (Rotmilan)	*Milvus*	*milvus*	1993	2015	**17**	3	14	20		sehr häufig beobachtet

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Habicht	*Accipiter*	*gentilis*	2003	2003	**1**		1		Ruine Neu Falkenstein	wenig häufig beobachtet
Sperber	*Accipiter*	*nisus*	1993	2013	**2**	1		1	Oberbergweide Mitte, Roggen, Weide Ost	mässig häufig beobachtet
Mäusebussard	*Buteo*	*buteo*	1993	1993	**1**	1			Haulen, Wiese West	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert
Turmfalke	*Falco*	*tionnunculus*	1993	2015	**13**	4	7	10		häufig beobachtet
Hohltaube	*Columba*	*oenas*	2003	2003	**1**		1		Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	mässig häufig beobachtet
Ringeltaube	*Columba*	*palumbus*	1993	1993	**3**	3				sehr häufig beobachtet, aber meist nicht registriert
Türkentaube	*Streptopelia*	*decaocto*	2003	2013	**4**		4			häufig beobachtet
Kuckuck	*Cuculus*	*canorus*	1993	1993	**3**	3				früher häufig gehört, aber in letzter Zeit **selten geworden**
Mauersegler	*Apus*	*apus*	2003	2013	**6**		5	2		häufig beobachtet
Grauspecht	*Picus*	*canus*	1993	2014	**12**	9	1	3		früher häufig beobachtet, aber in den letzen Jahren nur noch wenig häufig
Grünspecht	*Picus*	*viridis*	1993	2014	**22**	26	31	12		sehr häufig beobachtet
Schwarzspecht	*Dryocopus*	*martius*	1993	2014	**18**	7	19	4		sehr häufig beobachtet
Kleinspecht	*Dendrocopos = Dryocopus*	*minor*	1993	1993	**3**	7				mässig häufig beobachtet
Feldlerche	*Alauda*	*arvensis*	1964	1993	**2**	2			Farisberg, Rand der Klus, Waldrand Oberberg	frühe häufig beobachtet, ist in letzter Zeit seltener geworden
Felsenschwalbe	*Ptyonoprogne*	*rupestris*	1993	2003	**1**	1	1		Von Roll-Areal, die Art brütet in den Felsen der Klus	**selten beobachtet**
Rauchschwalbe	*Hirundo*	*rustica*	2013	2013	**2**			3	Roggen, Weide Ost, Schwängimatt, Weide Mitte	häufig beobachtet, erst in der dritten Beobachtungsperiod inventarisiert
Mehlschwalbe	*Delichron*	*urbica*	1998	1999	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	häufig beobachtet
Baumpieper	*Anthus*	*trivialis*	1993	2015	**14**	9	13	14		häufig beobachtet
Wiesenpieper	*Anthus*	*pratensis*	1986	1986	**1**	1			Farisberg, untere Weide West	wenig häufig beobachtet
Gebirgsstelze	*Motacilla*	*cinerea*	1993	1993	**2**	3			Von Roll Areal, Fuss der Fluh St. Wolfgang	häufig beobachtet, aber nur mässig häufig registriert
Zaunkönig	*Troglodytes*	*troglodytes*	1989	1989	**1**	1			Fuss der Holzfluh	sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Heckenbraunelle	*Prunella*	*modularis*	1993	2014	**8**	5	1	4		häufig beobachtet
Hausrotschwanz	*Phoenicurus*	*ochruros*	1964	1964	**1**	1			Farisberg, Rand der Klus	sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert
Gartenrotschwanz	*Phoenicurus*	*phoenicurus*	1993	1993	**1**	2			Fuss der Holzfluh	früher mässig häufig beobachtet, **in letzter Zeit nur noch selten**
Steinschmätzer	*Oenanthe*	*oenanthe*	2013	2013	**1**			1	Chalm Oberberg, Wiese Ost	**selten beobachtet**
Wacholderdrossel	*Turdus*	*pilaris*	1993	2014	**3**	2		2		häufig beobachtet, aber in letzter Zeit weniger
Misteldrossel	*Turdus*	*viscivorus*	1993	2015	**17**	1	31	11		sehr häufig beobachtet
Gartengrasmücke	*Sylvia*	*borin*	1993	2015	**11**	9	4	2		häufig beobachtet
Berglaubsänger	*Phylloscopus*	*bonelli*	1993	2014	**19**	12	14	14		häufig beobachtet
Waldlaubsänger	*Phylloscopus*	*sibilatrix*	1993	2008	**5**	4				früher häufig beobachtet, aber in den letzen Jahren nur noch selten
Fitis	*Phylloscopus*	*trochilus*	1993	1993	**1**	1			Weide Seidenbergweg	früher häufig beobachtet, aber in den letzen Jahren nur noch selten
Wintergoldhähnchen	*Regulus*	*regulus*	2003	2015	**7**		9	1		häufig beobachtet
Grauschnäpper	*Muscicapa*	*striata*	2003	2003	**1**		1		Hemmet, Wiese Ost	mässig häufig beobachtet
Trauerschnäpper	*Ficedula*	*hypoleuca*	1993	2015	**12**	5	6	8		häufig beobachtet
Schwanzmeise	*Aegitalus*	*caudatus*	1993	2014	**15**	2	16	2		häufig beobachtet
Nonnenmeise oder Sumpfmeise	*Parus*	*palustris*	1993	1993	**1**	1			Von Roll Areal	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert
Haubenmeise	*Parus*	*cristatus*	1993	2013	**16**	16	18	1		sehr häufig beobachtet
Kohlmeise	*Parus*	*major*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Paradies	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert
Waldbaumläufer	*Certhia*	*familiaris*	2003	2013	**5**		4	1		häufig beobachtet
Gartenbaumläufer	*Certhia*	*brachydactyla*	2003	2014	**6**		4	6		sehr häufig beobachtet
Elster	*Pica*	*pica*	1993	2014	**7**	2	3	7		sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert
Tannenhäher	*Nucifraga*	*caryocatactes*	1993	2003	**5**	11	4			früher häufig beobachtet, in letzter Zeit seltener geworden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Dohle	*Corvus*	*monedula*	2003	2013	**4**		2	1		mässig häufig beobachtet
Kolkrabe	*Corvus*	*corax*	1993	2014	**23**	14	30	18		sehr häufig beobachtet
Star	*Sturnus*	*vulgaris*	1993	1993	**2**	2			Oberbergweide Mitte, Fuss der Holzfluh	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert
Feldsperling	*Passer*	*montanus*	2014	2014	**1**			1	Hemmet, Wiese Ost	häufig beobachtet
Girlitz	*Serinus*	*serinus*	1993	1993	**5**	6				sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert
Stieglitz, Distelfink	*Carduelis*	*carduelis*	1993	2013	**8**	3	6	2		häufig beobachtet
Hänfling	*Carduelis*	*cannabina*	1993	1993	**1**	1			Waldrand Paradies	**selten beobachtet**
Gimpel, Dompfaff	*Pyrrhula*	*pyrrhula*	1993	2003	**8**	7	5			häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren seltener
Kernbeisser	*Coccothraustes*	*coccothraustes*	1993	2003	**2**	1	1		Chalm Oberberg, Wiese Ost , Weide Seidenbergweg	mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig nachgewiesen
Goldammer	*Emberiza*	*citrinella*	1993	2014	**11**	15	8	7		sehr häufig beobachtet
Igel	*Erinaceus*	*europaeus*	2003	2003	**1**		1		Oberbergweide West	wenig häufig beobachtet
Maulwurf	*Talpa*	*europaea*	1993	2003	**14**	6	24			anhand der Spuren sehr häufig festgestellt
Spitzmäuse Familie	*(Soricidae)*	*non det.*	2003	2003	**1**				Roggen, Weide West	selten beobachtet
Feldhase	*Lepus*	*europaeus*	1993	2013	**6**	3	7	1		Sichtbeobachtungen mässig häufig, aber anhand der Spuren häufig nachgewiesen
Eichhörnchen	*Sciurus*	*vulgaris*	1993	1993	**4**	6				häufig beobachtet
Haselmaus	*Muscardinus*	*avellanarius*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfang, **einer von 2 Funden in der R!**	**erst 2 Mal beobachtet**
Wald- od. Gelbhalsmaus (nicht genau bestimmt)	*Apodemus*	*silvaticus cf. flavicollis*	1993	1993	**1**	1			Fuss der Fluh St. Wolfgang	anhand der Spuren mässig häufig festgestellt
Schermaus	*Arvicola*	*terrestris*	1993	2003	**15**	3	25			anhand der Spuren sehr häufig festgestellt
Mauslöcher	*(Mauslöcher)*	*non det.*	2003				21			sehr häufig gefunden
Mäusespuren	*(Mäusespuren)*	*non det.*	2003				11			häufig gefunden
Fuchs	*Vulpes*	*vulpes*	1993	2003	**7**	6	7			mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig festgestellt

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Dachs	*Meles*	*meles*	2003	2014	**6**		4			anhand der Spuren häufig festgestellt
Steinmarder	*Martes*	*foina*	2003	2003	**2**		2		Weide Brachhüsliweg, Böschung Hasenweg	Losung wenig häufig bregistriert, aber wahrscheinlich häufig
Mauswiesel	*Mustela*	*nivalis*	2003	2003	**1**		1		Böschung Hasenweg, **einer von 2 Funden in der Region!**	**erst 2 Mal beobachtet**
Wildschwein	*Sus*	*scrova*	2003	2015	**8**		11	3		anhand der Spuren zunehmend häufiger festgestellt
Gämse	*Rupicapra*	*rupicapra*	1964	2003	**3**	1	2			mässig häufig beobachtet
Reh	*Capreolus*	*capreolus*	1964	2014	**12**	8	8	4		häufig beobachtet und anhand der Spuren festgestellt
BLAUALGEN	**Auswahl**		2003							
Blaualgen-Art	*Nostoc*	*commune*	1993		**3**					mässig viele Fundorte
PILZE	**Auswahl**		2003							
Hexenring (nicht bestimmt)	(Hexenring)	*non det.*	2013		**3**					wenig Fundorte
Parasolpilz	*Macrolepiota*	*procera*	2003		**4**					mässig viele Fundorte
Schirmtintling	*Coprinus*	*comatus*	1993		**1**				Waldrand Alt Berg	viele Fundorte, aber wenig registriert registriert
Körnchenröhrling	*Suillus*	*granulatus*	2003		**1**				Rinderweid	mässig viele Fundorte
Fichten-Blutreizker	*Lactarius*	*deterrimus*	1993		**1**				Von Roll Areal	viele Fundorte, aber wenig häufig registriert
FLECHTEN	**Auswahl**		2003							
Becherflechten-, Rentierflechten-Art	*Cladonia*	*rangiformis*	2003		**4**					mässig viele Fundorte
Schildflechte, Hundsflechte Gattung	*Peltigera*	*sp.*	1993		**1**				Hauensteinmatt	Gattung wenig Fundorte
Gelbflechte (ehemals Schönflechte)	*Xanthoria = Calplaca*	*elegans*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	
Kleinleuchterflechte Gattung	*Candelariella*	*sp.*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	
Gallertflechte	*Collema*	*undulatum*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	
Krätzflechte Gattung	*Lepraria*	*sp.*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
MOOSE	**Auswahl**		1998							
Gedrehtes Glockenhutmoos	*Encalypta*	*streptocarpa = contorta*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	wenig Fundorte, weil nur selten registriert
Moos-Art	*Eucladium*	*verticillatum*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein, bisher nur zwei Funde in der	bisher nur zwei Fundorte registriert
Echtes Kräuselmoos	*Tortella*	*tortuosa*	1989		**3**					viele Fundorte, aber wenig häufig registriert
Mauer-Drehzahnmoos	*Tortula*	*muralis*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	viele Fundorte, aber wenig häufig registriert
Polster-Kissenmoos	*Grimmia*	*pulvinata*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert
Gemeines Spaltmoos	*Schistidium*	*apocarpum*	1989		**2**				Ruine Neu Falkenstein, Fuss der Fluh St. Wolfgang	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert
Drehmoos	*Funaria*	*hygrometrica*	1993		**2**				Von Roll Areal, Schwängimatt, Weide Mitte	mässig viele Fundorte
Haar-Birnmoos	*Bryum*	*capillare*	1989		**2**				Ruine Neu Falkenstein, Fuss der Fluh St. Wolfgang	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Echtes Sternmoos	*Mnium*	*stellare*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	sehr wenig Fundorte, weil selten registriert
Glattes Neckermoos	*Neckera*	*complanata*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	viele Fundorte, aber nur selten registriert
Tannenmoos	*Abietinella*	*abietina*	1998		**14**					viele Fundorte
Echter Wolfsfuss	*Anomodon*	*viticulosus*	1989	2003	**3**					mässig viele Fundorte
Zartes Thujamoos	*Thuidium*	*recognitum aggr. delicatulum*	2003	2003	**27**					viele Fundorte
Thujamoos-Art	*Thuidium*	*philiberti*	2003	2003	**1**				Feuchtwiese Paradies	
Tamarisken-Thujamoos	*Thuidium*	*tamariscinum*	1993	1993	**1**				Wiese Klopfackerweg	wenig Fundorte, weil wenig häufig registriert
Echtes Goldmoos	*Homalothecium*	*lutescens*	1989	2003	**21**					viele Fundorte
Echtes Seidenmoos	*Homalothecium*	*sericeum*	1989	2003	**1**				Ruine Neu Falkenstein	wenig Fundorte
Gelbstengelmoos	*Entodon*	*concinnus*	1993	2003	**10**					mässig viele Fundorte, typisch für Magerwiesen und -weiden
Katzenpfötchen-Moos	*Rhytidium*	*rugosum*	1986	2014	**6**					viele Fundorte
Etagenmoos	*Hylocomium*	*splendens*	2003	2003	**9**					viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Rotstengelmoos	*Pleurozium*	*schreberi*	1993	1993	**1**				Roggen, Weide West	
Sparriges Kranzmoos	*Rhytidiadel-phus*	*squarrosus*	1993	2003	**10**					viele Fundorte
Grosses Kranzmoos	*Rhytidiadelphus*	*triquetrus*	2003	2003	**18**					viele Fundorte
FARNPFLANZEN	**Auswahl**		2003							
Riesen-Schachtelhalm	*Equisetum*	*telmateia*	1993	2003	**1**				Feuchtwiese Paradies	mässig vile Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Sumpf-Schachtelhalm	*Equisetum*	*palustre*	1993	1993	**1**				Goletenkanal	wenig Fundorte
Ruprechtsfarn	*Gymnocarpium*	*robertianum*	1993	2013	**3**					
Gelappter Schildfarn	*Polystichum*	*aculeatum = lobatum*	2003	2003	**1**				Leberen, Chalch- und Wassergraben	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Gewöhnlicher Blasenfarn	*Cystopteris*	*fragilis*	1989	2003	**3**					wenig Fundorte, weil nur wenig häufig registriert
Grüner Streifenfarn	*Asplenium*	*viride*	2003	2003	**1**				Leberen, Chalch- und Wassergraben	wenig Fundorte
Braunstieliger Streifenfarn	*Asplenium*	*trichomanes*	1989	2003	**3**					viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert
Mauerraute	*Asplenium*	*ruta-muraria*	1989	2003	**5**					mässig viele Fundorte
Hirschzunge	*Phyllitis*	*scolopendrium*	2003		**1**				Leberen, Chalch- und Wassergraben	wenig Fundorte
SAMENPFLANZEN	**Auswahl**		1989							
Eibe	*Taxus*	*baccata*	2003		**4**					viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Gewöhnlicher Wacholder	*Juniperus*	*communis*	2003		**3**					viele Fundorte
Sumpf-Dotterblume	*Caltha*	*palustris*	2003		**5**					viele Fundorte
Stinkende Nieswurz	*Helleborus*	*foetidus*	1989		**16**					viele Fundorte
Gewöhnliche Akelei	*Aquilegia*	*vulgaris*	1998		**17**					viele Fundorte
Busch-Windröschen	*Anemone*	*nemorosa*	2003		**11**					sehr viele Fundorte
Scharbockskraut, Feigwurz	*Ranunculus*	*ficaria*	2003		**10**					sehr viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Eisenhutblättriger Hahnenfuss	*Ranunculus*	*aconitifolius*	2003		**1**				Von Roll Areal	wenig Fundorte
Gold-Hahnenfuss	*Ranunculus*	*auricomus*	1998		**6**					viele Fundorte
Knolliger Hahnenfuss	*Ranunculus*	*bulbosus*	1993		**30**					sehr viele Fundorte
Kriechender Hahnenfuss	*Ranunculus*	*repens*	2003							viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Knolliger Hain-Hahnenfuss	*Ranunculus*	*tuberosus = nemorosus*	1993		**5**					viele Fundorte
Sauerdorn	*Berberis*	*vulgaris*	2003		**1**				Rinderweid	mässig viele Fundorte
Klatsch-Mohn	*Papaver*	*rhoeas*	2003		**1**					mässig viele Fundorte
Schöllkraut	*Chelidonium*	*majus*	1989		**5**					mässig viele Fundorte
Hohlknolliger Lerchensporn	*Corydalis*	*cava*	1993		**1**				Von Roll Areal	mässig viele Fundorte
Echter Erdrauch	*Fumaria*	*officinalis*	2003		**1**				Haulen, Wiese Ost	wenig Fundorte
Europäische Haselwurz	*Asarum*	*europaeum*	2003		**6**					viele Fundorte
Flaumeiche	*Quercus*	*pubescens*	2003		**1**				Holzfluh	wenig Fundorte
Feldulme	*Ulmus*	*minor = carpinifolia*	2003		**1**				Fuss der Holzfluh	wenig Fundorte
Walnussbaum	*Juglans*	*regia*	2003		**1**				Weide Seidenbergweg	viele Fundorte
Alpen-Johannisbeere	*Ribes*	*alpinum*	2003		**1**				Schwängimatt, Weide Mitte	wenig Fundorte
Stachelbeere	*Ribes*	*uva-crispa*	1989		**3**					mässig viele Fundorte
Saubohnen-Mauerpfeffer	*Sedum*	*telephium fabaria*	2003		**1**				Goletenkanal	mässig viele Fundorte
Kaukasus-Mauerpfeffer	*Sedum*	*spurium*	2003		**1**				Böschung Oberbergweg	Gartenpflanze, wenig Fundorte
Scharfer Mauerpfeffer	*Sedum*	*acre*	2003		**1**				Von Roll Areal	mässig viele Fundorte
Milder Mauerpfeffer	*Sedum*	*sexangulare*	1998		**9**					viele Fundorte
Dickblättriger Mauerpfeffer	*Sedum*	*dasyphyllum*	2003		**1**				Schwängimatt, Weide Mitte	sehr wenig Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Weisser Mauerpfeffer	*Sedum*	*album*	1989		**6**					mässig viele Fundorte, typisch für felsige Stellen.
Immergrüner Steinbrech	*Saxifraga*	*paniculata = aizoon*	2003		**1**				Ruine Neu Falkenstein	wenig Fundorte
Dreifingriger Steinbrech	*Saxifraga*	*tridactylites*	2003		**1**				Von Roll Areal	wenig Fundorte aber hier oft in grosser Dichte, typisch für Kiesflächen.
Studentenröschen, Herzblatt	*Parnassia*	*palustris*	1993		**3**					mässig viele Fundorte
Waldgeissbart	*Aruncus*	*dioicus = silvester*	2003		**2**				Leberen, Chalch- und Wassergraben, Von Roll	wenig Fundorte
Wiesen-Spierstaude, Mähdesüss	*Filipendula*	*ulmaria*	2003		**3**					viele Fundorte
Gewöhnlicher Odermennig	*Agrimonia*	*eupatoria*	1998		**4**					viele Fundorte
Kleiner Wiesenknopf	*Sanguisorba*	*minor*	1998		**24**					sehr viele Fundorte
Erdbeer-Fingerkraut	*Potentilla*	*sterilis*	1993		**15**					sehr viele Fundorte
Aufrechtes Fingerkraut	*Potentilla*	*erecta*	2003		**8**					viele Fundorte
Frühlings-Fingerkraut	*Potentilla*	*verna = neumanniana*	1993		**19**					viele Fundorte
Wald-Erdbeere	*Fragaria*	*vesca*	1989		**24**					sehr viele Fundorte
Gemeiner Frauenmantel, Gelbgrüner Frauenmantel	*Alchemilla*	*xanthochlora aggr. = vulgaris =*	2003		**8**					viele Fundorte, aber vermutlich oft übersehen
Alpen-Hagrose	*Rosa*	*pendulina*	2003		**2**				Roggen, Weide Ost, Schwängimatt, Weide Süd	wenig Fundorte
Feldrose	*Rosa*	*arvensis*	2003		**5**					mässig viele Fundorte
Birnbaum	*Pyrus*	*piraster*	2003		**5**					viele Fundorte
Apfelbaum	*Malus*	*sylvestris*	2003		**6**					mässig viele Fundorte
Vogelbeerbaum	*Sorbus*	*aucuparia*	2003		**3**					mässig viele Fundorte
Mehlbeerbaum	*Sorbus*	*aria*	2003		**12**					viele Fundorte
Mougeots Mehlbeere	*Sorbus*	*mougeotii*	2003		**2**				Fuss der Holzfluh, Holzfluh	wenig Fundorte
Ovalblättrige Felsenmispel	*Amelanchier*	*ovalis*	1993		**2**				Fuss der Holzfluh, Holzfluh	wenig Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Garten-Steinmispel	*Cotoneaster*	*horizontalis*	2003		**6**					mässig viele Fundorte, unsicher bestimmt
Schwarzdorn, Schlehdorn	*Prunus*	*spinosa*	2003		**9**					viele Fundorte
Felsenkirsche	*Prunus*	*mahaleb*	1993		**4**					in der Region nur wenig Fundorte
Behaarter Ginster	*Genista*	*pilosa*	2003		**1**				Holzfluh, einziger Fundort in der Region	**nur 1 Fundort**
Dornige Hauhechel	*Ononis*	*spinosa*	2003		**1**				Roggen, Weide West	mässig viele Fundorte
Kriechende Hauhechel	*Ononis*	*repens*	1998		**16**					viele Fundorte
Sichelklee	*Medicago*	*falcata*	2013		**1**				Farisberg, untere Weide West	wenig Fundorte
Mittlerer Klee	*Trifolium*	*medium*	2003		**1**				Rinderweid	viele Fundorte
Gelblicher Klee	*Trifolium*	*ochroleucum*	1993		**5**					mässig viele Fundorte
Berg-Klee	*Trifolium*	*montanum*	1998		**9**					viele Fundorte
Gewöhnlicher Wundklee	*Anthyllis*	*vulneraria vulneraria*	2003		**12**					viele Fundorte
Gewöhnlicher Hornklee Wiesen-Schotenklee	*Lotus*	*corniculatus*	2003							sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Gelbe Spargelerbse	*Lotus = Tetragonolobus*	*maritimus*	1993		**5**					
Robinie, Falsche Akazie	*Robinia*	*pseudacacia*	2003							Neophyt, mässig viele Fundorte
Bärenschote	*Astragalus*	*glycyphyllos*	1993		**2**				Roggen, Weide Ost, Hauensteinmatt	wenig Fundorte
Strauchwicke	*Hippocrepis = Coronilla*	*emerus*	1989							mässig viele Fundorte
Schopfiger Hufeisenklee	*Hippocrepis*	*comosa*	1993		**16**					viele Fundorte
Saat-Esparsette	*Onobrychis*	*viciifolia*	2003		**4**					viele Fundorte
Gewöhnliche Vogel-Wicke	*Vicia*	*cracca*	2003		**7**					viele Fundorte
Schmalblättrige Wicke	*Vicia*	*sativa ssp. nigra incl. angustifolia*	1993		**7**					viele Fundorte
Wiesen-Platterbse	*Lathyrus*	*pratensis*	2003							viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Wald-Platterbse	*Lathyrus*	*sylvestris*	1993		**1**				Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig Fundorte
Frühlings-Platterbse	*Lathyrus*	*vernus*	2003		**4**					viele Fundorte
Blut-Weiderich	*Lythrum*	*salicaria*	1993		**4**					viele Fundorte
Wald-Weidenröschen	*Epilobium*	*angustifolium*	2003		**1**				Schwängimatt, Weide West	mässig viele Fundorte
Rosmarinblättriges Weidenröschen	*Epilobium*	*dodonaei*	1993		**2**				Fuss der Fluh St. Wolfgang, Von Roll Areal	wenig Fundorte, fast ausschlieslich in Kiesgruben
Behaartes Weidenröschen	*Epilobium*	*hirsutum*	2003		**5**					viele Fundorte
Lamarcks Nachtkerze	*Oenothera*	*glazoviana = erythrosepala*	2003		**2**				Fuss der Holzfluh, Von Roll Areal	mässig viele Fundorte
Fiederblättrige Pimpernuss	*Staphylea*	*pinnata*	2003		**1**				Waldrand Alt Berg	
Sauerklee, Kuckucksklee	*Oxalis*	*acetosella*	2003							viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	*Linum*	*catharticum*	1998		**9**					viele Fundorte
Flachs	*Linum*	*usitatissimum*	1993		**1**				Waldrand Alt Berg	wenig Fundorte in der Region
Rupprechtskraut Stinkender Storchenschnabel	*Geranium*	*robertianum*	1993							sehr viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert
Wald-Storchenschnabel	*Geranium*	*sylvaticum*	2003		**4**					mässig viee Fundorte, bes. in höheren Lagen des Juras
Tauben-Storchenschnabel	*Geranium*	*columbinum*	2003		**2**				Weide Brachhüsliweg, Hauensteinmatt	viele Fundorte
Drüsentragendes Springkraut	*Impatiens*	*glandulifera*	1993		**3**					Neophyt, mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Buchsblättrige Kreuzblume	*Polygala*	*chamaebuxus*	1986		**6**					im Thal und am Jura-Südfuss bis Egerkingen häufig, fehlt weiter östlich
Bittere Kreuzblume	*Polygala*	*amarella*	1998		**10**					viele Fundorte
Gewöhnliche Kreuzblume	*Polygala*	*vulgaris vulgaris*	2003		**6**					viele Fundorte
Kornelkirsche	*Cornus*	*mas*	2013		**1**				Fuss der Holzfluh	wenig Fundorte, dann aus Gärten verwildert
Europäische Sanikel	*Sanicula*	*europaea*	1993		**1**				Chalm Oberberg, Wiese Ost	wenig Fundorte
Gelbfrüchtiger Kälberkopf	*Chaerophyllum*	*aureum*	2003		**1**				Fuss der Fluh St. Wolfgang	viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Echter Kümmel	*Carum*	*carvi*	1998		**7**					viele Fundorte
Grosse Bibernelle	*Pimpinella*	*major*	1993							viele Fundorte , aber nur wenig häufig egistriert
Kleine Bibernelle	*Pimpinella*	*saxifraga*	1998		**19**					viele Fundorte
Hirschheil-Bergfenchel	*Seseli*	*libanotis*	1993		**3**					wenig Fundorte
Silgenähnlicher Rosskümmel	*Silaum*	*silaus*	1993		**7**					mässig viele Fundorte
Wilde Brustwurz	*Angelica*	*sylvestris*	2003		**3**					viele Fundorte
Hirschwurz	*Peucedanum*	*cervaria*	2003		**2**				Hemmet, Wiese Ost, Farisberg, untere Weide	mässig viele Fundorte
Gewöhnlicher Pastinak	*Pastinaca*	*sativa*	1993		**2**				Südliche Bahnböschung, Von Roll Areal	wenig Fundorte, in Brachäckern angesät
Jura-Bärenklau	*Heracleum*	*sphondylium alpinum*	2003		**1**				Rinderweid	nur in hohen Lagen des Juras, wenig Fundorte
Breitblättriges Laserkraut	*Laserpitium*	*latifolium*	1993		**2**				Fuss der Holzfluh, Holzfluh	mässig viele Fundorte
Wilde Möhre	*Daucus*	*carota*	2003		**22**					viele Fundorte
Stechpalme	*Ilex*	*aquifolium*	2003		**6**					viele Fundorte
Pfaffenhütchen	*Euonymus*	*europaea*	2003		**8**					viele Fundorte
Purgier-Kreuzdorn	*Rhamnus*	*cathartica*	2003		**5**					viele Fundorte
Alpen-Kreuzdorn	*Rhamnus*	*alpinus*	1993		**9**					mässig viele Fundorte
Faulbaum, Pulverholz	*Frangula*	*alnus*	2003		**3**					viele Fundorte
Pyrenäen-Bergflachs	*Thesium*	*pyrenaicum*	1993		**3**					wenig Fundorte
Alpen-Bergflachs	*Thesium*	*alpinum*	1993		**4**					mässig viele Fundorte
Bayrischer Bergflachs	*Thesium*	*bavarum*	2003		**1**				Waldrand Alt Berg	wenig Fundorte
Weisse Mistel	*Viscum*	*album*	2003		**2**				Fuss der Holzfluh, Oberbergweide Mitte	mässig viele Fundorte
Ausdauerndes Bingelkraut	*Mercurialis*	*perennis*	1993							viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Süsse Wolfsmilch	*Euphorbia*	*dulcis*	2003		**6**					viele Fundorte
Warzige Wolfsmilch	*Euphorbia*	*verrucosa*	1998		**19**					viele Fundorte
Mandelblättrige Wolfsmilch	*Euphorbia*	*amygdaloides*	1993		**12**					viele Fundorte
Gew. Seidelbast, Zilande	*Daphne*	*mezereum*	1964		**2**				Farisberg, Rand der Klus, Feuchtwiese Paradies	mässig viele Fundorte
Lorbeer-Seidelbast	*Daphne*	*laureola*	2003		**1**				Rinderweid	viele Fundorte
Behaartes Johanniskraut	*Hypericum*	*hirsutum*	2003		**8**					viele Fundorte
Berg-Johanniskraut	*Hypericum*	*montanum*	1989		**2**				Ruine Neu Falkenstein, Roggen, Weide Ost	mässig viele Fundorte
Echtes Johanniskraut	*Hypericum*	*perforatum*	1989		**22**					sehr viele Fundorte
Scharfkantiges Johanniskraut	*Hypericum*	*tetrapterum*	2003		**2**				Alter Steinbruch Mümliswiler Klus, Feuchtwiese Paradies	in Feuchtlebensräumen, mässig viele Fundorte
Rauhhaariges Veilchen	*Viola*	*hirta*	1989		**23**					sehr viele Fundorte
Wald-Veilchen	*Viola*	*reichenbachiana = sylvestris*	1993		**5**					viele Fundorte
Ovalblättriges Sonnenröschen	*Helianthemum*	*nummularium ssp. obscurum*	1993		**8**					viele Fundorte
Knoblauchhederich, Lauchkraut	*Alliaria*	*petiolata*	2003		**7**					viele Fundorte
Echte Nachtviole	*Hesperis*	*matronalis*	2003		**1**				Ruine Neu Falkenstein	wenig Fundorte
Gewöhnliche Winterkresse	*Barbarea*	*vulgaris*	2003		**1**				Leberen, Chalch- und Wassergraben	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Echte Brunnenkresse	*Nasturtium*	*officinale*	1998		**1**				Farisberg, untere Weide West	wenig Fundorte
Bitteres Schaumkraut	*Cardamine*	*amara*	1998		**2**				Fuss der Holzfluh , Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	wenig Fundorte
Wiesen-Schaumkraut	*Cardamine*	*pratensis*	2003		**12**					sehr viele Fundorte
Wald-Schaumkraut	*Cardamine*	*flexuosa*	1993		**2**				Rinderweid, Hauensteinmatt	wenig Fundorte
Behaartes Schaumkraut	*Cardamine*	*hirsuta*	1993		**5**					sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Fieder-Zahnwurz	*Cardamine = Dentaria*	*heptaphylla*	2003		**6**					mässig viele Fundorte , aber oft in grosser Anzahl

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Finger-Zahnwurz	*Cardamine = Dentaria*	*pentaphyllos*	2003		**2**				Von Roll Areal, Roggen, Weide Ost	wenig Fundorte , aber lokal oft in grosser Anzahl
Turm-Gänsekresse	*Arabis*	*turrita*	1993		**4**					mässig viele Fundorte
Alpen-Gänsekresse	*Arabis*	*alpina*	1989		**3**					mässig viele Fundorte
Rauhhaarige Gänsekresse	*Arabis*	*hirsuta*	1993		**11**					viele Fundorte
Felsen-Gänsekresse	*Arabis*	*nova*	2003		**1**				Leberen, Chalch- und Wassergraben	**wenig Fundorte**
Garten-Monviole, Zweijährige Mondviole, Silberling	*Lunaria*	*annua*	2013		**1**				Fuss der Fluh St. Wolfgang	Gartenpflanze, wenig Fundorte in der Natur
Kelch-Steinkresse	*Alyssum*	*alyssoides*	1998		**1**				Farisberg, untere Weide West	mässig viele Fundorte
Immergrünes Felsenblümchen	*Draba*	*aizoides*	1989		**2**				Ruine Neu Falkenstein, Holzfluh	wenig Fundorte
Frühlings-Hungerblümchen	*Erophila*	*verna*	1993		**5**					mässig häufig nachgewiesen, aber vermutlich häufig
Felsen-Kugelschötchen	*Kernera*	*saxatilis*	1989		**2**				Ruine Neu Falkenstein, Holzfluh	wenig Fundorte
Durchwachsenes Täschelkraut	*Thlaspi*	*perfoliatum*	1993							häufig, aber meist nicht inventarisiert
Virginische Kresse	*Lepidium*	*virginicum*	1993 1		**1**				Von Roll Areal	wenig Fundorte, typisch für Sand- und Kiesflächen.
Gelbe Resede	*Reseda*	*lutea*	2003		**2**				Von Roll Areal, Schwängimatt, Weide West	mässig viele Fundorte, wichtig als Nahrungsquelle für spezialisierte Bienenarten
Korb-Weide	*Salix*	*viminalis*	2003		**1**				Von Roll Areal	mässig viele Fundorte
Primel, Stengellose Schlüsselblume	*Primula*	*vulgaris*	1993		**4**					mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert
Wald-Schlüsselblume	*Primula*	*elatior*	2003		**8**					viele Fundorte
Frühlings-Schlüsselblume	*Primula*	*veris*	1993		**23**					sehr viele Fundorte
Pfennigkraut	*Lysimachia*	*nummularia*	2003							viele Fundorte, aber meist nicht inventarisiert
Gewöhnlicher Gilbweiderich	*Lysimachia*	*vulgaris*	1993		**3**					mässig viele Fundorte
Punktierter Gilbweiderich	*Lysimachia*	*punctata*	2013		**1**				Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig Fundorte
Quendelblättriges Sandkraut	*Arenaria*	*serpyllifolia*	2003		**4**					mässig viele Fundorte, typisch für sehr magere Stellen.

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Moos-Nabelmiere	*Moehringia*	*muscosa*	1993		**3**					mässig viele Fundorte
Mittlere Sternmiere	*Stellaria*	*media*	1993							sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Echtes Seifenkraut	*Saponaria*	*officinalis*	1993		**2**				Alter Steinbruch Mümliswiler Klus, Südliche Bahnbösch.	mässig viele Fundorte
Prachtnelke	*Dianthus*	*superbus*	1993		**1**				Roggen, Weide West	**wenig Fundorte**
Grenobler Nelke	*Dianthus*	*gratianopoli-tanus*	1993		**2**				Ruine Neu Falkenstein, Holzfluh	mässig viele Fundorte
Rote Waldnelke	*Silene*	*dioeca*	2003		**1**				Roggen, Weide Ost	viele Fundorte
Nickendes Leimkraut	*Silene*	*nutans*	2003		**4**					mässig viele Fundorte
Kuckucks-Lichtnelke	*Lychnis*	*flos-cuculi*	2013		**1**				Chalm Oberberg, Wiese Ost	viele Fundorte
Schildampfer	*Rumex*	*scutatus*	1993		**2**				Fuss der Holzfluh, Fuss der Fluh St. Wolfgang	in der Region nur am Fuss der Holzfluh,und in St. Wolfang gefunden
Schlangen-Knöterich	*Polygonum*	*bistorta*	2003		**3**					mässig viele Fundorte
Zugespitzter Knöterich	*Reynoutria*	*japonica*	2003		**1**				Wiese Klopfackerweg	Neophyt, mässig viele Fundorte
Echtes Tausenguldenkraut	*Centaurium*	*erythraea*	2003		**3**					mässig viele Fundorte
Gelber Enzian	*Gentiana*	*lutea*	2003		**2**				Feuchtwiese Paradies, Oberbergweide West	viele Fundorte
Frühlings-Enzian	*Gentiana*	*verna*	1993		**7**					mässig viele Fundorte
Gefranster Enzian	*Gentiana*	*ciliata*	2003		**2**				Schwängimatt, Weide West, Schwängimatt, Weide Mitte	mässig viele Fundorte
Deutscher Enzian	*Gentiana*	*germanica*	1993		**5**					mässig viele Fundorte
Singrün, Kleines Immergrün	*Vinca*	*minor*	1993		**5**					mässig viele Fundorte
Schwalbenwurz	*Vincetoxicum*	*hirundinaria*	1993		**9**					viele Fundorte
Hügelmeister, Hundsmeister	*Asperula*	*cynanchica*	1998		**6**					viele Fundorte
Gewöhnliches Kreuzlabkraut	*Cruciata*	*laevipes*	2003		**4**					viele Fundorte
Echtes Labkraut	*Galium*	*verum*	1998		**10**					viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Waldmeister	*Galium*	*odoratum*	2003		**8**					viele Fundorte
Sumpf-Labkraut	*Galium*	*palustre*	2003		**1**				Feuchtwiese Paradies	wenig Fundorte
Niedriges Labkraut	*Galium*	*pumilum*	2003		**6**					viele Fundorte
Zwerg-Holunder, Attich	*Sambucus*	*ebulus*	2003		**6**					mässig viele Fundorte
Alpen-Geissblatt	*Lonicera*	*alpigena*	2003		**2**				Schwängimatt, Weide Süd, Schwängimatt, Weide Mitte	mässig viele Fundorte
Nüsslisalat-Artkomplex	*Valerianella*	*locusta s.l.*	1993		**10**					viele Fundorte
Echter Baldrian	*Valeriana*	*officinalis*	2003		**14**					viele Fundorte
Hügel-Baldrian	*Valeriana*	*wallrothii*	2003		**3**					mässig viele Fundorte, aber icht alle Funde sicher von V. officinalis abgegrenzt
Zweihäusiger Baldrian	*Valeriana*	*dioeca*	2003		**5**					mässig viele Fundorte
Berg-Baldrian	*Valeriana*	*montana*	2003		**1**				Schwängimatt, Weide Mitte	wenig Fundorte
Wilde Karde	*Dipsacus*	*fullonum = silvestris*	1998		**1**				Farisberg, untere Weide West	viele Fundorte
Teufelsabbiss, Abbisskraut	*Succisa*	*pratensis*	1993		**9**					viele Fundorte
Acker-Witwenblume	*Knautia*	*arvensis*	1998		**18**					sehr viele Fundorte
Wald-Witwenblume	*Knautia*	*dipsacifolia*	2003		**5**					viele Fundorte
Tauben-Skabiose	*Scabiosa*	*columbaria*	1989		**17**					viele Fundorte
Acker-Winde	*Convolvulus*	*arvensis*	2003							viele Fundorte , aber meist nicht inventarisiert
Grosse Winde	*Calystegia*	*sepium*	2003		**1**				Weide Seidenbergweg	viele Fundorte
Echte Hundszunge	*Cynoglossum*	*officinale*	1993		**3**					wenig Fundorte
Wald-Vergissmeinnicht	*Myosotis*	*sylvatica*	2003		**7**					viele Fundorte
Acker-Vergissmeinnicht	*Myosotis*	*arvensis*	2003							viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Gewöhnlicher Natterkopf	*Echium*	*vulgare*	1993		**2**				Von Roll Areal, Schwängimatt, Weide West	mässig viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Dunkelgrünes Lungenkraut	*Pulmonaria*	*obscura*	2003		**1**				Von Roll Areal	viele Fundorte, aber oft nicht inventarisiert
Gewöhnliche Tollkirsche	*Atropa*	*bella-donna*	1993		**3**					wenig Fundorte
Sommerflieder	*Buddleja*	*davidii*	2003		**1**				Fuss der Fluh St. Wolfgang	Neophyt, mässig viele Fundorte
Schwarze Königskerze	*Verbascum*	*nigrum*	2003		**2**				Ruine Neu Falkenstein, Von Roll Areal	mässig viele Fundorte
Grossblütige Königskerze	*Verbascum*	*densiflorum*	2003		**1**				Weide Brachhüsliweg	wenig häufig nachgewiesen, aber vermutlich häufig
Knotige Braunwurz	*Scrophularia*	*nodosa*	1993		**7**					viele Fundorte
Gewöhnliches Leinkraut	*Linaria*	*vulgaris*	2003		**3**					viele Fundorte
Zimbelkraut, Mauer-Leinkraut	*Cymbalaria*	*muralis*	1989		**3**					wenig Fundorte
Kleines Leinkraut	*Chaenorrhinum*	*minus*	2003		**1**				Von Roll Areal	wenig Fundorte
Gelber Fingerhut	*Digitalis*	*lutea*	1993		**3**					mässig viele Fundorte
Grosser Ehrenpreis	*Veronica*	*teucrium*	1998		**11**					viele Fundorte
Bachbungen-Ehrenpreis	*Veronica*	*beccabunga*	2003		**2**				Feuchtwiese Paradies, Farisberg, untere Weide	mässig viele Fundorte
Echter Ehrenpreis	*Veronica*	*officinalis*	2003		**2**				Weide Seidenbergweg, Leberen, Chalch- und	mässig viele Fundorte
Feld-Ehrenpreis	*Veronica*	*arvensis*	1993		**2**				Waldrand Paradies, Haulen, Wiese Ost	nur wenige Fundorte registriert
Efeublättriger Ehrenpreis	*Veronica*	*hederifolia*	1993		**2**				Haulen, Wiese West, Südliche Bahnböschung	viele Fundorte
Wiesen-Augentrost Gebräuchlicher Augentrost	*Euphrasia*	*rostkoviana*	1993		**4**					viele Fundorte
Kleiner Klappertopf	*Rhinanthus*	*minor*	2003		**5**					viele Fundorte
Behaarter Klappertopf	*Rhinanthus*	*alectorolophus*	2003		**3**					viele Fundorte
Gewöhnliche Sommerwurz	*Orobanche*	*caryophyllacea*	2003		**5**					mässig viele Fundorte
Sommerwurz Gattung	*Orobanche*	*sp.*	1993		**6**					viele Fundorte
Herzblättrige Kugelblume	*Globularia*	*cordifolia*	1993		**7**					mässig viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Mittlerer Wegerich	*Plantago*	*media*	2003		**12**					viele Fundorte
Echtes Eisenkraut	*Verbena*	*officinalis*	2003		**4**					viele Fundorte
Berg-Gamander	*Teucrium*	*montanum*	1993		**5**					mässig viele Fundorte
Echter Gamander	*Teucrium*	*chamaedrys*	1993		**6**					viele Fundorte
Gundelrebe	*Glechoma*	*hederacea*	1993							sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Grosse Brunelle	*Prunella*	*grandiflora*	1998		**6**					viele Fundorte
Immenblatt, Waldmelisse	*Melittis*	*melissophyllum*	2003		**5**					viele Fundorte
Schmalblättriger Hohlzahn	*Galeopsis*	*angustifolia*	1993		**3**					wenig Fundorte, typisch für Grob-Kiesflächen
Gefleckte Taubnessel	*Lamium*	*maculatum*	1993		**8**					viele Fundorte
Purpurrote Taubnessel	*Lamium*	*purpureum*	1993							viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Berg-Goldnessel	*Lamium = Lamiastrum*	*galeoptolon montanum*	2003		**9**					viele Fundorte
Alpenziest	*Stachys*	*alpina*	1993		**7**					viele Fundorte
Aufrechter Ziest	*Stachys*	*recta*	1993		**4**					mässig viele Fundorte
Echte Betonie	*Stachys = Betonica*	*officinalis*	1998		**9**					viele Fundorte
Klebrige Salbei	*Salvia*	*glutinosa*	1993		**1**				Waldrand Alt Berg	mässig viele Fundorte
Wiesen-Salbei	*Salvia*	*pratensis*	1998		**11**					viele Fundorte
Wald-Bergminze = Echter Bergthymian	*Calamintha*	*menthifolia = sylvatica*	1993		**6**					viele Fundorte
Feld-Kalaminthe, Steinquendel	*Acinos*	*arvensis*	1993		**4**					mässig viele Fundorte , typisch für sehr magere, meist felsige Stellen
Echter Dost, Wilder Majoran	*Origanum*	*vulgare*	1989		**12**					viele Fundorte
Arznei-Feld-Thymian	*Thymus*	*pulegioides*	1998		**19**					sehr viele Fundorte
Gebirgs-Feld-Thymian Alpen-Thymian	*Thymus*	*praecox polytrichus*	2003		**1**				Fuss der Holzfluh	wenig Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Acker-Minze	*Mentha*	*arvensis*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	wenig Fundorte
Wasser-Minze	*Mentha*	*aquatica*	2003		**1**				Fischteich Haulenrain ("Leisiweiher")	in Feuchtlebensräumen, mässig viele Fundorte
Wasserstern Gattung	*Callitriche*	*sp.*	1993		**1**				Waldrand Alt Berg	wenig Fundorte
Büschel-Glockenblume	*Campanula*	*glomerata*	1998		**10**					viele Fundorte
Kleine Glockenblume	*Campanula*	*cochleariifolia*	2003		**1**					**wenig Fundorte**
Rundblättrige Glockenblume	*Campanula*	*rotundifolia*	1989		**21**					sehr viele Fundorte
Pfirsichblättrige Glockenblume	*Campanula*	*persicifolia*	1993		**8**					mässig viele Fundorte
Acker-Glockenblume	*Campanula*	*rapunculoides*	1993		**6**					viele Fundorte
Rundköpfige Rapunzel	*Phyteuma*	*orbiculare*	2003		**1**				Rinderweid	wenig Fundorte
Ährige Rapunzel	*Phyteuma*	*spicatum*	1993		**9**					viele Fundorte
Wasserdost	*Eupatorium*	*cannabinum*	2003		**7**					viele Fundorte
Grauer Alpendost	*Adenostyles*	*alliariae*	2003		**1**				Schwängimatt, Weide Mitte	
Echte Goldrute	*Solidago*	*virgaurea virgaurea*	2003		**3**					viele Fundorte
Kanadische Goldrute	*Solidago*	*canadensis*	2003		**1**				Von Roll Areal	mässig viele Fundorte
Alpenmasslieb = Michelis Sternlieb	*Aster*	*bellidiastrum*	1993		**3**					mässig viele Fundorte
Berg-Aster	*Aster*	*amellus*	1998		**2**				Fuss der Holzfluh	mässig viele Fundorte
Kanadisches Berufkraut	*Conyza*	*canadensis*	2003		**1**				Von Roll Areal	wenig Fundorte
Scharfes Berufkraut	*Erigeron*	*acer acer*	2003		**1**				Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig Fundorte
Einjähriges Berufkraut	*Erigeron*	*annuus annuus*	2003							mässig viele Fundorte , aber lokal oft sehr häufig, meist nicht inventarisiert
Zweihäusiges Katzenpfötchen	*Antennaria*	*dioeca*	1993		**1**				Schwängimatt, Weide Mitte	
Dürrwurz	*Inula*	*conyza*	1998		**5**					mässig viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Weiden-Alant	*Inula*	*salicina*	1993		**1**				Waldrand Oberberg	wenig Fundorte, aber hier oft in dichten Beständen
Färber-Hundskamille	*Anthemis*	*tinctoria*	1993		**1**				Von Roll Areal	wenig Fundorte, aus Gärten verwildert oder angesät
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	*Leucanthemum*	*vulgare*	1998		**24**					sehr viele Fundorte
Rainfarn	*Tanacetum*	*vulgare*	1993		**1**				Waldrand Alt Berg	wenig Fundorte
Gewöhnlicher Beifuss	*Artemisia*	*vulgaris*	2003		**1**				Von Roll Areal	wenig Fundorte
Huflattich	*Tussilago*	*farfara*	1993		**7**					viele Fundorte
Gewöhnliche Pestwurz	*Petasites*	*hybridus*	2003		**1**				Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Weisse Pestwurz	*Petasites*	*albus*	2013		**1**				Oberbergweide West	wenig Fundorte, aber nicht alle registriert, weil ausserhalb meiner Beobchtungsorte
Fuchs' Kreuzkraut Fuchs' Greiskraut	*Senecio*	*ovatus = fuchsii Gmelin*	2003		**1**				Leberen, Chalch- und Wassergraben	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Raukenblättriges Kreuzkraut	*Senecio*	*erucifolius*	2003		**4**					viele Fundorte
Gewöhnliche Eberwurz, Golddistel	*Carlina*	*vulgaris*	1993		**1**				Farisberg, untere Weide West	viele Fundorte
Silberdistel = Einf. Eberwurz	*Carlina*	*acaulis ssp. caulescens =*	1998		**12**					viele Fundorte
Bergdistel	*Carduus*	*defloratus*	1993		**4**					mässig viele Fundorte
Krause Distel	*Carduus*	*crispus*	2013		**2**				Haulen, Wiese West, Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig Fundorte
Wollköpfige Kratzdistel	*Cirsium*	*eriophorum*	1993		**1**				Hauensteinmatt	**wenig Fundorte**
Sumpf-Kratzdistel	*Cirsium*	*palustre*	2003		**4**					viele Fundorte
Stengellose Kratzdistel	*Cirsium*	*acaule*	1998		**15**					viele Fundorte
Knollige Kratzdistel	*Cirsium*	*tuberosum*	2003		**2**				Schwängimatt, Wiese Nord, Weide Brachhüsliweg	mässig viele Fundorte
Kohldistel	*Cirsium*	*oleraceum*	2003		**5**					viele Fundorte
Berg-Flockenblume	*Centaurea*	*montana*	2003		**1**				Rinderweid	wenig Fundorte
Skabiosen-Flockenblume	*Centaurea*	*scabiosa*	1989		**10**					viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Wiesen-Flockenblume	*Centaurea*	*jacea s.l.*	1998		**17**					sehr viele Fundorte
Wiesen-Flockenblume	*Centaurea*	*jacea jacea*	2003		**3**					sehr viele Fundorte
Schmalblättrige Flockenblume	*Centaurea*	*jacea angustifolia*	1998		**10**					mässig viele Fundorte
Wegwarte, Zichorie	*Cichorium*	*intybus*	1998		**4**					viele Fundorte
Herbst-Löwenzahn	*Leontodon*	*autumnalis*	2003		**4**					
Gew. Rauhes Milchkraut	*Leontodon*	*hispidus*	1998		**12**					sehr sehr viele Fundorte
Habichtskrautart. Bitterkraut	*Picris*	*hieracioides*	2003		**1**				Weide Brachhüsliweg	sehr viele Fundorte, nur wenig häufig inventarisiert
Östlicher Wiesen-Bocksbart	*Tragopogon*	*orientalis*	1998		**8**					viele Fundorte
Glattes Pfaffenröhrlein	*Taraxacum*	*laevigatum*	2003		**4**					mässig viele Fundorte
Mauerlattich	*Mycelis*	*muralis*	1989		**1**				Ruine Neu Falkenstein	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert
Pippau Gattung	*Crepis*	*sp.*	2013		**2**				Schwängimatt, Wiese Süd, Schwängimatt, Wiese West	
Abgebissener Pippau	*Crepis*	*praemorsa*	1993		**9**					mässig viele Fundorte, **beachtenswerte Art!**
Langhaariges Habichtskraut	*Hieracium*	*pilosella*	1993		**10**					viele Fundorte
Öhrchen-Habichtskraut	*Hieracium*	*lactucella*	2003		**5**					viele Fundorte
Stengelumfassendes Habichtskraut	*Hieracium*	*amplexicaule*	2003		**1**				Ruine Neu Falkenstein	wenig Fundorte
Niedriges Habichtskraut	*Hieracium*	*humile*	2003		**2**				Ruine Neu Falkenstein, Fuss der Holzfluh	wenig Fundorte
Wald-Habichtskraut, Mauer-Habichtskraut	*Hieracium*	*sylvaticum*	2003							viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Kanadische Wasserpest	*Elodea*	*canadensis*	2003		**1**				Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte, aber hier meist in dichten Beständen
Herbstzeitlose	*Colchicum*	*autumnale*	1993		**20**					viele Fundorte
Ästige Graslilie	*Anthericum*	*ramosum*	2003		**5**					mässig viele Fundorte
Weinberg-Lauch	*Allium*	*vineale*	2003		**3**					viele Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Bärlauch	*Allium*	*ursinum*	2003							sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert
Rosslauch	*Allium*	*oleraceum*	1998		**11**					viele Fundorte
Türkenbundlilie	*Lilium*	*martagon*	1993		**4**					mässig viele Fundorte, **nach NHV geschützt**
Schachblume	*Fritillaria*	*meleagris*	2014		**1**				Schwängimatt, Wiese West	
Traubige Bisamhyazinthe	*Muscari*	*racemosum*	1993		**4**					mässig viele Fundorte
Vielblütige Weisswurz	*Polygonatum*	*multiflorum*	2003							im Wald viele Fundorte
Echtes Salomonssiegel	*Polygonatum*	*odoratum*	2003		**4**					mässig viele Fundorte
Maiglöckchen, Maienriesli	*Convallaria*	*majalis*	2003		**4**					mässig viele Fundorte, **im Kanton Solothurn geschützt.**
Vierblättrige Einbeere	*Paris*	*quadrifolia*	2003							viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert
Märzenglöcklein, Hegerli, Frühlings-Knotenblume	*Leucojum*	*vernum*	2003		**1**				Waldrand Alt Berg	wenig Fundorte
Osterglocke, Gelbe Narzisse	*Narcissus*	*pseudo-narcissus*	2003		**2**				(geflanzt) Wiese Klopfackerweg,	Gartenpflanze, mässig viele Fundorte in der Natur, aber ausgeflanzt
Poeten-, Weisse Narzisse	*Narcissus*	*poeticus*	2015		**1**				Schwängimatt, Wiese Süd	
Weissblütiger Safran	*Crocus*	*albiflorus*	2003		**1**				Rinderweid	wenig Fundorte
Gelbe Schwertlilie	*Iris*	*pseudacorus*	2003		**2**				Goletenkanal , Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	mässig viele Fundorte
Langblättriges Waldvögelein	*Cephalanthera*	*longifolia*	2003		**1**				Schwängimatt, Weide Mitte	wenig Fundorte
Dunkelrote Sumpfwurz	*Epipactis*	*atrorubens*	2003		**1**				Schwängimatt, Weide Mitte	wenig Fundorte
Grosses Zweiblatt	*Listera*	*ovata*	1993		**3**					mässig viele Fundorte, **nach NHV geschützt**
Vogelnestwurz	*Neottia*	*nidus-avis*	2003		**4**					mässig viele Fundorte
Zweiblättriges Breitkölbchen	*Platanthera*	*bifolia*	1993		**3**					mässig viele Fundorte, **nach NHV geschützt**
Grünliches Breitkölbchen	*Platanthera*	*chlorantha*	1993		**2**				Oberbergweide West, Chalm Oberberg, Wiese Ost	mässig viele Fundorte, **nach NHV geschützt**
Grüne Hohlzunge	*Coeloglossum*	*viride*	1993		**4**					wenig Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Mücken-Handwurz	*Gymnadenia*	*conopsea*	1993		**11**					viele Fundorte, **nach NHV geschützt**
Wohlriechende Handwurz	*Gymnadenia*	*odoratissima*	2013		**1**				Oberbergweide West	wenig Fundorte, **nach NHV geschützt**
Geflecktes Knabenkraut	*Dactylorhiza*	*maculata* s.l.	1993		**9**					viele Fundorte, **nach NHV geschützt**
Breitblättrige Orchis	*Dactylorhiza*	*majalis*	2013		**2**				Schwängimatt, Wiese Wese, Schwängimatt, Weide Mitte	sehr wenig Fundorte
Hummel-Ragwurz	*Ophrys*	*holosericea*	1993		**2**				Oberbergweide West, Oberbergweide Mitte	wenig Fundorte, **im Kanton Solothurn geschützt.**
Bienen-Ragwurz	*Ophrys*	*apifera*	2003		**2**				Oberbergweide West, Oberbergweide Mitte	wenig Fundorte
Kleine Orchis	*Orchis*	*morio*	1993		**3**					mässig viele Fundorte
Angebrannte Orchis	*Orchis*	*ustulata*	1993		**3**					wenig Fundorte
Helm-Orchis	*Orchis*	*militaris*	1993		**1**				Oberbergweide West	mässig viele Fundorte, **im Kanton Solothurn geschützt.**
Männliche Orchis	*Orchis*	*mascula*	1993		**15**					viele Fundorte, **nach NHV geschützt**
Spitzorchis, Pyramidenorchis	*Anacamptis*	*pyramidalis*	1993		**5**					mässig viele Fundorte, **nach NHV geschützt**
Feld-Hainsimse	*Luzula*	*campestris*	1993		**12**					viele Fundorte
Waldsimse	*Scirpus*	*sylvaticus*	2003		**2**				Feuchtwiese Paradies, Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Seebinse	*Schoeno-plectus*	*lacustris*	2003		**1**				Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte
Davalls Segge	*Carex*	*davalliana*	1993		**1**				Feuchtwiese Paradies	wenig Fundorte
Gedrängtährige Segge	*Carex*	*spicata = muricata*	1993		**1**				Hauensteinmatt	sehr wenig Fundorte und meist nicht sicher bestimmt
Pairas Segge	*Carex*	*pairaei = muricata*	2003		**4**					mässig viele Fundorte
Entferntährige Segge	*Carex*	*divulsa = muricata*	2003		**2**				Hauensteinmatt, Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig Fundorte
Abgerücktährige Segge	*Carex*	*remota*	2003		**1**				Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	mässig viele Fundorte, aber oft nicht registriert
Schatten-Segge	*Carex*	*umbrosa*	1993		**1**				Älibuch	
Berg-Segge	*Carex*	*montana*	1993		**14**					viele Fundorte und oft in grosser Dichte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Frühlings-Segge	*Carex*	*caryophyllea*	1993		**9**					viele Fundorte, typisch für Magerrasen
Bleiche Segge	*Carex*	*pallescens*	2003		**2**				Schwängimatt, Weide Mitte, Roggen, Weide Ost	wenig Fundorte
Hängende Segge	*Carex*	*pendula*	2003		**1**					mässig viele Fundorte und meist nicht inventarisiert
Schlaffe Segge	*Carex*	*flacca*	1993		**15**					viele Fundorte
Hirsenfrüchtige Segge	*Carex*	*panicea*	1993		**5**					mässig viele Fundorte
Weisse Segge	*Carex*	*alba*	1993		**5**					mässig viele Fundorte, hier oft in grosser Dichte
Niedrige Segge	*Carex*	*humilis*	1986		**2**				Fuss der Holzfluh, Fuss der Fluh St. Wolfgang	wenig Fundorte
Gefingerte Segge	*Carex*	*digitata*	2003							viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert
Vogelfuss-Segge	*Carex*	*ornithopoda*	2003		**2**				Waldrand Alt Berg, Fuss der Holzfluh	mässig viele Fundorte, aber wahrscheinlich oft übersehen
Scharfkantige Segge	*Carex*	*acutiformis*	2003		**2**				Goletenkanal, Feuchtwiese Paradies	mässig viele registrierte Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Verzweigter Igelkolben	*Sparganium*	*erectum*	2003		**1**				Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	mässig viele Fundorte
Aufrechte Trespe	*Bromus*	*erectus*	1998		**18**					sehr viele Fundorte
Hoher Schwingel	*Festuca*	*altissima*	2008							meist nicht inventarisiert
Rot-Schwingel	*Festuca*	*rubra*	2003							viele Fundorte registriert, wahrscheinlich sehr viele
Schaf-Schwingel	*Festuca*	*ovina*	1998		**2**				Fuss der Holzfluh , Von Roll Areal	mässig viele Fundorte
Mäuse-Federschwingel	*Vulpia*	*myuros*	1993		**1**				Von Roll Areal	sehr wenig Fundorte, typisch für Sand- und Kiesflächen
Fieder-Zwenke	*Brachypodium*	*pinnatum*	2003		**4**					viele Fundorte
Gefaltetes Süssgras	*Glyceria*	*plicata*	2003		**1**				Fischteich Haulenrain (“Leisiweiher”)	mässig viele Fundorte
Platthalm-Rispengras	*Poa*	*compressa*	1993		**3**					mässig viele Fundorte
Mittleres Zittergras	*Briza*	*media*	1998		**14**					viele Fundorte
Bewimpertes Perlgras	*Melica*	*ciliata*	1993		**3**					wenig Fundorte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	Anz. F	Anzahl E BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art in der Gemeinde	Bemerkungen zur Art in der Region
Nickendes Perlgras	*Melica*	*nutans*	2003		**5**					mässig viele Fundorte
Kalk-Blaugras	*Sesleria*	*caerulea = varia*	1993		**11**					mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Strand-Pfeifengras	*Molinia*	*arundinacea*	1993		**4**					mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Haargerste, Waldgerste	*Hordelymus*	*europaeus*	1993		**1**				Schwängimatt, Weide Süd	wenig Fundorte
Schilf	*Phragmites*	*australis*	2003		**1**				Goletenkanal	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte
Horstbildende Schmiele, Rasenschmiele	*Deschampsia*	*caespitosa*	2003							viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert
Pyramiden-Kammschmiele	*Koeleria*	*pyramidata*	1998		**6**					mässig viele Fundorte
Silber-Rauhgras	*Achnatherum*	*calamagrostis*	2003		**1**				Alter Steinbruch Mümliswiler Klus	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	*Anthoxanthum*	*odoratum*	2003		**20**					viele Fundorte
Gefleckter Aronstab	*Arum*	*maculatum*	1989		**9**					viele Fundorte