Chalm Oberberg Wiese Ost Balsthal (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 618600 242825 Höhe ü. M.: 920 m Expositionen: SSW E Fläche: 250 a

	BP1 (1986) 1993	BP2 2003	BP3 2013 - 2015	alle BP (1986) 1993 - 2015
Anzahl Begehungen:	5	6	7	18
Beobachtungsdauer:	14 Std. 20 Min.	17 Std. 05 Min.	17 Std. 50 Min.	49 Std. 15 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:		BP1	BP2	BP3	alle A	alle B	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle A	alle B	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle A	alle B
	Anzahl Ereignisse:	276	307	319	908		428	488	492	1421			1,55	1,59	1,54	1,56		
	Bewertete Taxa:	183	199	176	344	564	322	366	324	745	1025		1,76	1,84	1,84	2,17	1,82	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
WEICHTIERE										
		1993								
Gemeine Achatschnecke	Cochlicopa lubrica	2003	2003			1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig	2
Kleine Achatschnecke	Cochlicopa lubricella	2003	2003			1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden und oft nicht sicher von C. lubrica unterschieden, gilt nach Literatur als	4
Moospuppenschnecke	Pupilla muscorum	2003	2003			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig	2

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse

Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse

Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse

Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse

Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse

Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten

Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort

Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

() in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert

& Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war

* in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert

** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

o in dieser Beobachtungsperiode habe ich den Gesang nur noch schwach wahrgenommen

oo in dieser Beobachtungsperiode habe ich den Gesang nicht mehr wahrgenommen

Schmetterlinge Regio Basiliensis:

Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

Seltenheits-Index: Für die bewerteten Taxa gilt: alle A: wenn jedes Taxon für die drei Beobachtungsperioden nur 1 Mal berücksichtigt wird

alle B: wenn ein Taxon in jeder Beobachtungsperiode gezählt wird

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Gerippte Grasschnecke	Vallonia	costata	1993	2003	1	2		Max. Ab3	mässig häufig gefunden, weil klein, nach Literatur in der Schweiz häufig	2	
Kleine Turmschnecke	Merdigera = Ena	obscura	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig, vor allem im Jura	2	
Gefleckte Schüsselschnecke	Discus	rotundatus	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als sehr häufig	1	
Kugelige Glasschnecke	Vitrina	pellucida	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig	4	
Weitmündige Glanzschnecke	Aegopinella	nitens	2003	2003		1	*	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1	
Streifen-Glanzschnecke	Perpolita = Nesovitrea	hammonis	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig	2	
Gemeine Blindschnecke	Ceciloides	acicula	1993	1993	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig	2	
Seidenhaarschnecke	Trochulus = Trichia	sericeus	2003	2003		3	*	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1	
Seidenhaarschnecke oder Quendelschnecke (nicht bestimmt)	Trochulus = Trichia	sericea cf. Candidula	1993	1993	1			Max. Ab2	häufig gefunden, wahrscheinlich meist T. sericea	2	
Zottige Haarschnecke	Trochulus = Trichia	villosus	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur in der Schweiz	1	
Gemeine Heideschnecke	Helicella	itala	1993	2003	2	4		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Rötliche Laubschnecke	Monachoides = Perforatella	incarnatus	1993	2003	1	1	*	Max. Ab1	häufig ngefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig	1	
Gefleckte Schnirkelschnecke	Arianta	arbustorum	2003	2003		1		Max. Ab1	in beschatteten und/oder feuchten Lebensräumen häufig gefunden, gilt nach	1	
Steinpicker	Helicigona	lapicida	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, nach Literatur vor allem im Jura häufig	2	
Weissmündige Bänderschnecke	Cepaea	hortensis	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	1993	2003	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
GLIEDERFÜSSLER			1993								
SPINNENTIERE			1993								
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(Phalangidae)	non det.	1993	1993	1	1	**	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert		
Eichblatt-Radspinne	Aculepeira	ceropegia	2003	1993		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	2013	2013			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Wespenspinne, Zebraspinne	Argiope	bruennichi	1993	1993	1							Max. Ab1	häufig gefunden	2
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	Alopecosa	cuneata	1993	2003	1	1	*					Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 216	2
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	Alopecosa	trabalis	1993	2003	1	2						Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 150	2
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	palustris	1993	2003	1							Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 42	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	pullata	1993	2003	1	2	*					Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 498	1
Listspinne	Pisaura	mirabilis	2015	2015				1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1993	1993	2							Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Laufspinnen-, Flachstrecker-Art	Thanatus	formicinus	2003	2013		1	1					Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	2015	2015				1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	bifasciatus	2003	2003		1						Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 59	4
VIELFÜSSER			2003											
Westlicher Sechsstreifen-Saftkugler	Glomeris	intermedia	2003	2003		1	*					Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
INSEKTEN			1993											
Schaben			1993	1993	1									
Waldschabe Gattung	Ectobius	sp.	1993	1993	1							Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Heuschrecken			1993											
Grünes Heupferd	Tettigonia	viridissima	1993	2015	2	2	2					Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Warzenbeisser	Decticus	verrucivorus	1993	2015	4	5	2					Max. Ab3	häufig gefunden	2
Westliche Beissschrecke	Platycleis	albopunctata albopunctata	1993	2003	2	1						Max. Ab4	im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig	1
Kurzflüglige Beissschrecke	Metrioptera	brachyptera	1993	1993	1							Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roeselii	1993	2015	3	2	1					Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung					letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6	BP7	BP8	BP9	BP10			
Gewöhnliche Strauchschrecke nur Gesang	Pholidoptera	griseoptera nur Gesang	1986	2013	3		2					Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Feldgrille	Gryllus	campestris	1993	2014	4	6	4					Max. Ab5	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1
Waldgrille nur Gesang	Nemobius	sylvestris nur Gesang	1986	2013	3	2	2					Max. Ab3	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Lauschschrecke	Mecostethus alt: Parapleurus	parapleurus alt: alliaceus	2003	2015		1	3					Max. Ab4	sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren	1
Kleine Goldschrecke	Euthystira = Chrysochraon	brachyptera	1993	2015	4	5	5					Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Buntbäuchiger Grashüpfer nur Gesang	Omocestus	rufipes nur Gesang	1993	2013	1		1					Max. Ab1	im Kettenjura häufig gefunden, aber anspruchsvolle Art	2
Bunter Grashüpfer	Omocestus	viridulus	1986	2015	1	2	2					Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Heidegrashüpfer	Stenobothrus	lineatus	1986	2013	4	3	2					Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1986	2013	3	2	3					Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Wiesengrashüpfer	Chorthippus	dorsatus	2003	2003		1						Max. Ab2	häufig gefunden, aber im Bezirk Thal selten	2
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1993	2015	2	4	4					Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Wanzen			1993											
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	2003	2013		2	1					Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	2003	2003		1						Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	2003	2003		1						Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Glasflügelwanzen-Art	Corizus	hyoscyami	2003	2003		1						Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Bodenwanzen-Art	Rhyparochromus	pini	2013	2013			1					Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 32	4
Gemeine Wiesenwanze	Lygus	pratensis	2013	2013			1					Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 46	2
Weichwanzen-Art	Calocoris	pilicornis	1993	2013	1		1					Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Weichwanzen-Art	Calocoris	affinis	2003	2003		1						Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Weichwanzen-Art	Calocoris	roseomaculatus	2003	2003		1						Max. Ab1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6	BP7	BP8				
Weichwanzen-Art	Megaloceraea	recticornis	2003	2003				1			Max. Ab3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2	
Weichwanzen-Art	Leptopterna	dolobrata	1993	2003	1	1					Max. Ab2	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	1	
Gleichflügler			1993											
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus	spumarius	1993	2015	1	1	1				Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	2003	2003		1					Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Netzflügler			1993		1									
Blattlauslöwen-Art	Micromus	variegatus	2013	2013				1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla	carnea	1993	2003	1	1					Max. Ab2	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1	
Käfer			1993											
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	2003	2003			2				Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1993	2003	1	1					Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Zweifleckiger Warzenkäfer	Malachius	bipustulatus	2003	2003		1					Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schnellkäfer-Art	Athous	vittatus	2003	2003		1					Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia	nitidula	2003	2003		1					Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 117	2	
Prachtkäfer-Art	Anthaxia	helvetica	2013	2013				1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 27	2	
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1993	2014	1	1	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	2003	2003		1					Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1993	1993	1						Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gartenlaubkäfer	Phyllopertha	horticola	1993	1993	1						Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Kleiner Rehschröter	Platycerus	caraboides	2003	2003		1					Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4	
Roter Schmalbock, Roter Halsbock	Leptura neu: Stictoleptura	rubra	2013	1993				1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Gefleckter Schmalbock	Strangalia neu: Rutpela	maculata	1993	2015		2	1	3				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	1
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina	salina	2013	2013				1				Max. Ab1	häufig gefunden	2
Zweifleckiger Fallkäfer	Cryptocephalus	biguttatus	1993	1993	1							Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1993	2015	2	2	3					Max. Ab4	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	1993	2003	2	1						Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	violaceus	1993	2015	2		1					Max. Ab4	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Kahler Sumpfblattkäfer	Hydrothassa	glabra	2003	2003		1						Max. Ab1	selten gefunden	16
Hautflügler			1993											
Bürstenhornblattwespen-Art	Arge	pagana	1993	1993	1							Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Blattwespen-Art	Dolerus	gonager	2013	2013				1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	4
Blattwespen-Art	Monophadnus	pallescens	1993	1993	1							Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 54	4
Blattwespen-Art	Tenthredo	solitaria	2003	2003			1					Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Blattwespen-Art	Tenthredo	arcuata	2003	2003			1					Max. Ab2	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	notha	1993	1993	1							Max. Ab1	unsicher bestimmt	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	brevicornis	2003	2013			1	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	koehleri	2003	2003			1					Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata alt: ligata	2003	2013			1					Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2
Brackwespe Gattung (Puppenkokon)	Apanteles	sp. (Puppenkokon)	2003	2003			1					Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	terminatorius	2015	2015				1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespe Artenkomplex	Ichneumon	albiger-Komplex	2003	2003			1					Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	affector	2015	2015				1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2013	2014	2015	2016	2017	BP1	BP2			
Schlupfwespen-Art	Patrocloides alt: Patroclus	sputator	2013	2013				1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	2003	2003			1	Max. Ab1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Sichelwespen-Art	Erigorgus	cerinops	1993	1993	1			Max. Ab1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schlupfwespen-Art	Apophua	genalis	2003	2013			1	1	Max. Ab3	wenig häufig gefunden	8	
Drüsenameise Artengruppe	Tapinoma	erraticum cf. ambiguum Emery	1993	1993	1		*	Max. Ab2	Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Gelbe Wegameise	Lasius	flavus	2003	2003			1	*	Max. Ab3	sehr häufig gefunden in den Fallen der WSL häufig: 495 Individuen	1	
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1993	2014	2	2	1*	Max. Ab4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1	
Zweifarbige Sklavenameise	Formica	rufibarbis	1993	1993	1		*	Max. Ab2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 89	1	
Berg-Waldameise	Formica	lugubris	1993	2013	1	3	2	Max. Ab4	Max. Ab4	häufig gefunden	2	
Wiesen-Waldameise	Formica	pratensis	2003	2014			2	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	
Kahlrückige Waldameise	Formica	polystena	2003	2003			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	2	
Blutrote Raubameise	Formica	sanguinea	2003	2013			2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1	
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	2003	2003			1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1	
Hornisse	Vespa	crabro	2003	2015			1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	1	
Waldwespe	Dolichovespula	sylvestris	1993	2015	1	1	1	Max. Ab1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	2003	2015			1	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1	
Wegwespen-Art	Priocnemis	coriacea	1993	1993	1			Max. Ab1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8	
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	1993	2013	1		1	Max. Ab2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1	
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	1993	1993	2			Max. Ab2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1	
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum	leucozonium	2003	2003			1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1993	2015	2		3	Max. Ab2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Weissbeinige Schmalbienen	Lasioglossum	albipes	1993	2013	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	1993	1993	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1	
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum	fulvicorne	1993	1993	2			Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 45	2	
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	1993	1993			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1	
Rostfarbene Blutbiene	Sphecodes	ferruginatus	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	
Braune Schuppensandbiene	Andrena	curvungula	1993	2003	1	1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Glanzlose Zergsandbiene	Andrena	subopaca	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	2	
Rotschopfige Sandbiene	Andrena	haemorrhoea	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 234	2	
Glänzende Düstersandbiene	Andrena	nitida	2014	2014			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 129	2	
Fuchsrote Lockensandbiene	Andrena	fulva	2013	2013			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	4	
Östliche Zangensandbiene	Andrena	fulvata	2013	2013			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 242	2	
Weissdorn-Sandbiene	Andrena	bucephala	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 17	4	
Gewöhnliche Dörnchensandbiene	Andrena	humilis	2013	2013			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2	
Gelbbeinige Kielsandbiene	Andrena	chrysosceles	1993	2003	1	1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	
Frühe Doldensandbiene, Giersch-Sandbiene	Andrena	proxima	1993	1993	1			Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4	
Weisse Bindensandbiene	Andrena	gravida	1993	1993	1			Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 35	2	
Grosse Harzbiene, Bastardbiene	Anthidium	byssinum	2003	2003		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	
Mai-Langhornbiene	Eucera	nigrescens alt: tuberculata	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Feld-Wespenbiene	Nomada	goodeniana neu: succincta f.	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2	
Wiesen-Wespenbiene	Nomada	marshamella	1993	2003	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gelbe Wespenbiene	Nomada	flava	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Rotschwarze Wespenbiene	Nomada	fabriciana	1993	2003	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2	
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	1993	2015	1		3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1	
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum	1993	2014	2	3	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1	
Bergwaldhummel	Bombus	wurfleini	1993	2015	4	2		Max. Ab3	häufig gefunden	2	
Baumhummel	Bombus	hypnorum	2015	2015			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2	
Wiesenhummel	Bombus	pratorum	1993	2013	1	2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1	
Glockenblumenhummel oder Distelhummel	Bombus	soroensis	2013	2013			3	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1993	2015	2		7	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1	
Waldhummel oder Bunte Hummel	Bombus	sylvarum	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1993	2015	4	2	7	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1	
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	1993	2015	1	1	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1	
Gartenhummel	Bombus	hortorum	1993	2014	3		3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1	
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	barbutellus	1993	2003	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1	
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	bohemicus	1993	2015	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1	
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	campestris	2003	2013		2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1	
Rotschwarze oder Felsen-Kuckuckshummel	Psithyrus alt und neu: Bombus	rupestris	2003	2003		1	2	Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	sylvestris	2003	2015		2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1	
Honigbiene	Apis	mellifera	1993	2013	4	2	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1	
Schmetterlinge			1993								
Weichgras-Sackträger-Art	Epichnopteryx	sieboldi	1993	2014	1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 12, 46	1	
Sackträgermotten-Art	Coleophora	ornatipenella	1993	2013	1		1	Max. Ab2	häufig gefunden	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Schlupfwespen-Glasflügler	Bembecia	ichneumoni- formis	2015	2003			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 10, 5	4	
Beilfleck-Widderchen, Tragant-Widderchen	Zygaena	loti	1993	1993	1			Max. Ab5	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 24, 162	2	
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	1993	2013	2	1	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1	
Grosses Fünffleck-Widderchen	Zygaena	lonicerae	1993	2003	1	1		Max. Ab4	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 8, 66	4	
Ampfer-Grünwidderchen	Adscita	statices	1993	2013	1	1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 23, 255	1	
Wickler-Art	Aethes	tesserana	2003	2003		2		Max. Ab3	mässig häufig gefunden	4	
Wickler-Art	Aphelia	viburnana	1993	1993	2			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Wickler-Art	Endothenia	marginana	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Wickler-Art	Celypha	lacunana	2003	2013		2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Wickler-Art	Ancylis	comptana	1993	2003	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Skabiosen-Federgeistchen	Stenoptilia	bipunctidactyla	2003	2015		1	4	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	1993	1993	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	2003	2015		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1993	2013	1	1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Weisser Graszünsler	Crambus	perlella	1993	2015	2	1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	1993	2013	1	2	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1993	2015	1	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Graszünsler-Art	Thisanotia	chrysonuchella	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	1993	2015	1	1	6	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	1993	2013	2	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Zünsler-Art	Microstega	pandalis	1993	2013	2	3	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Wanderzünsler	Nomophila	noctuella	1993	2003	1	1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	1	
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2003	2015		2	3	Max. Ab2	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1	
Nagelfleck	Aglia	tau	1993	2014	1		2	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 17, 49	1	
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	1993	2015	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1	
Weissfleckiger Kommafalter	Hesperia	comma	1993	2013	1		1	Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 370	2	
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	2003	2015		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1	
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	1993	1993	2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	1	
Roter Würfelfalter	Spialia	sertorius	1993	2013	2	2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438	1	
Zweibrütiger Würfelfalter	Pyrgus	armoricanus	2013	2013			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 12, 104	2	
Schwalbenschwanz	Papilio	machaon	1993	2013	3	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis-Komplex	2003	2015		3	5	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1	
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae	1993	2003	2	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1	
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1993	2013	1	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1	
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1993	2015	1	1	3	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1	
Bergweissling	Pieris	bryoniae	2013	2013			1	Max. Ab1 (unsicher bestimmt)	selten und nur in hohen Lagen gefunden, R.Bas.: 1, 1	16	
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	1993	2014	1	2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1	
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	crocea	2003	2013		1	2	Max. Ab2	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1	
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis	1993	1993	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1	
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	1993	2015	1		2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1	
Admiral	Vanessa	atalanta	2003	2013		1	1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1	
Distelfalter	Vanessa	cardui	2003	2013		4	1	Max. Ab3	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	1993	2013		2	2	2				Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	Polygonia	c-album	2013	2013				1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Grosser Perlmutterfalter	Argynnis	aglaja	2003	2003				1				Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 153	2
Märzveilchenfalter	Argynnis	adippe	2013	2013				1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 7, 13	4
Veilchen-Perlmutterfalter	Boloria	euphrosyne	2013	2013				1				Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 21, 143	2
Hainveilchen-Perlmutterfalter	Boloria	dia	2013	2014				3				Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 22, 977	2
Wachtelweizen-Scheckenfalter	Melitaea	athalia	1993	1993	1							Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 35, 337	2
Westlicher Scheckenfalter Mähwiesen-Scheckenfalter	Melitaea	parthenoides	1993	2013	1			2				Max. Ab3	häufig gefunden, R.Bas.: 25, 510	2
Skabiosen-Scheckenfalter	Euphydryas	aurinia aurinia	1993	1993	1							Max. Ab2	früher mässig häufig gefunden, neuerdings selten geworden, R.Bas.: 13, 154	8
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1993	2015	2	1	2					Max. Ab5	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Weisser Waldportier	Brintesia	circe	2013	2003				2				Max. Ab2	häufig gefunden, aber erst (wieder) seit diesem Jahrhundert, R.Bas.: 22, 341	2
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1993	2015	2	2	3					Max. Ab5	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	2003	2003				1				Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1993	2013	2	5	4					Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria	2003	2003				1				Max. Ab1	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megea	2003	2013				2	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Ulmen-Zipfelfalter	Satyrrium	w-album	2003	2003				1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 42	4
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	1993	2013	1	1	2					Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Zwerg-Bläuling	Cupido	minimus	2003	2013				3	1			Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 332	2
Violetter Wald-Bläuling	Cyaniris	semiargus	1993	2013	3	1	1					Max. Ab2	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Wundklee-Bläuling, Steinklee-Bläuling	Polyommatus	dorylas	1993	1993	2							Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 202	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Silbergrüner Bläuling	Polyommatus alt: Lysandra	coridon	2003	2013				1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416	1	
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus alt: Lysandra	bellargus	1993	2013	2	3	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1	
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1993	2013	2	4	4				Max. Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1	
Marmorierter Kleinspanner	Scopula	immorata	1993	2013	1	1	2				Max. Ab4	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1	
Schmuck- Kleinspanner	Scopula	ornata	2003	2003				1			Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 111	2	
Rostgelber Magerrasen-Zwergspanner	Idaea	serpentata	1993	2015	1		2				Max. Ab4	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 4, 35	2	
Braunrandiger Zwergspanner	Idaea	humiliata	2015	2015					1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 338	2	
Spanner-Art	Scotopteryx	bipunctaria	1993	2015	1		3				Max. Ab4	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 433	2	
Spanner-Art	Scotopteryx	chaenopodiata	1993	2003	1	1					Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 155	1	
Spanner-Art	Xanthorhoe	spadicearia	2003	2003				1			Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 57	2	
Löwenzahnspanner	Camptogramma	bilineata	1993	2013	2	2	2				Max. Ab4	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1	
Spanner-Art	Perizoma	albulata	2003	2013				2	1		Max. Ab2	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 9, 121	4	
Mausspanner	Minoa	murinata	2013	2013					1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 41	2	
Klee-Gitterspanner	Chiasmia alt: Semiothisa	clathrata	1993	1993	2						Max. Ab	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1	
Pantherspanner	Pseudopanthera	macularia	2003	2003				1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden gefunden, R.Bas.: 10, 95	1	
Heidespanner	Ematurga	atomaria	2013	2014					3		Max. Ab3	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1	
Rotrandbär	Diacrisia	sannio	2013	2013					1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 45	2	
Gescheckte Tageule	Callistege	mi	2003	2003				1			Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 70	2	
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1993	2015	3	3	5				Max. Ab4	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1	
Seideneulchen	Rivula	sericealis	2003	2003				1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 104	1	
Eulenfalter-Art	Phytometra	viridaria	1993	2015	3	2	3				Max. Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 11, 37	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Gammaeule	Autographa	gamma	1993	2013	2	2	3	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1	
Schnabelfliegen			1993								
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa	germanica	2003	2003		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa	vulgaris	1993	2015	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Zweiflügler			1993								
Wintermücke Gattung	Trichocera	sp.	2003	2003		1		Max. Ab2	Gattung im Winter sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. Tipula s.str.	paludosa	2003	2013		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1993	2013	1	2	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	flavescens	1993	2003	1	1		Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1	
Kammschnaken-Art	Tanyptera	atrata	2003	2003		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	non det.	2014	2014			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Johannismücke	Bibio	johannis	1993	2013	1		1	Max. Ab2	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2	
Johannismücke	Bibio	johannis	2014	2014			1	Max. Ab2	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2	
Märzmücke	Bibio	marci	1993	1993	1			Max. Ab2	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2	
Käsefliege, Stinkfliege	Coenomyia	ferruginea	1993	1993	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	1993	2003	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Regenbremsen-Art	Haematopota alt: Chrysozona	pluvialis	1993	2003	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Raubfliegen-Art	Leptogaster	cylindrica	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Wollschweber-Art	Bombylius	major	1993	2014	1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Trauerschweber-Art	Villa	cingulata	2003	2015		1	1	Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	1993	2003	1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Tanzfliegen-Art	Rhaphomyia	sulcata	2003	2003			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gestreifte Waldschwebfliege Waldschneisenschwebefliege	Dasysyrphus	albostratus	2013	2013				1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	4
Posthorn-Waldschwebefliege Waldschneisenschwebefliege	Dasysyrphus	friuliensis	1993	1993	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gemeine Winter- oder Parkschwebefliege	Episyrphus	balteatus	1993	2013	3	1	2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1
Gemeine Feldschwebefliege	Eupeodes	corollae	1993	1993	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2
Breitband-Feldschwebefliege	Eupeodes	latifasciatus	2003	2003			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Feldschwebefliegen-Art	Eupeodes	luniger	2003	2003			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kurze oder Bogenader- Feldschwebefliege	Eupeodes	lapponicus	2013	1993				1	Max. Ab1	häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark	2
Späte Grossstirnschwebefliege, Weisse Dickkopfschwebefliege	Scaeva	pyrastris	1993	1993	1				Max. Ab2	häufig gefunden	2
Frühe Grossstirnschwebefliege, Gelbe Dickkopfschwebefliege	Scaeva	selenitica	1993	1993	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta	1993	2015	3	1	2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	1993	2013	1		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1
Behaarte Schwebefliege, Grosse Gartenschwebefliege	Syrphus	torvus	2013	2013				2	Max. Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	2
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus	vitripennis	1993	2013	1	1	2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Späte Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	pedissequum	2013	2015				2	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Zweiband-Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	bicinctum	1993	1993	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Elegante Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	elegans	1993	2013	1		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Kahle oder Südliche Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	intermedium	1993	1993	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Gemeine Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	cautum	1993	1993	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	2013	2013				2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1
Graue oder Schwarze Breitfusschwebefliege	Platycheirus	albimanus	2003	2003			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	1993	2003	2	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1	
Weissfuss-Erzswebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	1993	2013	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Kerbel-Erzswebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	pagana	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Trüffel-Erzswebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	rufipes alt: soror	2013	2013			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Korbblüten- oder Bienen- Erz- schwebefliege Canicularis-Gruppe	Cheilosia	canicularis	1993	2013	1	1	2	Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Erzswebefliegen-Art Proxima-Gruppe	Cheilosia	proxima	2013	2013			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Erzswebefliegen-Art Bergenstammi-Gruppe	Cheilosia	mutabilis	1993	1993	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	1993	2013	3		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	
Hummel-Gebirgsschwebefliege, Gelbe Bärenschwebefliege	Arctophila	bombiformis	2013	2013			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Braune Bärenschwebefliege	Arctophila	superbiens	2013	2013			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten:4	4	
Grosskopf-Zwiebelschwebefliege	Eumerus	ornatus	1993	1993	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 12	4	
Gemeine Narzissenschwebefliege, Gemeine Zwiebelschwebefliege	Merodon	equestris	2003	2003		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	
Kleine Bienenschwebefliege	Eristalis	arbustorum	1993	2013	2		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1	
Keilfleckschwebefliegen-Art	Eristalis	interrupta	1993	2013	1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Distel-Bienenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1993	2013	3	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis	pertinax	1993	2013	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Schwarze Bienenschwebefliege	Eristalis	pratorum	2014	2014			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1993	2015	3	3	5	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1	
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebefliege	Helophilus	parallelus	1993	1993	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	
Gemeine Sumpfschwebefliege, Gemeine Sonnenschwebefliege	Helophilus	pendulus	2013	1993			2	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2	
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	1993	2015	3	2	5	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulen- oder Mistschwebefliege	Syritta	pipiens	1993	1993	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Braune Ameisenschwebefliege	Microdon	devius	2003	2003		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8
Dickkopffliegen-Art	Conops	quadrifasciatus	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atra	1993	1993	1				Max. Ab1	unsicher bestimmt	2
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	2003	2003		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schmuckfliegen-Art	Herina	frondescentiae	2003	2003		1			Max. Ab1	selten gefunden	16
Netzfliegen-Art	Limnia	unguicornis	2003	2003		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Halmfliege Gattung	Chlorops	sp.	1993	1993	2				Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden, aber oft übersehen und kaum registriert	
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis	1993	1993	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	
Stubenfliege Gattung	Neomyia alt: Orthellia	sp.	1993	1993	1		*		Max. Ab4	Gattung sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen	
Hirschlausfliege	Lipoptena	cervi	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schmeissfliegen-Art	Cynomyia	mortuorum	1993	2015	1	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1993	2013	2	1	1		Max. Ab5	Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1993	2003	4	5	**		Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliegen-Art	Eriothrix	rufomaculata	1993	2013	1		1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	2003	2003		1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliege Gattung	Tachina	sp.	1993	2003	2	1			Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliegen-Art	Tachina alt: Echinomyia	fera	2013	2003			1		Max. Ab2	häufig gefunden, aber oft nicht registriert	2
Raupenfliegen-Art	Nowickia	ferox	2013	2003			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
WIRBELTIERE			1993								
Zauneidechse	Lacerta	agilis	1993	1993	3				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2003	2013			1	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Turmfalke	Falco	tionnunculus	2013	2015				3	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Kuckuck	Cuculus	canorus	1993	1993	1				Max. Ab1	früher häufig gehört, aber in letzter Zeit selten geworden	4
Grauspecht	Picus	canus	1993	1993	1				Max. Ab1	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch wenig häufig	4
Grünspecht	Picus	viridis	1993	2013	1		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Schwarzspecht	Dryocopus	martius	2003	2003			1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Baumpieper	Anthus	trivialis	2003	2014			1	3	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Wiesenpieper	Anthus	pratensis	1986	1986	1				Max. Ab4	wenig häufig beobachtet	8
Steinschmätzer	Oenanthe	oenanthe	2013	2013				1	Max. Ab1	selten beobachtet	16
Misteldrossel	Turdus	viscivorus	2014	2014				1	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
Berglaubsänger	Phylloscopus	bonelli	2013	2013				1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Trauerschnäpper	Ficedula	hypoleuca	2013	2013				1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Schwanzmeise	Aegialus	caudatus	2003	2003			1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Haubenmeise	Parus	cristatus	2003	2003			1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Tannenhäher	Nucifraga	caryocatactes	1993	2013	1				Max. Ab1	früher häufig beobachtet, in letzter Zeit seltener geworden	4
Kolkrabe	Corvus	corax	1993	2013	1	3	1		Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
Kernbeisser	Coccothraustes	coccothraustes	1993	1993	1				Max. Ab1	mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig nachgewiesen	4
Maulwurf	Talpa	europaea	2003	2003		2	**		Max. Ab1	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Feldhase	Lepus	europaeus	1993	1993	1	1			Max. Ab1	Sichtbeobachtungen mässig häufig, aber anhand der Spuren häufig nachgewiesen	2
Scherm Maus	Arvicola	terrestris	2003	2003		4	**		Max. Ab2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Mauslöcher	(Mauslöcher)	non det.	2003	2003		3	**		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Fuchs	Vulpes	vulpes	2003	2003			1		Max. Ab1	mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig festgestellt	2
Reh	Capreolus	capreolus	2003	2013			1	1	Max. Ab1	häufig beobachtet und auch anhand der Spuren festgestellt	2
Hexenring (nicht bestimmt)	(Hexenring)	non det.	2013	2013				1	Max. Ab1	wenig Fundorte	
MOOSE	Auswahl		2003							Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrasen sind registriert	
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	2003						lokal häufig	viele Fundorte	
Echtes Goldmoos	Homalothecium	lutescens	2003						lokal häufig	viele Fundorte	
Etagenmoos	Hylocomium	splendens	2003						lokal häufig unter Fichte und am Waldrand	viele Fundorte	
Grosses Kranzmoos	Rhytidiadelphus	triquetrus	2003						sehr häufig, besonders am Waldrand	viele Fundorte	
SAMENPFLANZEN	SPERMATOPHYTA		2003							Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Eibe	Taxus	baccata	2003						1 Baum im Wald	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Gewöhnliche Akelei	Aquilegia	vulgaris	2003						lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	2003						sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	2003						sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Aufrechtes Fingerkraut	Potentilla	erecta	2003						lokal häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna alt: neumanniana	2003						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wald-Erdbeere	Fragaria	vesca	2003						lokal sehr häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte	
Vogelbeerbaum	Sorbus	aucuparia	2003						1 Pflanzen am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Mehlbeerbaum	Sorbus	aria	2003						vereinzelt am Waldrand	viele Fundorte	
Berg-Klee	Trifolium	montanum	2003						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis	vulneraria vulneraria	2003						lokal häufig	viele Fundorte	
Schopfiger Hufeisenklee	Hippocrepis	comosa	2003						lokal mässig häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3								
Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia	cracca	2003							lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Wiesen-Platterbse	Lathyrus	pratensis	2014							lokal sehr häufig am Waldrand	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert		
Frühlings-Platterbse	Lathyrus	vernus	2003							lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte		
Frühlings-Platterbse	Lathyrus	vernus		2013						lokal sehr häufig am Waldrand	viele Fundorte		
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	Linum	catharticum	2003							lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Wald-Storchenschnabel	Geranium	sylvaticum	2003							lokal häufig Wiese am Waldrand	mässig vee Fundorte, bes. in höheren Lagen des Juras		
Bittere Kreuzblume	Polygala	amarella	2003							mässig häufig	viele Fundorte		
Gewöhnliche Kreuzblume	Polygala	vulgaris vulgaris	2003							häufig	viele Fundorte		
Europäische Sanikel	Sanicula	europaea	1993							häufig am Waldrand	wenig Fundorte		
Kleine Bibernelle	Pimpinella	saxifraga	2003							mässig häufig	viele Fundorte		
Silgenähnlicher Rosskümmel	Silaum	silaus	1993							1 Pflanze	mässig viele Fundorte		
Silgenähnlicher Rosskümmel	Silaum	silaus								mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Silgenähnlicher Rosskümmel	Silaum	silaus		2013						häufig	mässig viele Fundorte		
Wilde Möhre	Daucus	carota	2003							lokal sehr häufig	sehr viele Fundorte		
Stechpalme	Ilex	aquifolium	2003							lokal häufig Waldrand und Wald	viele Fundorte		
Pyrenäen-Bergflachs	Thesium	pyrenaicum	2003							lokal mässig häufig	wenig Fundorte		
Alpen-Bergflachs	Thesium	alpinum	2003							lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Süsse Wolfsmilch	Euphorbia	dulcis	2003							lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte		
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia	verrucosa	2003							sehr häufig	viele Fundorte		
Mandelblättrige Wolfsmilch	Euphorbia	amygdaloides	2003							lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte		
Gew. Seidelbast, Zilande	Daphne	mezereum	2003							5 Pflanzen am Waldrand	mässig viele Fundorte		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3								
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	2003							mässig häufig	sehr viele Fundorte		
Wald-Veilchen	Viola	reichenbachiana alt: sylvestris	2003							lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte		
Wiesen-Schaumkraut	Cardamine	pratensis	2003							lokal mässig häufig Wr., sehr h. Fettwiese Süd	sehr viele Fundorte		
Wald-Schlüsselblume	Primula	elatior	2003							lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte		
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	2003							sehr häufig	sehr viele Fundorte		
Kuckucks-Lichtnelke	Lychnis	flos-cuculi	2013							lokal sehr häufig an klei- ner Stelle Fettwiese W	viele Fundorte		
Gelber Enzian	Gentiana	lutea	2003							lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte		
Frühlings-Enzian	Gentiana	verna	1993							mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Frühlings-Enzian	Gentiana	verna								lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Frühlings-Enzian	Gentiana	verna		2013						lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Deutscher Enzian	Gentiana	germanica	1993							häufig auf der Nordseite	mässig viele Fundorte		
Deutscher Enzian	Gentiana	germanica		2013						lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Echtes Labkraut	Galium	verum	2003							lokal häufig	viele Fundorte		
Niedriges Labkraut	Galium	pumilum	2003							mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte		
Teufelsabbiss, Abbisskraut	Succisa	pratensis	1993							häufig	viele Fundorte		
Teufelsabbiss, Abbisskraut	Succisa	pratensis								häufig	viele Fundorte		
Teufelsabbiss, Abbisskraut	Succisa	pratensis		2013						sehr häufig	viele Fundorte		
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	2003							häufig	sehr viele Fundorte		
Wald-Witwenblume	Knautia	dipsacifolia	2003							lokal häufig in Baumhecke	viele Fundorte		
Tauben-Skabiose	Scabiosa	columbaria	2003							lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Wald-Vergissmeinnicht	Myosotis	sylvatica	2003							lokal sehr häufig am Waldrand	viele Fundorte		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3								
Wiesen-Augentrost Gebräuchlicher Augentrost	Euphrasia	rostkoviana	1993								lokal häufig	viele Fundorte	
Mittlerer Wegerich	Plantago	media	2003								mässig häufig	viele Fundorte	
Grosse Brunelle	Prunella	grandiflora	2003								vereinzelt	viele Fundorte	
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	2003								vereinzelt, lokal häufig	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	2003								lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Büschel-Glockenblume	Campanula	glomerata	2003								mässig häufig	viele Fundorte	
Rundblättrige Glockenblume	Campanula	rotundifolia	2003								lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula	persicifolia	2003								lokal mässig häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	2003								sehr häufig (massenhaft)	sehr viele Fundorte	
Huflattich	Tussilago	farfara	2003								lokal häufig an NW-exponierter Stelle	viele Fundorte	
Silberdistel = Einf. Eberwurz	Carlina	acaulis ssp. caulescens	2003								vereinzelt	viele Fundorte	
Stengellose Kratzdistel	Cirsium	acaule	2003								vereinzelt	viele Fundorte	
Kohldistel	Cirsium	oleraceum	2003								lokal häufig am Westrand	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	2003								lokal sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Östlicher Wiesen-Bocksbart	Tragopogon	orientalis	2003								sehr häufig	viele Fundorte	
Abgebissener Pippau	Crepis	praemorsa	2003								häufig!	mässig viele Fundorte, beachtenswerte Art!	
Abgebissener Pippau	Crepis	praemorsa		2013							lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, beachtenswerte Art!	
Langhaariges Habichtskraut	Hieracium	pilosella	2003								lokal häufig	viele Fundorte	
Herbstzeitlose	Colchicum	autumnale	2003								häufig, lokal sehr häufig, besonders nördl. Teil	viele Fundorte	
Türkenbundlilie	Lilium	martagon	1993								häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Türkenbundlilie	Lilium	martagon		2003							lokal sehr häufig Waldrand und unter Bäumen	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3								
Vielblütige Weisswurz	Polygonatum	multiflorum	2003								lokal häufig am Waldrand	im Wald viele Fundorte	
Echtes Salomonssiegel	Polygonatum	odoratum	2003								lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Maiglöckchen, Maienriesli	Convallaria	majalis	2003								lokal häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte, im Kanton Solothurn geschützt.	
Vierblättrige Einbeere	Paris	quadrifolia	2003								lokal mässig häufig Baumhecke und Waldr.	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert	
Grosses Zweiblatt	Listera	ovata	1993								lokal häufig	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Grosses Zweiblatt	Listera	ovata									1 Pflanze mitten in der Wiese und 1 am Waldr.	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Grosses Zweiblatt	Listera	ovata		2013							2 Pflanzen	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Grünliches Breitkölbchen	Platanthera	chlorantha	1993								3 Pflanzen	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Grünliches Breitkölbchen	Platanthera	chlorantha									1 Pflanze	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Grünliches Breitkölbchen	Platanthera	chlorantha		2013							lokal mässig häufig, 5 Pflanzen am Waldrand	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Mücken-Handwurz	Gymnadenia	conopsea	1993								mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Mücken-Handwurz	Gymnadenia	conopsea									lokal häufig	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Mücken-Handwurz	Gymnadenia	conopsea		2013							sehr häufig	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Geflecktes Knabenkraut	Dactylorhiza	maculata s.l.	1993								häufig, besonders am Waldrand	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Geflecktes Knabenkraut	Dactylorhiza	maculata s.l.									lokal sehr häufig Waldrand auf der Nordseite	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Geflecktes Knabenkraut	Dactylorhiza	maculata s.l.		2013							vereinzelt, lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Kleine Orchis	Orchis	morio	1993								mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Kleine Orchis	Orchis	morio									lokal sehr häufig, vor allem an flachen Stellen	mässig viele Fundorte	
Kleine Orchis	Orchis	morio		2013							vereinzelt in der Wiese	mässig viele Fundorte	
Männliche Orchis	Orchis	mascula	1993								mässig häufig	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Männliche Orchis	Orchis	mascula	2003								lokal häufig, bes. Wr., mässig h. Waldschneise	viele Fundorte, nach NHV geschützt	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region		
			erste Beobachtung	letzte	Anz. BP1	BP2				BP3
Männliche Orchis	Orchis	mascula	2013	2013				vereinzelt Wiese, lokal mässig häufig Wraldrand	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Spitzorchis, Pyramidenorchis	Anacamptis	pyramidalis	1993					3 Pflanzen	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Spitzorchis, Pyramidenorchis	Anacamptis	pyramidalis						vereinzelt	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Spitzorchis, Pyramidenorchis	Anacamptis	pyramidalis		2013				4 Pflanzen	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Berg-Segge	Carex	montana	1993					sehr häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Berg-Segge	Carex	montana		2003				sehr häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Schlaffe Segge	Carex	flacca	2003					lokal häufig	viele Fundorte	
Hirsenfrüchtige Segge	Carex	panicea	2003					lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Mittleres Zittergras	Briza	media	2003					sehr häufig	viele Fundorte	
Strand-Pfeifengras	Molinia	arundinacea	2003					mässig häufig mitten in der Wiese	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Pyramiden-Kammschmiele	Koeleria	pyramidata	2003					lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	Anthoxanthum	odoratum	2003					häufig	viele Fundorte	