

Naturreservat Chilpen Diegten (BI) – Artenliste der Käfer Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 628900 251900

Höhe ü. M.: 510 bis 550 m

Expositionen: verschiedene

Fläche: 40 ha

	BP1(1962 bis 1991)	BP2 (1992 bis 2001)	BP3 (2003 bis 2009)	BP4 (2012 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	375	9	13	19
Beobachtungsdauer:	unbestimmt	28 Std.	63 Std.	74 Std.

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4			
Berg-Sandläufer	Cicindela	silvicola	1995	1995		1			Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	häufig gefunden
Feld-Sandläufer	Cicindela	campestris	1981	2017	483	11	12	7	Max. Ab5	sehr häufig gefunden
Lederlaufkäfer	Carabus	coriaceus	2004	2004			2		Persönliche Erstbeobachtung im Reservat, aber schon von Reutimann gefangen.	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 129
Körniger Laufkäfer	Carabus	granulatus	1991	1991	1				Grünlandstreifen in der Mulde, 1 Imago conf. W. Marggi 1991	selten gefunden , in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 96
Körnerwarze	Carabus	cancellatus	1986	1991	7				Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 6
Hain-Laufkäfer	Carabus	nemoralis	1991	1992	1	1			Max. Ab1, 1 conf. W. Marggi 1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 271
Dammläufer-Art	Nebria	brevicollis	1990	1992	5	1			Max. Ab2, 1 conf. W. Marggi 1991	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 469
Sumpf-Strandläufer	Notiophilus	palustris	1991	1991	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago conf. W. Marggi 1991	erst 2 Mal gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 43

Ereignis = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe:

1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

* in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht regelmässig oder nur summarisch inventarisiert

** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

& Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war

Mit "Region" sind hier vorwiegend der Kettenjura in der Nähe von Olten, das Flachland und Hügelland südlich davon und zum kleineren Teil der Tafeljura im oberen Baselbiet gemeint.

Die Fallen der WSL standen Mitte der 90-Jahre in der Nähe von Olten

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Krummhornkäfer	Loricera	pilicornis	1991	1991	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago	selten gefunden , in den Bodenfallen der WSL häufig: 180
Gemeiner Grabläufer, Fingerkäfer	Clivina	fossor	1990	1991	2				Max. Ab1, 1 conf. W Marggi 1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14
Flinkläufer-Art	Trechus	quadristriatus	1992	1992		1			Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago det. W. Marggi 1992	selten gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 275
Ahlenläufer-Art	Tachys	bistriatus	1989	1996	2	1			Max. Ab1, 1 conf. W. Marggi 1991	selten gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 173
Glatter Ahlenläufer	Bembidion	lampros	1991	1992	8	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 427
Ahlenläufer-Art	Bembidion	properans	1989	1992	1	2			Max. Ab1, 1 det. und 1 conf. W. Marggi 1991 und 1992	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 56
Schöner Ahlenläufer	Bembidion	quadrimaculatum	1985	1991	21				Max. Ab4	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 51
Zweifleckiger Schmuckläufer	Anisodactylus	binotatus	1989	2014	8	3	1	1	Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 106
Laufkäfer-Art	Diachromus	germanus	1987	2004	3	4	1		Max. Ab4	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 206
Schnellläufer-Art	Ophonus	azureus	1989	1991	5				Max. Ab1, 1 Imago det. W. Marggi 1989 und 2 conf .1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 2 Individuen
Schnellläufer-Art	Harpalus = Pseudophonus	rufipes	1990	1991	4				Max. Ab1, 2 Imagines conf. W. Marggi 1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 79
Erzgrüner Schnellläufer	Harpalus	affinis = aeneus	1990	2005	11	1	2		Max. Ab2, 1 Imago det. und 1 conf. W .Marggi 1991	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 12
Schnellläufer-Art	Harpalus	dimidiatus	1991	1992	5	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 86
Schnellläufer-Art	Harpalus	latus	1987	1992	8	1			Max. Ab1, 4 Imagines conf. W. Marggi 1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 131

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Kupferiger Schulterläufer, Listkäfer-Art	Poecilus	cupreus	1982	2005	87	5	8		Max. Ab3	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 598
Grabkäfer-Art	Pterostichus	ovoideus	1991	1991	1				Grünlandstreifen in der Mulde, 1 Imago det. W. Marggi 1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 17
Frühlings-Grabkäfer	Pterostichus	vernalis	1988	1996	8	6			Max. Ab2	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 35
Grabkäfer-Art	Pterostichus	anthracinus	1988	2001	7	3			Max. Ab2, 1 Imago det. W. Marggi 1989 und 1 conf. 1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 4
Gemeiner Grabkäfer	Pterostichus	melanarius	1986	1992	4	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 466
Grabkäfer-Art	Pterostichus	madidus	1988	2005	2		2		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 975
Grabkäfer-Art	Pterostichus	melas	1989	1991	2				Max. Ab1, 1 Imago det. W. Marggi 1991	selten gefunden
Pechfarbiger Striemenkäfer	Molops	piceus	1985	1996	10	3			Max. Ab2	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 475
Grosser Breitkäfer	Abax	parallelepipedus	1990	1991	5				Max. Ab1, 1 Imago conf. W. Marggi 1991	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 916
Paralleler Breitkäfer	Abax	parallelus	1990	1992	4	1			Max. Ab1, 1 Imago conf..W. Marggi 1991	mässig häufig gefunden, vor allem unter Steinen, in den Bodenfallen der WSL häufig: 242
Ovaler Breitkäfer	Abax	ovalis	1988	2004	1	1	1		Max. Ab1, 1 Imago det. W. Marggi 1989	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 899
Braunfüssiger Breihalsläufer	Calathus	fuscipes	1985	2004	2	3	1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 22
Müllers Putzläufer	Agonum	muelleri	1992	1992	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 2 Imagines	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 328
Putzläufer-Art	Platynus	albipes	1989	1989	1				lockerer Föhrenwald im Norden des Südwesthanges, 1 Weibchen	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Grüner Putzläufer	Platynus	dorsalis	1990	2005	11	8	1		Max. Ab4, 1 Imago conf. W. Marggi 1991	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 1225
Gemeiner Kanalkäfer-, Kamelläufer	Amara Zezea	plebeja	1985	1996	5	1			Max. Ab1, 5 Imagines det. und conf. W. Marggi 1987 bis 1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 33
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	Amara s.str.	similata	1991	2005	1		1		Max. Ab1, 1 Imago det. W. Marggi 1991	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8
Ovaler Kanalkäfer-, Kamelläufer	Amara s.str.	ovata	1991	1992	2	1			Max. Ab1, 2 Imagines det. W. Marggi 1991 und 1 conf. 1992	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	Amara s.str.	convexior	1986	1986	2				Max. Ab1 1 Imago det. W. Marggi	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	Amara s.str.	aenea	1987	1991	10				Max. Ab1, 5 Imagines conf. W. Marggi 1991	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 22
Gelbbeiniger Kanalkäfer-, Kamelläufer	Amara s.str.	familiaris	1984	1991	5				Max. Ab1, 5 Imagines det. und conf. W. Marggi 1987 bis 1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 110
Wanderläufer-Art	Badister	bullatus	1990	1991	5				Max. Ab1, 1 Imago det. W. Marggi 1991	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 50
Wanderläufer-Art	Badister	sodalis	1991	1991	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago conf. W. Marggi 1991	selten gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 45
Rennläufer-, Rindenkäfer-Art	Philorhizus	melanocephalus	1991	1991	1				einzigster Fund in der Region , Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Im.	erst 1 Mal gefunden , det. W. Marggi 1991, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum
Rennläufer-, Rindenkäfer-Art	Paradromius = Dromius	linearis	1991	1991	1				1 von 2 Funden in der Region , Wegböschung westlich Südwesthang	erst 2 Mal gefunden, 1 Imago conf. W. Marggi 1991
Laufkäfer-Art	Microlestes	maurus	1989	2004	1		1		Max. Ab2, 1 Imago conf.. W. Marggi 1991	erst 2 Mal gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 18
Kleiner Bombardierkäfer	Brachinus	explosivus	1991	2005	1	3	1		Max. Ab1, 1 Imago det. W. Marggi 1991	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 11
Schwarzer Schneckenjäger	Phosphuga	atrata	1989	1989	1				Waldlichtung nördlich Südwesthang, 1 Imago	mässig häufig gefunden, im Versteckten sehr wahrscheinlich häufig

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Nestkäfer-Art	Ptomaphagus	subvillosus	1991	1991	5				einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden, det. K. Wolf-Schwenninger 2003
Kurzflügelkäfer-Art	Arpedium	quadrum	1989	1991	2				Max. Ab1 , 1 conf. J. Vogel 1991	selten gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	Platystethus	arenarius	1991	1991	1				einzigster Fund in der Region , Waldrand nord-westlich Südwesthang	erst 1 Mal gefunden, det. S. Kiener 1992
Kurzflügelkäfer-Art	Coprophilus	striatulus	1986	1986	1				einzigster Fund in der Region , Wegböschung westlich Südwesthang	erst 1 Mal gefunden, det. S. Kiener 1992
Kurzflügelkäfer Artengruppe	Anotylus	sculpturatus-Gruppe	1985	1985	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. J. Vogel 1991	selten gefunden, gilt in der Schweiz nach Literatur als häufig
Kurzflügelkäfer-Art	Anotylus	tetracarinus	1985	1991	1				im Chilpen die 2 einzigen Funde in der Region	erst 2 Mal fast am selben Ort gefunden, conf. S. Kiener 1992
Kurzflügelkäfer-Art	Anotylus	rugosus	1991	1991	2				Max. Ab1, 1 Imago det. S. Kiener 1992	wenig häufig gefunden
Schmalräuber-Art	Stenus	flavipes	1984	1984	1				1 von 2 Funden in der Region , Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	erst 2 Mal gefunden, 1 det. S. Kiener 1992
Gemeiner Uferräuber	Paederus	litoralis	1990	1996	5	3			Max. Ab1	mässig häufig gefunden
Braunfüssiger Uferräuber	Paederus	fuscipes	1988	1988	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago conf. J. Vogel 1991	mässig häufig gefunden
Rotflügeliger Uferräuber	Lathrobium	fulvipenne	1991	1991	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 2 Imagines det. S. Kiener 1992	wenig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	Gyrohypnus	punctulatus	1990	1990	1				1 von 2 Funden in der Region , Waldrand nord-westlich Südwesthang	erst 2 Mal gefunden, 1 det. J. Vogel 1991
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	Platydracus	latebricola	1985	1990	2				Max. Ab1, 1 Imago conf. J. Vogel 1991 und 1 S. Kiener 1995	selten gefunden
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	Platydracus	stercorarius	1988	1988	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. J. Vogel 1991	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Grabender Raubkäfer (Kurzflügler)	Parabemus	fossor	1990	1992	2				Max. Ab1, 1 Imago det. J. Vogel 1991	wenig häufig gefunden
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	Staphylinus	dimidiaticornis	1988	1988	1				Feldweg westlich Südwesthang, 1 Imago det. J. Vogel 1991	wenig häufig gefunden
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	Ocypus	ophthalmicus	1985	1985	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. J. Vogel 1991	wenig häufig gefunden
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	Ocypus	nero	1991	1991	2				Max. Ab1, 1 Imago det. J. Vogel 1991 und 2 Imagines det. S. Kiener 1992	selten gefunden
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	Ocypus	olens	1988	1990	3				Max. Ab1, 1 Imago conf. J. Vogel 1991	mässig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer Gattung	Gabrius	sp.	1991	1991	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago	Gattung selten gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	Quedius	curtipennis	1991	1991	1				einzigster Fund in der Region , Grünlandstreifen in der Mulde, 1 Imago	erst 1 Mal gefunden, det. S. Kiener 1992
Kurzflügelkäfer-Art	Philonthus	cognatus	1984	1996	5	4			2 Imagines det. J. Vogel 1991 und 4 Imagines det. und conf. S. Kiener 1992 bis 1996	mässig häufig gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	Philonthus	tenuicornis = carbonarius	1991	1991	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago conf. K. Wolf-Schwenninger	selten gefunden
Kurzflügelkäfer-Art	Philonthus	decorus	1991	1991	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago det. S. Kiener 1992	wenig häufig gefunden
Schnellräuber-Art (Kurzflügler)	Tachyporus	chrysomelinus	1991	1991	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago conf. S. Kiener 1992	wenig häufig gefunden
Moos-Schnellräuber (Kurzflügler)	Tachyporus	hypnorum	1985	1992	3	1			Max. Ab1, 3 Imagines conf. S. Kiener 1992	selten gefunden
Kurzflügelkäfer Unterfamilie	(Aleocharinae)	non det.	1991	1986	5				Max. Ab1	selten gefunden, weil nicht danach gesucht und oft übersehen
Kurzflügelkäfer-Art	Drusilla	canaliculata	1990	1992	6	1			Max. Ab1, 3 Imagines det. J. Vogel 1991 und 3 det. S. Kiener 1992	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4			
Kurzflügelkäfer-Art	Zyras	limbatus	1991	1991	1				1 von 2 Funden in der Region , Wiesenböschung südlich Südwesthang	erst 2 Mal gefunden, 1 det. S. Kiener 1992
Kurzflügelkäfer-Art	Lomechusa	emarginata	1991	1991	1				einzigster Fund in der Region , 1 Imago	erst 1 Mal gefunden, det. S. Kiener 1992
Rotdeckenkäfer (im weiteren Sinne)	Homalysius	fontisbellaquei	1987	1988	2				Max. Ab1, 1 Imago conf. Cl. Besuchtet 1991	selten gefunden
Gemeiner Weichkäfer	Cantharis	fusca	1986	2015	9		4	3	Max. Ab2, 1 Imago det. W. Wittmer 1991	sehr häufig gefunden
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	1986	2017	11			7	Max. Ab1	sehr häufig gefunden
Weichkäfer-Art	Cantharis	nigricans	1987	2004	3		1		Max. Ab1	häufig gefunden
Weichkäfer-Art	Cantharis	pellucida	1985	1989	4				Max. Ab1	mässig häufig gefunden
Weichkäfer-Art	Cantharis	livida	1982	2008	21		5		Max. Ab3	häufig gefunden
Weichkäfer-Art	Cantharis	decepiens	1991	1991	1				Waldweg im Südwesten des Südwesthanges, 1 Männchen det. W. Wittmer 1991	wenig häufig gefunden
Weichkäfer-Art	Cantharis	pallida	1989	1989	2				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. P. Herger 1999	mässig häufig gefunden
Weichkäfer-Art	Metacantharis	discoidea	2004	2004			1		Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen det. P. Herger 2005	selten gefunden
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1987	2004	6		8		Max. Ab2	sehr häufig gefunden
Weichkäfer-Art	Rhagonycha	limbata	1985	1990	4				Max. Ab1	häufig gefunden
Schneckenhauskäfer-Art	Drilus	flavescens	2004	2015			1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Warzenkäfer-Art	Troglops	albicans	1990	1990	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago conf. W. Wittmer 1993	selten gefunden
Gelbfüssiger Warzenkäfer	Charopus	flavipes	1985	1985	2				einzigster Fundort in der Region , 1 Männchen conf. W. Wittmer 1991	erst 2 Mal am selben Ort gefunden
Zweifleckiger Warzenkäfer	Malachius	bipustulatus	1987	1991	6				Max. Ab1, 1 Imago det. W. Wittmer 1991 und 1 Weibchen conf. 1993	häufig gefunden
Schwarzer Wollhaarkäfer	Dasytes	niger	1985	1990	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago conf. A Kapp 1999	wenig häufig gefunden
Blauer Wollhaarkäfer	Dasytes	caeruleus	1989	1989	1				kleine Magerwiese in der Waldecke südwestlich Mulde, 1 Männchen conf. A. Kapp	mässig häufig gefunden
Bleischwarzer Wollhaarkäfer	Dasytes	plumbeus	1985	1991	3				Max. Ab1, 2 Imagines det. A. Kapp 1999	mässig häufig gefunden
Ameisen-Buntkäfer	Thanasimus	formicarius	1990	1990	1				südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Imago	mässig häufig gefunden
Buchenwerftkäfer, Bohrkäfer	Hylecoetus	dermestoides	1991	1991	1				lockerer Föhrenwald im Norden des Südwesthanges, 1 Imago	wenig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	pilosellus	1988	1988	1				lockerer Föhrenwald nördlich Südwesthang, 1 Imago det. L. Leseigneur 1991	mässig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	obscurus	1991	1991	1				Grünlandstreifen in der Mulde, 1 Imago	wenig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	sputator	1988	1989	2				Max. Ab1, 1 Imago conf. L. Leseigneur 1993	Gattung mässig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	ustulatus	1990	1990	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago det. L. Leseigneur 1991	mässig häufig gefunden
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	gallicus	1984	1988	3				Max. Ab1, 3 Imagines det. L. Leseigneur 1991	häufig gefunden
Mausgrauer Schnellkäfer	Argypnus = Adelocera	murinus	1985	2015	12			2	Max. Ab1	häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Rindenschnellkäfer-Art	Selatosomus	impressus	1988	1988	1				einzigster Fund in der Region , Waldrand südlich Südwesthang, 1 Weibchen	erst 1 Mal gefunden, conf. L. Leseigneur 1993
Zahnhalsschnellkäfer	Denticollis	linearis	1987	1987	1				südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Im. conf. L. Leseigneur 1993	wenig häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	Cidnopus	pilosus	1989	2017	7		3	2	Max. Ab3, 1 Imago det. L. Leseigneur 1991	häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	Pheletes = Limonius	quercus	1985	2016	8		1	1	Max. Ab1, 7 Imagines det. L. Leseigneur 1991 bis 1993	mässig häufig gefunden, weil klein, vermutlich häufig
Schnellkäfer-Art	Hemicrepidius = Athous = Pseudathous	niger	1986	1990	11				Max. Ab4, 4 Imagines det. L. Leseigneur 1993 und 1994	häufig gefunden
Rauhhaariger Schnellkäfer	Hemicrepidius = Athous = Pseudathous	hirtus	1989						Waldrand im Südosten des Südwesthanges, 1 Imago det. L. Leseigneur 1991	wenig häufig gefunden
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	Athous	haemorrhoidalis	1985	2017	17		2	2	Max. Ab2, 2 Imagines det. L. Leseigneur 1991 und 1993	häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	Athous	subfuscus	1990	1990	2				Max. Ab1, 2 Imagines det. L. Leseigneur 1991	wenig häufig gefunden
Schnellkäfer-Art	Athous	bicolor	1985	2014	1			1	Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	wenig häufig gefunden
Schienenkäfer	Melasis	buprestoides	1988	1988	1				1 von 2 Funden in der Region , Waldlichtung am Osthang, 1 Imago	erst 2 Mal gefunden, 1 conf. L. Leseigneur 1991
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia	nitidula	1987	2008	6		2		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 117
Prachtkäfer-Art	Anthaxia	similis	1987	2015	2			2	Max. Ab1. 1 Imago det. Psily 1993	wenig häufig gefunden
Prachtkäfer-Art	Anthaxia	helvetica	1986	2004	1		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 27
Vierpunktprachtkäfer	Anthaxia	quadripunctata	2004	2014			2	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 51

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4			
Prachtkäfer-Art	Trachys	minuta	1989	1989	1				südexponierter Waldrand südlich Südwesthang, 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1991	selten gefunden , in den Fallen der WSL selten: 3
Pillenkäfer Gattung	Byrrhus	sp.	1987	1991	6				Max. Ab1	Gattung wenig häufig gefunden
Pillenkäfer-Art	Byrrhus	lineatus = luniger	1988	1988	1				einzigster Fund in der Region , Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	erst 1 Mal gefunden
Gemeiner Pillenkäfer	Byrrhus	pilula	1991	1991	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen conf. P. Herger 2005	wenig häufig gefunden
Blütenfresser	Byturus	aestivus	1990	1991	4				Max. Ab2, 1 Imago det. Cl. Besuchet 1991	häufig gefunden
Glanzkäfer Familie	(Nitidulidae)	non det.	1984	1987	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	Familie sehr häufig gefunden, nicht inventarisiert
Rapsglanzkäfer	Meligethes	aeneus	1989	1990	2				Max. Ab4, 2 Imagines det. Jelmeck 1991	selten gefunden, nicht inventarisiert
Moder-, Schimmelkäfer-Art	Enicmus	transversus = Lathridius sp. B	1985	1985	2				Max. Ab1, 2 Imagines det. A. Kapp 1999	erst 2 Mal gefunden, aber kaum inventarisiert
Pilzkäfer-Art	Mycetina	cruciata	2008	2008			1		1 von 2 Funden in der Region , Waldrand nordwestlich Südwesthang,	erst 2 Mal gefunden , 1 det. P. Herger 2008
Schwarzer Kugelkäfer	Scymnus	nigrinus	1985	1985	2				Max. Ab1, 2 Imagines det. A. Kapp 1999	erst 2 Mal gefunden, aber kaum inventarisiert
Rotgefleckter Kugelkäfer	Scymnus	rubromaculatus	1985	1985	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. A. Kapp 1999	erst 1 Mal gefunden, aber kaum inventarisiert
Kugelkäfer-Art	Scymnus	suturalis	1985	1985	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. A. Kapp 1999	erst 1 Mal gefunden, aber kaum inventarisiert
Kugelkäfer-Art	Platynopsis	luteorubra	1990	1990	1				einzigster Fund in der Region , Waldrand im Süden des Südwesthanges	erst 1 Mal gefunden, det. A. Kapp 1999
Vierfleckiger Kugelkäfer	Exochomus	quadripustulatus	1985	2017	25	1	1	9	Max. Ab2, 2 Imagines det. Cl. Besuchet 1993	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Veränderlicher Marienkäfer	Adonia	variegata	1988	2004	1		5		Max. Ab3, 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1993	mässig häufig gefunden
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1982	2017	79	4	19	9	Max. Ab2	sehr häufig gefunden
Zweipunkt	Adalia	bipunctata	1989	1989	3				Max. Ab1, 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1993	mässig häufig gefunden
Zehnpunkt	Adalia	decempunctata	1988	2008	6		1		Max. Ab1, 5 Imagines det. und conf. Cl. Besuchet 1993 und 1994	mässig häufig gefunden
Kugeliger Marienkäfer	Synharmonia	conglobata	1985	2004	3		1		Max. Ab1. 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1994	wenig häufig gefunden
Marienkäfer-Art	Harmonia	quadripunctata	1989	2014	5			1	Max. Ab1, 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1993	selten gefunden
Marienkäfer-Art	Harmonia	axyridis	2008		&	&	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig
Augenfleckiger Marienkäfer	Anatis	ocellata	1985	1985	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Imago	selten gefunden
Längsfleckiger Marienkäfer	Neomyza	oblongoguttata	1988	1988	1				Waldlichtung auf dem "Plateau", 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1994	selten gefunden
Zweiundzwanzigpunkt	Thea	vigintiduo-punctata	1985	2014	4			3	Max. Ab1	mässig häufig gefunden
Marienkäfer-Art	Calvia	quatordecimguttata	1990	1991	2				Max. Ab1, 2 Imagines conf. Cl. Besuchet 1994	mässig häufig gefunden
Achtzehnfleckiger Marienkäfer	Myrrha	octodecimguttata	1988	1988	1				einzigster Fund in der Region , Waldrand im Süden des Südwesthanges	erst 1 Mal gefunden, conf. Cl. Besuchet 1994
Vierzehnpunktiger Marienkäfer	Propylaea	quadridecimpunctata	1984	2015	14		3	1	Max. Ab1, 1 Imago det. Cl. Besuchet 1994	häufig gefunden
Scheinbockkäfer-Art	Anogcodes = Anoncodes = Nacerda	rufiventris	1990	2016	1			3	Max. Ab1, 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1994	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Metallgrüner Schenkelkäfer	Chrysanthia	viridissima	1985	1991	10				Max. Ab1, 2 Imagines conf. Cl. Besuchet 1991	wenig häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	Chrysanthia	geniculata = nigricornis Westh.	1984	2004	32		2		Spezielle Art des Reservats, Max. Ab1, 2 Imagines det und conf. Cl. Besuchet 1991	mässig häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	flavipes	1985	2016	26		3	2	Spezielle Art des Reservats, Max. Ab2, 3 Imagines det. und conf. Cl. Besuchet 1991 - 94	wenig häufig gefunden, im Chilpen-Reservat Diegten (BL) mässig häufig
Graugrüner Schenkelkäfer	Oedemera	virescens	2014	2014				1	Waldlichtung im nördlichen Teil des Osthanges, 1 Männchen	häufig gefunden
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	1987	2016	1		2	2	Max. Ab1, 1 Männchen conf. Cl. Besuchet 1991	häufig gefunden
Feuerkäfer-Art	Pyrochroa	serraticornis	1988	1991	2				Max. Ab1, 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1991	häufig gefunden
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1986	2014	21		9	2	Max. Ab3. 1 Imago conf. J. Horak 1991	sehr häufig gefunden
Stachelkäfer-Art	Mordella	brachyura	1990	1990	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. J Horak 1991	mässig häufig gefunden aber oft nicht registriert
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	neuwaldegiana	1988	1988	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago det. J. Horak 1991	erst 2 Mal gefunden, weil kaum registriert
Gemeiner Wollkäfer	Lagria	hirta	1987	1991	3				Max. Ab1, 2 Imagines conf. Cl. Besuchet 1991	mässig häufig gefunden
Ovaler Kotkäfer	Onthophagus	ovatus	1988	1990	2				Max. Ab1, 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1993	wenig häufig gefunden
Kotkäfer-Art	Onthophagus	coenobita	1991	1991	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Imago det. A Kapp 1999	selten gefunden
Waldmistkäfer	Anoplodtrupes = Geotrupes	stercorosus	1985	1985	1				Waldrand im Süden des Osthanges, 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1993	häufig gefunden, besonders im Wald
Gemeiner Dungkäfer	Aphodius	fimetarius	1989	1989	1				Feldweg westlich Südwesthang, 3 Imagines, 1 Weibchen conf. Piltino 1994	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Dungkäfer-Art	Calamoterunus = Aphodius	granarius	1991	1991	1				Wiesenböschung südlich des Südwesthanges, 1 Imago det. Piltino 1994	selten gefunden
Dungkäfer-Art	Melinopterus = Aphodius	prodromus	1989	1989	1				Wiesenböschung südlich des Südwesthanges, 1 Weibchen det. Piltino 1994	mässig häufig gefunden
Maikäfer-Verwandter	Rhizotrogus	aestivus	1991	1996	3	2			Max. Ab1	selten gefunden
Dunkelbrauner Junikäfer	Amphimallon	atrum	1987	1989	3				Max. Ab2	häufig gefunden, oft in grosser Zahl
Gartenlaubkäfer	Phyllopertha	horticola	1991	1991	1				Waldrand nordwestlich Südwesthang, mehrere Imagines	häufig gefunden
Purzelkäfer-Art	Hoplia	philanthus	1985	1987	2				Max. Ab1, 1 Imago conf. Cl. Besuchet 1993	mässig häufig gefunden
Silbriger Purzelkäfer	Hoplia	argentea = farinosa (Linnaeus)	1985	2017	3			1	Max. Ab2, 1 Imago conf Cl. Besuchet 1993	häufig gefunden
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	1986	2004	3		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	1987	2008	7		2		Max. Ab1	häufig gefunden
Düsterbock	Asemum	striatum	1988	1988	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	erst 1 Mal gefunden
Kleiner Zangenbock	Rhagium	inquisitor	2008	2008			1		Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum
Variabler Stubbenbock	Stenocorus	meridianus	1990	1990	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen
Bunter Kugelhalsbock	Dinoptera = Acmaeops	collaris	2004	2004			1		Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 5
Rothörniger oder Mattschwarzer Blütenbock	Grammoptera	ruficornis	1991	1991	1				Waldlichtung am Südwesthang, mehrere Imagines	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 40

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Feldhornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	Alosterna	tabacicolor	1994	2008		1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 4
Fleckenhörniger Halsbock	Stictoleptura = Leptura	maculicornis	1987	2017	12			1	Max. Ab2	mässig häufig gefunden , in den Fallen der WSL nur 2 Individuen
Roter Schmalbock, Roter Halsbock	Stictoleptura = Leptura	rubra	1986	2004	15		5		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36
Blutroter Halsbock	Anastrangalia = Leptura	sanguinolenta	1987	2017	4			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3
Schwarzrandiger oder Zweifelhafter Halsbock	Anastrangalia = Leptura	dubia	1991	1991	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3
Gefleckter Schmalbock	Rutpela = Strangalia = Leptura	maculata	1986	2004	14		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	1986	2004	17		2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14
Zweibindiger Halsbock	Stenurella = Strangalia	bifasciata	1984	2004	79		2		Art, die oekologisch wertvolle Lebensräume anzeigt. Max. Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum
Roter Spitzdeckenbock	Stenopterus	rufus	2012	2012				1	Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago	häufig gefunden
Moschusbock	Aromia	moschata	1986	1986	1				südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Imago	selten gefunden, weil versteckte Lebensweise
Buchen-Widdercock, Echter Widderbock	Clytus	arietis	1987	1987	1				Waldlichtung im nördlichen Teil des Osthanges, 1 Imago	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58
Zierbock	Anaglyptus	mysticus	2015	2015				1	Waldrand im Osten des Osthanges , 1 Imago	selten gefunden , in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum
Metallglänzender Distelbock	Agapanthia	violacea	1991	2004	1		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden
Kleiner Pappelbock, Espenbock	Saperda	populnea	1986	1988	2				1 von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Zylindrischer Walzenhalsbock	Phytoecia	cylindrica	1991	1991	1				Waldrand im Süden des Osthanges, 1 Imago	wenig häufig gefunden
Kleiner Pflaumenbock	Tetrops	praeusta	2008	2008			1		Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago	wenig häufig gefunden, weil sehr klein, in den Fallen der WSL selten: 3
Getreidehähnchen-Art	Oulema	gallaeciana	1983	1989	10				1 Imago conf. Cl. Besuchet 1992, 1 det. D. Sassi 1995, 1 conf. H. Kippenberg 1995	wenig häufig gefunden
Rothalsiges Getreidehähnchen	Oulema	melanopus	1982	1991	7				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, hier handelt es sich um zwei sehr ähnliche Arten
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina	salina	1987	2017	5		2	7	Max. Ab2	häufig gefunden
Grosskopfblattkäfer-Art	Coptocephala	rubicunda	1985	2012	39	1	4	1	Spezielle Art des Reservats Max. Ab3, 2 conf. Cl. Besuchet 1993	wenig häufig gefunden, im Chilpen-Reservat Diegten (BL) mässig häufig
Ameisen-Blattkäfer-Art	Clytra	laeviuscula	1994	2004		1	3		Spezielle Art des Reservats. In der Region sonst wenig häufig gefunden. Max. Ab1	wenig häufig gefunden
Zweipunktiger Fallkäfer	Cryptocephalus	bipunctatus	1988	2004	5		2		Max. Ab2, 1 Imago conf. D. Sassi 1993	mässig häufig gefunden
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1985	2017	90		7	7	Max. Ab4, 2 Imagines conf. D. Sassi 1993	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	1985	2016	1		10	2	Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	violaceus	2017	2017				1	Waldrand im Süden des Osthanges, 2 Imagines	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben
Pappelblattkäfer-Art	Chrysomela = Melasoma	populi	1986	1986	1				Waldlichtung am Westhang, 1 Imago conf. Horst Kippenberg 1993	wenig häufig gefunden
Kleiner Weidenblattkäfer	Phratora = Phyllodecta Kirby	vitellinae	1985	1990	6				Max. Ab1, 4 Imagines det. H. Kippenberg 1990 bis 1993	wenig häufig gefunden, aber manchmal in grösserer Anzahl
Erlenblattkäfer	Agelastica	alni	1983	1988	3				Max. Ab1	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Schneeballblattkäfer	Pyrrhalta	viburni	1985	2015	54		2	2	Max. Ab5	sehr häufig gefunden
Blattkäfer-Art	Calomicrus	pinicola	1985	2017	13			1	Max. Ab2, 2 conf. P. Herger 2005	wenig häufig und nur an sehr wenigen Orten gefunden
Blattkäfer-Art	Luperus	longicornis	1985	2008	12		2		Max. Ab1, 2 Imagines conf. D. Sassi 1994	wenig häufig gefunden
Blattkäfer-Art	Luperus	flavipes	2004	2004			1		lockerer Föhrenwald auf dem Felsgrat östlich und südöstlich des Westhanges	wenig häufig gefunden, weil klein, vermutlich häufig
Erdflohkäfer-Art	Aphthona	pygmaea	1983	1983	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. M. Döberl 1992	erst 2 Mal gefunden, aber meist übersehen oder nicht inventarisiert
Erdflohkäfer-Art	Longitarsus	luridus	1985	1985	17				Max. Ab4, 3 Imagines det. M. Döberl 1992	selten gefunden, ausser im Chilpen-Reservat Diegten (BL), aber meist übersehen oder nicht inventarisiert
Erdflohkäfer-Art	Crepidodera	aurata	1990	1990	1				südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Imago det. M. Döberl 1992	selten gefunden
Erdflohkäfer-Art	Chaetocnema	hortensis	1984	1991	11				Max. Ab4. 2 Imagines conf. M. Döberl 1992	wenig häufig gefunden
Erdflohkäfer-Art	Apteropeda	globosa	1987	1987	1				einzigster Fund in der Region , Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Im.	erst 1 Mal gefunden , det. M. Döberl 1992
Grüner Schildkäfer	Cassida	viridis	1985	1985	1				Max. Ab1	selten gefunden
Schildkäfer-Art	Cassida	rubiginosa	1990	1990	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago det. D. Sassi 1993	wenig häufig gefunden
Langfühler-Breitrüssler, Weisser Breitrüssler	Anthribus neu: Platystomos	albinus	1991	1991	1				südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Imago conf P. Scherler 1993	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Dunkler Kiefernblütenrüssler	Doydirhynchus	austriacus	1988	1988	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago det. Cl. Besuchet 1993	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Literatur als wenig häufig
Kupferroter Pflaumenstecher	Rhynchites	cupreus	1988	1988	1				Waldrand im Südosten des Südwesthanges, 1 Imago det. P. Scherler 1991	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Literatur als wenig häufig

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Haselblattroller, Haselnuss-Dickkopffroller	Apoderus	coryli	1986	1990	5				Max. Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Rotbeiniger Ginster-Spitzmausrüssler	Exapion = Apion	formaneki	1984	1985	16				Max. Ab4, 1 Imago det. P. Scherler 1991	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur als wenig häufig
Rotfüssiger Klee-Spitzmausrüssler	Protapion = Apion	fulvipes = flavipes	1985	1985	3				Max. Ab1, 1 Imago det. P. Scherler 1991	selten gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Dunkler Klee-Spitzmausrüssler	Protapion = Apion	apricans	1987	1987	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago det. P. Scherler 1991	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Rotfüssiger Klee-Spitzmausrüssler	Protapion = Apion	fulvipes = flavipes	1988	1989	2				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago	selten gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Grüner Klee-Spitzmausrüssler	Ischnopterapion = Apion	virens	1984	1984	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. P. Scherler 1991	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Gewöhnlicher Hornklee-Spitzmausrüssler	Ischnopterapion = Apion	loti	1985	1985	5				Max. Ab1, 1 Imago det. P. Scherler 1991	selten gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Grüner Klee-Spitzmausrüssler	Ischnopterapion = Apion	virens	1985	2003	4		1		Max. Ab1, 2 Weibchen det. P. Scherler 1991, 1 conf. Ch. Germann 2004	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Gelbschenkel-Spitzmausrüssler	Oryxolaemus = Apion	flavifemoratus	1985	1985	3				Max. Ab1, 1 Imago det. P. Scherler 1991	selten gefunden, gilt nach Literatur als sehr selten
Wolliger Hufeisenklee-Spitzmausrüssler	Eutrichapion = Apion	lanigerum	1985	1990	2				1 von 2 Funden in der Region , 1 Imago det. P. Scherler 1991	erst 2 Mal gefunden, gilt nach Literatur als selten
Brauner Schmalbauch, Länglicher Blattrüssler	Phyllobius	oblongus	1988	1991	7				Max. Ab2, 2 Imagines conf. Cl. Besuchet 1991	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Breiter Birnengrünrüssler, Kupfriger Blattrüssler	Phyllobius	pyri	1987	1992	12	1			Max. Ab2, 2 Imagines conf. Cl. Besuchet 1991, 1 conf P. Scherler 1992	häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Weissdorn-Blattrüssler	Phyllobius	betulinus = betulae	1986	2015	16			2	Max. Ab4, 3 Imagines conf. Cl. Besuchet 1991	häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig
Grosser Schwarzer Dickmaulrüssler	Otiorhynchus	niger	1987	1987	3				Max. Ab1, 1 Männchen conf. Cl. Besuchet 1991	selten gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 17, gilt nach Literatur als mässig häufig

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Nabelpunkt-Dickmaulrüssler	Otiorhynchus	veterator	1988	2015	1	1		1	Max. Ab1, 1 Imago conf. Cl. Besuchtet 1991 als singularis	selten gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14, gilt nach Einschätzung von Ch. Germann als häufig
Fichten-Glanzrüssler	Polydrusus	impar	1985	1989	7				Max. Ab1, 1 Imago conf. Cl. Besuchtet 1991	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3, gilt nach Literatur als mässig häufig
Grauhaariger Glanzrüssler	Polydrusus	aeratus = atomarius	1985	1991	5				Max. Ab1, 3 Imagines conf. Cl. Besuchtet 1991 und P. Scerler 1993	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 10, gilt nach Literatur als häufig
Weiden-Glanzrüssler	Polydrusus	corruscus	1988	1988	1				einzigster Fund in der Region , Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Im.	erst 1 Mal gefunden, det. P. Scherler 1991, gilt nach Literatur als selten
Dickkopf-Glanzrüssler	Polydrusus	pterygomalis	1990	1990	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Imago det. P. Scherler 1991	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als mässig häufig
Gescheckter oder Hirsch-Glanzrüssler	Polydrusus	cervinus	1986	1991	17				Max. Ab4, 1 Imago det. und conf. P. Scherler 1991 und 1992	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als häufig
Seidiger Glanzrüssler	Polydrusus	formosus = sericeus	1985	1991	11				Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als häufig
Gewürfelter Staubrüssler, Würfelfleckerüssler	Liophloeus	tesselatus	1988	1989	3				Max. Ab1, 2 Imagines conf. P. Scherler 1991	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen, nach Lit. häufig
Furchenkopf-Blattrandrüssler	Sitona	sulcifrons	1991	1991	1				Grünlandstreifen in der Mulde, 1 Imago det. P. Scherler 1993	erst 2 Mal gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, gilt nach Literatur als häufig
Rotklee-Blattrandrüssler	Sitona	lepidus = flavescens	1985	1991	3				Max. Ab1, 1 Imago conf. P. Scherler 1993	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 134, gilt nach Literatur als häufig
Borstiger Blattrandrüssler	Sitona	hispidulus	1985	1991	4				Max. Ab1, 3 Imagines det. und coll. P. Scherler 1991 und 1993	selten gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5, gilt nach Literatur als sehr häufig
Luzerne-Blattrandrüssler	Sitona	humeralis	1985	1985	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago det. P. Scherler 1991	selten gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als häufig
Kratzdistelrüssler	Larinus	turbinatus	1986	2004	2		1		Max. Ab2	häufig gefunden, stellenweise in grosser Zahl auf Disteln, gilt nach Literatur als mässig häufig
Gestreifter Steppenrüssler, Streifiger Langrüssler	Pseudocleonus	grammicus	1988	1989	3				Max. Ab1, 1 Imago conf. P. Scherler 1993	selten gefunden, gilt nach Literatur als sehr selten

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Weissklee-Blütenrüssler, Kleeblütenrüssler	Tychius	picrostris	1985	1985	2				Max. Ab1, 2 Imagines det. P. Scherler 1991 und 1992	selten gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Erdbeerblütenstecher, Himbeerblütenstecher	Anthonomus	rubi	1984	1984	1				Max. Ab1, 1 Imago det. P. Scherler 1991	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Grosser Kiefernrüßler, Grosser Brauner Rüsselkäfer	Hylobius	abietis	1986	1986	1				lockerer Föhrenwald im N des Südwesthanges, 2 Imagines, 1 conf. P. Scherler 1993	selten gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9, gilt nach Literatur als häufig
Kerbel-Dickrüßler oder Möhrenrüßler	Liparus	coronatus	1991	1991	1				lockerer Föhrenwald im N des Südwesthanges, 1 Imago conf. P. Scherler 1993	selten gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Wurzelstockrüßler	Mitoplinthus = Epibolaeus	calignosus	1990	1990	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago conf. P. Scherler 1991	erst 2 Mal gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 149, gilt nach Literatur als wenig häufig
Dreimakelrüßler	Graptus = Alophus	triguttatus	2015	2015				1	Max. Ab1	erst 1 Mal gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18, gilt nach Literatur als häufig
Sellerie-Kokonrüßler	Hypera	conmaculata = adpersa	1986	2015	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago det. P. Scherler 1991	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Literatur als wenig häufig
Hornklee-Kokonrüßler	Hypera	plantaginis	1988	1989	2				Max. Ab1, 12 Imagines det. P. Scherler 1992	selten gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen, gilt nach Einschätzung von Ch. Germann als häufig
Luzerne-Kokonrüßler	Hypera	postica	1985	1985	1				Feldweg westlich Südwesthang, 1 Imago det. P. Scherler 1991	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Grüner Kokonrüßler	Hypera	nigrirostris	1985	1985	1				lockerer Föhrenwald südlich der Waldlichtung am Südwesthang, 1 Imago conf. P.S.	selten gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5, gilt nach Literatur als häufig
Gefleckter Rapsstängel- oder Kohlstängel- oder Kohltriebrüssler, Kleiner Kohltriebrüssler	Ceutorhynchus	pallidactylus = quadridens	1991	1996	1	1			Max. Ab1, 1 Imago det. P. Scherler 1993	selten gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig
Löwenzahn-Milchsafrüssler	Glocianus = Ceutorhynchus	punctiger	1990	1990	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Imago det. P. Scherler 1991	selten gefunden, gilt nach Literatur als häufig
Buchen-Springrüßler, Buchenblattrüssler	Orchestes = Rhynchaenus	fagi	1985	1990	5				Max. Ab3	Frassspuren an Rotbuchen sehr häufig in den Fallen der WSL wenig häufig: 13
Grosser Waldgärtner	Blastophagus	piniperda	1991	1991	3				Max. Ab1	selten gefunden, nicht inventarisiert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art	Bemerkungen zur Art in der Region
			Beobachtung	Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort	
Fichtenstamm-Bastkäfer	Hylurgops	pallidatus	1992	1992		1			Waldrand nordwestlich des Südwesthanges, 1 Imago conf. Cl. Germann 2006	selten gefunden, nicht inventarisiert
Buchdrucker-Art	Ips	typographus	1987	1987	1				kleine Waldlichtung nordöstlich des Westhanges, viele Imagines in Falle	selten gefunden, weil wenig beachtet, nicht inventarisiert
Langbeinfliegen-Art	Chrysotus	gramineus	1985	1985	1				1 von 2 Fundorten in der Region , 1 Weibchen det. St. Naglis 2000	erst 3 Mal an 2 Orten gefunden