

Naturreservat Chilpen Diegten (BI) – Artenliste der acalyptraten und calyptraten Zweiflügler

Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 628900 251900

Höhe ü. M.: 510 bis 550 m

Expositionen: verschiedene

Fläche: 40 ha

	BP1(1962 bis 1991)	BP2 (1992 bis 2001)	BP3 (2003 bis 2009)	BP4 (2012 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	375	9	13	19
Beobachtungsdauer:	unbestimmt	28 Std.	63 Std.	74 Std.

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4			
Stelzfliegen-Art	Micropeza	corrigiolata	1990	2008	3		1		3 det. bzw. conf. B. Merz 1991 und 1993, max. Ab1	wenig häufig gefunden
Nacktfliegen-Art	Loxocera	aristata = ichneumonea	1987	1987	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Weibchen det. B. Merz 1991	selten gefunden
Nacktfliegen-Art	Chyliza	extenuata	1990	1990	2				Waldrand im Süden des Südwesthanges	selten gefunden, weil unscheinbar
Schmuckfliegen-Art	Herina	frondescentiae	2015	2017				3	Max. Ab2	selten gefunden
Schmuckfliegen-Art	Herina	germinationis	1984	1991	47				2 det. B. Merz 1991, max. Ab2	wenig häufig gefunden, nur im Chilpen-Reservat Diegten mässig häufig
Schmuckfliegen-Art	Herina	lugubris	1985	1985	1				2 det. B. Merz 1999	erst 1 Mal gefunden
Schmuckfliegen-Art	Otites	centralis	1988	1989	3				2 det. B. Merz 1991, max. Ab2	wenig häufig gefunden
Schmuckfliegen-Art	Otites	guttata	1987	1990	2				1 det. B. Merz 1991, max. Ab1	wenig häufig gefunden

Ereignis = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe:

1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

* in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht regelmässig oder nur summarisch inventarisiert

** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

& Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war

Mit "Region" sind hier vorwiegend der Kettenjura in der Nähe von Olten, das Flachland und Hügelland südlich davon und zum kleineren Teil der Tafeljura im oberen Baselbiet gemeint.

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art	Bemerkungen zur Art in der Region
			Beobachtung	Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort	
Fruchtliegen-Art	Tephritis	matricariae	1984	2017	8		1	8	6 det. B. Merz 1991, max. Ab4	wenig häufig gefunden, im Chilpen-Reservat Diegten häufig
Fruchtliegen-Art	Tephritis	neesii	2015	2017				6	Max. Ab4	wenig häufig gefunden
Fruchtliegen-Art	Chaetorellia	jacea	2015	2015	1				Waldlichtung nördlich des Südwesthanges, 1 Paar	
Fruchtliegen-Art	Euleia	heraclei	1988	1988	1				Waldrand im Südosten des Südwesthanges, 1 det. B. Merz 1991	erst 1 Mal gefunden
Schwingfliegen-Art	Sepsis	fulgens	1985	1985	1				1 det. B. Merz 1991 und mehrere unsicher bestimmte, max. Ab5	wenig häufig gefunden, aber kaum mehr registriert
Netzfliege Familie	(Sciomycidae)	non det.	1985	1985	2				Max. Ab1	Familie sehr häufig gefunden
Netzfliegen-Art	Pherbellia	cinerella	1989	2015	2			1	3 det. B. Merz 1991, max. Ab2	mässig häufig gefunden, unscheinbar und oft übersehen oder nicht registriert, vermutlich sehr häufig
Netzfliegen-Art	Pherbellia	pallidicarpa = lichtwardti	1987	1987	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 det. B. Merz 1991, max. Ab1	erst 1 Mal gefunden
Netzfliegen-Art	Dichetophora	obliterata	2014	2016				2	1 Männchen und 1	wenig häufig gefunden
Netzfliegen-Art	Hydromyia	dorsalis	1988	1988	1				Waldlichtung nördlich des Südwesthanges, 1 conf. B. Merz 1991	selten gefunden
Netzfliegen-Art	Trypetoptera	punctulata	1984	2015	7		1	1	2 conf. B. Merz 1991, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Netzfliegen-Art	Coremacera	fabricii	1985	1985	1				Wald auf dem "Plateau" südlich der Waldlichtung, 1 det. B. Merz 1991	erst 2 Mal gefunden
Netzfliegen-Art	Coremacera	halensis	1990	1990	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen conf. G. Bächli 2013	selten gefunden
Netzfliegen-Art	Euthycera	fumigata	1990	2017	1		1	1	1 det. B. Merz 1991, max. Ab1	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Netzfliegen-Art	Limnia	unguicornis	1985	2015	1			2	1 det. B. Merz 1991, max. Ab1	häufig gefunden
Netzfliegen-Art	Sciomyca	simplex	2015	2015				2	Max. Ab1	selten gefunden
Polier- od. Faulfliegen-Art	Calliopum	aeneum	1987	1990	3				1 Weibchen und 1 det. B. Merz 1991, max. Ab1	wenig häufig gefunden
Polier- od. Faulfliegen-Art	Lyciella	decempunctata	1987	1991	4				1 det. B. Merz 1991, max. Ab4	selten gefunden
Polier- od. Faulfliegen-Art	Lyciella	rorida	1987	1990	9				2 det. B. Merz 1991, max. Ab3	wenig häufig gefunden
Scheufliege Gattung	Tephroclamys	sp.	1985	1985	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 det. genus B. Merz 1991	Gattung erst 1 Mal gefunden
Scheufliegen-Art	Suillia	gigantea	1989	1989	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 det. B. Merz 1991	selten gefunden, Bestimmung unsicher
Saft- od. Wiesenfliegen-Art	Geomyza	tripunctata	1984	2017	11		1	1	1 Männchen. 1 Weibchen und 2 det. B. Merz 1991, max. Ab3	wenig häufig gefunden
Saft- od. Wiesenfliegen-Art	Opomyza	florum	1984	1991	8				2 Männchen und 1 det. B. Merz 1991, max. Ab2	wenig häufig gefunden
Dungfliege Gattung	Crumomyia	sp.	1990	1990	1				Waldlichtung am Südwesthang, det. genus B. Merz	Gattung erst 1 Mal gefunden, aber später kaum mehr registriert
Dungfliegen-Art	Sphaerocera	curvipes	1992	1992	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 det. B. Merz 1992	erst 1 Mal gefunden, aber später kaum mehr registriert
Salz- od. Sumpffliegen-Art (nicht bestimmt)	(Ephydridae)	non det. Art A	1983	1990	56				Max. Ab5	im Chilpen-Reservat häufig gefunden, aber anderswo kaum registriert
Halmfliege Familie	(Chloropidae)	non det.	1984	1988	18				Max. Ab5	Familie mässig häufig gefunden, aber oft übersehen und kaum registriert
Halmfliegen-Art	Chlorops	fasciatus	1985	1988	2				1 det. B. Merz 1991, max. Ab1	erst 2 Mal gefunden, aber später kaum mehr registriert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4			
Halmfliegen-Art	Chlorops	geminatus	1984	1989	4				1 det. B. Merz 1991, max. Ab1	selten gefunden, aber später kaum mehr registriert
Kotfliegen-Art	Gonatherus	planiceps	1990	1990	1				Waldlichtung nördlich des Südwesthanges, 1 det. incert. B. Merz 1991	erst 1 Mal gefunden, aber später kaum mehr registriert
Kotfliegen-Art	Norellia	spinimana	1988	1988	1				Waldrand im Südosten des Südwesthanges, 1 det. B. Merz 1991	erst 2 Mal gefunden, aber später kaum mehr registriert
Kotfliegen-Art	Scatophaga	lutaria	1985	1989	2				1 Männchen und 1 Weibchen det. B. Merz 1991, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercoraria	1985	2004	19	1	2		2 Weibchen und 1 Männchen det. B. Merz 1991, max. Ab5	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert
Blumenfliege Familie	(Anthomyidae)	non det.	1985	1989	300				Max. Ab5	sehr häufig gefunden, aber kaum registriert
Kleine Stubenfliege	Fannia	armata	1987	2008	38		1		Max. Ab4	mässig häufig gefunden, aber meist nicht registriert
Stubenfliege Familie	(Muscidae)	non det.	1989	2008	91		**	**	Max. Ab5	Familie sehr häufig gesehen, aber nur wenige auffällige und leicht zu bestimmende Arten registriert
Stubenfliegen-Verwandte Gattung	Dasyphora	sp.	1985	1985	1		*	*	Wegböschung westlich Südwesthang, unsicher bestimmt	Gattung erst 1 Mal gefunden, aber später oft nicht mehr registriert
Stubenfliegen-Verwandte	Eudasyphora	cyanicolor	1987	1985	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 det. B. Merz 1992	erst 1 Mal gefunden, aber später oft nicht mehr registriert
Stubenfliegen-Verwandte	Mesembrina	meridiana	1983	2004	19	1	1		1 conf. B. Merz 1992, max. Ab2	häufig gefunden
Stubenfliegen-Verwandte	Mesembrina	mystacea	1990	1990	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Weibchen conf. B. Merz 1992	
Stubenfliegen-Verwandte	Morellia	hortorum	1985	1985	1				Wegböschung westlich Südwesthang 1 Männchen det. B. Merz 1992	erst 2 Mal gefunden, aber später nicht mehr registriert
Stubenfliegen-Verwandte	Morellia	podagrica = simplex	1986	1990	4				2 Weibchen und 1 Männchen det. B. Merz 1992, max. Ab1	selten gefunden, aber später nicht mehr registriert

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Stubenfliegen-Verwandte	Morellia	aenescens	1988	1988	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen det. incert. B. Merz 1992	erst 1 Mal gefunden, aber später nicht mehr registriert
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis	1984	2016	84			2	2 Weibchen und 1 Männchen. B. Merz 1992, max. Ab4	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert
Stubenfliege Gattung	Neomyia = Orthellia	sp.	1982	2015	58	1		1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen kann
Stubenfliegen-Verwandte	Neomyia = Orthellia	cornicina	1990	1990	1				1 Männchen det. B. Merz 1992	
Stubenfliegen-Verwandte	Neomyia = Orthellia	viridescens	1984	1984	1				1 Weibchen det. B. Merz 1992	
Stubenfliegen-Verwandte	Polietes	lardarius	1980	1991	33				1 Weibchen und 1 Männchen det. B. Merz 1992, max. Ab4	sehr häufig gefunden, auf Kuhfladen, im Herbst auch auf Blättern am Waldrand
Wadenstecher	Stomyx	calcitrans	1987	1989	2				1 Weibchen conf. B. Merz 1992, max. Ab4	erst 2 Mal gefunden, aber später nicht mehr registriert
Stubenfliegen-Verwandte	Graphomyia	maculata	1985	1990	10		*	*	1 Weibchen conf. B. Merz 1992, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Stubenfliegen-Verwandte	Helina	evecta = lucorum	1986	1991	19				Max. Ab2	
Stubenfliegen-Verwandte	Phaonia	pallida	1987	1987	3				Max. Ab2	nur selten registriert, vermutlich häufig
Hirschlausfliege	Lipoptena	cervi	1986	1990	10				Max. Ab1	mässig häufig gefunden
Schmeissflieg Familie	(Calliphoridae)	non det.	1989	1990	19		*	*	Max. Ab1	Familie sehr häufig gesehen, aber nicht registriert
Schmeissfliegen-Art	Calliphora	vicina	1985	1989	7				Max. Ab1	wenig häufig registriert
Schmeissfliegen-Art	Calliphora	vomitorea (?) sp. E	1985	1991	12		*	*	unsicher bestimmt, max. Ab1	nur wenig häufig registriert, vermutlich sehr häufig

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Schmeissfliegen-Art	Cynomyia	mortuorum	1985	1990	5				Max. Ab1	häufig gefunden
Kaisergoldfliege	Lucilia	caesar	1986	1991	52				1 det. B. Merz 1998, max. Ab2	vermutlich sehr häufig, aber nur selten registriert
Goldfliegen-Art (nicht sicher bestimmt)	Lucilia	sericata	1986	1991	18				1 Männchen det. B. Merz 1998, max. Ab2	vermutlich häufig, aber selten registriert
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1985	2015	220	8	3	4	Max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden
Schmeissfliegen-Art	Stomorhina	lunata	1988	2015	9			3	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, weil zu wenig beachtet, aber vermutlich häufig
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1982	2009	376	2	24	**	Max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert
Raupenflieg Familie	(Tachinidae)	non det.	1984	1987	188		**	**	Max. Ab4	Familie sehr häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	Eriothrix	rufomaculata	1985	2004	53		4		Max. Ab4	häufig gefunden
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1985	2014	53		6	2	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	Gymnosoma	clavatum	1987	1987	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen	selten gefunden
Raupenfliegen-Art	Gymnosoma	rotundatum	1985	2015	2			7	Max. Ab2	bis etwa 2013 nur selten auf die Art bestimmt und meist als Gymnosoma sp. registriert, sehr häufig
Raupenfliegen-Art	Phasia = Alophora	hemiptera	1989	1989	1				Föhrenwald im Norden des Südwesthanges	häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	Phasia	obesa	1990	1990	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen det. B. Botta 1999	wenig häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	Ectophasia	crassipennis	2015	2015				1	Waldlichtung im nördlichen Teil des Osthangs	häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art	Bemerkungen zur Art in der Region
			Beobachtung	Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort	
Raupenfliegen-Art	Cylindromyia = Ocyptera	bicolor	2015	2015				1	Waldlichtung am Südwesthang	selten gefunden
Raupenfliegen-Art	Cylindromyia = Ocyptera	brassicaria	2004	2004			2		Max. Ab2	unsicher bestimmt
Raupenfliege Gattung	Tachina	sp.	1984	2004	105				Max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	fera	1985	2015	2		2	9	1 Männchen und 1 det. B. Merz, max. Ab2	häufig gefunden, aber oft nicht registriert
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	magnicornis	1985	2017	1			6	1 det. B. Merz 2000, max. Ab1	häufig gefunden
Raupenfliegen-Art	Nowickia	ferox	1985	2004	3		2		2 det. B. Merz 2000, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Grüne Raupenfliege	Gymnochaeta	viridis	1989	1991	4				Max. Ab1	wenig häufig gefunden, aber vermutlich oft übersehen