

Kiegsrube Hard Dulliken (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 639500 244200 Höhe ü. M.: 400 m

	BP 1 (1992–2001)	BP2 (2002–2011)	BP3 (2012–2015)	alle BP (1992–2015)											
Anzahl Begehungen:	8	10	7	25											
Beobachtungsdauer:	27 Std. 30 Min.	21 Std. 20 Min.	19 Std. 5 Min.	67 Std. 55 Min.											
Berechnung des Seltenheits-Index der Fauna:	Anzahl:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Indices:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Durchschn. Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
	Ereignisse:	368	326	283	977	1'008	813	740	2561		2,74	3,31	2,61	2,62	
	Arten:	217	165	169	348	719	533	537	1386		3,31	3,23	3,18	3,98	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-Index
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-----	-----	-----	---	-----------------------------------	-------------------

WEICHTIERE

			1995							
Gemeine Achatschnecke	Cochlicopa	lubrica	2014	2014			1	max. Ab 1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig	2
Wegschnecke Gattung	Arion	sp.	1995	2005	2	1		max. Ab 3	Gattung sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	-
Grosse Wegschnecke	Arion	rufus	1995	2005	2	2		max. Ab 3	mässig häufig gefunden, wird neuerdings von der Spanische Wegschnecke verdrängt	4
Weitmündige Glanzschnecke	Aegopinella	nitens	1995	2005	3	1		max. Ab 1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Ackerschnecke Gattung	Deroceras	sp.	1995	1995	1			max. Ab 2	Gattung häufig gefunden, aber nur mässig häufig registriert, nicht beurteilt	-
Kartäuserschnecke	Monacha	cartusiana	2005	2015		2	6	max. Ab 5	häufig gefunden, kann lokal in grossen Massen auftreten, gilt nach Literatur als wenig häufig	2
Seidenhaarschnecke	Trochulus = Trichia	sericeus	1995	2005	3	2		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Gemeine Heideschnecke	Helicella	itala	1995	2015	1	1	3	max. Ab 3	sehr häufig gefunden	1

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe (max. Ab): 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse, Index: 1 mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse, Index: 4 selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse, Index: 16
häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse, Index: 2 wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse, Index: 8 sehr selten gefunden: 1 bis 2 Ereignisse, Index: 32

Regio Basiliensis: Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im		Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3	Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kantige Laubschnecke	Hygromia	cinctella	2005	2015		2	3	max. Ab 2	mässig häufig gefunden, Neozoon, seit 1997 häufiger, bes. im Siedlungsraum	4
Rötliche Laubschnecke	Monachoides = Perforatella	incarnatus	2015	2015			1	max. Ab 3	häufig ngefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig	1
Schwarzmündige Bänderschnecke	Cepaea	nemoralis	1995	2015	1	3	2	max. Ab 3	sehr häufig gefunden	1
Weissmündige Bänderschnecke	Cepaea	hortensis	2005	2005		1		max. Ab 1	häufig gefunden	2
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	1995	1995	1			max. Ab 2	sehr häufig gefunden	1
GLIEDERFÜSSLER			1995							
SPINNENTIERE			1995							
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(Phalangidae)	non det.	1995	1995	2			max. Ab 1	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	-
Streckerinnen-Art	Tetragnatha	extensa	2015	2015			1	max. Ab 1	an Bächen mässig häufig gefunden, vermutlich aber häufig	3
Eichblatt-Radspinne	Aculepeira	ceropegia	1995	2005	2	1		max. Ab 2	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Brückenspinne	Larinioides	sclopetarius	1995	1995	1			max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8
Streifenkreuzspinne	Mangora	acalypha	2005	2005		1		max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	4
Kugel- oder Haubennetzspinnen-Art	Theridion	impressum	1995	1995	1			max. Ab 1	wenig häufig gefunden, weil klein und unscheinbar, in den Bodenfallen der WSL nur 2	8
Wolfsspinne Familie	(Lycosidae)	non det.	1995	2015	4	3	1	max. Ab 5	Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	-
Wolfsspinne Gattung	Pardosa	sp.	1995	1995	1			max. Ab 2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	amentata	1999	2005	1	1		max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 204	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	1995	2015	4	3	1	max. Ab 5	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 219	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	wagleri	1995	2006	1	5		max. Ab 3	mässig häufig gefunden, typisch für Kiesgruben	4
Wolfsspinnen-Art	Xerolycosa	nemoralis	1995	1995	1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Listspinne	Pisaura	mirabilis	1995	2015	1	1	1	max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1995	1995	3			max. Ab 4	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			1995	2015				BP1	BP2			
Grüne Krabbenspinne	Diaea	dorsata	1995	2015			1		1	max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	4
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	2006	2015				1	1	max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	1
Krabbenspinne Gattung	Xysticus	sp.	1995	1995			1			max. Ab 1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Springspinnen-Art	Evarcha	arcuata	1995	1995			2			max. Ab 1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
KREBSTIERE			1995									
Muschelkrebs Ordnung	(Ostracoda)	non det.	1995	1995			1			max. Ab 5	selten gefunden, weil nicht danach gesucht, nicht inventarisiert	-
Flohkrebs Gattung	Gammarus	sp.	2015	2015					1	max. Ab 4	Gattung in Gewässern mässig häufig gefunden, aber oft in grosser Anzahl gefunden	-
Landassel Ordnung	(Oniscoidea)	non det.	1995	1995			3			max. Ab 2	häufig gefunden	-
Kellerassel-Art	Porcellio	scaber	1999	1999			1			max. Ab 1	mässig häufig registriert, wahrscheinlich im Versteckten häufig	2
Assel-Art	Cylisticus	convexus	1995	1995			1			max. Ab 1	selten gefunden, weil nur selten danach gesucht	8
Assel-Art	Trachelipus	rathkei	2005	2015				2	1	max. Ab 3	häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig	1
Rollassel-Art	Armadillidium	opacum	2005	2005				1		max. Ab 1	mässig häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten häufig	2
VIELFÜSSER			1995									
Steinläufer Gattung	Lithobius	sp.	1999	2015			1	1	1	max. Ab 1	Gattung häufig gefunden, aber nie auf die Art bestimmt und oft nicht registriert	-
Tausendfüsser-Art	Polydesmus	testaceus	1995	1995			1			max. Ab 1	selten gefunden, aber vermutlich in der Erde häufig, nicht inventarisiert	-
INSEKTEN			1995									
Libellen			1995									
Gebänderte Prachtlibelle	Calopteryx	splendens	1995	1995			1			max. Ab 1	Gattung an Flüssen und Bächen häufig gefunden	2
Weidenjungfer	Lestes	viridis	2015	2015					2	max. Ab 3	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, besonders im Herbst	4
Frühe Adonislibelle	Pyrrhosoma	nymphula	2015	2015					2	max. Ab 1	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Grosse Pechlibelle	Ischnura	elegans	1995	2015			1	2	2	max. Ab 2	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3				
Kleine Pechlibelle	Ischnura	pumilio	2005	2013		1	1		max. Ab 2	mässig häufig gefunden, vor allem in flachen Kiesgrubentümpeln	4	
Becher-Azurjungfer	Enallagma	cyathigerum	2006	2015		1	1		max. Ab 2	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2	
Hufeisen-Azurjungfer	Coenagrion	puella	1995	2015	2	1	2		max. Ab 3	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2	
Blaugrüne Mosaikjungfer	Aeshna	cyanea	1995	2015	1	1	1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	1	
Grosse Königslibelle	Anax	imperator	1995	2015	1	1	2		max. Ab 2	häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern	2	
Vierfleck	Libellula	quadrimaculata	1995	2015	2	1	2		max. Ab 3	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2	
Plattbauch	Libellula	depressa	1995	2015	1	1	2		max. Ab 1	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2	
Südlicher Blaupfeil	Orthetrum	brunneum	2005	2015		1	2		max. Ab 2	an Gewässern mässig häufig, oft auch an Pfüetzen	4	
Grosse Heidelibelle	Sympetrum	striolatum	1995	2015	2	1	2		max. Ab 3	häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst	2	
Frühe Heidelibelle	Sympetrum	fonscolombei	2013	2013			2		max. Ab 1	selten gefunden	16	
Heuschrecken			1995									
Gemeine Sichelschrecke	Phaneroptera	falcata	2005	2015		1	2		max. Ab 2	früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen und häufig	2	
Grünes Heupferd	Tettigonia	viridissima	1995	2013	6	1	1		max. Ab 3	sehr häufig gefunden	1	
Gewöhnliche Strauschschrecke	Pholidoptera	griseoptera	1995	1995	1				max. Ab 3	sehr häufig gefunden	1	
Feldgrille	Gryllus	campestris	2005	2005		2			max. Ab 2	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1	
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	2005	2005		1			max. Ab 2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1	
Langfühler-Dornschrecke	Tetrix	tenuicornis	1995	2015	5	1	2		max. Ab 4	sehr häufig gefunden	1	
Blauflüglige Sandschrecke	Sphingonotus	caerulans	2005	2015		6	2		max. Ab 4	mässig häufig gefunden und in Ausbreitung begriffen, nur auf nacktem Kiesboden	4	
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus = Gomphocerus	rufus	1995	1995	1				max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1	
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1995	2015	4	6	7		max. Ab 4	sehr häufig gefunden	1	
Brauner Grashüpfer	Chorthippus	brunneus	1995	2015	5	6	3		max. Ab 4	sehr häufig gefunden	1	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	Beobachtungsgebiet	Beobachtungsgebiet			
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1995	2013	4	1	1	max. Ab 4	sehr häufig gefunden	1	
Wanzen			1995								
Rückenschwimmer Gattung	Notonecta	sp.	1995	1995	1			max. Ab 2	Gattung in stehenden Gewässern häufig gefunden	2	
Wasserläufer Gattung	Gerris	sp.	1995	2015	1	2	1	max. Ab 2	Gattung in stehenden Gewässern häufig gefunden	2	
Wasserläufer-Art	Gerris	najas	2005	2005		1		max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8	
Wasserläufer-Art	Gerris	gibbifer	2015	2015			1	max. Ab 2	mässig häufig gefunden, aber vermutlich auf stehenden Gewässern häufig, in den Fallen der	2	
Wasserläufer-Art	Gerris	lacustris	2013	2013			1	max. Ab 1	mässig häufig gefunden, aber vermutlich auf stehenden Gewässern häufig, in den Fallen der	2	
Streifenwanze	Graphosoma	lineatum	1995	1995	1			max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	2015	2015			1	max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	1	
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	1995	1995	1			max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2	
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	1995	2015	3		2	max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	1	
Ginster-Baumwanze	Piezodorus	lituratus	1995	1995	1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4	
Gartenwanze	Raphigaster	nebulosa	2005	2005		1		max. Ab 1	wenig häufig gefunden, vor allem im Siedlungsraum	8	
Kohlwanze	Eurydema	oleraceum	1995	1995	1			max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	2	
Bläuling, Blaugrüne Baumwanze	Zicrona	coerulea	1995	1995	2			max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4	
Randwanzen-Art	Enoplops	scava	1995	2015	2		2	max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4	
Leder- oder Saumwanzen-Art	Coreus	marginatus	1995	2015	1	1	1	max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	1	
Glasflügelwanzen-Art	Corizus	hyoscyami	1995	2015	1		1	max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2	
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalus	parumpunctatus	1995	1995	1			max. Ab 1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	8	
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus	punctatonervosus	1995	2015	3		3	max. Ab 5	häufig gefunden	2	
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus	abutilon	1995	2015	1		1	max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Brennesselwanze	Heterogaster	urticae	1995	1995	1				max. Ab 1 einer von 4 Fundorten in der Region	selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	16
Bodenwanzen-Art	Rhyparochromus	pini	2015	2015			1	max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 32	4	
Sichelwanzen-Art	Nabis	rugosus	2005	2005		1		max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 28	2	
Gemeine Wiesenwanze	Lygus	pratensis	1995	2015	1	2	1	max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 46	2	
Gemeine Zierwanze	Adelphocoris	lineolatus	1995	2005	1	2		max. Ab 2	häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	1	
Weichwanzen-Art	Stenodema	laevigatum	2014	2014			1	max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 42	2	
Gleichflügler			1995								
Blutzikaden-Art	Cercopis	vulnerata	2015	2015			1	max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Büffelzirpe	Stictocephala	bisonia	1995	2015	2		2	max. Ab 2	mässig häufig gefunden, Neozoon	4	
Grüne Zwergzikade	Cicadella	viridis	1995	2015	3	1	1	max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in Feuchtlebensräumen oft massenhaft	1	
Netzflügler			1995								
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla	carnea	1995	2005	3	1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1	
Käfer			1995								
Berg-Sandläufer	Cicindela	silvicola	2013	2013			1	max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Dünen-Sandläufer	Cicindela	hybrida	2005	2005		1		max. Ab 1	mässig häufig gefunden, nur auf Sandböden	4	
Feld-Sandläufer	Cicindela	campestris	1995	2015	4	4	5	max. Ab 3	sehr häufig gefunden	1	
Laufkäferlarve (nicht bestimmt)	(Carabidae)	(Larve)	1995	1999	2			max. Ab 1	selten gefunden, nicht beurteilt	-	
Ahlenläufer-Art	Bembidion	milleri	2015	2015			1	max. Ab 2 einer von 4 Fundorten in der Region	selten gefunden	16	
Ahlenläufer-Art	Bembidion	tetragrammum	1995	1995	1			max. Ab 1 einer von 3 Fundorten in der Region	selten gefunden	16	
Zweifleckiger Schmuckläufer	Anisodactylus	binotatus	2005	2005		2		max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 106	2	
Schmuckläufer-Art	Anisodactylus	signatus	1995	1995	1			max. Ab 1 einzigster Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden	32	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2	BP3		BP1	BP2			
Schnellläufer-Art	Ophonus	ardosianus	1995	1999	3				max. Ab 2	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	8
Schnellläufer-Art	Ophonus = Metophonus	puncticeps	1995	1995	1				max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) : 42	4
Schnellläufer-Art	Harpalus = Pseudophonus	rufipes	2005	2005		1			max. Ab 2	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 79	4
Schnellläufer-Art	Harpalus = Pseudophonus	griseus	1995	1995	?1				max. Ab 1	erst 1 Mal gefunden, aber unsicher, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	16
Erzgrüner Schnellläufer	Harpalus	affinis = aeneus	1995	2005	1	3			max. Ab 2	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12	4
Schnellläufer-Art	Harpalus	distinguendus	1995	1995	1				max. Ab 2	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	8
Schnellläufer-Art	Harpalus	dimidiatus	1995	1995	1				max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 86	4
Behaarter Schnellläufer	Harpalus	rubripes	1995	2015	2		1		max. Ab 2	mässig häufig gefunden	4
Laufkäfer-Art	Bradycellus	verbasci	1995	1995	1				max. Ab 1 einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden , in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) 1 Individuum	32
Kupferiger Schulterläufer, Listkäfer-Art	Poecilus	cupreus	1995	2015	2	1	1		max. Ab 1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 598	1
Schulterläufer- oder Listkäfer-Art	Poecilus	versicolor	1995	1995	1				max. Ab 1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 71	2
Frühlings-Grabkäfer	Pterostichus	vernalis	1999	1999	1				max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 35	4
Ovaler Kanalkäfer-, Kamelläufer	Amara s.str.	ovata	1999	1999	1				max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18	4
Schnellschwimmer-Art	Rhantus	pulverosus	1995	1995	1				max. Ab 2	erst 2 Mal gefunden, nicht inventarisiert	-
Schmalräuber-Art	Stenus	comma	1995	1995	2				max. Ab 4	selten gefunden , vermutlich in geeigneten Habitaten häufig	8
Gemeiner Uferräuber	Paederus	litoralis	1995	1995	1				max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	Staphylinus	dimidiaticornis	2015	2015			1		max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1995	2005	1	1			max. Ab 2	sehr häufig gefunden	1
Grüner Warzenkäfer	Malachius	viridis	2005	2005		1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	ustulatus	1995	2013	1	2	1		max. Ab 2	mässig häufig gefunden	4
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	gallicus	1995	2005	1	1			max. Ab 2	häufig gefunden	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			1995	1995	1995	2015	2015	BP1	BP2			
Glanzkäfer Gattung	Meligethes	sp.	1995	1995		1			max. Ab 1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1995	2015	4	4	1		max. Ab 3	sehr häufig gefunden	1	
Zweipunkt	Adalia	bipunctata	2006	2006		1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4	
Vierzehnpunktiger Marienkäfer	Propylaea	quadridecem-punctata	2005	2005		1			max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	1995	2005	1	1			max. Ab 2	häufig gefunden	2	
Graugrüner Schenkelkäfer	Oedemera	virescens	1995	2005	1	1	1		max. Ab 2	häufig gefunden	2	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	1995	2015	2		1		max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	brevicauda	1995	1995	2				max. Ab 2	häufig gefunden	2	
Waldmistkäfer	Geotrupes	stercorosus	2005	2005		2			max. Ab 2	häufig gefunden, besonders im Wald	2	
Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	1995	1995	1				max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	1	
Moschusbock	Aromia	moschata	2005	2005		1			max. Ab 1	selten gefunden, weil versteckte Lebensweise	8	
Gemeiner Langbeinkäfer	Labidostomis	longimana	1995	1995	1				max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8	
Hieroglyphenkäfer	Pachybrachys	sinuatus	1995	1995	1				max. Ab 2	selten gefunden	16	
Weidenblattkäfer Gattung	Phratora = Phyllodecta Kirby	sp.	1995	1995	1				max. Ab 1	Gattung wenig häufig gefunden	8	
Kohlerdfloh Gattung	Altica	sp.	1995	1995	3				max. Ab 1	Gattung mässig häufig gefunden, aber meist übersehen oder nicht inventarisiert	-	
Erdflohkäfer-Art	Crepidodera	aurata	1995	1995	1				max. Ab 1	selten gefunden	16	
Schildkäfer-Art	Hypocassida	subferruginea	2005	2005		1			max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8	
Kratzdistelrüssler	Larinus	turbinatus	2005	2005		1			max. Ab 2	mässig häufig gefunden, stellenweise in grosser Zahl auf Disteln, gilt nach Literatur als mässig	4	
Hautflügler			1995									
Blattwespen-Art	Duplophanes = Neoselandria	morio	1995	1995	1				max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4	
Blattwespen-Art	Dolerus	germanicus	2005	2015		1	1		max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region		Index
			1995	2005	1	2		BP1	BP2	BP3				
Kohlrübsenblattwespe	Athalia	rosae	1995	2005	1	2			max. Ab 3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 23		2		
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	stigma	1995	1995	1				max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11		4		
Blattwespen-Art	Macrophya	rufipes	1995	1995	1				max. Ab 1	mässig häufig gefunden		4		
Brackwespe Gattung (Puppenkokon)	Apanteles	sp. (Puppenkokon)	1995	1995	1				max. Ab 1	Gattung häufig gefunden		2		
Brackwespe Gattung	Chelonus	sp.	2005	2005		1			max. Ab 1	Gattung mässig häufig gefunden		4		
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	sarcitorius	1995	1995	1				max. Ab 1	häufig gefunden		2		
Sichelwespe Unterfamilie	(Anomaloninae)	non det.	1995	1995	1				max. Ab 1	Unterfamilie sehr häufig gefunden		-		
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	1995	2015	1		1		max. Ab 1	sehr häufig gefunden		1		
Schwarze Schlupfwespe	Pimpla	rufipes	1995	1995	1				max. Ab 1	häufig gefunden		2		
Schlupfwespen-Art	Diplazon	tibiatorius	2005	2005		1			max. Ab 2 einer von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden		32		
Knotenameisen-Art	Manica	rubida	1995	2014	2	2	1		max. Ab 4	mässig häufig, auf Sandböden lokal sehr häufig		4		
Gemeine Rasenameise	Tetramorium	caespitum	1995	1995	1				max. Ab 2	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3 Individuen		2		
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1995	2005	2	4			max. Ab 4	sehr häufig gefunden in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 1248 Individuen		1		
Wegameisen-Art	Lasius	platythorax	2005	2005		1			max. Ab 3	mässig häufig gefunden		4		
Gelbe Wegameise	Lasius	flavus	2005	2005		1			max. Ab 3	sehr häufig gefunden in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 495 Individuen		1		
Zweifarbige Sklavenameise	Formica	rufibarbis	1995	1995	1				max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 89		1		
Urbane Hilfsameise	Formica	fuscocinerea = lefrancoisi	1995	2015	6	5	2		max. Ab 4	häufig, gefunden, aber nur auf Kiesböden (Alluvionen)		2		
Pillenwespen-Art	Eumenes	pedunculatus	2015	2015			1		max. Ab 1	wenig häufig gefunden		8		
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	nigricornis	1995	1995	1				max. Ab 1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12		2		
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	1995	2015	3	3	2		max. Ab 4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern		1		
Hornisse	Vespa	crabro	1995	2015	1	1	1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4		1		

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	1995	2015	2	1	1	max. Ab 2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 359	1	
Wegwespen-Art	Anoplius	nigerrimus	1995	1995	1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	4	
Wegwespen-Art	Anoplius	infuscatus	1995	1995	1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4	
Bienenwolf (Grabwespe)	Philanthus	triangulum	1995	1995	1			max. Ab 2	wenig häufig gefunden	8	
Bienenjagende Knotenwespe	Cerceris	rybiensis	2005	2005		1		max. Ab 1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2	
Knotenwespen-Art	Cerceris	quinquefasciata	1995	1995	1			max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8	
Grabwespen-Art	Gorytes	laticinctus	1995	1995	1			max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8	
Kotwespen-Art (Grabwespe)	Mellinus	arvensis	2006	2006		1		max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8	
Grabwespen-Art	Psen s.str.	ater	2005	2005		1		max. Ab 1 einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden , nach De Beaumont nur in der Südschweiz, im Wallis und selten im	32	
Grabwespen-Art	Psen (Mimumesa)	atratinus	1995	1995	2			max. Ab 1	selten gefunden	16	
Grabwespen-Art	Pemphredon	inornata	1995	1995	1			max. Ab 1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6	8	
Grabwespen-Art	Ectemnius (Hypocrabro)	continuus	1995	1995	2			max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2	
Fliegenspiesswespen-Art (Grabwespe)	Oxybelus	bipunctatus	1995	2005	1	1		max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4	
Maskenbiene Gattung	Hylaeus	sp.	1995	1995	1			max. Ab 1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Gehörnte Maskenbiene	Hylaeus	cornutus	1995	1995	1			max. Ab 1 einer von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32	
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communis	2005	2005		1		max. Ab 1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 26	2	
Mauer-Maskenbiene	Hylaeus	hyalinatus	2015	2015			1	max. Ab 1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4	
Reseden-Maskenbiene	Hylaeus	signatus	2005	2005		4		max. Ab 2	mässig häufig gefunden, fliegen an Gelber Resede, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1	4	
Rainfarn-Seidenbiene	Colletes	similis	2005	2015		2	1	max. Ab 2	wenig häufig gefunden	8	
Rotbeinige Furchenbiene	Halictus	rubicundus	2005	2005		1		max. Ab 1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	2	
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosae	1995	2015	1	5	3	max. Ab 2	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	Beobachtungsgebiet	Beobachtungsgebiet			
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	1995	2015	1		2	max. Ab 1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 17	1	
Langobarden-Furchenbiene	Halictus	langobardicus	2014	2014			1	max. Ab 1	selten gefunden	16	
Dichtpunktierte Goldfurchenbiene	Halictus	subauratus	2015	2015			1	max. Ab 1	selten gefunden	16	
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	1995	1995	2			max. Ab 1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 29	1	
Breitbindige Schmalbiene	Lasioglossum	zonulum	1995	1995	1			max. Ab 2	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	2	
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1995	2015	1	1	1	max. Ab 2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 50	1	
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum	malachurum	1995	2015	3		1	max. Ab 2	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 76	2	
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	1995	2015	4	4	3	max. Ab 5	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 616	1	
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauxillum	2005	2005		3		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 49	1	
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	2005	2005		1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	1	
Mattglänzende Schmalbiene	Lasioglossum	semilucens	2005	2005		1		max. Ab 1	selten gefunden , den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	16	
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum	morio	1995	1995	2			max. Ab 1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 93	1	
Dickkopf-Blutbiene	Sphecodes	monilicornis	1995	1995	1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4	
Schencks Blutbiene	Sphecodes	schenckii	2013	2015			2	max. Ab 1	wenig häufig gefunden, aber in letzter Zeit häufiger geworden	8	
Buckel-Blutbiene	Sphecodes	gibbus	1995	1995	1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4	
Gewöhnliche Blutbiene	Sphecodes	ephippius	1995	2005	1	2		max. Ab 1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2	
Rostfarbene Blutbiene	Sphecodes	ferruginatus	1995	2005	2	2		max. Ab 2	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2	
Punktierte Zwergsandbiene	Andrena	nana	2005	2005		1		max. Ab 1 einer von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32	
Gewöhnliche Zergsandbiene	Andrena	minutula	1995	1995	1			max. Ab 2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13	2	
Pippau-Sandbiene	Andrena	fulvago	1995	1995	1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	4	
Zweifarbige Sandbiene	Andrena	bicolor	1995	1995	1			max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21	2	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			1995	2015				1995	2015				
Gewöhnliche Bindensanbiene	Andrena	flavipes	1995	1995	1					max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	2	
Garten-Wollbiene	Anthidium	manicatum	1995	1995	1					max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Weissfleckige oder Punktierte Wollbiene	Anthidium	punctatum	2015	2015				1		max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8	
Garten-Blattschneiderbiene	Megachile	willoughbiella	2015	2015				1		max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2	
Juni-Langhornbiene	Eucera	longicornis	1995	1995	1					max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	1995	2015	3	4	2			max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 71	1	
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum	1995	2015	2		1			max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 262	1	
Baumhummel	Bombus	hypnorum	2015	2015				1		max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	2	
Steinhummel	Bombus	lapidarius	2005	2013		4	2			max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	1	
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1995	2015	3	1	5			max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 96	1	
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	2013	2015				4		max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	1	
Gartenhummel	Bombus	hortorum	2013	2013				1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	1	
Honigbiene	Apis	mellifera	1995	2015	7	6	5			max. Ab 5	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 489	1	
Köcherfliegen			1995										
Köcherfliege Gattung	Hydropsyche	sp.	2015	2015				1		max. Ab 1	Gattung mässig häufig gefunden, für die Region beim CSCF mehr als 50 Quadrate	1	
Köcherfliegen-Art	Hydropsyche	incognita	2005	2005				1		max. Ab 1	mässig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 35 Quadrate	2	
Köcherfliegen-Art	Limnephilus	lunatus	1995	1995	1					max. Ab 1	wenig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 30 Quadrate	2	
Schmetterlinge			1995										
Sackträger-Art	Psyche	casta	2005	2005				1		max. Ab 1	Säcke sehr häufig, männliche Falter aber selten gefunden, R.Bas.: 25, 95	1	
Kohlmotte, Schleiermotte	Plutella	xylostella	1995	1995	1					max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Grasminiermotte Gattung	Depressaria	sp.	2006	2006				1		max. Ab 1	Gattung häufig gefunden	2	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			1995	2005	2015	BP1	BP2	BP3	BP1			
Grasminiermotten-Art	Depressaria	douglasella	1995	1995			1			max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8
Palpenmotten-Art	Scrobipalpula	tussilaginis	2015	2015				1		max. Ab 1		-
Wickler-Art	Cochylis	dubitana	1995	1995	1					max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8
Wickler-Art	Celypha	rufana	1995	2005	2	1				max. Ab 2	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Celypha	lacunana	1995	2015	1		1			max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1
Wickler-Art	Phiaris (Olethreutes)	olivana	1995	1995	1					max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Eucosma	conterminana	1995	2005	1	1				max. Ab 2	selten gefunden	16
Wickler-Art	Epiblema	sticticana	1995	1995	3					max. Ab 2	mässig häufig gefunden, Raupen an Huflattich	4
Wickler-Art	Cydia	compositella	1995	1995	1					max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Federgeistchen-Art	Platyptilia	gonodactyla	1995	2015	3	2	1			max. Ab 4	mässig häufig gefunden, an Huflattich	4
Schlehengeistchen, Winden-Federgeistchen	Pterophorus	pentadactyla	1995	1995	1					max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Federgeistchen-Art	Emmelina	monodactyla	1995	1995	1					max. Ab. 1	mässig häufig gefunden	4
Zünsler-Art	Synaphe	punctalis	2005	2005			1			max. Ab. 1	häufig gefunden	2
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	1995	2015	1	1	4			max. Ab 3	sehr häufig gefunden	1
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	1995	1995	1					max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	pascuellus	1995	1995	1					max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Weisser Graszünsler	Crambus	perlellus	1995	2015	2	1	4			max. Ab 4	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	2005	2015			2	2		max. Ab 2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	1995	2015	1		1			max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	2005	2006			3			max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1
Seerosenzünsler	Elophila	nymphaeata	1995	1995	1					max. Ab 1	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, hier oft in grosser Zahl	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3				
Zünsler-Art	Scoparia	subfusca zelleri	1995	1995	1				max. Ab 1	selten gefunden	16	
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2015	2015			3		max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1	
Zünsler-Art	Paracorsia	repandalis	2005	2005		1			max. Ab 1 einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	32	
Zünsler-Art	Udea	ferrugalis	2015	2015			1		max. Ab 3	mässig häufig gefunden, besonders im Herbst	4	
Wanderzünsler	Nomophila	noctuella	1995	2015	1	1	1		max. Ab. 3	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	1	
Nesselzünsler	Pleuroptya	ruralis	2006	2006		1			max. Ab 1	häufig gefunden, besonders an Brennnesseln	2	
Hummelschwärmer	Hemaris	fuciformis	2005	2005		1			max. Ab 1	am Tag 20 Falter gesehen, R.Bas.: 14, 20	8	
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2005	2015		3	2		max. Ab 2	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1	
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	1995	2005	1	1			max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1	
Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	lineola	1995	1995	2				max. Ab 5	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 164	4	
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	1995	2015	2		1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1	
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	2015	2015			1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	1	
Malven-Dickkopffalter, Eibischfalter	Carcharodus	alceae	2015	2015			1		max. Ab 1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 19	4	
Kleiner Nördlicher Würfelfalter	Pyrgus	malvae	2015	2015			1		max. Ab 1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 338	2	
Schwalbenschwanz	Papilio	machaon	2005	2015		4	3		max. Ab 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1	
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1995	2015	5	7	5		max. Ab 4	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	1	
Tintenfleckweissling-Komplex	Leptidea	sinapis-Komplex	1995	2015	1		2		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1	
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae	1995	2005	1	1			max. Ab 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1	
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1995	2015	1	5	3		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1	
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1995	2013	4	2	1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1	
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	croceus	2015	2015			2		max. Ab 3	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	2015	2015			2	max. Ab 2	sehr häufig gefunden	1	
Goldene Acht, Gemeiner Heufalter	Colias	hyale	2015	2015			1	max. Ab 1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 22, 82	4	
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2013	2013			1	max. Ab 1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1	
Tagpfauenauge	Inachis	io	1995	1995	3			max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1	
Admiral	Vanessa	atalanta	2005	2014		3	2	max. Ab 2	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1	
Distelfalter	Vanessa = Cynthia	cardui	2015	2015			2	max. Ab 2	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	1	
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	1995	2015	3	1	1	max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1	
Landkärtchen	Araschnia	levana	2005	2005		1		max. Ab 1	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2	
Kleiner Perlmutterfalter	Issoria	lathonia	2015	2015			2	max. Ab 1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 30, 89	4	
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1995	1995	2			max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1	
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1995	2015	3		2	max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1	
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	1995	2013	1		1	max. Ab 3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1	
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1995	2015	1		2	max. Ab 2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1	
Mauerfuchs	Lasiommata	megea	2005	2015		2	1	max. Ab 3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1	
Kurzschwänziger Bläuling	Cupido	argiades	2013	2015			4	max. Ab 4	häufig gefunden, erst vor wenigen Jahren wieder in der Schweiz nördlich der Alpen,	2	
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris	semiargus	2015	2015			2	max. Ab 1	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1	
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1995	2015	3	5	4	max. Ab 2	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1	
Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa	clathrata	1995	2015	2	1	1	max. Ab 2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1	
Heidespanner	Ematurga	atomaria	1995	1995	1			max. Ab 2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1	
Spanner-Art	Cabera	exanthemata	1995	1995	1			max. Ab 1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 23	2	
Spanner-Art	Idaea	humiliata	2005	2005		2		max. Ab 2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 338	2	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Spanner-Art	Rhodometra	sacraria	2015	2015			1	max. Ab 1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 10	8	
Spanner-Art	Epirrhoe	alternata	2005	2005		1		max. Ab 1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1	
Jakobskrautbär, Blutbär	Tyria	jacobeae	2005	2005		1		max. Ab 1 einer von 2 Funden in der Region	am Tag selber 1 Raupe, B. Erb hat etwa 30 gesehen, R.Bas.: 0, 0	32	
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	2015	2015			1	max. Ab 1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1	
Seideneulchen	Rivula	sericealis	2015	2015			1	max. Ab 1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 104	1	
Eulenfalter-Art	Macdunnoughia	confusa	2005	2005		1		max. Ab 1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 16	2	
Gammaeule	Autographa	gamma	1995	2015	2	2	2	max. Ab 2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1	
Eulenfalter-Art	Helcoperva = Heliothis	peltigera	2015	2015			1	max. Ab 1	am Tag 11 Falter gefunden, R.Bas.: 3, 2	16	
Weissfleckige Schilfgraseule	Mythimna	albipuncta	2015	2015			1	max. Ab 1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 81	4	
Hausmutter	Noctua	pronuba	2006	2006		1		max. Ab 1	am Tag 22 schlafende Falter und 4 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 22, 177	2	
Schnabelfliegen			1995								
Skorpionsfliege (nicht genau bestimmt)	Panorpa	vulgaris cf. communis	1995	1995	1			max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1	
Zweiflügler			1995								
Schnaken-Art	Tipula U.g. Yamatotipula	lateralis	1995	2005	1	2		max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Kohlschnake	Tipula U.g. Tipula s.str.	oleracea	1995	1995	1			max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. Tipula s.str.	paludosa	1995	2015	1	1	1	max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Savtshenkia	obsoleta	1995	1995	1			max. Ab 4	wenig häufig gefunden	8	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Pterelachisus	neurotica	1995	1995	1			max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1995	2015	1		1	max. Ab 2	sehr häufig gefunden	1	
Krähschnaken-Art	Nephrotoma	appendiculata	1995	2015	1		1	max. Ab 4	häufig gefunden	2	
Krähschnaken-Art	Nephrotoma	flavescens	1995	1995	1			max. Ab 2	sehr häufig gefunden	1	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			1995	2015								
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	scurra	1995	2015	1	1	1		max. Ab. 1	wenig häufig gefunden, vor allem in Kiesgruben	8	
Stelzmücken-Art	Dicranomyia	modesta	1995	1995	2				max. Ab 4	mässig häufig gefunden, aber nicht inventarisiert	-	
Asiatische Buschmücke	Aedes	japonicus	2014	2014			1		max. Ab 1	erst selten und an wenigen Orten gefunden , Neozoon,	16	
Haarmücken-Art	Dilophus	febrilis	2015	2015			1		max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	1995	1995	1				max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	pluvialis	1995	1995	1	1	1		max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1	
Raubfliegen-Art	Dioctria	baumhaueri	1995	1995	1				max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8	
Wollschweber-Art	Bombylius	discolor	1995	1995	1				max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Wollschweber-Art	Bombylius	cinerascens	1995	2015	1		2		max. Ab 2	häufig gefunden	2	
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus	balteatus	1995	2014	4	2	1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 200	1	
Gemeine Feldschwebfliege	Eupeodes	corollae	2005	2005		1			max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	2	
Späte Frühlingsschwebfliege, Gemeine Zartschwebfliege	Meliscaeva	cinctella	1995	1995	1				max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 20	2	
Späte Grossstirnschwebfliege, Weisse Dickkopfschwebfliege	Scaeva	pyrastri	2005	2005		3			max. Ab 1	häufig gefunden	2	
Späte Grossstirnschwebfliege, Weisse Dickkopfschwebfliege	Scaeva	pyrastri	2005	2005					max. Ab 2	häufig gefunden	2	
Kugelträger Gattung	Sphaerophoria	sp.	1995	2005	2	1			max. Ab 1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebfliege	Sphaerophoria	scripta	1995	2015	4	5	4		max. Ab 3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1	
Grosse Schwebfliege, Gemeine Gartenschwebfliege	Syrphus	ribesii	1995	2015	1		1		max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13	1	
Behaarte Schwebfliege, Grosse Gartenschwebfliege	Syrphus	torvus	1995	1995	2				max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7	2	
Kleine Gartenschwebfliege	Syrphus	vitripennis	1995	1995	2				max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	1	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebfliege	Melanostoma	mellinum	1995	2015	1	2	1		max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 58	1	
Matte Schwarzkopfschwebfliege, Lange Grasschwebfliege	Melanostoma	scalare	2005	2005		1			max. Ab. 2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 34	2	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Schwebfliege Gattung	Paragus	sp.	2005	2005			1		max. Ab 1	Gattung häufig gefunden	2
Gemeine Zwergschwebfliege	Pipizella	viduata	1995	1995	2				max. Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	1
Weissfuss-Erzschwebfliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	1995	1995	1				max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1
Trüffel-Erzschwebfliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	rufipes = soror	1995	1995	1				max. Ab 1	häufig gefunden	2
Erzschwebfliegen-Art Pagana-Gruppe	Cheilosia	caerulescens	2005	2005			1		max. Ab 1	wenig häufig gefunden	8
Frühlings- oder Aster-Erzschwebfliege Bergenstammi-	Cheilosia	vernalis	2005	2005			1		max. Ab 1	häufig gefunden	2
Frühe Erzschwebfliege Bergenstammi-Gruppe	Cheilosia	praecox	1995	1995	1				max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Schnauzenschwebfliege, Feld-Schnabelschwebfliege	Rhingia	campestris	1995	2015	1	1	2		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	1
Kleine Keilfleckschwebfliege, Kleine Bienenschwebfliege	Eristalis	arbustorum	1995	2013	3	5	1		max. Ab 3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	1
Keilfleckschwebfliegen-Art	Eristalis	interrupta	1995	2015	1	1	2		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1
Gemeine Keilfleckschwebfliege Lange Bienenschwebfliege	Eristalis	pertinax	1995	2006	2	3			max. Ab 4	sehr häufig gefunden	1
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1995	2015	6	6	6		max. Ab 5	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 57	1
Grosse Sumpfschwebfliege, Grosse Sonnenschwebfliege	Helophilus	parallelus	1995	2015	1	3	1		max. Ab 3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Gemeine Sumpfschwebfliege, Gemeine Sonnenschwebfliege	Helophilus	pendulus	1995	2005	2	1			max. Ab 2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	2
Totenkopfschwebfliege	Myathropa	florea	1995	2015	2	5	3		max. Ab 2max. Ab 3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18	1
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebfliege, Gemeine	Syritta	pipiens	1995	1995	2				max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	2
Gemeine Langbauchschwebfliege Gemeine Holzschwebfliege	Xylota	segnis	1995	2006	1	2			max. Ab 1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 160	2
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atra	2015	2015			1		max. Ab 1	häufig gefunden	2
Schmuckfliegen-Art	Seioptera	vibrans	1995	1995	1				max. Ab 1 einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	32
Schmuckfliegen-Art	Physiphora	alceae = demandata	2015	2015			1		max. Ab 1 einer von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32
Fruchtfliegen-Art	Tephritis	matricariae	1995	1995	1				max. Ab 1	wenig häufig gefunden, weil klein, aber vermutlich häufig	8

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3			
WIRBELTIERE			1995							
Fadenmolch	Triturus	helveticus	1995	1995	1			max. Ab 1	wenig häufig gefunden, aber selten danach gesucht	8
Gelbbauchunke	Bombina	variegata	2005	2014		1	2	max. Ab 2	mässig häufig gefunden	4
Geburtshelferkröte	Alytes	obstetricans	1995	2005	1	1		max. Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Erdkröte	Bufo	bufo	1995	2015	1		1	max. Ab 4	häufig gefunden	2
Kreuzkröte	Bufo	calamita	1995	2015	3	2	3	max. Ab 5	mässig häufig gefunden, vorwiegend in Kiesgruben	4
Grasfrosch	Rana	temporaria	1995	2005	2	2		max. Ab 3	häufig gefunden	2
Wasserfrosch	Rana	esculenta	2005	2005		1		max. Ab 2	häufig beobachtet	2
Eidechse (nicht bestimmt)	Lacerta cf. Podarcis	non det.	2005	2015		1	1	max. Ab 1	sehr häufig gefunden	1
Mauereidechse	Podarcis	muralis	2005	2015		5	3	max. Ab 2	sehr häufig gefunden	1
Zauneidechse	Lacerta	agilis	1995	2005	1	1		max. Ab 2	sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)	2
Graureiher	Ardea	cinerea	2005	2015		3	3	max. Ab 1	häufig beobachtet	2
Stockente	Anas	platyrhynchus	2015	2015			1	max. Ab 1	häufig beobachtet	2
Schwarzer Milan (Schwarzmilan)	Milvus	migrans	1995	1995	1			max. Ab 1	häufig beobachtet	2
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	1995	2015	1	1	1	max. Ab 1	sehr häufig beobachtet	1
Mäusebussard	Buteo	buteo	1995		1			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Turmfalke	Falco	tionnunculus	1995	2013	2	1	1	max. Ab 1	häufig beobachtet	2
Bläsralle, Blässhuhn	Fulica	atra	2013	2015			4	max. Ab 1	häufig beobachtet	2
Waldschnepfe	Scolopax	rusticola	2015	2015			1	max. Ab 1	erst 1 Mal beobachtet	32
Ringeltaube	Columba	palumbus	1995		3			max. Ab 2	sehr häufig beobachtet, aber meist nicht registriert	-
Grünspecht	Picus	viridis	1995	2014	2		1	max. Ab 1	sehr häufig beobachtet	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP1	BP2			
Uferschwalbe	Riparia	riparia	1995	2015		5	4	2	max. Ab 4	wenig häufig beobachtet	8	
Mehlschwalbe	Delichron	urbica	2005	2005			2		max. Ab 2	häufig beobachtet	2	
Bachstelze	Motacilla	alba	1995			7			max. Ab 2	sehr häufig beobachtet, aber selten registriert	-	
Zaunkönig	Troglodytes	troglodytes	1995			1			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	-	
Amsel	Turdus	merula	1995			2			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-	
Misteldrossel	Turdus	viscivorus	1995	1995		1			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet	1	
Teichrohrsänger	Acrocephalus	scirpaceus	2005	2015			1	1	max. Ab 2	häufig beobachtet	2	
Gartengrasmücke	Sylvia	borin	1995	2013		1	3	1	max. Ab 2	häufig beobachtet	2	
Mönchsgrasmücke	Sylvia	atricapilla	1995			1			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-	
Zilpzalp	Phylloscopus	collybita	1995			1			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-	
Fitis	Phylloscopus	trochilus	2005	2005			1		max. Ab 1	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten	4	
Nonnenmeise oder Sumpfmeise	Parus	palustris	1995			1			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-	
Blaumeise	Parus	caeruleus	1995			3			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-	
Kohlmeise	Parus	major	1995			2			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-	
Eichelhäher	Garrulus	glandarius	1995			2			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-	
Elster	Pica	pica	1995			1			max. Ab 1	sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert	1	
Rabenkrähe	Corvus	corone	1995			7			max. Ab 2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-	
Kolkrabe	Corvus	corax	2005	2005			1		max. Ab 2	sehr häufig beobachtet	1	
Feldsperling	Passer	montanus	2005	2005			1		max. Ab 2	häufig beobachtet	2	
Stieglitz, Distelfink	Carduelis	carduelis	1995	2005		1	1		max. Ab 2	häufig beobachtet	2	
Goldammer	Emberiza	citrinella	1995	2015		7	5	2	max. Ab 2	sehr häufig beobachtet	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index	
			erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2	BP3				
Maulwurf	Talpa	europaea	1995			2	2		max. Ab 2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Schermaus	Arvicola	terrestris	1995			1			max. Ab 2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Mauslöcher	(Mauslöcher)	non det.	2005				2		max. Ab 3	sehr häufig gefunden	1
Reh	Capreolus	capreolus	2005	2015		1	1		max. Ab 4	häufig beobachtet und anhand der Spuren festgestellt	2
BLAUALGEN	Auswahl										
Blualgen-Art	Nostoc	commune	2005						max. Ab 2	mässig viele Fundorte	
ALGEN	Auswahl		1995								
Armleuchteralge Gattung	Chara	sp.	1995						max. Ab 1	Gattung mässig viele Fundorte, in stehenden Gewässern,	
MOOSE	Auswahl		1999								
Drehmoos	Funaria	hygrometrica	1999						max. Ab 3	mässig viele Fundorte	
Silber-Birnmoos	Bryum	argenteum	1999						max. Ab 1	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
SAMENPFLANZEN	Auswahl		1995								
Gewöhnliche Akelei	Aquilegia	vulgaris	2015						max. Ab 1	viele Fundorte	
Klatsch-Mohn	Papaver	rhoeas	2015						max. Ab 2	mässig viele Fundorte	
Dreifingriger Steinbrech	Saxifraga	tridactylites	2005						max. Ab 4	wenig Fundorte aber hier oft in grosser Dichte, typisch für Kiesflächen.	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	1995						max. Ab 1	sehr viele Fundorte	
Gemeiner Frauenmantel, Gelbgrüner Frauenmantel	Alchemilla	xanthochlora aggr. = vulgaris =	2005						max. Ab 2	viele Fundorte, aber vermutlich oft übersehen	
Echter Honigklee	Melilotus	officinalis	1995						max. Ab 1	viele Fundorte, aber selten registriert	
Feldk-Kee	Trifolium	campestre	1995						max. Ab 4	wenig registrierte Fundorte, weil meist nicht beachtet	
Robinie, Falsche Akazie	Robinia	pseudacacia	2015						max. Ab 3	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Bunte Kronwicke	Coronilla	varia	1995						max. Ab 3	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art im		Index	
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3	Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region
Viersamige Wicke	Vicia	tetrasperma	1995					max. Ab 4	wenig häufig registriert	
Schmalblättrige Wicke	Vicia	sativa ssp. nigra incl. angustifolia	2005					max. Ab 3	viele Fundorte	
Schmalblättrige Wicke	Vicia	sativa ssp. nigra incl. angustifolia	2015					max. Ab 4	viele Fundorte	
Rosmarinblättriges Weidenröschen	Epilobium	dodonaei	1995					max. Ab 4	wenig Fundorte, fast ausschließlich in Kiesgruben	
Behaartes Weidenröschen	Epilobium	hirsutum	2005					max. Ab 3	viele Fundorte	
Zweijährige Nachtkerze	Oenothera	biennis	2005					max. Ab 2	mässig viele Fundorte	
Lamarcks Nachtkerze	Oenothera	glazoviana = erythrosepala	2005					max. Ab 5	mässig viele Fundorte	
Essigbaum	Rhus	typhina	2005					max. Ab 1	Neophyt, wenig Fundorte	
Sumpf-Storchenschnabel	Geranium	palustre	2015					max. Ab 1	nur wenig Fundorte	
Wiesen-Storchenschnabel	Geranium	pratense	2015					max. Ab 2 einer von 6 Fundorten in der Reg.	nur 6 Fundorte	
Schlitzblättriger Storchenschnabel	Geranium	dissectum	1995					max. Ab 1	mässig viele Fundorte	
Riesen-Bärenklau	Heracleum	mantegazzianum	1995					max. Ab 1	Neophyt, wenig Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2005					max. Ab 4	viele Fundorte	
Echtes Johanniskraut	Hypericum	perforatum	2005					max. Ab 3	sehr viele Fundorte	
Echte Sumpfkresse	Rorippa	palustris	2005					max. Ab 3 Funden in der Region	nur 2 Fundorte	
Virginische Kresse	Lepidium	virginicum	2005					max. Ab 2	wenig Fundorte, typisch für Sand- und Kiesflächen.	
Gelbe Resede	Reseda	lutea	2005					max. Ab 2	mässig viele Fundorte, wichtig als Nahrungsquelle für spezialisierte Bienenarten	
Moschusmalve	Malva	moschata	2005					max. Ab 2	mässig viele Fundorte	
Wilde Malve	Malva	sylvestris	2013					max. Ab 1	mässig viele Fundorte	
Primel, Stengellose Schlüsselblume	Primula	vulgaris	1995					max. Ab 2	mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert	
Pfennigkraut	Lysimachia	nummularia	1995					max. Ab 2	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2	BP3						
Punktierter Gilbweiderich	Lysimachia	punctata	1995						max. Ab 1	wenig Fundorte	
Rauhe Nelke	Dianthus	armeria	2005						max. Ab 2	wenig Fundorte	
Jupiternelke	Lychnis	flos-jovis	1995						max. Ab 2	sehr wenig Fundorte	
Singrün, Kleines Immergrün	Vinca	minor	2005						max. Ab 2	mässig viele Fundorte	
Wilde Karde	Dipsacus	fullonum = silvestris	2005						max. Ab 2	viele Fundorte	
Skorpionskraut	Heliotropium	europaeum	1995						max. Ab 2 einzigster Fund in der Region	nur 1 Fundort	
Gewöhnlicher Natterkopf	Echium	vulgare	2005						max. Ab 2	mässig viele Fundorte	
Echter Wallwurz, Beinwell	Symphytum	officinale	2015						max. Ab 1	mässig viele Fundorte	
Schwarzer Nachtschatten	Solanum	nigrum	2005						max. Ab 3	wenig Fundorte	
Sommerflieder	Buddleja	dauidii	2005						max. Ab 5	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Knotige Braunwurz	Scrophularia	nodosa	2005						max. Ab 1	viele Fundorte	
Kleines Leinkraut	Chaenorrhinum	minus	2005						max. Ab 2	wenig Fundorte	
Efeublättriger Ehrenpreis	Veronica	hederifolia	1995						max. Ab 1	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	1995						max. Ab 2	viele Fundorte	
Kanadische Goldrute	Solidago	canadensis	2005						max. Ab 4	mässig viele Fundorte	
Späte Goldrute	Solidago	gigantea	2005						max. Ab 5	mässig viele Fundorte	
Sumpf-Ruhrkraut	Gnaphalium	uliginosum	2015						max. Ab 1	sehr wenig Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1995						max. Ab 3	sehr viele Fundorte	
Mutternkraut	Tanacetum	parthenium	1995						max. Ab 1	nur wenig Fundorte	
Huflattich	Tussilago	farfara	1995						max. Ab 5	viele Fundorte	
Raukenblättriges Kreuzkraut	Senecio	erucifolius	2005						max. Ab 3	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2	BP3						
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaea	2005						max. Ab 2	viele Fundorte	
Kornblume	Centaurea	cyanus	2013						max. Ab 2	wenig Fundorte	
Ausdauernder Lattich	Lactuca	perennis	2005						max. Ab 2	mässig häufig gefunden, aber nur wenig Funde inventarisiert	
Kompass-Lattich	Lactuca	serriola	2005						max. Ab 3	mässig viele Fundorte	
Stinkender Pippau	Crepis	foetida	2005						max. Ab 4 einzigster Fund in der Region	nur 1 Fundort	
Florentiner Habichtskraut	Hieracium	piloselloides	2015						max. Ab 5	wenig Fundorte, unauffällige, aber beachtenswerte Pflanzenart!	
Doldiges Habichtskraut	Hieracium	umbellatum	1995						max. Ab 1 einer von 4 Fundorten in der Reg.	nur 4 Fundorte	
Schwimmendes Laichkraut	Potamogeton	natans	2005						max. Ab 3	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte, aber hier oft in grosser Anzahl	
Blaustern	Scilla	bifolia	1995						max. Ab 1	mässig viele Fundorte, hier oft in grosser Anzahl	
Hasenglöckchen	Scilla	non-scripta	2015						max. Ab 1	Gartenpflanze, in der freien Natur wenig wenig Fundorte	
Kleines Schneeglöcklein	Galanthus	nivalis	2005						max. Ab 2	wenig Fundorte	
Tabernaemontanus' Teichbinse	Schoenoplectus	tabernaemontani	2015						max. Ab 3 einer von 2 Fundorten in der Reg.	nur 2 Fundorte	
Seebinse	Schoenoplectus	lacustris	2005						max. Ab 2	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte	
Gewöhnliche Sumpfbirse	Eleocharis	palustris	2005						max. Ab 3	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Zitzen-Sumpfbirse	Eleocharis	mamillata	2015						max. Ab 3	nur 2 Fundorte, aber vermutlich oft als E. palustris inventarisiert	
Hängende Segge	Carex	pendula	2005						max. Ab 1	mässig viele Fundorte	
Schmalblättriger Rohrkolben	Typha	angustifolia	2015						max. Ab 3	wenig Fundorte, beachtenswerte, seltene Pflanzenart!	
Verzweigter Igelkolben	Sparganium	erectum	2005						max. Ab 3	mässig viele Fundorte	
Bluthirse	Digitaria	sanguinalis	2005						max. Ab 3	wenig Fundorte, aber vermutlich oft nicht registriert	