

Weide Gwidemhöchi Hägendorf (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 627750 245625 Höhe ü. M.: 1050 m Expositionen: SSW S Fläche: 430 a

	BP1 (1986 bis 2000)	BP2 (2006 und 2012)	BP3 (2016 und 2017)	alle BP (1986 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	13	9	6	27
Beobachtungsdauer:	23 Std. 50 Min.	26 Std.	16 Std.	65 Std. 50 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
	Ereignisse:	389	370	227	991		683	620	413	1721		1,76	1,68	1,82	1,74
	Bewertete Taxa:	199	210	150	331		460	430	325	915		2,31	2,05	2,17	2,76

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------

WEICHTIERE

			1996												
Wegschnecke Gattung	Arion	sp.	1996	1996	1				Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert					
Grosse Wegschnecke	Arion	rufus	1996	1996	1				Max. Ab1	früher häufig gefunden, wird neuerdings von der Spanischen Wegschnecke verdrängt					2
Kugelige Glasschnecke	Vitrina	pellucida	1996	1996	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig					4
Ackerschnecke Gattung	Deroceras	sp.	1996	1996	1				Max. Ab2	Gattung häufig gefunden, aber nur mässig häufig registriert, nicht beurteilt					
Seidenhaarschnecke oder Quendelschnecke (nicht bestimmt)	Trochulus = Trichia	sericea cf. Candidula	1996	1996	1				Max. Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich meist T. sericea					2

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
 Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

- Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
- Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
- Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
- Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
- Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
- Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
- Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
- Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

- () in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
- & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
- * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
- ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:
 Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
 Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Gemeine Heideschnecke	Helicella	itala	1996	2017	6	6	4	Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Weissmündige Bänderschnecke	Cepaea	hortensis	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Fleckenstreifige Bänderschnecke	Cepaea	sylvatica	2006	2012		2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, vor allem in höheren Lagen des Jura	4
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	1996	2012	7	4		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
GLIEDERFÜSSLER			1995							
SPINNENTIERE			1996							
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(Phalangidae)	non det.	1996	1996	1		**	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	
Eichblatt-Radspinne	Aculepeira	ceropegia	2007	2016		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	2
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	2006	2016		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1
Kürbiskreuzspinnen-Art	Araniella	cucurbitina	2006	2006		1		unsicher bestimmt	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	
Wespenspinne, Zebraspinne	Argiope	bruennichi	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	Alopecosa	accentuata	1996	2006	1	3		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	monticola	1996	1996	2			Max. Ab3	häufig gefunden	2
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	pullata	2006	2006		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 498	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1996	2017	2	3	2	Max. Ab5	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Glattbauchspinnen-Art	Drassodes	cupreus	1996	1996	1			Max. Ab1	selten gefunden	16
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	kochi	1996	1996	1		*	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 3	2
KREBSTIERE			1996							
Landassel Ordnung	(Oniscoidea)	non det.	1996	1996	1			Max. Ab2	häufig gefunden	
VIELFÜSSLER			1996							
Tausendfüsser-Art	Cylindrojulus	caeruleocinctus	1996	1996	2			Max. Ab2	unter Steinen und Totholz am Boden häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6			
Wanzen			1996								
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	2016	2016			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	1996	2006	3	1		Max. Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2	
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	1996	2006	2	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1	
Kohlwanze	Eurydema	oleraceum	1996	2006	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2	
Kleine Blattwanze	Elasmostethus	minor	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	8	
Buntrock	Cyphostethus	tristriatus	2016	2016			1	Max. Ab2	erst seit 2015 wenig häufig gefunden		
Buntrock	Cyphostethus	tristriatus	2017	2017			1	Max. Ab1	erst seit 2015 wenig häufig gefunden		
Leder- oder Saumwanzen-Art	Coriomeris	denticulatus	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalus	subrufus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2	
Bodenwanzen-Art	Kleidocerus	resedae	2017	2017			1	Max. Ab1			
Bodenwanzen-Art	Rhyparochromus	pini	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 32	4	
Bodenwanzen-Art	Megalonotus	chiragra	1996	1996	1			Max. Ab1	selten gefunden , in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	16	
Weichwanzen-Art	Hadrodemus	M-flavum	1996	2007	1	2		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Weichwanzen-Art	Calocoris	biclavatus	2006	2006		1		Max. Ab4	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	4	
Weichwanzen-Art	Calocoris	roseomaculatus	1996	2016	2	1	1	Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Gemeine Zierwanze	Adelphocoris	lineolatus	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL selten: 3	1	
Weichwanzen-Art	Leptopterna	ferrugata	2016	2016			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Weichwanzen-Art	Leptopterna	dolobrata	1996	1996	3	2	2	Max. Ab4	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	1	
Gleichflügler			1996								
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	1996	2017				Max. Ab2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3			
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus spumarius	1996	2016	1		2	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora alni	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schaumzikaden-Art	Lepyronia coleoptrata	2016	2016			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Blutzikaden-Art	Cercopis vulnerata	2017	2006			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Netzflügler		1996							
Florfliege, Goldauge	Diochrysa = Mallada prasina	2016				1	Max. Ab1		
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla carnea	2006			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1
Ameisenjunger-, -löwen-Art	Myrmeleon formicarius	1996	1996	3			Max. Ab4	häufig gefunden	2
Käfer		1996							
Feld-Sandläufer	Cicindela campestris	1996	1996	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Kupferiger Schulterläufer, Listkäfer-Art	Poecilus cupreus	1996	1996	2			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 598	1
Gemeiner Kanalkäfer-, Kamelläufer	Amara Zezea plebeja	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 33	4
Gelbbeiniger Kanalkäfer-, Kamelläufer	Amara s.str. familiaris	1996	1996	2			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 110	2
Prunkkäfer-, Prunkläufer-Art	Lebia cyanocephala	2006	2006		1		Max. Ab1	erst 2 Mal gefunden	32
Weichkäfer-Art	Cantharis rustica	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Weichkäfer-Art	Cantharis nigricans	2007	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Weichkäfer-Art	Cantharis livida	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Weichkäfer-Art	Cantharis sudetica	1996	1996	1			Max. Ab1	selten gefunden	16
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha fulva	1996	2016	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes gallicus	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Mausgrauer Schnellkäfer	Argypnus = Adelocera murinus	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Schnellkäfer-Art	Cidnopus	pilosus	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schnellkäfer-Art	Pheletes = Limonius	quercus	2007	2007		2		Max. Ab2	mässig häufig gefunden, weil klein, vermutlich häufig	4
Schnellkäfer-Art	Hemicrepidius = Athous =	niger	1996	1996	1			unsicher bestimmt	häufig gefunden	
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	Athous	haemorrhoidalis	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Glanzkäfer Gattung	Meligethes	sp.	2006	2006		1	*	Max. Ab5	Gattung sehr häufig gefunden	1
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1996	2006	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zweipunkt	Adalia	bipunctata	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	1996	2006	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Dunkelbrauner Junikäfer	Amphimallon	atrum	1996	1996	1			Max. Ab4	häufig gefunden, oft in grosser Zahl	2
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	2016	2016			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Rothörniger oder Mattschwarzer Blütenbock	Grammoptera	ruficornis	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 40	4
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Kirsch-Blatthähnchen	Orsodacne	cerasi	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Langbeinkäfer-Art	Smaragdina	xanthaspis	2012	2012		1		Max. Ab1	selten gefunden	16
Zweipunktiger Fallkäfer	Cryptocephalus	bipunctatus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	2006	2007		2		Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	1996	2007	1	1		Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	violaceus	1996	2017	2	1	1	Max. Ab3	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	marginellus	2017	2017			1	Max. Ab1	selten gefunden	16
Tatzenkäfer, Ledriger Blattkäfer	Timarcha	goettingensis	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Blattkäfer-Art	Luperus	flavipes	1996	1996	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden, weil klein, vermutlich häufig	4
Kohlerdfloh Gattung	Altica	sp.	2006	2016		2	1		Max. Ab2	Gattung mässig häufig gefunden, aber meist übersehen oder nicht inventarisiert	
Kleiner Blattrüssler	Phyllobius	subdentatus = parvulus	2017	2017			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig	2
Breiter Birnengrünrüssler, Kupfriger Blattrüssler	Phyllobius	pyri	2006	2006		1			Max. Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Weissdorn-Blattrüssler	Phyllobius	betulinus = betulae	1996	2017	1	2	1		Max. Ab2	häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig	2
Hautflügler			1995								
Blattwespen-Art	Dolerus	nigratus	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Blattwespen-Art	Dolerus	picipes	1996	1996	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Blattwespen-Art	Athalia	cordata	1996	1996	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Blattwespe Artengruppe	Tenthredo	arcuata-Gruppe	1996	1996	2				Max. Ab2	sehr häufig gefunden	
Blattwespen-Art	Tenthredo	arcuata	1996	1996	1				Max. Ab2	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	brevicornis	2016	2016			1		unsicher bestimmt	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	
Brackwespe Gattung	Microgaster	sp.	2017	2017			1		Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4
Brackwespe Gattung (Puppenkokon)	Apanteles	sp. (Puppen kokon)	1996	1996	1				Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	sarcitorius	1996	1996	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	caloscelis	2016	2016			1		Max. Ab1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	bucculentus	2016	2016			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Amblyteles	armatorius	1996	1996	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Coelichneumon	sinister	2006	2006		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	1995	2017	2	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Sichelwespen-Art	Heteropelma	megarthrum	2007	2007		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte	
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3				
Sichelwespen-Art	Erigorgus	cerinops	1996	1996	3			unsicher bestimmt	häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	Pristomerus	armatus	2016	2016			1	Max. Ab1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Lissonota	coracina = bellator	2016	2016			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Olethrodotis	modesta	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	1996	2016	1	3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Knotenameisen-Art	Myrmica	rubra	1996	1996	2		*	Max. Ab3	häufig gefundenin, den Fallen der WSL häufig: 243 Individuen	2
Drüsenameise Artengruppe	Tapinoma	erraticum cf. ambiguum Emery	1996	2006	2	1	*	Max. Ab4	häufig gefunden	2
Rossameisen-Art	Camponotus	herculaneus	2016	2016			1	Max. Ab1	selten gefunden , in den Fallen der WSL selten: 3	16
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1996	2016	1	2	1	Max. Ab4	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1
Gelbe Wegameise	Lasius	flavus	2006	2006		2	*	Max. Ab3	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL häufig: 495 Individuen	1
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1996	2017	1	1	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1
Zweifarbige Sklavenameise	Formica	rufibarbis	1996	2006	1	1	*	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 89	1
Wiesen-Waldameise	Formica	pratensis	1996	2017	1		2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Blutrote Raubameise	Formica	sanguinea	1996	2012	1	2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	2006	2016		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Grabwespen-Art	Ectemnius (s.str.)	borealis = nigrinus	1996	996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	1996	2016	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	1996	2006	1	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1996	2016	3	3	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Weissbeinige Schmalbienen	Lasioglossum	albipes	1996	2016	3	2	2	Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum	fulvicorne	1996	2012	3	2		Max. Ab3	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 45	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3			
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum villosulum	1996	1996	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1
Durchscheinende Blutbiene	Sphecodes hyalinatus	2007	2012		2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Fingerkraut-Zwergsandbiene	Andrena falsifica	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gewöhnliche Zergsandbiene	Andrena minutula	2012	2012		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Pippau-Sandbiene	Andrena fulvago	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	2
Weisse Bindensandbiene	Andrena gravida	2006	2006		1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 35	2
Goldene Schneckenhausbiene	Osmia aurulenta	1996	2006	2	1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Rotborstige Schneckenhausbiene	Osmia rufohirta	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wiesen-Wespenbiene	Nomada marshamella	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Dunkle Erdhummel	Bombus terrestris	1996	2017	2	1	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Helle Erdhummel	Bombus lucorum	2016	2017			3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1
Wiesenhummel	Bombus pratorum	1996	2017	1	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1
Glockenblumenhummel oder Distelhummel	Bombus soroensis	2016	2016			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Steinhummel	Bombus lapidarius	1995	2016	5	3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus pascuorum	2006	2017		4	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus humilis	2006	2016		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus hortorum	1996	2016	2	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Bombus = Psithyrus bohemicus	1996	2006	1	3		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Bombus = Psithyrus campestris	2011	2016		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1
Rotschwarze oder Felsen-Kuckuckshummel	Bombus = Psithyrus rupestris	1996	2016	2	1	1	Max. Ab3	häufig gefunden	2
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	Bombus = Psithyrus sylvestris	1996	2011	2	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Honigbiene	Apis	mellifera	1995	2017	6	4	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge			1995							
Urmotten-Art	Micropteryx	rothenbachi	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	1996	2016	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Langfühlermotten-Art	Incurvaria	pectinea	1996	1996	1			Max. Ab1	selten gefunden	16
Weichgras-Sackträger-Art	Epichnopteryx	sieboldi	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 12, 46	1
Schwarzdorn-Gespinstmotte	Yponomeuta	padella	1996	2007	1	1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Kohlmotte, Schleiermotte	Plutella	xylostella	1996	2006	2	1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Ziermotten-Art	Scythris	fallacella	2007	2007		1		Max. Ab1	selten gefunden	16
Palpenmotten-Art	Bryotropha	terrella	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Widderche Gattung	Zygaena	sp.	1996	2017	1	1	1	Max. Ab3	Gattung sehr häufig gefunden	
Beilfleck-Widderchen, Tragant-Widderchen	Zygaena	loti	2007	2017		1	2	Max. Ab3	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 24, 162	2
Kleines Fünffleck-Widderchen	Zygaena	viciae	2017	2017			1	Max. Ab3	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 86	4
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	1996	2017	2	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
Grosses Fünffleck-Widderchen	Zygaena	ionicerae	1996	2006	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 8, 66	4
Thymian-Widderchen, Purpur-Widderchen	Zygaena	purpuralis	1996	2006	1	1		Max. Ab3	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 10, 51	4
Ampfer-Grünwidderchen	Adscita	statices	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 23, 255	1
Wickler-Art	Aethes	hartmanniana	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Wickler-Art	Cochylis	hybridella	1996	1996	1			Max. Ab1	selten gefunden	16
Wickler-Art	Acleris	aspersana	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Wickler-Art	Cnephasia	stephensiana	1996	1996	1			Max. Ab1	selten gefunden	16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Pflaumenknospenwickler	Hedya	pruniana	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Celypha	striana	1996	1996	3			Max. Ab3	häufig gefunden	2
Wickler-Art	Celypha	lacunana	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wickler-Art	Rhopobota = Griselda	stagnana	2006	2006		1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Ancylis	comptana	1996	2006	1	2		Max. Ab3	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Ancylis	badiana	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Lathronympha	strigana	2006	2006		2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Federgeistchen-Art	Stenoptilia	pterodactyla	1996	1996	1			Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Federgeistchen-Art	Marasmarcha	lunaedactyla	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Federgeistchen-Art	Merrifieldia	leucodactyla	1996	2006	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	1996	2017	1	2	2	Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1996	2017	2	2	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Weisser Graszünsler	Crambus	perlellus	1995	2016	4	2	1	Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	1996	2016	1			Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	2011	2016		1	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1996	2006	2	1		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Thisanotia	chrysonuchella	1996	2016	1	1	1	Max. Ab2	häufig gefunden	2
Zünsler-Art	Scoparia	pyralella	1996	2007	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	1996	2011	4	5		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2011	2011		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Pyrausta	nigrata	1996	2016	3	1	1	Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region		
			BP1	BP2	BP3				
Wanderzünsler	Nomophila noctuella	1996	2016	3	2	1	Max. Ab4	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	1
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus sylvestris	1995	2016	3	1	1	Max. Ab5	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Weissfleckiger Kommafalter	Hesperia comma	1996	2011	2	1		Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 370	2
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes venata	1996	2016	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis tages	1996	2011	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	1
Roter Würfelfalter	Spialia sertorius	1996	2017	1	4	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438	1
Zweibrütiger Würfelfalter	Pyrgus armoricanus	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 12, 104	2
Schwalbenschwanz	Papilio machaon	2006	2017		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1
Weissling Familie	(Pieridae)	1995		2	6	4	Max. Ab2	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea sinapis- Komplex	2006	2017		2	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris rapae	1996	2006	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris napi	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris cardamines	1996	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias crocea	1996	2017	1	1	1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias hyale Komplex	1990	2006	2	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias alfacariensis	2000	2017	1	4	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1
Zitronenfalter	Gonepteryx rhamni	2006	2017		2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Tagpfauenauge	Inachis io	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	Vanessa atalanta	2006	2006		1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Distelfalter	Vanessa = Cynthia cardui	1996	2006	4	2		Max. Ab3	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	1
Kleiner Fuchs	Aglais urticae	1990	2017	7	3	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Perlmutterfalter Gattung	Argynnis	sp.	2016	2016			1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	
Grosser Perlmutterfalter	Argynnis = Mesoacidalia	aglaja	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 153	2
Hainveilchen-Perlmutterfalter	Boloria = Clossiana	dia	2006	2017		4	3	Max. Ab3	häufig gefunden, R.Bas.: 22, 977	2
Wachtelweizen-Scheckenfalter	Melitaea = Mellicta	athalia	2006	2017		2	2	Max. Ab4	häufig gefunden, R.Bas.: 35, 337	2
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1995	2006	4	2	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Weisser Waldportier	Brintesia	circe	2006	2016		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, aber erst (wieder) seit diesem Jahrhundert, R.Bas.: 22, 341	2
Milchfleck, Wald-Mohrenfalter	Erebia	ligea	2006	2016		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 25, 195	2
Waldteufel	Erebia	aethiops	2011	2011		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 502	1
Rundaugen-Mohrenfalter	Erebia	medusa	2007	2017		1	2	Max. Ab2	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 177	4
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1995	2016	5	3	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	1996	2016	2	2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1995	2017	5	6	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megea	2000	2016	1	3	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Braunauge	Lasiommata	maera	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 175	2
Frühlings-Scheckenfalter, Perlbinde	Hamearis	lucina	2017	2017			1	Max. Ab2	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 107	8
Nierenfleck, Birken-Zipfelfalter	Thecla	betulae	1986	1986	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 68	2
Zwerg-Bläuling	Cupido	minimus	1996	2017	1	2	2	Max. Ab3	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 332	2
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris	semiargus	1996	2017	2	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Silbergrüner Bläuling	Polyommatus = Lysandra	coridon	2011	2011		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416	1
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra	bellargus	1996	2017	3	5	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1995	2017	6	5	4	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Marmorierter Kleinspanner	Scopula	immorata	1996	2017	1	2	2	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1
Schmuck- Kleinspanner	Scopula	ornata	1996	2017	1	1	2	Max. Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 111	2
Einfarbiger Zwergspanner	Idea	dilutaria	1996	1996	1			Max. Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 3, 24	4
Braunrandiger Zwergspanner	Idea	humiliata	2006	1996		1		Max. Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 338	2
Rotbandspanner	Rhodostrophia	vibicaria	1996	2006	1	1		Max. Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 9, 36	4
Spanner-Art	Scotopteryx	bipunctaria	1996	2016	1		1	Max. Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 433	2
Spanner-Art	Scotopteryx	chaenopodiata	2016	2016			1	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 155	1
Spanner-Art	Epirrhoe	alternata	2006	2006		1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Löwenzahnspanner	Camptogramma	bilineata	1996	2016	1	1	2	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
Spanner-Art	Perizoma	albulata	2017	2017			2	Max. Ab2	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 9, 121	4
Mausspanner	Minoa	murinata	2017	2017			1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 41	2
Klee-Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa	clathrata	2006	2006		1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1
Pantherspanner	Pseudopanthera	macularia	1996	2017	1	2	2	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden gefunden, R.Bas.: 10, 95	1
Heidespanner	Ematurga	atomaria	1996	2017	2	4	2	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1
Weisser Hartheuspanner	Siona	lineata	1996	2017	1	2	2	Max. Ab3	häufig gefunden, R.Bas.: 9, 36	2
Einstreifiger Trockenranspanner	Aspitates = Aspilates	gilvaria	1996	2016	1		1	Max. Ab2	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 144	4
Rotrandbär	Diacrisia	sannio	2016	2016			1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 45	2
Gescheckte Tageule	Callistege	mi	2017	2017			1	Max. Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 70	2
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1996	2017	2	4	4	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Eulenfalter-Art	Phytometra	viridaria	1996	1996	1			Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 11, 37	2
Gammaeule	Autographa	gamma	1996	2016	4	2	1	Max. Ab4	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Schnabelfliegen			1996								
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa	vulgaris	2011			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1
Zweiflügler			1995								
Schnaken-Art	Tipula U.g. Pterelachisus	pabulina	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden		4
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	flavescens	1995	2016	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	non det.	2012	2016		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1
Johannismücke	Bibio	johannis	2006	2017		2	1	Max. Ab2	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl		2
Märzmücke	Bibio	marci	2006	2006		1		Max. Ab2	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl		2
Waffenfliegen-Art	Actina	chalybea	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden		4
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	pluvialis	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1
Raubfliegen-Art	Dioctria	linearis	2016	2016			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden		8
Raubfliegen-Art	Dioctria	rufipes	2017	2017			1	Max. Ab2	häufig gefunden		2
Raubfliegen-Art	Leptogaster	cylindrica	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden		2
Raubfliegen-Art	Tolmerus	atricapillus	1996	1996	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1
Wollschweber-Art	Bombylius	major	2006	2012		2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1
Trauerschweber-Art	Hemipenthes	maurus	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden		4
Tanzfliegen-Art	Empis	pseudonuntia	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden		2
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	1996	1996	3			Max. Ab4	sehr häufig gefunden		1
Tanzfliegen-Art	Rhamphomyia	sulcata	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden		4
Gefleckte Waldschneisenschwebefliege,	Dasysyrphus	lunulatus	2006	2006		1		Max. Ab1	selten gefunden , in den Fallen der WSL nur 1 Individuum		16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1996	2006	2016	1996	2006	2016				
Grosse Breitbauchschwebefliege	Didea = Megasyrphus	erratica	1996	2006		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Grosse Wiesenschwebefliege, Grosse Heckenschwebefliege	Epistrophe	grossulariae	2006	2006			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gemeine Winter- oder Parkschwebefliege	Episyrphus	balteatus	1996	2016	4	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1	
Gemeine Feldschwebefliege	Eupeodes	corollae	1996	1996	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2	
Kurze oder Bogenader-Feldschwebefliege	Eupeodes	lapponicus	2017	2017				1	Max. Ab1	häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark	2	
Gelbhals-Frühlingsschwebefliege, Dreieck-Zartschwebefliege	Meliscaeva = Episyrphus	auricollis	2007	2007			1		unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum		
Späte Grossstirnschwebefliege, Weisse Dickkopfschwebefliege	Scaeva	pyrastris	1996	2006	2	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Frühe Grossstirnschwebefliege, Gelbe Dickkopfschwebefliege	Scaeva	selenitica	2006	2006			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Kugelträger Gattung	Sphaerophoria	sp.	2017	2017				1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta	1996	2016	3	1	2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	1996	2017	1	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1	
Behaarte Schwebefliege, Grosse Gartenschwebefliege	Syrphus	torvus	2006	2017			1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	2	
Zweiband-Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	bicinctum	1996	1996	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	1996	2016	1			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1	
Waldrandschwebefliege, Mondswebfliegen-Art	Pipiza	noctiluca	2016	2016				1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Weissfuss-Erzswebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	2006	2017			1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Trüffel-Erzswebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	rufipes = soror	1996	1996	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Erzswebefliegen-Art Proxima-Gruppe	Cheilosia	proxima	1996	1996	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Glänzende Smaragdschwebefliege, Kleine Goldbauchschwebefliege	Melanogaster	nuda = lucida	2007	2016			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Keifleckschwebefliegen-Art	Eristalis	interrupta	1996	2016	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Distel-Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1996	2016	3	1	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis	pertinax	2016	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1996	2016	4	6	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	1996	2016	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atra	1996	2006	1	1		unsicher bestimmt	unsicher bestimmt	
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Fruchtliegen-Art	Terellia	longicauda	2016	2016			1	Max. Ab2	selten gefunden	16
Saft- od. Wiesenfliegen-Art	Opomyza	florum	2016	2016			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Halmfliegen-Art	Chlorops	strigulus	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, aber vermutlich oft übersehen	
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercoraria	1996	1996	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Stubenfliege Familie	(Muscidae)	non det.	2007	2007		1	**	Max. Ab1	Familie sehr häufig gesehen, aber nur wenige auffällige und leicht zu bestimmende Arten	
Stubenfliege Gattung	Neomyia = Orthellia	sp.	1996	1996	2		*	Max. Ab1	Gattung sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen	
Stubenfliegen-Verwandte	Polietes	lardarius	1996	2006	1	1		Max. Ab5	sehr häufig gefunden, auf Kuhfladen, im Herbst auch auf Blättern am Waldrand	1
Schmeissfliegen-Art	Cynomyia	mortuorum	1996	1996	4			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1996	2017	4		1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1996	2006	4	1	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1996	1996	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	magnicornis	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Grüne Raupenfliege	Gymnochaeta	viridis	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, aber vermutlich oft übersehen	4
WIRBELTIERE			1995							
Zauneidechse	Lacerta	agilis	1996	2006	4	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)	1
Berg- od. Waldeidechse	Lacerta	vivipara	2007	2007		1		unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2012	2017		1	2	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Mäusebussard	Buteo	buteo	1996	1996	1	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Turmfalke	Falco	tionnunculus	2016	2016			1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Mauersegler	Apus	apus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Schwarzspecht	Dryocopus	martius	1996	2016	3	1	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Baumpieper	Anthus	trivialis	1996	2012	2	1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Zaunkönig	Troglodytes	troglodytes	1996	2012	1	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	
Rotkehlchen	Erithracus	rubecula	1996	2012	1	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	
Hausrotschwanz	Phoenicurus	ochruros	1990	2012	3	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	
Gartenrotschwanz	Phoenicurus	phoenicurus	1996	2012	1			Max. Ab2	früher häufig beobachtet, in letzter Zeit nur noch wenig häufig	8
Amsel	Turdus	merula	1996	2012	1	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Wacholderdrossel	Turdus	pilaris	1996	2012	1			Max. Ab1	häufig beobachtet, aber in letzter Zeit weniger	2
Singdrossel	Turdus	philomelos	1996	2012	1	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Misteldrossel	Turdus	viscivorus	1996	2017	1		2	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Mönchsgrasmücke	Sylvia	atricapilla	1996	2017	1	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Berglaubsänger	Phylloscopus	bonelli	1996	2017	2	2	2	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Waldlaubsänger	Phylloscopus	sibilatrix	2007	2007		1		Max. Ab1	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten	4
Zilpzalp	Phylloscopus	collybita	1996	1996	2	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Sommergoldhähnchen	Regulus	ignicapillus	1996	1996	1	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Meise Gattung	Parus	sp.	1996	1996	1	**	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig beobachtet	
Haubenmeise	Parus	cristatus	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte BP1	Anz. Ereignisse BP2	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
MOOSE	Auswahl						Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrasen sind registriert	
Eichhornschwanz	Leucodon	sciuroides	2016			lokal häufig an Eschensta,,	mässig viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Tannenmoos	Abietinella	abietina	2006			häufig	viele Fundorte	
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	2012			lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Katzenpfötchen-Moos	Rhytidium	rugosum	2012			sehr häufig	viele Fundorte	
SAMENPFLANZEN	Auswahl						Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Gewöhnlicher Wacholder	Juniperus	communis	1996			häufig	viele Fundorte	
Gewöhnliche Akelei	Aquilegia	vulgaris	1996			lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	2006			lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	1996			sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Knolliger Hain-Hahnenfuss	Ranunculus	tuberosus = nemorosus	2007			sehr häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Odermennig	Agrimonia	eupatoria	2006			1 Pflanze	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1996			sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	2006			lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Aufrechtes Fingerkraut	Potentilla	erecta	1996			mässig häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna = neumanniana	1996			sehr häufig	viele Fundorte	
Birnbaum	Pyrus	piraster	2006			1 junger Baum	viele Fundorte	
Mehlbeerbaum	Sorbus	aria	2006			lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa	2006			vereinzelt, lokal häufig	viele Fundorte	
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	1996			häufig	viele Fundorte	
Mittlerer Klee	Trifolium	medium	1996			lokal häufig im Gebüsch	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region		
			BP1	BP2	BP3	Anz. Ereignisse	letzte				
Gelblicher Klee	Trifolium	ochroleucum	1996					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Berg-Klee	Trifolium	montanum	1996					sehr häufig	viele Fundorte		
Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis	vulneraria vulneraria	1996					sehr häufig	viele Fundorte		
Schopfiger Hufeisenklee	Hippocrepis	comosa	1996					1 Pflanze	viele Fundorte		
Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia	cracca	2006					vereinzelt	viele Fundorte		
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	Linum	catharticum	2006					lokal häufig	viele Fundorte		
Tauben-Storchenschnabel	Geranium	columbinum	1996					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Bittere Kreuzblume	Polygala	amarella	1996					sehr häufig	viele Fundorte		
Echter Kümmel	Carum	carvi	1996					sehr häufig	viele Fundorte		
Kleine Bibernelle	Pimpinella	saxifraga	1996					sehr häufig (massenhaft)	viele Fundorte		
Wilde Brustwurz	Angelica	sylvestris	1996					1 Pflanze	viele Fundorte		
Wilde Möhre	Daucus	carota	2006					lokal häufig	sehr viele Fundorte		
Faulbaum, Pulverholz	Frangula	alnus	2006					2 Pflanzen	viele Fundorte		
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia	verrucosa	1996					1 Pflanze	viele Fundorte		
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1996					1 Pflanze	sehr viele Fundorte		
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	2006					häufig	sehr viele Fundorte		
Ovalblättriges Sonnenröschen	Helianthemum	nummularium ssp. obscurum	1996					häufig	viele Fundorte		
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	1996					sehr häufig	sehr viele Fundorte		
Gelber Enzian	Gentiana	lutea	1996					häufig	viele Fundorte		
Kreuz-Enzian	Gentiana	cruciata	2006					vereinzelt, lokal mässig häufig	wenig Fundorte		
Frühlings-Enzian	Gentiana	verna	1996					mässig häufig, lokal häufig	mässig viele Fundorte		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3						
Gefranster Enzian	<i>Gentiana</i>	<i>ciliata</i>	1996						vereinzelt, lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Deutscher Enzian	<i>Gentiana</i>	<i>germanica</i>	1996						mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Hügelmeister, Hundsmeister	<i>Asperula</i>	<i>cynanchica</i>	1996						häufig	viele Fundorte	
Echtes Labkraut	<i>Galium</i>	<i>verum</i>	1996						lokal häufig	viele Fundorte	
Niedriges Labkraut	<i>Galium</i>	<i>pumilum</i>	1996						sehr häufig	viele Fundorte	
Wilde Karde	<i>Dipsacus</i>	<i>fullonum</i> = <i>silvestris</i>	1996						1 Pflanze	viele Fundorte	
Teufelsabbiss, Abbisskraut	<i>Succisa</i>	<i>pratensis</i>	2011						1 Pflanze	viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	<i>Knautia</i>	<i>arvensis</i>	1996						kommt vor	sehr viele Fundorte	
Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa</i>	<i>columbaria</i>	1996						sehr häufig	viele Fundorte	
Grosser Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>teucrium</i>	1995						mässig häufig. loka häufig am Wegrand	viele Fundorte	
Kleiner Klappertopf	<i>Rhinanthus</i>	<i>minor</i>	2007						lokal häufig	viele Fundorte	
Herzblättrige Kugelblume	<i>Globularia</i>	<i>cordifolia</i>	1996						sehr häufig	mässig viele Fundorte	
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago</i>	<i>media</i>	2006						sehr häufig	viele Fundorte	
Echter Gamander	<i>Teucrium</i>	<i>chamaedrys</i>	1996						häufig	viele Fundorte	
Grosse Brunelle	<i>Prunella</i>	<i>grandiflora</i>	1996						häufig	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	<i>Thymus</i>	<i>pulegioides</i>	1996						häufig	sehr viele Fundorte	
Büschel-Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>glomerata</i>	2006						1 Pflanze	viele Fundorte	
Rundblättrige Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>rotundifolia</i>	1996						mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum</i>	<i>vulgare</i>	1996						sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Jakobs-Kreuzkraut	<i>Senecio</i>	<i>jacobaea</i>	2006						vereinzelt	viele Fundorte	
Silberdistel = Einf. Eberwurz	<i>Carlina</i>	<i>acaulis</i> ssp. <i>caulescens</i> =	1996						häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2			
Wollköpfige Kratzdistel	Cirsium	eriphorum	1996				lokal häufig, bes. auf der oberen Fläche	wenig Fundorte	
Stengellose Kratzdistel	Cirsium	acaule	1996				vereinzelt	viele Fundorte	
Skabiosen-Flockenblume	Centaurea	scabiosa	2006				1 Pflanze	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	1996				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	Leontodon	hispidus	1996				häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Östlicher Wiesen-Bocksbart	Tragopogon	orientalis	2006				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Glattes Pfaffenröhrlein	Taraxacum	laevigatum	2012				vereinzelt, lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Öhrchen-Habichtskraut	Hieracium	lactucella	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Herbstzeitlose	Colchicum	autumnale	2006				lokal häufig	viele Fundorte	
Grosses Zweiblatt	Listera	ovata	2006				1 Pflanze	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Zweiblättriges Breitkölbchen	Platanthera	bifolia	2006				2 Pflanzen	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Mücken-Handwurz	Gymnadenia	conopsea	1996				vereinzelt, lokal häufig	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Angebrannte Orchis	Orchis	ustulata	1996				vereinzelt in der Weide	wenig Fundorte	
Spitzorchis, Pyramidenorchis	Anacamptis	pyramidalis	2006				1 Pflanze	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Feld-Hainsimse	Luzula	campestris	1996				1 Pflanze	viele Fundorte	
Berg-Segge	Carex	montana	1996				sehr häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Frühlings-Segge	Carex	caryophyllea	2012				lokal mässig häufig	viele Fundorte, typisch für Magerrasen	
Schlaffe Segge	Carex	flacca	2006				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Aufrechte Trespe	Bromus	erectus	1996				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Mittleres Zittergras	Briza	media	1996				sehr häufig	viele Fundorte	
Pyramiden-Kammschmiele	Koeleria	pyramidata	1996				häufig	mässig viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Anz. BP2	Anz. BP3	am Beobachtungsort		
Pyramiden-Kammschmiele	Koeleria	pyramidata	2006					häufig	mässig viele Fundorte	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	Anthoxanthum	odoratum	2006					1 Pflanze	viele Fundorte	