

Weide Rüteli Hägendorf (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 628100 628100 Höhe ü. M.: 1970 m Expositionen: SE NE Fläche: 144 a

	BP1 (1996)	BP2 (2006 und 2011)	BP3 (2016 und 2017)	alle BP (1996 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	5	8	7	20
Beobachtungsdauer:	16 Std. 25 Min.	19 Std. 30 Min	11 Std.	48 Std. 35 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:		273	362	185	820	568	1011	409	1988		2,08	2,79	2,21	2,42	
Bewertete Taxa:		201	238	130	362	480	860	330	1360		2,39	3,61	2,54	3,76	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	Anz. Ereignisse BP2	Anz. Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
WEICHTIERE									
		1996							
Berg-Turmschnecke	Ena montana	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig, vor allem	2
Kleine Turmschnecke	Merdigera = Ena obscura	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig, vor allem im Jura	2
Wegschnecke Gattung	Arion sp.	1996	2006	1	2		Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Grosse Wegschnecke	Arion rufus	1996	1996	1			Max. Ab1	früher häufig gefunden, wird neuerdings von der Spanischen Wegschnecke verdrängt	2
Kugelige Glasschnecke	Vitrina pellucida	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig	4

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
 Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
 Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
 Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
 Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
 Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
 Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
 Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
 Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

() in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
 & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
 * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
 ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:

Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Ereignisse				
Kleine Glanzschnecke	Aegopinella	pura	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig	2	
Weitmündige Glanzschnecke	Aegopinella	nitens	1996	2006	1	2	*	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1	
Haarschnecke Gattung	Trochulus = Trichia	sp.	1996	1996	1			Max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden		
Gemeine Haarschnecke	Trochulus = Trichia	hispidus	1996	1996	2		*	Max. Ab4	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig	4	
Seidenhaarschnecke	Trochulus = Trichia	sericeus	1996	1996	1		*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1	
Seidenhaarschnecke oder Quendelschnecke (nicht bestimmt)	Trochulus = Trichia	sericea cf. Candidula	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich meist T. sericea		
Gekerbte Jura-Haarschnecke	Trochulus = Trichia	caelatus	1996	1996	1			einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Literatur als selten	64	
Zottige Haarschnecke	Trochulus = Trichia	villosus	1996	2006	1	1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur in der Schweiz	1	
Gemeine Heideschnecke	Helicella	itala	1996	2006	2	2		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Rötliche Laubschnecke	Monachoides = Perforatella	incarnatus	1996	2006	1	1	*	Max. Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig	1	
Gefleckte Schnirkelschnecke	Arianta	arbustorum	1996	1996	1			Max. Ab2	in beschatteten und/oder feuchten Lebensräumen häufig gefunden, gilt nach	1	
Weissmündige Bänderschnecke	Cepaea	hortensis	1996	2006	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	1996	2017	5	5	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
GLIEDERFÜSSLER			1996								
SPINNENTIERE			1996								
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(Phalangidae)	non det.	2006	2006		1	**	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert		
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	1996	1996	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1	
Konische Radspinne, Kreisspinne	Cyclosa	conica	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, weil klein und unscheinbar, in den Bodenfallen der WSL nur	8	
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	hortensis	1996	1996	1		*	Max. Ab4	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	2	
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	2006	2006		2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1	
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	Alopecosa	pulverulenta	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 585	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	Anz. Ereignisse BP2	Anz. Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Schaben										
Podas Waldschabe	Ectobius	sylvestris	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Heuschrecken										
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia	sp. J	1996	2006	1	1		Max. Ab1	Jungtiere häufig gefunden	
Grünes Heupferd	Tettigonia	viridissima	2006	2006		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zwischerschrecke	Tettigonia	cantans	1996	2016	3	5	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliche Strauschschrecke	Pholidoptera	griseoptera	1996	2016	3	3	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Feldgrille	Gryllus	campestris	2006	2017		4	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1996	2011	2	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Grosse Goldschrecke	Chrysochraon	dispar	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Bunter Grashüpfer	Omocestus	viridulus	2006	2006		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Heidegrashüpfer	Stenobothrus	lineatus	1996	2016	2	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus	rufus	1996	1996	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Feld-Grashüpfer	Chorthippus	apricarius	2006	2006		2		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1996	2016	2	4	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Brauner Grashüpfer	Chorthippus	brunneus	2006	2006		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1996	2016	4	4	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Wanzen										
Baumwanzen-Art	Rubiconia	intermedia	1996	2016	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	1996	2006	1	1		Max. Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Stinkwanze Gattung	Palomena	sp.	1996	1996	1			Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, aber Jungtiere nicht registriert	1	
Bodenwanzen-Art	Rhyarochromus	pini	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 32	4	
Weichwanzen-Art	Deraeocoris	ruber	1996	1996	1			Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 74	2	
Weichwanzen-Art	Hadrodemus	M-flavum	2006	2016		2	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Weichwanzen-Art	Calocoris	sexguttatus	2006	2006		2		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Weichwanzen-Art	Calocoris	affinis	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Weichwanzen-Art	Stenodema	laevigatum	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 42	2	
Weichwanzen-Art	Stenodema	holosatum	2017	2017			2	Max. Ab1	selten gefunden	16	
Weichwanzen-Art	Leptopterna	dolobrata	2006	2016		1	1	Max. Ab2	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	1	
Gleichflügler			1996								
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	1996	2016	1	2	2	Max. Ab5	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden		
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus	spumarius	2006	2006		1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Grüne Zwergzikade	Cicadella	viridis	2006	2006		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in Feuchtlebensräumen oft massenhaft	1	
Grüne Fichtengallenlaus	Sacchiphantes	viridis	2006			1		Max. Ab2	selten gefunden, aber nicht inventarisiert		
Netzflügler											
Florfliegen-Art	Peyerimhoffina	gracilis	2006	2006		1		einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64	
Käfer			1996								
Gemeiner Grabläufer, Fingerkäfer	Clivina	fossor	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	8	
Laufkäfer-Art	Diachromus	germanus	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 206	2	
Uferräuber-Art	Domene	scabricollis	2006	2006		1		Max. Ab1	selten gefunden	16	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2017	2017			BP1	BP2			
Mausgrauer Raubkäfer	Ontholestes	murinus	2017	2017			1	Max. Ab1	selten gefunden	16	
Gemeiner Weichkäfer	Cantharis	fusca	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Weichkäfer-Art	Cantharis	nigricans	1996	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1996	2006	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Warzenkäfer-Art	Clanoptilus = Malachius	geniculatus	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Glanzkäfer Gattung	Meligethes	sp.	2006	2006		1	*	Max. Ab5	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	1996	2006	2	2		Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Graugrüner Schenkelkäfer	Oedemera	virescens	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1996	1996	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Stachelkäfer-Art	Mordella	brachyura	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden aber oft nicht registriert		
Gartenlaubkäfer	Phyllopertha	horticola	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	1996	2006	1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Kleiner Rehschröter	Platycerus	caraboides	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Bunter Kugelhalsbock	Dinoptera = Acmaeops	collaris	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 5	4	
Blaubock	Gaurotes	virginea	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Feldhornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	Alosterna	tabacicolor	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 4	2	
Feldhornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	Alosterna	tabacicolor	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 4	2	
Fleckenhörniger Halsbock	Stictoleptura = Leptura	maculicornis	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden , in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4	
Roter Schmalbock, Roter Halsbock	Stictoleptura = Leptura	rubra	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36	2	
Blutroter Halsbock	Anastrangalia = Leptura	sanguinolenta	1996	2006	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Schwarzrandiger oder Zweifelhafter Halsbock	Anastrangalia = Leptura	dubia	1996	2006	1	1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2	
Gefleckter Schmalbock	Rutpela = Strangalia =	maculata	2006	2006		2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	1	
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	2006	2016		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1	
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	2006	2017		1	1	Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	2006	2016		1	1	Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	violaceus	2006	2006		1		Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Tatzenkäfer-Art	Timarcha	tenebricosa	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Geglätteter Blattkäfer	Chrysolina = Chrysomela	polita	2006	2006		1		Max. Ab1	selten gefunden	16	
Johanniskraut-Blattkäfer	Chrysolina = Chrysomela	varians	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, an Johanniskraut	4	
Blattkäfer-Art	Oreina = Chrysochloa	speciosa	2016	2016			1	Max. Ab1	selten gefunden	16	
Schildkäfer-Art	Cassida	rubiginosa	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Seidiger Glanzrüssler	Polydrusus	formosus = sericeus	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als häufig	2	
Blauer Kiefertriebstecher	Magdalis	phlegmatica	2017	2017			1	Max. Ab1			
Hautflügler			1996								
Keulenblattwespen-Art	Abia	sericea	1996	1996	1			Max. Ab1	selten gefunden	16	
Blattwespen-Art	Dolerus	picipes	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Blattwespen-Art	Empria	sexpunctata = klugii	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	4	
Blattwespen-Art	Claremontia	brevicornis = confusa	1996	2017	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	4	
Blattwespen-Art	Claremontia	waldheimii	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	8	
Blattwespen-Art	Aglaostigma	aucupariae	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 176	2	
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	nassata	1996	2017	1	1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 37	4	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1996	2017		BP1	BP2	BP3			
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	sordida	1996	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 40	2	
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	tesselata	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Blattwespen-Art	Tenthredo	zonula	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Blattwespen-Artkomplex	Tenthredo	marginella-Komplex	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, möglicherweise zwei verschiedene Arten	2	
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata = ligata	1996	2017	1	2	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2	
Schlupfwespe Gattung	Ichneumon s.str.	sp.	1996	1996	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden		
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	terminatorius	2016	2016			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	bucculentus	2006	1996		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schlupfwespe Artenkomplex	Ichneumon	albiger-Komplex	2006	1996		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schlupfwespen-Art	Patrocloides = Patroclus	sputator	2006	1996		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schlupfwespen-Art	Ulesta	perspicua	2016	2016			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	16	
Schlupfwespen-Art	Amblyteles	armatorius	1996	2016	2		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Schlupfwespen-Art	Phaeogenes	planifrons	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Schlupfwespen-Art	Alomya	semiflava	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Schlupfwespen-Art	Aptesis	nigrocincta	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	1996	1996	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Schlupfwespen-Art	Dusona	stragifex = delusor	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Schlupfwespen-Art	Dusona	obliterata	2006	2006		1		einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64	
Schlupfwespen-Art	Dusona	juvenilis	2006	2006		1		einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64	
Schlupfwespen-Art	Glypta	femorator	2006	2006		1		einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64	
Schlupfwespen-Art	Lissonota	proxima	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3				
Schlupfwespen-Art	Stilbops	ruficornis	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Pion	fortipes	2017	2017			1	Max. Ab2	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Lagarotis	debitor	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Lagarotis	semicaligata	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Alexeter	rapinator	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Tryphon	thomsoni	2006	2006		1		unsicher bestimmt	selten gefunden	
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	2006	2016		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Knotenameisen-Art	Myrmica	rubra	1996	2006	2	1	*	Max. Ab5	häufig gefundenin, den Fallen der WSL häufig: 243 Individuen	2
Knotenameisen-Art	Myrmica	ruginodis	1996	1996	1		*	Max. Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 1799 Individuen	2
Gelbe Wegameise	Lasius	flavus	1996	2006	1	1	*	Max. Ab4	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL häufig: 495 Individuen	1
Grauschwarze Sklavenameise	Formica	fusca	1996	1996	2	1	*	Max. Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 236	2
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1996	1996	2	2	*	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1
Zweifarbige Sklavenameise	Formica	rufibarbis	1996	1996	1		*	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 89	1
Berg-Waldameise	Formica	lugubris	1996	1996	4			Max. Ab4	häufig gefunden	2
Wiesen-Waldameise	Formica	pratensis	2006	2011		2		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Rote Waldameise	Formica	rufa	2006	2016		3	1	Max. Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 3037 Individuen	2
Kahlrückige Waldameise	Formica	polystena	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	2
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	nigricornis	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 12	2
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	oviventris	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	trifasciatus	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 9	4
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	gazella	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3			
Hornisse	Vespa crabro	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	1
Gemeine Wespe	Vespula vulgaris	1996	2016	1	3	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Wegwespen-Art	Arachnospila spissa	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 70	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Clytochrysus) cavifrons	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	8
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus confusus	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2
Kurzfühler-Maskenbiene	Hylaeus brevicornis	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Rotbeinige Furchenbiene	Halictus rubicundus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	2
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus scabiosae	2016	2016			1	Max. Ab1	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus simplex	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus tumulorum	1996	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Breitbauch-Schmalbiene	Lasioglossum lativentre	2011 2011			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum calceatum	1996	2017	1	5	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Weissbeinige Schmalbienenene	Lasioglossum albipes	1996	2017	2	3	1	Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum fulvicorne	1996	2006	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 45	2
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum morio	2006	2006		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 93	1
Gewöhnliche Blutbiene	Sphecodes ephippius	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Glanzlose Zergsandbiene	Andrena subopaca	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	2
Gewöhnliche Zergsandbiene	Andrena minutula	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Fuchsrote Lockensandbiene	Andrena fulva	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	4
Alpenrosen-Lockensandbiene	Andrena rogenhoferi	2006	2006		1		Max. Ab2	selten gefunden	32
Glänzende Düstersandbiene	Andrena nitida	1996	2017	1		2	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 129	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3			
Gelbbeinige Kieselsandbiene	Andrena chrysoceles	1996	2006	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Glockenblumen- Sägehornbiene	Melitta haemorrhoidalis	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Hahnenfuss-Scherenbiene	Chelostoma florisomne	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	2
Zweifarbige Schneckenhausbiene	Osmia bicolor	1996	2006	1	1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Frühlings-Pelzbiene	Anthophora plumipes	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gewöhnliche Keulenhornbiene	Ceratina cyanea	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Feld-Wespenbiene	Nomada goodeniana = succincta	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2
Rotfühler- oder Gespaltene Wespenbiene	Nomada ruficornis = bifida	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Gelbfleckige Wespenbiene	Nomada flavoguttata	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2
Rotschwarze Wespenbiene	Nomada fabriciana	2006	2006		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Dunkle Erdhummel	Bombus terrestris	1996	2006	2	3		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Helle Erdhummel	Bombus lucorum	2006	2016		4	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1
Baumhummel	Bombus hypnorum	2006	2017		2	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Wiesenhummel	Bombus pratorum	1996	2016	2	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1
Steinhummel	Bombus lapidarius	1996	2016	2	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus pascuorum	1996	2017	4	5	5	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Gartenhummel	Bombus hortorum	1996	2006	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	Bombus = Psithyrus barbutellus	2006	2016		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Bombus = Psithyrus bohemicus	1996	2016	1	2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Bombus = Psithyrus campestris	1996	2016	1		2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1
Rotschwarze oder Felsen-Kuckuckshummel	Bombus = Psithyrus rupestris	1996	2016	1	1	1	Max. Ab2	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummele)	Bombus = Psithyrus	sylvestris	1996	2017	2	2	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1
Honigbiene	Apis	mellifera	1996	2017	3	4	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge			1996							
Langfühlermotten-Art	Nematopogon	robertella	2006	2016		2	1	Max. Ab2	selten gefunden	16
Kleines Fünffleck-Widderchen	Zygaena	viciae	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 86	4
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	1996	2006	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
Wickler-Art	Aethes	decimana	1996	2017	1		1	Max. Ab1	selten gefunden	16
Wickler-Art	Acleris	aspersana	2016	2016			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Wickler-Art	Celypha	lacunana	2006	2016		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Wickler-Art	Lathronympha	strigana	1996	2006	1	2		Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Federgeistchen-Art	Stenoptilia	lutescens	1996	2017	1	2	2	Max. Ab3	wenig häufig gefunden	8
Federgeistchen-Art	Merrifieldia	baliodactyla	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	1996	2016	1	2	1	Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1996	2017	1	2	2	Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	2006	2016		3	1	Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1996	2006	1	1		Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Goldzünsler	Pyrausta	aurata	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	1996	2006	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega	pandalis	1996	1996	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wanderzünsler	Nomophila	noctuella	1996	2006	2	1		Max. Ab4	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3			
Eichenspinner, Quittenvogel	Lasiocampa quercus	2017	2017			1	von weitem unsicher bestimmt	erst mehrere Raupen und mehrere, z.T. unsichere Falter-Nachweise, R.Bas.: 7, 25	
Taubenschwänzchen	Macroglossum stellatarum	2006	2017		1	1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1
Nagelfleck	Aglia tau	2006	2006		1		Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 17, 49	1
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus sylvestris	1996	2006	1	1	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Weissfleckiger Kommafalter	Hesperia comma	2006	2016		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 370	2
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes venata	1996	2016	1	3	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Roter Würfelfalter	Spialia sertorius	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438	1
Kleiner Nördlicher Würfelfalter	Pyrgus malvae	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 338	2
Schwalbenschwanz	Papilio machaon	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1
Weissling Familie	(Pieridae)	1996	2016	2	3	2	Max. Ab2	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea sinapis- Komplex	2006	2006		3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser Kohlweissling	Pieris brassicae	2006	2006		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris rapae	2006	2006		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Aurorafalter	Anthocaris cardamines	1996	2006	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Zitronenfalter	Gonepteryx rhamni	1996	2006	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Grosser Schillerfalter	Apatura iris	1996	1996	1			Max. Ab1	eigene Funde selten, R.Bas.: 18, 44	16
Tagpfauenauge	Inachis io	1996	1996	2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	Vanessa atalanta	1996	2016	1	2	1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Distelfalter	Vanessa = Cynthia cardui	1996	2006	2	1		Max. Ab3	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	1
Kleiner Fuchs	Aglais urticae	1996	2016	2	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
Landkärtchen	Araschnia levana	1996	2006	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Kaisermantel	Argynnis	paphia	1996	2006	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531	1
Hainveilchen-Perlmutterfalter	Boloria = Clossiana	dia	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 22, 977	2
Wachtelweizen-Scheckenfalter	Melitaea = Mellicta	athalia	1996	2016	1	1	1	Max. Ab3	häufig gefunden, R.Bas.: 35, 337	2
Westlicher Scheckenfalter Mähwiesen-Scheckenfalter	Melitaea = Mellicta	parthenoides	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 25, 510	2
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1996	2016	1	2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Weisser Waldportier	Brintesia	circe	2006	2006			1	Max. Ab1	häufig gefunden, aber erst (wieder) seit diesem Jahrhundert, R.Bas.: 22, 341	2
Milchfleck, Wald-Mohrenfalter	Erebia	ligea	1996	2006	1	1		Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 25, 195	2
Rundaugen-Mohrenfalter	Erebia	medusa	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 177	4
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1996	2016	2	2	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	1996	2016	1	3	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1996	2017	3	2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria	1996	2016	1	1	1	Max. Ab1	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megea	2006	2017		2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Braunauge	Lasiommata	maera	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 175	2
Nierenfleck, Birken-Zipfelfalter	Thecla	betulae	2016	2016			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 68	2
Zipfelfalter Gattung	Satyrium	sp.	1996	1996	1			Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	1
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris	semiargus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Silbergrüner Bläuling	Polyommatus = Lysandra	coridon	1996	2016	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416	1
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra	bellargus	1996	2017	2	2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1996	2017	2	3	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Schmuck- Kleinspanner	Scopula	ornata	2016	2016			1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 111	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
		1996	2016	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Spanner-Art	Scotopteryx chaenopodiata	1996	2016	1	1	1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 155	1	
Spanner-Art	Xanthorhoe spadicearia	1996	1996	2				Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 57	2	
Spanner-Art	Xanthorhoe montanata	2006	2006		1			Max. Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 13, 83	4	
Spanner-Art	Epirrhoe tristata	1996	1996	1				Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 14, 122	2	
Löwenzahnspanner	Camptogramma bilineata	1996	2016	1	1	2		Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1	
Spanner-Art	Perizoma albulata	2006	2017			1	1	Max. Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 9, 121	4	
Pantherspanner	Pseudo-panthera macularia	1996	2006	1	1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden gefunden, R.Bas.: 10, 95	1	
Heidespanner	Ematurga atomaria	2006	2006			1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1	
Hellgebänderter Steinspanner	Charissa = Gnophos pullata	2006	2006			1		Max. Ab1	am Tag erst 2 Falter gefunden, R.Bas.: 6, 29	8	
Weisser Hartheuspanner	Siona lineata	2016	2017				2	Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 9, 36	2	
Gescheckte Tageule	Callistege mi	2017	2017				1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 70	2	
Braune Tageule	Euclidia glyphica	1996	2017	2	2	1		Max. Ab3	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1	
Gammaeule	Autographa gamma	1996	2016	3	2	1		Max. Ab4	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1	
Schnabelfliegen		1996									
Alpen-Skorpionsfliege	Panorpa alpina	1996	1996	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa germanica	1996	2016	1	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Gewöhnliche Skorpionsfliege	Panorpa communis	2006	2006			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Zweiflügler		1996									
Schnake Gattung	Tipula sp.	2016	2016				1	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden		
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. s.str. Tipula paludosa	1996	1996	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Savtshenkia pagana	1996	1996	1				Max. Ab1	häufig gefunden, Männchen oft lokal massenhaft	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1996	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	flavescens	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Stelzmücken-Art	Prionolabis	hospes = platyptera	2017	2017			1	Max. Ab2	wenig häufig gefunden, aber wahrscheinlich oft übersehen oder nicht beachtet	4
Johannismücke	Bibio	johannis	1996	2017	1	1	2	Max. Ab5	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	1996	2006	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Waffenfliegen-Art	Sargus	flavipes	2006	2006			1	Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Bremsen-Art	Hybomitra	aterrima	2016	2016			1	Max. Ab1	selten gefunden	16
Raubfliegen-Art	Choerades	fimbriata	2006	2006			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Raubfliegen-Art	Leptogaster	cylindrica	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Raubfliegen-Art	Tolmerus	atricapillus	1996	2016	1	3	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius	major	1996	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Platypalpus	cruralis	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	1996	2017	2	2	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Langbeinfliegen-Art	Argyra	auricollis	2006	2006			1	einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64
Grosse Wiesenschwebefliege, Grosse Heckenschwebefliege	Epistrophe	grossulariae	1996	2016	1	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Gemeine Winter- oder Parkswebefliege	Episyrphus	balteatus	1996	2017	1	4	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1
Gemeine Feldschwebefliege	Eupeodes	corollae	1996	1996	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2
Feldschwebefliegen-Art	Eupeodes	nitens	2006	2006				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kurze oder Bogenader-Feldschwebefliege	Eupeodes	lapponicus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark	2
Späte Grossstirnschwebefliege, Weisse Dickkopfschwebefliege	Scaeva	pyrastris	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta	1996	1996	2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	2006	2017		2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1	
Behaarte Schwebefliege, Grosse Gartenschwebefliege	Syrphus	torvus	1996	2017	1	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	2	
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus	vitripennis	2011	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1	
Frühe Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	festivum	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Zweiband-Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	bicinctum	1996	2006	1	1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Kahle oder Südliche Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	intermedium	2006	2016		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1	
Graue oder Schwarze Breitfusschwebefliege	Platycheirus	albimanus	1996	2016	1	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2	
Vierfleck-Waldrand- oder Mondschwebefliege	Pipiza	quadrimaculata	2006	2017		1	1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Erzschwebefliegen-Art Variabilis-Gruppe	Cheilosia	rhynchops	1996	1996	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Weissfuss-Erzschwebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	1996	2006	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Erzschwebefliegen-Art Antigua-Gruppe	Cheilosia	impudens	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Weiden-Erzschwebefliege Canicularis-Gruppe	Cheilosia	albipila	2006	2006		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Korbblüten-oder Bienen- Erzschwebefliege Canicularis-Gr.	Cheilosia	canicularis	2011	2011		1		Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Grüne Erzschwebefliege Canicularis Gruppe Fraterna-Untergruppe	Cheilosia	chloris	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	1996	2006	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	
Gebänderte Waldschwebefliege, Gelbe Hummelschwebefliege	Volucella	inanis	2006	2006		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Gemeine Waldschwebefliege, Gemeine Hummelschwebefliege	Volucella	pellucens	1996	1996	2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1	
Braune Bärenschwebefliege	Arctophila	superbiens	1996	1996	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten:4	4	
Gelbband-Torfschwebefliege	Sericomyia	silentis	2016	2016			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Keilfleckschwebefliegen-Art	Eristalis	interrupta	1996	2006	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
WIRBELTIERE			1996							
Grasfrosch	Rana	temporaria	1996	1996	2			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Eidechse (nicht bestimmt)	Lacerta cf. Podarcis	non det.	1996	2006	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2006	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
Mäusebussard	Buteo	buteo	1996	1996	4	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Turmfalke	Falco	tionnunculus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Hohltaube	Columba	oenas	2006	2006		1		unsicher bestimmt	mässig häufig beobachtet	
Ringeltaube	Columba	palumbus	1996	1996	2	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber meist nicht registriert	
Mauersegler	Apus	apus	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Grünspecht	Picus	viridis	1996	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Schwarzspecht	Dryocopus	martius	2006	2016		2	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Buntspecht	Dendrocopos = Dryocopus	major	1996	1996	1	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Zaunkönig	Troglodytes	troglodytes	1996	1996	3	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	
Rotkehlchen	Erithracus	rubecula	1996	1996	3	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	
Amsel	Turdus	merula	1996	1996	4	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Misteldrossel	Turdus	viscivorus	1996	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Mönchsgrasmücke	Sylvia	atricapilla	1996	1996	2	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Berglaubsänger	Phylloscopus	bonelli	1996	2017	2	2	2	Max. Ab2	häufig beobachtet	2
Waldlaubsänger	Phylloscopus	sibilatrix	1996	1996	1			Max. Ab1	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten	4
Zilpzalp	Phylloscopus	collybita	1996	1996	3	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Wintergoldhähnchen	Regulus	regulus	1996	2006	2	1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Sommergoldhähnchen	Regulus	ignicapillus	1996	1996	2	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Trauerschnäpper	Ficedula	hypoleuca	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Schwanzmeise	Aegitalus	caudatus	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Meise Gattung	Parus	sp.	1996	1996	1	**	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig beobachtet	
Nonnenmeise oder Sumpfmeise	Parus	palustris	1996	1996	2	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Haubenmeise	Parus	cristatus	1996	2016	2	2	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Tannenmeise	Parus	ater	1996	1996	2	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Blaumeise	Parus	caeruleus	1996	1996	3	**	**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Kohlmeise	Parus	major	1996	1996	2	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Kleiber, Spechtmeise	Sitta	europaea	1996	1996	5	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	
Waldbaumläufer	Certhia	familiaris	2006	2006		3		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactyla	2006	2006		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Eichelhäher	Garrulus	glandarius	1996	1996	4	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Tannenhäher	Nucifraga	caryocatactes	1996	2006	2	2		Max. Ab2	früher häufig beobachtet, in letzter Zeit seltener geworden	4
Rabenkrähe	Corvus	corone	1996	1996	2	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Kolkrabe	Corvus	corax	1996	2017	4	4	7	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
Buchfink	Fringilla	coelebs	1996	1996	3	**	**	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Gimpel, Dompfaff	Pyrrhula	pyrrhula	1996	1996	2			Max. Ab2	häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren seltener	2
Eichhörnchen	Sciurus	vulgaris	1996	1996	1			Max. Ab1	häufig beobachtet, vor allem anhand der Frassspuren	2
Wald- od. Gelbhalsmaus (nicht genau bestimmt)	Apodemus	silvaticus cf. flavicollis	1996	1996	1			Max. Ab2	anhand der Spuren mässig häufig festgestellt	4
Scherm Maus	Arvicola	terrestris	1996	2006	1	1	**	Max. Ab2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1996	2006		BP1	BP2	BP3			
Mauslöcher	(Mauslöcher)	non det.	1996	2006	1	1	**	Max. Ab3	sehr häufig gefunden		
Mauslöcher	(Mauslöcher)	non det.	2006	2006		3	**	Max. Ab3	sehr häufig gefunden		
Gämse	Rupicapra	rupicapra	2016	2016			1	Max. Ab2	mässig häufig beobachtet	4	
Reh	Capreolus	capreolus	2006	2006		1		Max. Ab1	häufig beobachtet und auch anhand der Spuren festgestellt	2	
Körnchenröhrling	Suillus	granulatus	1996		1			lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Steinpilz Gattung	Boletus	sp.	2016					1 Pflanze	wenig Fundorte		
Fichten-Blutreizker	Lactarius	deterimus	1996					vereinzelt in der Weide unsicher bestimmt	viele Fundorte, aber wenig häufig registriert		
MOOSE	Auswahl								Hauptsächlich Arten der Halbtrockenransen sind registriert		
Etagenmoos	Hylocomium	splendens	2006					häufig, lokal sehr häufig am Waldrand	viele Fundorte		
Grosses Kranzmoos	Rhytidiadelphus	triquetrus	2006					sehr häufig	viele Fundorte		
SAMENPFLANZEN	Auswahl								Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen		
Gewöhnlicher Wacholder	Juniperus	communis	2006					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Sumpf-Dotterblume	Caltha	palustris	1996					lokal häufig	viele Fundorte		
Stinkende Nieswurz	Helleborus	foetidus	2006					vereinzelt am Waldrand	viele Fundorte		
Gewöhnliche Akelei	Aquilegia	vulgaris	1996					häufig	viele Fundorte		
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	2006					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte		
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	1996					lokal sehr häufig	sehr viele Fundorte		
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	1996					häufig	sehr viele Fundorte		
Knolliger Hain-Hahnenfuss	Ranunculus	tuberosus = nemorosus	1996					häufig	viele Fundorte		
Studentenröschen, Herzblatt	Parnassia	palustris	1996					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1996					sehr häufig	sehr viele Fundorte		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region		
			1996								
Bach-Nelkenwurz	Geum	rivale	1996					mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	1996					mässig häufig	sehr viele Fundorte		
Aufrechtes Fingerkraut	Potentilla	erecta	1996					sehr häufig	viele Fundorte		
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna = neumanniana	1996					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Gemeiner Frauenmantel, Gelbgrüner Frauenmantel	Alchemilla	xanthochlora aggr. = vulgaris =	2006					sehr häufig	viele Fundorte, aber vermutlich oft übersehen		
Feldrose	Rosa	arvensis	2006					lokal häufig	mässig viele Fundorte		
Hundsrose	Rosa	canina	1996					cf. ssp. subcanina unsicher bestimmt	sehr viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert		
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa	2006					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	1996					lokal mässig häufig, lokal häufig, bes. auf der	viele Fundorte		
Mittlerer Klee	Trifolium	medium	2006					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Berg-Klee	Trifolium	montanum	1996					lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis	vulneraria vulneraria	1996					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Schopfiger Hufeisenklee	Hippocrepis	comosa	1996					lokal häufig	viele Fundorte		
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	Linum	catharticum	1996					häufig	viele Fundorte		
Bittere Kreuzblume	Polygala	amarella	1996					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Gewöhnliche Kreuzblume	Polygala	vulgaris vulgaris	1996					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Europäische Sanikel	Sanicula	europaea	1996					1 Pflanze	wenig Fundorte		
Echter Kümmel	Carum	carvi	1996					sehr häufig	viele Fundorte		
Grosse Bibernelle	Pimpinella	major	1996					mässig häufig	viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert		
Kleine Bibernelle	Pimpinella	saxifraga	1996					mässig häufig	viele Fundorte		
Wilde Möhre	Daucus	carota	2006					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3								
Stechpalme	Ilex	aquifolium	1996								1 Pflanze in der Weide, 1 mehrere Junge am	viele Fundorte	
Alpen-Kreuzdorn	Rhamnus	alpinus	2006								1 juner Strauch	mässig viele Fundorte	
Mandelblättrige Wolfsmilch	Euphorbia	amygdaloides	1996								vereinzelt, lokal häufig	viele Fundorte	
Gew. Seidelbast, Zilande	Daphne	mezereum	2006								4 Sträucher auf Südseite und 2 auf der Nordseite	mässig viele Fundorte	
Lorbeer-Seidelbast	Daphne	laureola	2006								1 Pflanze	viele Fundorte	
Behaartes Johanniskraut	Hypericum	hirsutum	2006								mässig häufig	viele Fundorte	
Echtes Johanniskraut	Hypericum	perforatum	1996								sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Scharfkantiges Johanniskraut	Hypericum	tetrapterum	2006								sehr häufig	in Feuchtlebensräumen, mässig viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	2006								mässig häufig, lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Veilchen	Viola	reichenbachiana = sylvestris	1996								häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Ovalblättriges Sonnenröschen	Helianthemum	nummularium ssp. obscurum	1996								vereinzelt, lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Moschusmalve	Malva	moschata	2006								lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Wald-Schlüsselblume	Primula	elatior	1996								vereinzelt am Waldrand, lokal häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	1996								sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Rote Waldnelke	Silene	dioeca	1996								1 Pflanze	viele Fundorte	
Gelber Enzian	Gentiana	lutea	1996								sehr häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Enzian	Gentiana	verna	1996								mässig häufig, bes. auf der Südseite	mässig viele Fundorte	
Deutscher Enzian	Gentiana	germanica	1996								vereinzelt	mässig viele Fundorte	
Gewöhnliches Kreuzlabkraut	Cruciata	laevipes	1996								lokal häufig	viele Fundorte	
Niedriges Labkraut	Galium	pumilum	1996								sehr häufig	viele Fundorte	
Zwerg-Holunder, Attich	Sambucus	ebulus	2006								lokal häufig auf Südseite	mässig viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	Anz. Ereignisse				
Echter Baldrian	Valeriana	officinalis	2006					vereinzelt	viele Fundorte	
Zweihäusiger Baldrian	Valeriana	dioeca	1996					lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Wilde Karde	Dipsacus	fullonum = silvestris	1996					mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1996					mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Tauben-Skabiose	Scabiosa	columbaria	1996					häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Gewöhnliche Tollkirsche	Atropa	bella-donna	1996					1 Pflanze im Brombeergebüsche	wenig Fundorte	
Gelber Fingerhut	Digitalis	lutea	1996					1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
Grosser Ehrenpreis	Veronica	teucrium	1996					häufig	viele Fundorte	
Echter Ehrenpreis	Veronica	officinalis	2006					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Wiesen-Augentrost Gebräuchlicher Augentrost	Euphrasia	rostkoviana	2011					lokal häufig	viele Fundorte	
Behaarter Klappertopf	Rhinanthus	alectorolophus	2006					sehr häufig, auf der Südseite massenhaft	viele Fundorte	
Mittlerer Wegerich	Plantago	media	2006					lokal häufig	viele Fundorte	
Echter Gamander	Teucrium	chamaedrys	1996					1 Pflanze	viele Fundorte	
Grosse Brunelle	Prunella	grandiflora	2006					mässig häufig	viele Fundorte	
Immenblatt, Waldmelisse	Melittis	melissophyllum	1996					1 Pflanze	viele Fundorte	
Alpenziest	Stachys	alpina	2006					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Echte Betonie	Stachys = Betonica	officinalis	1996					mässig häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	1996					1 Pflanze	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	2006					mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Ross-Minze	Mentha	longifolia	2006					lokal sehr häufig	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Rapunzel-Glockenblume	Campanula	rapunculus	2006					lokal mässig häufig	viele Fundorte , begehrte Nahrungsquelle für spezialisierte Bienenarten	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3								
Rundblättrige Glockenblume	Campanula	rotundifolia	2006								mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Ährige Rapunzel	Phyteuma	spicatum	2006								lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wasserdost	Eupatorium	cannabinum	2006								mässig häufig	viele Fundorte	
Dürrwurz	Inula	conyza	1996								1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1996								mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Huflattich	Tussilago	farfara	1996								mässig häufig	viele Fundorte	
Weisse Pestwurz	Petasites	albus	2006								lokal häufig im Wald	wenig Fundorte, aber nicht alle registriert, weil ausserhalb meiner Beobachtungsorte	
Fuchs' Kreuzkraut Fuchs' Greiskraut	Senecio	ovatus = fuchsii Gmelin	2006								lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaea	2006								1 Pflanze	viele Fundorte	
Silberdistel = Einf. Eberwurz	Carlina	acaulis ssp. caulescens =	1996								mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte	
Bergdistel	Carduus	defloratus	2006								lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Sumpf-Kratzdistel	Cirsium	palustre	1996								häufig	viele Fundorte	
Stengellose Kratzdistel	Cirsium	acaule	2006								mässig häufig	viele Fundorte	
Kohldistel	Cirsium	oleraceum	2006								1 Pflanze	viele Fundorte	
Berg-Flockenblume	Centaurea	montana	2006								1 Pflanze am Waldrand	wenig Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	1996								mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milkraut	Leontodon	hispidus	2006								lokal sehr häufig, bes. auf der Südseite	sehr sehr viele Fundorte	
Langhaariges Habichtskraut	Hieracium	pilosella	1996								lokal häufig	viele Fundorte	
Öhrchen-Habichtskraut	Hieracium	lactucella	2006								1 Pflanzen	viele Fundorte	
Herbstzeitlose	Colchicum	autumnale	1996								sehr häufig	viele Fundorte	
Bärlauch	Allium	ursinum	2006								sehr häufig im Wald und am Waldrand	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2			
Türkenbundlilie	Lilium martagon	2006				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Vielblütige Weisswurz	Polygonatum multiflorum	2006				1 Pflanze	im Wald viele Fundorte	
Vierblättrige Einbeere	Paris quadrifolia	2006				lokal mässig häufig	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert	
Weisses Waldvögelein	Cephalanthera damasonium	2016				1 Pflanze von Alfred Matthys gezeigt	wenig Fundorte	
Grosses Zweiblatt	Listera ovata	1996				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Zweiblättriges Breitkölbchen	Platanthera bifolia	1996				1 Pflanze	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Grünliches Breitkölbchen	Platanthera chlorantha	2006				vereinzelt (9Blütenstände)	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Mücken-Handwurz	Gymnadenia conopsea	1996				lokal häufig	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Geflecktes Knabenkraut	Dactylorhiza maculata s.l.	1996				häufig	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Männliche Orchis	Orchis mascula	1996				mässig häufig, bes. auf der Südseite	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Spitzorchis, Pyramidenorchis	Anacamptis pyramidalis	2016				1 Pflanze	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Feld-Hainsimse	Luzula campestris	1996				häufig	viele Fundorte	
Berg-Segge	Carex montana	1996				sehr häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Frühlings-Segge	Carex caryophylla	1996				1 Pflanze	viele Fundorte, typisch für Magerrasen	
Bleiche Segge	Carex pallescens	1996				sehr häufig	wenig Fundorte	
Hirsenfrüchtige Segge	Carex panicea	1996				häufig	mässig viele Fundorte	
Aufrechte Trespe	Bromus erectus	1996				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Fieder-Zwenke	Brachypodium pinnatum	2006				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Mittleres Zittergras	Briza media	1996				sehr häufig	viele Fundorte	
Pyramiden-Kammschmiele	Koeleria pyramidata	1996				mässig häufig, lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	Anthoxanthum odoratum	2006				häufig	viele Fundorte	