

Waldrand Ruttigen Olten, Lichtfänge zusammen mit L. Reser und E. Schäffer – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 634875 242825 Höhe: 415 m ü. M Exposition: SE

Beobachtungsdauer: Von 2006 bis 2013 20 Stunden

Berechnung des Seltenheits- Index der Fauna:	Bewertete Arten:	Anzahl	Summe	Index
	Ereignisse:	171	1'330	7,78
		229	1'597	6,97

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
GLIEDERFÜSSLER						
INSEKTEN						
Ohrwürmer						
Gemeiner Ohrwurm	<i>Forficula auricularia</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Imago beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden	2
Schaben						
Podas Waldschabe	<i>Ectobius sylvestris</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Jungtier beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden	2
Heuschrecken						
Punktierte Zartschrecke	<i>Leptophyes punctatissima</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Jungtier beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden	2
Grünes Heupferd (nur Stridulation)	<i>Tettigonia viridissima</i> G	2008	2008	1 E, Ab3, mehrere bis viele Männchen singen in der Nacht	sehr häufig gehört	1
Gewöhnliche Strauchschrecke	<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	2007	2008	2 E, max. Ab2, mehrere Männchen singen in der Nacht	sehr häufig gefunden	1

F = Fundort

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe (max. Ab): 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse, Index: 1 mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse, Index: 4 selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse, Index: 16

häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse, Index: 2 wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse, Index: 8 sehr selten gefunden: 1 bis 2 Ereignisse, Index: 32

Regio Basiliensis: Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Waldgrille	<i>Nemobius</i>	<i>sylvestris</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 mn singt in der Nacht	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Langfühler-Dornschrecke	<i>Tetrix</i>	<i>tenuicornis</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Imagines beim Lichtfang gesehen	sehr häufig gefunden	1
Nachtigall-Grashüpfer	<i>Chorthippus</i>	<i>biguttulus</i>	2010	2010	1 E, Ab1, mehrere Männchen beim Lichtfang gesehen	sehr häufig gefunden	1
Wanzen			2013				
Rotbeinige Baumwanze	<i>Pentatoma</i>	<i>rufipes</i>	2008	2011	3 E, Ab1, 4 Imagines bei 3 Lichtfängen gesehen	mässig häufig gefunden, Waldrandbewohner, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Feuerwanze	<i>Pyrrhocoris</i>	<i>apterus</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Imago beim Lichtfang gesehen	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1
Gleichflügler							
Ohrzirpe	<i>Ledra</i>	<i>aurita</i>	2008	2008	1 E, Ab1, 1 Imago am Licht gefangen	selten gefunden	16
Netzflügler							
Florfliegen-Art	<i>Hypochrysa</i>	<i>elegans</i>	2009	2009	1 E, Ab1 1 Imago beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Goldauge, Florfliegen-Art	<i>Chrysoperla</i>	<i>carnea</i>	2007	2009	3 E, Ab1, 4 Imagines bei 3 Lichtfängen gesehen	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1
Käfer			2006				
Schnellläufer-Art	<i>Harpalus</i> = <i>Pseudophonus</i>	<i>rufipes</i>	2008	2008	1 E, Ab1, 2 Imagines am Licht gefangen	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 79	4
Ufer-Totengräber	<i>Necrodes</i>	<i>littoralis</i>	2010	2010	1 E, Ab1, einziger Fund in der Region! 2 Imagines gefangen	erst 1 Mal gefunden	32
Weichkäfer-Art	<i>Cantharis</i>	<i>pellucida</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Imagines am Licht gefangen	mässig häufig gefunden	4
Weichkäfer-Art	<i>Cantharis</i>	<i>decipiens</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Imago am Licht gefangen	wenig häufig gefunden	8
Purpurroter Schnellkäfer	<i>Denticollis</i>	<i>rubens</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Imagines am Licht gefangen	selten gefunden	16
Schnellkäfer-Art	<i>Melanotus</i>	<i>rufipes</i>	2009	2009	1 E, Ab1, einer von 2 Funden in der Region!	erst 2 Mal gefunden	32
Schnellkäfer-Art	<i>Stenagostus</i>	<i>villosus</i>	2008	2008	2 E, Ab1, einziger Fundort in der Region! 2 Imagines gefangen	erst 2 Mal am selben Ort gefunden	32

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	<i>Athous</i>	<i>haemorrhoidalis</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Imago am Licht gefangen	häufig gefunden	2
Marienkäfer-Art	<i>Harmonia</i>	<i>axyridis</i>	2008	2010	3 E, max. Ab2, mehrere Imagines beim Lichtfang gesehen, 1 gefangen	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig	2
Marienkäfer-Art	<i>Halyzia</i>	<i>sedecimguttata</i>	2008	2009	4 E, max. Ab2, mehrere Imagines beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Marienkäfer-Art	<i>Calvia</i>	<i>quatordecimguttata</i>	2008	2008	1 E, Ab1, 1 Imago beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Marienkäfer-Art	<i>Calvia</i>	<i>decimgutta</i>	2008	2009	3 E, Ab1, mehrere Imagines bei 2 Lichtfängen gesehen, 2 gefangen	selten gefunden	16
Scheinbockkäfer-Art	<i>Xanthochroa</i>	<i>carniolica</i>	2008	2008	1 E, Ab1, 1 Imago am Licht gefangen	wenig häufig gefunden	8
Feuerkäfer-Art	<i>Pyrochroa</i>	<i>coccinea</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Imago beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Pflanzenkäfer-Art	<i>Gonodera</i>	<i>luperus</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Imago am Licht gefangen	selten gefunden	16
Dungkäfer-Art	<i>Aphodius</i>	<i>prodromus</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Imagines beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Feldmaikäfer, Gemeiner Maikäfer	<i>Melolontha</i>	<i>melolontha</i>	2006	2009	2 E, Ab1, mehrere Imagines bei 2 Lichtfängen gesehen	wenig häufig gefunden	8
Balkenschröter	<i>Dorcus</i>	<i>parallelpipedus</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Imago beim Lichtfang gesehen	wenig häufig gefunden	8
Hautflügler							
Brackwespe Gattung	<i>Homolobus</i>	<i>sp.</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Weibchen am Licht gefangen, nicht sicher bestimmt	Gattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespe Gattung	<i>Gelis</i>	<i>sp.</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Männchen am Licht gefangen	Gattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespe Gattung	<i>Ophion</i>	<i>sp.</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Männchen am Licht gefangen	Gattung mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	<i>Ophion</i>	<i>scutellaris</i>	2006	2006	1 E, Ab1, einer von 2 Funden, 1 Männchen gefangen, unsicher best.	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	<i>Ophion</i>	<i>obscuratus</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 2 Weibchen am Licht gefangen	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	<i>Ophion</i>	<i>costatus</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Männchen am Licht gefangen	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	<i>Dusona</i>	<i>bicoloripes</i> = <i>försteri</i> Roman,	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Weibchen am Licht gefangen	wenig häufig gefunden	8

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Schwarze Schlupfwespe	<i>Pimpla</i>	<i>rufipes</i>	2007	2007	1 E, Ab1, 1 Weibchen am Licht gefangen	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	<i>Metopius</i>	<i>fuscipennis</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Männchen am Licht gefangen	selten gefunden	16
Schlupfwespe Gattung	<i>Perilissus</i>	<i>sp.</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Weibchen am Licht gefangen	Gattung mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Gattung	<i>Absyrtus</i>	<i>sp.</i>	2008	2007	1 E, Ab1, einer von 2 Funden, 1 Weibchen am Licht gefangen	Gattung erst 2 Mal gefunden	32
Schlupfwespe Gattung	<i>Netelia s.l.</i>	<i>sp.</i>	2009	2010	1 E, Ab1, 1 Weibchen am Licht gefangen	Gattung mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Untergattung	<i>Netelia (Paropheltes)</i>	<i>sp.</i>	2009	2010	2 E, Ab1, je 1 Weibchen am Licht gefangen	Untergattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespe Gattung	<i>Thymaris</i>	<i>sp.</i>	2009	2009	1 E, Ab1, einziger Fund in der Region! 1 Männchen gefangen	Gattung erst 1 Mal gefunden	32
Zehrwespen-Art	<i>Phaenoserphus</i>	<i>viator</i>	2009	2009	1 E, Ab1, einer von nur 3 Funden in der Region! 1 Weibchen gefangen	selten gefunden	16
Zehrwespen-Art	<i>Disogmus</i>	<i>areolator</i>	2009	2009	1 E, Ab1, bisher einziger Fund 1 Männchen am Licht gefangen	erst 1 Mal gefunden	32
Knotenameisen-Art	<i>Myrmica</i>	<i>rubra</i>	2008	2008	1 E, Ab1, 1 wb und viele Arbeiterinnen gesehen	häufig gefundenin, den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 243 Individuen	2
Rossameisen-Art	<i>Camponotus</i>	<i>truncatus</i>	2008	2008	1 E, Ab1, einziger Fund in der Region! Viele Weibchen, 1 gefangen	erst 1 Mal gefunden	32
Mauer-Wegameise	<i>Lasius</i>	<i>emarginatus</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Arbeiterin beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Hornisse	<i>Vespa</i>	<i>crabro</i>	2007	2007	1 E, Ab1,1 Arbeiterin beim Lichtfang gesehen	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1
Köcherfliegen							
Köcherfliegen-Art	<i>Rhyacophila</i>	<i>dorsalis</i>	2009	2010	2 E, Ab5, sehr viele mn und wb bei 2 Lichtfängen gesehen, je 4 gefangen	wenig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 49 Quadrate	1
Köcherfliegen-Art	<i>Glossosoma</i>	<i>boltoni</i>	2009	2009	1 E, Ab2, einer von 3 Funden in der Region! 3 mn und 4 wb gefangen	selten gefunden , für die Region beim SZKF/CSCF 16 Quadrate	4
Köcherfliegen-Art	<i>Hydroptila</i>	<i>sparsa</i>	2009	2009	1 E, Ab1, bisher einziger Fund in der Region!	erst 2 Mal gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 21 Quadrate	2
Köcherfliegen-Art	<i>Psychomyia</i>	<i>pusilla</i>	2009	2009	1 E, Ab1, sehr viele mn und wb gesehen, 7 mn und 8 wb gefangen	selten gefunden , für die Region beim SZKF/CSCF 30 Quadrate	2
Köcherfliegen-Art	<i>Hydropsyche</i>	<i>incognita</i>	2007	2011	4 E, max. Ab5, bei 4 Lichtfängen in grosser Zahl, 9 mn und 2 wb gef.	mässig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 35 Quadrate	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Köcherfliegen-Art	<i>Oecetis</i>	<i>notata</i>	2010	2010	1 E, Ab1, einziger persönlicher Fund in der Region, 2 mn gefangen	erst 1 Mal gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 9 Quadrate	8
Köcherfliegen-Art	<i>Odontocerum</i>	<i>albicorne</i>	2008	2007	1 E, Ab1, 1 Weibchen beim Lichtfang gesehen, nicht sicher bestimmt	mässig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 60 Quadrate	1
Köcherfliegen-Art	<i>Micropterna</i>	<i>sequax</i>	2010	2010	1 E, Ab1, einer von 2 Funden in der Region, 1 wb am Licht gefangen	erst 2 Mal gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 7 Quadrate	8
Köcherfliegen-Art	<i>Lepidostoma</i>	<i>hirtum</i>	2009	2011	3 E, max. Ab3, mehrere bis viele mn und wb gesehen, mehrere gefangen	selten gefunden , für die Region beim SZKF/CSCF 25 Quadrate	2
Schmetterlinge							
Langfühlermotten-Art	<i>Nematopogon</i>	<i>swammerdamella</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Schwarzdorn-Gespinstmotte	<i>Yponomeuta</i>	<i>padella</i>	2008	2008	1 E, Ab2, m Falter beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Pfaffenhütchen-Gespinstmotte	<i>Yponomeuta</i>	<i>cagnagella</i>	2008	2008	1 E, Ab2, m Falter beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden	2
Kohlmotte, Schleiermotte	<i>Plutella</i>	<i>xylostella</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden	2
Buchenmotte, Sängerin	<i>Diurnea</i>	<i>fagella</i>	2006	2006	1 E, Ab1, einer von 3 Funden in der Region! 1 Männchen gefangen	selten gefunden	16
Kleinschmetterlings-Art	<i>Carcina</i>	<i>quercana</i>	2008	2011	3 E, Ab1, je 1 Falter bei 3 Lichtfängen gesehen, 2 gefangen	wenig häufig gefunden	8
Wickler Familie	<i>(Tortricidae)</i>	<i>non det.</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	Familie sehr häufig gefunden	-
Wickler-Art	<i>Cochylis</i>	<i>dubitana</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Männchen am Licht gefangen	wenig häufig gefunden	8
Wickler-Art	<i>Tortrix</i>	<i>viridana</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	selten gefunden	16
Wickler-Art	<i>Cnephasia</i>	<i>incertana</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Männchen am Licht gefangen	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	<i>Cnephasia</i>	<i>cupressivorana</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Männchen am Licht gefangen	erst 1 Mal gefunden	32
Wickler-Art	<i>Pandemis</i>	<i>corylana</i>	2008	2008	1 E, Ab2, 3 Falter beim Lichtfang gesehen, 2 gefangen	wenig häufig gefunden	8
Wickler-Art	<i>Eudemis</i>	<i>porphyrana</i>	2008	2008	1 E, Ab1, 1 Männchen am Licht gefangen	selten gefunden	16
Wickler-Art	<i>Notocelia (Epiblema)</i>	<i>cynosbatella</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Falter beim Lichtfang gesehen	wenig häufig gefunden	8

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Federgeistchen-Art	<i>Amblyptilia acanthodactyla</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Weibchen am Licht gefangen	wenig häufig gefunden	8
Federgeistchen-Art	<i>Stenoptilia coprodactyla</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen, nicht sicher bestimmt	mässig häufig gefunden	4
Federgeistchen-Art	<i>Euleioptilus = Oidaematophorus carphodactyla</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Weibchen am Licht gefangen	selten gefunden	16
Zünsler-Art	<i>Synaphe punctalis</i>	2008	2008	1 E, Ab1, 2 Falter beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden	2
Fruchtzünsler-Art	<i>Oncocera semirubella</i>	2010	2011	4 E, max. Ab3, mehrere bis viele Falter beim Lichtfang gesehen	sehr häufig gefunden	1
Fruchtzünsler-Art	<i>Phycita roborella</i>	2008	2008	1 E, Ab1, nur 2 Fundorte , beide in Olten! 2 Falter gefangen	erst 2 Mal gefunden	32
Fruchtzünsler-Art	<i>Dioryctria abietella</i>	2008	2008	1 E, Ab1, einziger Fund in der Region! 1 Männchen gefangen	erst 1 Mal gefunden	32
Fruchtzünsler-Art	<i>Euzophera pinguis</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 2 Männchen am Licht gefangen	erst 1 Falter am Licht gefangen	32
Weisser Graszünsler	<i>Crambus perlellus</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 2 Falter beim Lichtfang gesehen	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	<i>Catoptria falsella</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	wenig häufig gefunden	8
Purpurroter Zünsler	<i>Pyrausta purpuralis</i>	2010	2010	1 E, Ab1, mehrere Falter beim Lichtfang gesehen	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	<i>Microstega pandalis</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 3 Falter beim Lichtfang gesehen	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	<i>Microstega hyalinata</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Männchen beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden	2
Brennesselzünsler	<i>Eurrhynx hortulata</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Zünsler-Art	<i>Pleuroptya ruralis</i>	2008	2001 0	2 E, Ab2, mehrere Falter beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden, besonders an Brennnnesseln	2
Buchsbaum-Zünsler	<i>Cydalima = Diaphania perspectalis</i>	2013	2013	1 E, Ab2, mehrere Falter, auch dunkle Formen, beim Lichtfang	bis jetzt noch wenig häufig gefunden, Neozoon, breitet sich seit wenigen Jahren aus	8
Lindenschwärmer	<i>Mimas tiliae</i>	2012	2012	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	erst 1 Raupe am Tag und mehrere Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 11, 15	8
Kleiner Weinschwärmer	<i>Deilephia porcellus</i>	2012	2012	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	erst 1 Raupe am Tag und mehrere Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 18, 45	4
Nagelfleck	<i>Aglia tau</i>	2006	2008	1 E, Ab1, 1 Männchen beim Lichtfang gesehen	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 17, 49	1

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					7
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index	
Buchen-Sichelflügler	<i>Watsonalla = Drepana</i>	<i>cultraria</i>	2008	2013	5 E, max. Ab2, mehrere Falter bei 4 Lichtfängen gesehen	am Tag wenig häufig gesehen, R.Bas.: 19, 92	4	
Sichelflügler-Art	<i>Sabra</i>	<i>harpagula</i>	2011	2011	1 E, Ab1, erster persönlicher Fund in der Region	am Tag noch nie gesehen, 1 Falter am Licht gefangen, R.Bas.: 0, 0	32	
Rosen-Wollrückenspinner	<i>Thyatira</i>	<i>batis</i>	2012	2012	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag 1 Raupe und 1 schlafenden Falter, 1 Falter am Licht, 1 in Falle, R.Bas.: 19, 57	4	
Gitterspanner	<i>Chiasmia = Semiothisa</i>	<i>clathrata</i>	2006	2010	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1	
Gelbspanner	<i>Opisthograptis</i>	<i>luteolata</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 26, 201	8	
Spanner-Art	<i>Selenia</i>	<i>dentaria = bilunaria</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 2 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag 5 schlafende Falter, am Licht 2, in Falle 1, R.Bas.: 8, 44	4	
Spanner-Art	<i>Selenia</i>	<i>lunularia</i>	2009	2009	1 E, Ab1, einer von 2 persönlichen Funden in der Region, 1 Falter gef.	am Tag 2 schlafende Falter, am Licht 2 Falter gefunden, R.Bas.: 17, 28	8	
Mondfleckspanner	<i>Selenia</i>	<i>tetralunaria</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag erst 3 schlafende Falter gefangen, am Licht mehrere gesehen, R.Bas.: 12, 44	4	
Schlehenspanner	<i>Angerona</i>	<i>prunaria</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Männchen forma. corylaria am Licht gefangen	am Tag nur selten gefunden, R.Bas.: 11, 22	8	
Birkenspanner	<i>Biston</i>	<i>betularia</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Männchen am Licht gefangen	am Tag nur 2 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 19, 55	4	
Spanner-Art	<i>Hypomecis</i>	<i>roboraria</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Männchen am Licht gefangen	am Tag 2 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gefangen, R.Bas.: 10, 12	8	
Spanner-Art	<i>Hypomecis = Serraca</i>	<i>punctinalis</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag noch nie gesehen, am Licht 1 Falter, R.Bas.: 17, 24	8	
Heidespanner	<i>Ematurga</i>	<i>atomaria</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1	
Spanner-Art	<i>Campaea</i>	<i>margaritata</i>	2010	2012	2 E, Ab1, je 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 26, 132	2	
Spanner-Art	<i>Pungeleria</i>	<i>capreolaria</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag erst 2 Falter gefangen und 1 Falter am Licht, R.Bas.: 16, 45	4	
Spanner-Art	<i>Hemistola</i>	<i>chrysoprasaria = biliosata</i>	2008	2008	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag 4 schlafende und 1 Falter am Licht gefunden, R.Bas.: 8, 8	16	
Spanner-Art	<i>Cyclophora</i>	<i>linearia</i>	2006	2013	4 E, Ab1, 5 Falter bei 4 Lichtfängen gesehen	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 20. 62	4	
Spanner-Art	<i>Xanthorhoe</i>	<i>spadicearia</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 57	2	
Spanner-Art	<i>Epirrhoe</i>	<i>alternata</i>	2006	2011	2 E, Ab1, 3 Falter bei 2 Lichtfängen gesehen	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Löwenzahnspanner	<i>Camptogramma bilineata</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
Spanner-Art	<i>Anticlea derivata</i>	2006	2006	1 E, Ab1, einer von 2 persönlichen Funden in der Region, 1 F gefangen	am Tag erst 1 Falter gefangen und 1 am Licht gesehen, R.Bas.: 2, 1	32
Spanner-Art	<i>Chloroclysta siterata</i>	2007	2007	2 E, Ab1, je 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag 17 schlafende Falter und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 15, 72	4
Weissgrauer Blattspanner	<i>Chloroclysta truncata</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 F am Licht gefangen	am Tag erst wenige schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 23, 81	4
Spanner-Art	<i>Colostygia pectinataria</i>	2009	2011	2 E, Ab1, 3 Falter am Licht gefangen	am Tag erst 6 schlafende Falter und 3 Falter am Licht gefunden, R.Bas.: 18, 40	4
Spanner-Art	<i>Horisme radicularia</i>	2008	2008	1 E, Ab1, erster persönlicher Fund in der Region, 1 Falter gefangen	erst 1 Falter am Licht gefangen, R.Bas.: 9, 19	8
Spanner-Art	<i>Epirrita christyi</i>	2007	2007	1 E, Ab1, 2 Männchen beim Lichtfang gesehen	am Tag nur wenige Falter, 2 in Falle und 2 am Licht, R.Bas.: 9, 26	8
Spanner-Art	<i>Perizoma alchemillata</i>	2008	2008	1 E, Ab2, mehrere Falter beim Lichtfang gesehen, 1 gefangen	am Tag erst 2 Falter und 1 am Licht gefangen, R.Bas.: 18, 57	4
Blütenspanner-Art	<i>Eupithecia centaureata</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag erst 5 Falter gefangen, R.Bas.: 10, 15	8
Blütenspanner-Art	<i>Eupithecia tantillaria</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag 12 Falter gefunden, R.Bas.: 14, 123	2
Spanner-Art	<i>Asthenia albulata</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 F beim Lichtfang gesehen	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 14, 21	4
Spanner-Art	<i>Hydrelia flammeolaria</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag 3 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gefangen, R.Bas.: 15, 46	4
Spanner-Art	<i>Nothocasis sertata</i>	2007	2007	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag mehrere schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 8, 8	16
Mondvogel	<i>Phalera bucephala</i>	2012	2012	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag erst 6 Falter gesehen, R.Bas.: 9, 14	8
Zahnspinner-Art	<i>Peridea anceps</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag 1 schlafenden Falter gefangen und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 7, 10	8
Dromedar-Zahnspinner , Erlen-Zahnspinner	<i>Notodonta dromedarius</i>	2006	2006	1 E, Ab1, einer von 3 Funden in der Region, 1 F beim Lichtfang gesehen	erst 2 Falter am Licht und am Tag 2 Raupen gesehen, R.Bas.: 8, 11	8
Rotschwanz-, Streckfuss-Art	<i>Calliteara = Dasychira pudibunda</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	mehrere Raupen und Falter am Tag und mehrere am Licht ges, R.Bas.: 21, 108	2
Blankflügel-Flechtenbär	<i>Nudaria mundana</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 4, 2	16
Rosenmotte	<i>Miltochrista miniata</i>	2013	2013	1 E, Ab2, mehrere Falter am Licht gefangen, 1 gefangen	am Tag 9 schlafende Falter und mehrere am Licht gesehen, R.Bas.: 12, 77	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Flachflügel-Flechtenbär	<i>Eilema depressa = deplana (Esper, 1787)</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Männchen und 1 Weibchen am Licht gefangen	am Tag 5 schlafende Falter und 3 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 20, 105	2
Gewöhnlicher Flechtenbär	<i>Eilema complana</i>	2008	2008	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag 3 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gefangen, R.Bas.: 16, 61	8
Flechtenbär-Art	<i>Eilema caniola</i>	2009	2010	2 E, Ab1, je 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag 40 schlafende Falter und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 11, 26	4
Frühlings-Flechtenbär	<i>Eilema sororcula</i>	2009	2009	1 E, Ab2, 1 Weibchen und mehrere Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag 24 Falter und mehrere Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 17, 179	2
Weisse Tigermotte	<i>Spilosoma lubricipeda = menthastri</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 F beim Lichtfang gesehen	am Tag 10 schlafende Falter gesehen, R.Bas.: 21, 40	4
Pfeileule	<i>Acronicta psi</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 F am Licht gefangen	erst 2 Raupen am Tag und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 10, 17	8
Ligustereule	<i>Craniophora ligustri</i>	2008	2011	2 E, Ab1, die 2 einzigen persönlichen Falterfunde, 1 Falter gefangen	erst 1 Raupe am Tag und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 22, 128	2
Palpeneulen-Art	<i>Herminia = Quaramia grisealis = nemoralis</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag erst 5 Falter und 1 Falter am Licht gefunden, R.Bas.: 15, 25	8
Eulenfalter-Art	<i>Laspeyria flexula</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag 3 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gefunden, R.Bas.: 13, 40	4
Seideneulchen	<i>Rivula sericealis</i>	2008	2011	4 E, max. Ab2, mehrere Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 104	1
Eulenfalter-Art	<i>Hypena proboscidalis</i>	2007	2012	2 E, Ab1, 1 Männchen und 1 Weibchen bei 2 Lichtfängen gesehen	am Tag schlafende Falter mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 44	4
Messingeule	<i>Diachrysia chrysitis</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag erst 8 Falter gefunden, R.Bas.: 11, 9	16
Eulenfalter-Art	<i>Macdunnoughia confusa</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 16	2
Gammaeule	<i>Autographa gamma</i>	2010	2011	2 E, max. Ab2, mehrere Falter bei 2 Lichtfängen gesehen	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Eulenfalter-Art	<i>Hoplodrina ambigua</i>	2010	2011	2 E, Ab1, 3 Falter bei 2 Lichtfängen gesehen, 1 Falter gefangen	am Tag 9 Falter, am Licht 3 Falter gesehen, R.Bas.: 15, 22	8
Eulenfalter-Art	<i>Mythimna = Leucania obsoleta</i>	2013	2013	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	erst 1 Falter am Licht gefangen, R.Bas.: 1, 0	32
Weissfleckige Schilfgraseule	<i>Mythimna albipuncta</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 81	4
Eulenfalter-Art	<i>Mythimna pallens</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag erst 4 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 15, 14	8
Eulenfalter-Art	<i>Mythimna L-album</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Falter am Licht gefangen	am Tag erst 1 Falter und 1 Falter am Licht gefangen, R.Bas.: 8, 11	8

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Kätzcheneulen-Art	<i>Orthosia</i>	<i>gothica</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag erst 5 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 13, 160	2
Trapezeule	<i>Cosmia</i>	<i>trapezina</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag 7 Falter gefunden, R.Bas.: 19, 67	4
Eulenfalter-Art	<i>Agrochola</i>	<i>macilenta</i>	2007	2007	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag 5 schlafende Falter gefunden und 1 Falter in Falle gefangen, R.Bas.: 12, 103	2
Braune Heidelbeereule	<i>Conistra</i>	<i>vaccinii</i>	2006	2007	2 E, Ab1, je 1 Falter bei 2 Lichtfängen gesehen, 1 gefangen	am Tag 4 schlafende Falter und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 11, 78	4
Eulenfalter-Art	<i>Blepharita</i>	<i>satura</i>	2007	2007	1 E, Ab1, 2 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag erst 1 schlafenden Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 6, 9	16
Weissrandige Erdeule	<i>Ochropleura</i>	<i>plecta</i>	2008	2011	2 E, max. Ab2, mehrere Falter bei 2 Lichtfängen gesehen	am Tag 5 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen R.Bas.: 26, 149	2
Hausmutter	<i>Noctua</i>	<i>pronuba</i>	2008	2011	2 E, Ab1, 3 Falter bei 2 Lichtfängen gesehen	am Tag 22 schlafende Falter und 4 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 22, 177	2
Eulenfalter-Art	<i>Noctua</i>	<i>comes</i>	2011	2011	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	erst 1 Falter in Malaisefalle gefangen und 1 F am Licht gesehen, R.Bas.: 11, 34	4
Schwarzes C, C-Eule	<i>Xestia (Amates) c-nigrum</i>		2010	2011	2 E, Ab2, mehrere Falter bei 2 Lichtfängen gesehen	mehrere Falter am Tag und mehrere bis viele am Licht gesehen, R.Bas.: 24, 236	2
Gemeine Graseule	<i>Agrotis</i>	<i>exclamationis</i>	2012	2012	1 E, Ab1, 1 Falter beim Lichtfang gesehen	am Tag mässig häufig gefunden und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 24, 108	2
Eulenfalter-Art	<i>Colocasia</i>	<i>coryli</i>	2006	2006	1 E, 2 Falter beim Lichtfang gesehen, 1 gefangen	am Tag 3 schlafende Falter und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 17, 91	4
Schnabelfliegen							
Gemeine Skorpionsfliege	<i>Panorpa</i>	<i>vulgaris</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Weibchen beim Lichtfang gesehen	sehr häufig gefunden	1
Zweiflügler							
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Savtshenkia</i>	<i>obsoleta</i>	2007	2007	1 E, Ab1, 1 Männchen am Licht gefangen	wenig häufig gefunden	8
Krähenschnaken-Art	<i>Nephrotoma</i>	<i>appendiculata</i>	2009	2009	1 E, Ab2, 1 Weibchen und 2 Individuen beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden	2
Stelzmücken-Art	<i>Dicranomyia</i>	<i>modesta</i>	2007	2007	1 E, Ab1, 1 Weibchen gesehen, nicht sicher bestimmt	mässig häufig gefunden, aber nicht inventarisiert	-
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>hercegovinae</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 1 Weibchen beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
Stelzmücken-Art	<i>Metalimnobia</i>	<i>quadrimaculata</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Weibchen am Licht gefangen	selten gefunden	16

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum				
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Stelzmücken-Art	<i>Rhipidia</i>	<i>maculata</i>	2007	2007	1 E, Ab2, mehrere Männchen beim Lichtfang gesehen, 2 gefangen	selten gefunden	16
Haarmücken-Art	<i>Dilophus</i>	<i>febrilis</i>	2009	2009	1 E, Ab1, 2 Männchen beim Lichtfang gesehen	häufig gefunden	2
Fenstermücken-Art	<i>Sylvicola</i>	<i>punctatus</i>	2007	2007	1 E, Ab1, 1 Männchen beim Lichtfang gesehen	wenig häufig gefunden	8
Waffenfliegen-Art	<i>Sargus</i>	<i>bipunctatus</i>	2010	2010	1 E, Ab1, 1 Weibchen am Licht gefangen	mässig häufig gefunden	4
Tanzfliegen-Art	<i>Rhamphomyia</i>	<i>sulcatina</i>	2006	2006	1 E, Ab1, 2 Männchen beim Lichtfang gesehen	mässig häufig gefunden	4
WIRBELTIERE	Auswahl	ohne sehr häufige Arten					
Waldkauz	<i>Strix</i>	<i>aluca</i>	2007	2007	1 E, Ab1, 1 Männchen ruft in der Nacht	selten gesehen, aber oft gehört	8