

Alte Kiesgrube beim EW Wynau Schwarzhäusern (BE) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 625230 625233 Höhe ü. M.: 416 m Expositionen: - Div. Fläche: 200 a

	BP 1 (2001 bis 2003)	BP 2 (2009 bis 2012)	BP 3 (2013 - 2021)	BP 4 (2022 und 2023)	alle BP (2001 bis 2023)
Anzahl Begehungen:	08	12	22	26	68
Beobachtungsdauer:	21 Std. 50 Min.	25 Std. 05 Min.	70 Std. 25 Min.	87 Std. 45 Min.	205 Std. 05 Min.

	BP1	A	B	BP2	A	B	BP3	A	B	BP4	A	B	BP alle	A	B
Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:															
Anzahl der Ereignisse:		440	235		447	106		986	186		940	53		2813	580
Summe der Ereignisse:		1558	932		1767	636		4405	1345		4886	645		12716	3567
Seltenheitsindex:		3.54	3.97		3.95	6.00		4.57	7.28		5.20	12.17		4.52	6.15

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
WEICHTIERE	MOLLUSCA STAMM	2001	2022							
Gemeine SchlammschneckeArt	Radix labiataArt	2002	2014	1			2	max. Ab2, einziger Fundort in der Reg.	3 Mal am selben Ort gefunden, überall in der Schweiz, aber nirgends häufig	64

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur den Seltenheitswerten in der Region:

Index 1:	sehr häufig gefunden:	mehr als 500 Ereignisse
Index 2:	häufig gefunden:	100 bis 499 Ereignisse
Index 4:	mässig häufig gefunden:	31 bis 100 Ereignisse
Index 8:	wenig häufig gefunden:	10 bis 30 Ereignisse
Index 16:	selten gefunden:	3 bis 9 Ereignisse
Index 32:	sehr selten gefunden:	2 Ereignisse an verschiedenen Orten
Index 64:	äusserst selten gefunden:	1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
Index 128:	Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen	

() in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
& Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
* in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert
o in dieser Beobachtungsperiode habe ich den Gesang nur noch schwach wahrgenommen
oo in dieser Beobachtungsperiode habe ich den Gesang nicht mehr wahrgenommen
+ diese Werte sind so hoch, weil ich die Arten wenig beachtet habe: Spinnentiere und nachtfliegende Falter
Schmetterlinge Regio Basiliensis:
Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

Seltenheitswerte: Für die bewerteten Taxa (Namen) gilt: alle A: wenn jeder Seltenheitswert für alle Arten bei jeder Behebung gezählt wird
alle B: wenn jeder Seltenheitswert für alle Arten nur 1 Mal gezählt wird

* Dieser Seltenheitswert liegt nahe dem unteren Grenzwert. Beispiel: 16* bedeutet, dass 8 oder 9 Ereignisse vorliegen. Bei 10 Ereignissen wäre der Seltenheitswert 08

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	Anz. Ereignisse BP3 BP4		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Gekielte TellerschneckeArt	Planorbis	carinatusArt	2022	2022				1	Ab1	selten gefunden , weil kaum mehr danach gesucht, gilt nach Literatur als	16*
Gemeine AchatschneckeArt	Cochlicopa	lubricaArt	2001	2001	3				max. Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig	4
Gefleckte SchüsselschneckeArt	DiscusG	rotundatusArt	2001	2003	6				max. Ab4	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als sehr	4
Wegschnecken	ArionG	Gattung	2001	2001	1				Ab1	Gattung sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	2
Weitmündige GlanzzschneckeArt	Aegopinella	nitensArt	2001	2017	1		1*		max. Ab2	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	2
Glatte SchliessmundschneckeArt	Cochlodina	laminataArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als	4
Genabelte StrauchschneckeArt	BradybaenaG neu: Fruticola	fruticumArt	2011	2022		2	3	1	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Genabelte StrauchschneckeArt	BradybaenaG neu: Fruticola	fruticumArt	2022	2022				1	Ab1	sehr häufig gefunden	1
RiemenschneckeArt	HelicodontaG	obvolutaArt	2010	2023		2	3	3	max. Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	2
Kartäuserschnecken	MonachiinaeUf Unterfamilie		2001	2023	1	2		1	Ab1	häufig gefunden, kann lokal in grossen Massen auftreten, gilt nach Literatur als	2
SeidenhaarschneckeArt	Trochulus alt: Trichia	sericeusArt	2001	2001	2		*		max. Ab2	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	2
QuendelschneckeArt	CandidulaG	unifasciataArt	2010	2023		4	2		max. Ab2	häufig gefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz als häufig, aber verletzlich	2
Gemeine HeideschneckeArt	HelicellaG	italaArt	2013	2023			6	5	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Rötliche LaubschneckeArt	MonachoidesG alt: Perforatella	incarnatusArt	2001	2023	1	3	1*	1	max. Ab1	häufig ngefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig	2
Schwarzmündige BänderschneckeArt	Cepaea	nemoralisArt	2013	2022			1	1	max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
WeinbergschneckeArt	HelixG	pomatiaArt	2001	2023	3	4	7	3	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
GLIEDERFÜSSLER ARTHROPODA STAMM			2001	2001							
SPINNENTIERE ARACHNIDA KLASSE			2001	2001							
WEBERKNECHTE ZIMMERMANN			2001	2002	2		**		max. Ab2, registriert	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
StreckerspinnenArt	Tetragnatha	extensaArt	2014 2014			1		Ab1	an Bächen mässig häufig gefunden, vermutlich aber häufig	2
HerbstspinnenArt	Metellina	segmentataArt	2001 2013	1		1		max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	2
Eichblatt RadspinneArt	AculepeiraG	ceropegiaArt	2014 2014			1		Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	2
GartenkreuzspinneArt	Araneus	diadematusArt	2019 2020			2		max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1
GlanzkreuzspinnenArt	Singa	hamataArt	2002 2022	1				Ab1, ausser diesem nur noch ein weiterer	in der NW-CH erst 2 Mal gefunden	32+
GlanzkreuzspinnenArt	Singa	nitidulaArt	2012 2023		1	4	2	max. Ab2	in der NW-CH erst 6 Mal am selben Ort gefunden	64
BaldachinspinnenArt	Linyphia	triangularisArt	2013 2023			3	2	max. Ab5	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1
WolfsspinneF	LycosidaeF	Familie	2001 2014	2		2 [*]		max. Ab4	Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	1
WolfsspinnenArt	Pardosa	amentataArt	2014 2014			1		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 204	2
WolfsspinnenArt	Pardosa	hortensisArt	2001 2014	4	1	3 [*]		max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 219	1
Wolfsspinnen	TrochosaG	Gattung	2001 2001	1				Ab1	Gattung häufig gefunden	2
WolfsspinnenArt	Xerolycosa	nemoralisArt	2010 2019		1	5		max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
ListspinneArt	PisauraG	mirabilisArt	2014 2014			1		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1
Labyrinthspinnen	AgelenaG	Gattung	2001 2022	2	5	5	1	max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena	1
KrabbenspinnenArt	Xysticus	kochiArt	2010 2010		1	[*]		Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 3	2
SpringspinnenArt	Evarcha	arcuataArt	2001 2022	1		1 [*]	1	max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	2
SpringspinnenArt	PhlegraG	fasciataArt	2002 2002	1				Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	08
KREBSTIERE	CRUSTACEA KLASSE		2001 2001							
AsselArt	Hyloniscus	ripariusArt	2001 2001	1				Ab3, ausser diesem nur noch ein weiterer	in der NW-CH erst 2 Mal gefunden, weil kaum danach gesucht, nicht inventaris.	32+

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
AsselArt	TrachelipusG	ratzeburgiArt	2001 2001	1				Ab2	mässig häufig registriert, wahrscheinlich im Versteckten häufig	2
AsselArt	Trachelipus	rathkeiArt	2001 2022	1			1	Ab2	häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig	2
VIELFÜSSER	MYRIAPODA KLASSE		2001 2001							
Steinläufer	LithobiusG Gattung		2001 2002	3				max. Ab2	Gattung häufig gefunden, aber nie auf die Art bestimmt und oft nicht registriert	2
Gesprenkelter SaftkuglerArt	Glomeris	undulataArt forma conspersa	2001 2001	1				Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig	4
SchnurfüsserArt	Cylindrojulus	caeruleocinctusArt	2001 2001	2				Ab1	unter Steinen und Totholz am Boden häufig gefunden	2
INSEKTEN	HEXAPODA KLASSE		2001 2001							
Gebänderte PrachtlibelleArt	CalopteryxG	splendensArt	2001 2022	2	2	1	2	max. Ab1	Gattung an Flüssen und Bächen häufig gefunden	2
WeidenjungferArt	Lestes	viridisArt	2001 2023	1			1	Ab3	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, besonders im Herbst	4
Gemeine WinterlibelleArt	SympecmaG	fuscaArt	2001 2023	2	3	6	8	max. Ab2	häufig gefunden	2
Gemeine FederlibelleArt	PlatycnemisG	pennipesArt	2009 2023		6	2	1	max. Ab2	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,	4
Grosse PechlibelleArt	IschnuraG	elegansArt	2001 2022	2			1	max. Ab1	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Kleine PechlibelleArt	Ischnura	pumilioArt	2001 2023	1			1	Ab1	mässig häufig gefunden, vor allem in flachen Kiesgrubentümpeln	4
BecherAzurjungferArt	EnallagmaG	cyathigerumArt	2001 2022	3	2	1	1	max. Ab3	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Hufeisen AzurjungferArt	Coenagrion	puellaArt	2001 2023	4	1	4	5	max. Ab4	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Herbst MosaikjungferArt	Aeshna	mixtaArt	2013 2022			1	2	max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
Blaugrüne MosaikjungferArt	Aeshna	cyaneaArt	2001 2023	3	4	4	6	max. Ab2	sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	2
KeilflecklibelleArt	AnaciaeshnaG	isoscelesArt	2001 2001	1				Ab1, aber unsicherer Nachweis, weil nur	erst 1 Mal gefunden, aber unsicher bestimmt	-
Grosse KönigslibelleArt	Anax	imperatorArt	2001 2023	5	3	3	5	max. Ab2	häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kleine KönigslibelleArt	Anax parthenopeArt	2014	2014			1		Ab1, aber unsicherer Nachweis, aus	wenig häufig gefunden	-
Gemeine SmaragdlibelleArt	CorduliaG aeneaArt	2003	2022	1			1	Ab1, aber unsicherer Nachweis, aus	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,	-
VierfleckArt	Libellula quadrimaculataArt	2001	2022	4	2	2	3	max. Ab3	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
PlattbauchArt	Libellula depressaArt	2011	2022		1		1	max. Ab1	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Südlicher BlaupfeilArt	Orthetrum brunneumArt	2014	2022			1	1	max. Ab1	an Gewässern mässig häufig, oft auch an Pfützen	4
Grosser BlaupfeilArt	Orthetrum cancellatumArt	2001	2014	4		1		max. Ab3	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
FeuerlibelleArt	CrocothemisG erythraeaArt	2001	2015	1		2		max. Ab2	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, aber hier manchmal in grösserer	4
HeidelibelleG	SympetrumG Gattung	2013	2022			2	1	max. Ab2	Gattung häufig gefunden	2
Gemeine HeidelibelleArt	Sympetrum vulgatumArt	2001	2001	2				max. Ab2	wenig häufig gefunden	08
Grosse HeidelibelleArt	Sympetrum striolatumArt	2001	2023	4	4	4	6	max. Ab3	häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst	2
Blutrote HeidelibelleArt	Sympetrum sanguineumArt	2001	2023	1	1	1	4	max. Ab2	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,	4
Schwarze HeidelibelleArt	Sympetrum danaeArt	2001	2001	1				Ab1, einziger mir bekannter Fund ,	unsicher bestimmt	-
HEUSCHRECKEN	SALTATORIA ORDNUNG	2001	2001							
Gemeine SichelschreckeArt	PhaneropteraG falcataArt	2001	2023	3	3	3	3	max. Ab2	früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen und häufig	2
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia Juv. non det.	2022	2023				3	max. Ab2	Jungtiere häufig gefunden	1
Grünes HeupferdArt	TettigoniaG Gattung viridissimaArt	2001	2014	6		3 ^o		max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Westliche BeissschreckeArt	PlatycleisG Gattung albopunctataArt albopunctata	2011	2023		2	2	4	max. Ab2	im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig	1
Beissschrecke (Jungtier, nicht bestimmt)	Metrioptera Juv. non det.	2022	2022				1	Ab1	Jungtiere häufig gefunden	2
Roesels BeissschreckeArt z.T. nur Gesang	Metrioptera roeseliiArt z.T. nur Gesang	2003	2022	1		1 ^{oo}	1 ^{oo}	max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Gewöhnliche StrauchschreckeArt	PholidopteraG	griseopteraArt	2011 2023		1		2	Ab1	sehr häufig gefunden	1
FeldgrilleArt	GryllusG	campestrisArt	2001 2023	4	5	5	7	max. Ab3	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1
WaldgrilleArt	NemobiusG	sylvestrisArt	2001 2023	4	4	5	2	max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Dornschracken	TetrixG	Gattung	2021 2023			2		Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Zweipunkt DornschrackeArt	Tetrix	bipunctata1Art bipunctataUnterart	2022 2022				1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Langfühler DornschrackeArt	Tetrix	tenuicornisArt	2001 2023	3	1	6	3	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Blauflüglige ÖdlandschrackeArt	Oedipoda	caerulescensArt	2009 2023		8	9	14	max. Ab4, einziger Fundort in der	in der NW-CH mehrmals am selben Ort gefunden	64
Blauflüglige SandschrackeArt	SphingonotusG	caerulansArt	2019 2019			1		Ab1	mässig häufig gefunden und in Ausbreitung begriffen, nur auf nacktem	4
NachtigallgrashüpferArt	Chorthippus	biguttulusArt	2001 2023	1	6	11	10	Ab5	sehr häufig gefunden	1
NachtigallgrashüpferArt z.T. nur Gesang	Chorthippus	biguttulusArt z.T. nur Gesang	2001 2011	5	3			max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Brauner GrashüpferArt	Chorthippus	brunneusArt	2001 2023	2	4	5 ^o	12 ^o	max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Brauner GrashüpferArt nur Gesang	Chorthippus	brunneusArt z.T. nur Gesang	2001 2014	5	4	1		max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner GrashüpferArt	Chorthippus	parallelusArt	2001 2023		1	1	9	max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner GrashüpferArt z.T. nur Gesang	Chorthippus	parallelusArt z.T. nur Gesang	2001 2001	3				max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
SCHNABELKERFE	HETEROPTERA ORDNUNG		2001 2022							
SchildkrötenwanzeArt	Eurygaster	testudinariaArt	2001 2001	2				max. Ab1	häufig gefunden , in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
StreifenwanzeArt	GraphosomaG	lineatumArt	2010 2023		4	5	2	max. Ab2	sehr häufig gefunden	2
BrachwanzeArt	Sciocoris	macrocephalusArt	2014 2020			2		max. Ab1	selten gefunden	08
SpitzlingArt, Getreide SpitzwanzeArt	AeliaG	acuminataArt	2015			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4				
BaumwanzenArt	Carpocoris	purpureipennisArt	2011	2023		1	2	3	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2
BaumwanzenArt	Carpocoris	fuscispinusArt	2011	2015		1	1		max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
BaumwanzenArt	DolycorisG	baccarumArt	2001	2023	2	4	6	6	max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Ginster BaumwanzeArt	PiezodorusG	lituratusArt	2003	2014	1		1		max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Rotbeinige BaumwanzeArt	PentatomaG	rufipesArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden, Waldrandbewohner, in den Fallen der WSL	2
KohlwanzeArt	Eurydema	oleraceumArt	2001	2009	1	1			max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2
BläulingArt, Blaugrüne BaumwanzeArt	ZicronaG	coeruleaArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
RandwanzenArt	EnoplopsG	scavaArt	2015	2015			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
LederwanzeArt oder RandwanzeArt	CoreusG	marginatusArt	2013	2023			1	3	max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Rotrückiger IrrwischArt	AlydusG	calcaratusArt	2013	2023			2	4	max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
GlasflügelwanzeArt	Rhopalus	subrufusArt	2010	2023		2		1	max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2
GlasflügelwanzeArt	Stictopleurus	punctatonervosus Art	2001	2022	1	1	3	3	max. Ab21	häufig gefunden	2
GlasflügelwanzeArt	Stictopleurus	abutilonArt	2011	2014		1	1		max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
RitterwanzeArt	Lygaeus	equestrisArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
BodenwanzeArt	NysiusG	senecionisArt	2017	2017			1		Ab1	selten gefunden	16
SichelwanzeArt	Nabis	ferusArt	2022	2023				3	max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	08
SichelwanzeArt	Nabis	rugosusArt	2022	2022				1	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	2
Behaarte WiesenwanzeArt	Lygus	rugulipennisArt	2001	2001	1				Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	4
Gemeine WiesenwanzeArt	Lygus	pratensisArt	2015	2017			2		max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 46	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3 BP4				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
WeichwanzenArt	Calocoris	lineolatusArt	2022	2022				1	Ab3	in der NW-CH 4 Mal gefunden	16
Gelbsaum ZierwanzeArt	Adelphocoris	seticornisArt	2003	2023	1			1	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	2
Gemeine ZierwanzeArt	Adelphocoris	lineolatusArt	2001	2023	2		2	1	max. Ab2	häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL selten: 3	2
WeichwanzenArt	PlagiognathusG	chrysanthemiArt	2002	2002	1				1 von 3 Fundorten in der	selten gefunden	16
WasserläuferArt	GerrisG	Gattung	2002	2014	1		2		max. Ab4	Gattung in stehenden Gewässern häufig gefunden	2
RückenschwimmerArt	NotonectaG	Gattung	2013	2013			1		Ab2	Gattung in stehenden Gewässern häufig gefunden	2
GLEICHFLÜGLER	HOMOPTERA	ORDNUNG	2001	2001			1		Ab1		-
Europäischer LaternenträgerArt	DictyopharaG alt: Fulgora	europaeaArt	2012	2012		1			Ab1	selten gefunden	08*
SchaumzikadenArt nicht bestimmt	Cercopidae non det.		2001	2023	2		3	1	max. Ab5	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1
Wiesen SchaumzikadeArt	PhilaenusG	spumariusArt	2002	2023	1	1	2	1	max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Erlen SchaumzikadeArt	AphrophoraG	alniArt	2014	2022			1	1	max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
SchaumzikadenArt	LepyroniaG	coleoprataArt	2001	2001	1				Ab1	häufig gefunden	2
BlutzikadenArt	CercopisG	vulnerataArt	2013	2014			2		max. Ab1	häufig gefunden	2
BüffelzirpeArt	StictocephalaG	bisoniaArt	2015	2015			1		Ab1	mässig häufig gefunden, Neozoon	4
Grüne ZwergzikadeArt	CicadellaG	viridisArt	2001	2023	7	2	4	4	max. Ab5	sehr häufig gefunden, in Feuchtlebensräumen oft massenhaft	2
WasserflorfliegenArt	Sialis	lutariaArt	2014	2014			1		Ab1	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, aber vermutlich häufig	4
AmeisenjungferArt	AmeisenlöweArt	EuroleonG	2020	2022			1	3	max. Ab2	Larven wenig häufig, Imagines selten gefunden	4
KÄFER	COLEOPTERA	ORDNUNG	2001	2022							-
Sandlaufkäfer	CicindelaG	Gattung	2010	2022		2	4	3	max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Berg SandläuferArt	Cicindela silvicolaArt	2014	2023			6	4	Ad max. Ab 1 Larven max. Ab4	häufig gefunden	2
Dünen SandläuferArt	Cicindela hybridaArt	2011	2019		1	1		Ad Ab1 Larven Ab3, Anwesenheit	mässig häufig gefunden, nur auf Sandböden	4
Feld SandläuferArt	Cicindela campestrisArt	2009	2023		4	8	6	Ad max.Ab2 Larven max. Ab5	sehr häufig gefunden	2
AhlenläuferArt	Bembidion pygmaeumArt	2001	2014	7	1	2		Max. Ab3	in der NW-CH emehrere Funde an nur 3 Orten , ausschliesslich auf Sand	16
Vierfleck AhlenläuferArt	Bembidion quadrimaculatumA	2001	2001	2				max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 51	4
Gegliedelter AhlenläuferArt	Bembidion articulatumArt	2002	2002	1				Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16
NebelfleckenläuferArt	Asaphidion pallipesArt	2001	2022	5				1 von nur 2 Fund-orten in der	in der NW-CH mehrmals an nur 2 Orten gefunden	32
Schwarzer SchmuckläuferArt	Anisodactylus binotatusArt	2022	2022				1	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 106	2
SchnellläuferArt	Harpalus latusArt	2011	2011		1			Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 131	08
Kupferiger SchulterläuferArt, ListkäferArt	Poecilus cupreusArt	2001	2013	1		1		max. Ab2	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 598	2
Müllers PutzläuferArt	Agonum muelleriArt	2001	2001	1				Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 328	4
Ovaler KanalkäferArt, KamelläuferArt	Amara s.str. ovataArt	2001	2001	1				Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	4
Erzfarbener KanalkäferArt	Amara s.str. aeneaArt	2013	2013			1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 22	4
Kleiner BombardierkäferArt	Brachinus explodensArt	2011	2022		1			Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 11	4
Gemeiner GelbrandkäferArt	Dytiscus marginalisArt	2022	2022				1	Ab1	wenig häufig gefunden, nicht inventarisiert	16
TaumelkäferArt	Gyrinus substriatusArt	2022	2022				6	max. Ab4	Gattung selten gefunden, nicht inventarisiert	16
DungkugelkäferArt	Sphaeridium scarabaeoidesArt	2013	2013			1		Ab1	selten gefunden, nicht inventarisiert	16
StutzkäferArt	AtholusG duodecimstriatusA	2001	2011	1				einziger Fund in der Region!	in der NW-CH erst 1 Mal gefunden , conf. P. Herger 2001	64
Zweifleckiger SchmalräuberArt	Stenus biguttatusArt	2014	2014			2		max. Ab1	wenig häufig gefunden	08

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
SchmalräuberArt	Stenus commaArt	2002	2002	1					Ab1	selten gefunden , vermutlich in geeigneten Habitaten häufig	08
SchmalräuberArt	Stenus longipesArt	2001	2014	3			2		max. Ab1	selten gefunden , gilt in Mitteleuropa als selten	16*
Gemeiner UferräuberArt (KurzflüglerArt)	Paederus litoralisArt	2002	2002	1					Ab2	mässig häufig gefunden	4
Braunfüssiger UferräuberArt (KurzflüglerArt)	Paederus fuscipesArt	2002	2002	1					Ab1	mässig häufig gefunden	4
KurzflügelkäferArt	Philonthus variansArt	2001	2001	1					Ab1	selten gefunden	16
WeichkäferArt	Cantharis rusticaArt	2011	2023			1	1	1	max. Ab2	sehr häufig gefunden	2
Variabler WeichkäferArt	Cantharis lividaArt	2014	2014				1		Ab1	häufig gefunden	2
Rotgelber WeichkäferArt	Rhagonycha fulvaArt	2001	2010	1		1			max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Weichkäfer	MalthodesG Gattung	2003	2003	1					Ab1	Gattung wenig häufig gefunden	08
Grosser BlasenkäferArt	Malachius aeneusArt	2002	2002	1					Ab1	mässig häufig gefunden	4
Zottiger BienenwolfkäferArt	Trichodes alveariusArt	2013	2013				1		Ab1	häufig gefunden	2
SaatschnellkäferArt	Agriotes ustulatusArt	2003	2003	1					Ab1	mässig häufig gefunden	4
SaatschnellkäferArt	AdrastusG pallensArt	2014	2014				1		Ab1	in der NW-CH erst 1 Mal gefunden	64
Rotbauchiger LaubschnellkäferArt	Athous haemorrhoidalisArt	2014	2014				1		Ab1	häufig gefunden	2
PrachtkäferArt	Anthaxia helveticaArt	2013	2013				1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 27	2
GlanzkäferArt	GlischrochilusG hortensisArt	2010	2010			1			Ab1	in der NW-CH selten gefunden , weil klein und versteckt	16
Veränderlicher Flach MarienkäferArt	AdoniaG neu: Hippodamia variegataArt	2001	2023	1		2		1	max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Siebenpunkt MarienkäferArt	CoccinellaG septempunctataArt	2010	2011			2			max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zehnpunkt MarienkäferArt	Adalia decempunctataArt	2022	2022					1	Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Asiatischer MarienkäferArt	Harmonia axyridisArt	2014	2022	&			1	2	max. Ab1	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig	2
Gemeiner SchenkelkäferArt	Oedemera femorataArt	2014	2023				2	1	max. Ab1	häufig gefunden	2
SchenkelkäferArt	Oedemera luridaArt	2014	2023				1	2	Ab1	häufig gefunden	2
Gebänderter StachelkäferArt	VariimordaG villosaArt	2001	2003	2					max. Ab2	sehr häufig gefunden	2
KotkäferArt	Onthophagus fracticornisArt	2022	2022					1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
GartenlaubkäferArt	PhylloperthaG horticolaArt	2001	2014	1			3		max. Ab4	häufig gefunden	2
Gebänderter PinselkäferArt	TrichiusG fasciatusArt	2001	2023	2				1	max. Ab1	sehr häufig gefunden	2
Zottiger RosenkäferArt	TropinotaG hirtaArt	2011	2023		1	5		4	max. Ab3	früher selten, seit mehreren Jahren häufig gefunden	2
Trauer RosenkäferArt	OxythyreaG funestraArt	2014	2023				1	1	Ab1	wenig häufig gefunden, aber in starker Zunahme begriffen	2
Gemeiner RosenkäferArt	CetoniaG aurataArt	2001	2014	1			1		max. Ab1	häufig gefunden	2
Gefleckter SchmalbockArt	Strangalia neu: Rutpela maculataArt	2001	2023	1			2	1	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	1
Schwarznahtiger HalsbockArt, Schwarzschwänziger	Strangalia neu: Stenurella melanuraArt	2013	2023				1	1	Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Rothalsiges GetreidehähnchenArt	Oulema melanopusArt	2010	2023		3	1		3	max. Ab1	sehr häufig gefunden, hier handelt es sich um zwei sehr ähnliche Arten	2
HieroglyphenkäferArt	Pachybrachys sinuatusArt	2002	2023	1				1	Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16
Goldiger FallkäferArt	Cryptocephalus aureolusArt	2001	2014	1	2	3			max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
FallkäferArt	Cryptocephalus hypochoeridisArt	2002	2023	2	1	1		1	max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
FallkäferArt	Cryptocephalus violaceusArt	2013	2023				2	1	max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
FallkäferArt	Cryptocephalus ocellatusArt	2014	2014				1		Ab1	in der NW-CH erst 2 Mal gefunden	32
WeidenblattkäferArt	Phratora alt: Phyllodecta Kirby tibialisArt	2014	2022				2	2	max. Ab1	in der NW-CH erst 2 Mal an 3 Orten gefunden	16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kleiner WeidenblattkäferArt	Phratora alt: Phyllodecta Kirby vitellinaeArt	2014	2032			2	2	max. Ab2	wenig häufig gefunden, aber manchmal in grösserer Anzahl	08
Erlen BlattkäferArt	AgelasticaG alniArt	2022	2022				1	Ab1	wenig häufig gefunden	08
Rainfarn BlattkäferArt	GalerucaG tanacetiArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kohlerdflohkäfer	AlticaG Gattung	2022	2022				1	Ab1	Gattung mässig häufig gefunden, aber meist übersehen oder nicht inventarisiert	2
Seidiger GlanzrüsslerArt	Polydrusus sericeusArt neu: formosus	2013	2013			1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als	2
Buchen SpringrüsslerArt, BuchenblattrüsslerArt	Orchestes alt: Rhynchaenus fagiArt	2014	2014			1		Ab5 (Minierspuren)	Frassspuren an Rotbuchen sehr häufig in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
HAUTFLÜGLER		2001	2022							
HalmwespeArt	Cephus spinipesArt alt: cultratus	2001	2001	1				Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
BlattwespenArt	Dolerus germanicusArt	2001	2014	1		1		max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
BlattwespeArt	Allantus calceatusArt	2022	2022				1	Ab1	wenig häufig gefunden	08
BlattwespeArt	Allantus didymusArt	2001	2010	1	1			max. Ab1	wenig häufig gefunden	4*
BlattwespeArt	Claremontia brevicornisArt alt: confusa	2022	2022				1	Ab2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	4
BlattwespeArt	Tenthredo zonaArt	2020	2020			1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
BlattwespeArt	Macrophya montanaArt	2013	2014			2		max. Ab1	häufig gefunden	2
SchlupfwespeArt	Virgichneumon tergenusArt	2014	2014			1		Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16
SchlupfwespeArt	SpilothyratelesG illuminatoriusArt	2014	2014			1		Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16
SchlupfwespeArtengruppe	Ichneumon albigerKomplex	2001	2001	1				Ab1	häufig gefunden	2
SchlupfwespeArt	Acroricnus stylatorArt	2022	2022				1	Ab1	in der NW-CH einziger Fund	64
SichelwespeArt	Therion circumflexumArt	2015	2015			1		Ab1	sehr häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3 BP4				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
SichelwespeArt	Erigorgus	cerinopsArt	2009	2009		1			Ab1	häufig gefunden	2
SchlupfwespenArt	Cylloceria	melancholicaArt	2013	2014			2		max. Ab2	in der NW-CH selten gefunden	16
SchlupfwespeArt	Stilbops	ruficornisArt alt: abdominalisArt	2013	2022			1	1	max. Ab2	häufig gefunden	2
SchlupfwespeArt	ApechthisG	compunctorArt	2013	2022			1		Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16
SchlupfwespeArt	ColpotrochiaG	cinctaArt	2022	2022				2	max. Ab1	häufig gefunden	2
SchlupfwespeArt	Exochus	gravisArt	2013	2014			2		max. Ab1	in der NW-CH selten gefunden, in der Schweiz noch nicht publiziert!	16
SchlupfwespeArt	MetopiusUG Untergattung		2022	2023				7	Ab4	Gattung wenig häufig gefunden	08
Schlupfwespen Unterfamilie	CtenopelmatinaeUf Unterfamilie 27		2014	2014			1		Ab1	Unterfamilie sehr häufig gefunden	2
Brackwespe Gattung Puppenkokon	ApantelesG Gattung	sp. und Puppenkokon	2001	2023	1			1	Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Brackwespen Gattung	ChelonusG Gattung		2003	2003	1				Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4
SchmalbauchwespenArt	Gasteruption	assectatorArt	2014	2014			1		Ab2	mässig häufig gefunden	4
ErzwespenArt	Chalcis	myrifexArt	2014	2014			1		Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16*
Gemeine RosengallwespeArt (Galle)	DiplolepisG	rosaeArt (Galle)	2001	2020	1		2		max. Ab3 (Gallen)	sehr häufig gefunden	2*
GoldwespenArt	Hedychrum	gerstäckeriArt	2011	2015		2	3		max. Ab2	wenig häufig gefunden	08
Sand GoldwespeArt	Hedychrum	nobileArt	2003	2023	1	2	2	4	max. Ab2	in der NW-CH selten gefunden	16
Zweifarbige GoldwespeArt	Chrysis	bicolorArt	2003	2022	1		1	1	max. Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16
RollwespenArt	Tiphia	unicolorArt alt: ruficornis	2010	2010		1			1 von 3 Funden in der Region	in der NW-CH selten gefunden	16
TrugameiseArt	MyrmosaG	atraArt	2015	2015			1		Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 9	08
Rotbeinige SpinnenameiseArt	SmircomyrmeG	rufipesArt	2014	2014			1		Ab1 einer von 2 Fundorten in der	in der NW-CH einer von 2 Fundorten	16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	Anz. BP3	Ereignisse BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
KnotennameisenArt	ManicaG	rubidaArt	2001 2013	9	5	2		max. Ab5	mässig häufig, auf Sandböden lokal sehr häufig	4
KnotennameisenArt	Myrmica	sabuletiArt	2014 2014			1*		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 1091 Individuen	2
Trockenrasen KnotenameiseArt	Myrmica	scabrinodisArt	2001 2013	3	1	1*		max. Ab4	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 3906 Individuen	2
DrüsenameiseArtengruppe	TapinomaG	erraticumArt cf. ambiguumArt	2002 2012	1	2	*		max. Ab3	häufig gefunden	2
Schwarzgraue WegameiseArt	Lasius	nigerArt	2011 2011		1	*		Ab4, aber nicht jedesmal registriert	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1
Grauschwarze SklavenameiseArt	Formica	fuscaArt	2009 2022		1	3*	1	max. Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 236	2
Gewöhnliche SklavenameiseArt	Formica	cuniculariaArt	2014 2014			1*		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1
PillenwespenArt	Eumenes	coronatusArt	2009 2023		1	2	1	max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	2
PillenwespenArt	Eumenes	pedunculatusArt	2009 2023		1	4	2	max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
Mörtel- oder LehmwespenArt	Ancistrocerus	gazellaArt	2014 2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
LehmwespenArt	Symmorphus	gracilisArt	2014 2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Haus FeldwespeArt	Polistes	dominulusArt	2001 2023	2	1	1	4	max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und	1
HornisseArt	VespaG	crabroArt	2003 2017	1		4		max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
WaldwespeArt	Dolichovespula	sylvestrisArt	2015 2015			1		Ab1	häufig gefunden	2
GemeineWespeArt	Vespula	vulgarisArt	2001 2023	3	2	3	6	max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Wegwespe nicht bestimmt	Arachnospila non det.		2010 2010		1			Ab1	Gattung häufig gefunden	2
WegwespenArt	Arachnospila	ancepsArt	2001 2001	1				Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
WegwespenArt	Evagetes	pectinipesArt	2014 2014			1		Ab1, einziger Fund in der	in der NW-CH erst 1 Mal gefunden, conf. Chr. Schmid-Egger 2014	64
WegwespenArt	Anoplius	infuscatusArt	2001 2023	3	2	4	3	max. Ab2	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3 BP4				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Frühlings WegwespeArt	Anoplius	viaticusArt	2014	2014			2		max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Gemeine SandwespeArt	Ammophila	sabulosaArt	2010	2022		1			einziger Fund in der Region!	in der NW-CH erst 1 Mal gefunden	64
BienenwolfArt (Grabwespe)	Philanthus	triangulumArt	2020	2022			2	1	max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
Bienenjagende KnotenwespeArt	Cerceris	rybiensisArt	2001	2023	1	1	1	1	max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
SandknotenwespeArt	Cerceris	arenariaArt	2003	2023	1	3	1	4	max. Ab5	wenig häufig gefunden	08
GrabwespenArt	Gorytes (s.str.)	laticinctusArt	2015	2015			1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
GrabwespenArt	Gorytes (s.str.)	fallaxArt	2011	2011		1			1 von 2 Funden in der Region	in der NW-CH erst 2 Mal gefunden, Im Naturmuseum Solothurn ist 1 Tier	32
GrabwespenArt	Argogorytes	mystaceusArt	2013	2013			1		Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
GrabwespenArt	Nysson	trimaculatusArt	2014	2019			2		max. Ab1	in der NW-CH selten gefunden, Kuckuckswepe von Gorytes laticinctus	16
GrabwespenArt	Alysson	bimaculatusArt	2022	2022				3	max. Ab1	in der NW-CH erst 3 Mal am selben Ort gefunden	64
GrabwespenArt	Alysson	spinosusArt	2014	2014			1		Ab1	in der NW-CH erst 2 Mal gefunden	32
KotwespenArt (Grabwespen)	MellinusG	Gattung	2012	2012		1			Ab1	wenig häufig gefunden	08
Schabenjagende HeuschreckenwespeArt	Tachysphex	latalvisArt	2001	2023	3	3	4	4	max. Ab3	wenig häufig gefunden	08
HeuschreckenwespeArt	Tachysphex	pompiliformisArt	2003	2023	1	2	1	3	max. Ab4	mässig häufig gefunden	4
HeuschreckenwespeArt	Tachysphex	unicolorArt	2010	2010		1			1 von 2 Fundorten in der	selten gefunden	08
GrabwespenArt	Psen neu: Mimumesa	atratinusArt	2022	2023				2	Ab1	selten gefunden	16*
GrabwespenArt	Psen neu: Mimesa	lutariaArt	2014	2022			1	1	einziger Fund in der Region	in der NW-CH erst 2 Mal am selben Ort gefunden	64
GrabwespenArt	DiodontusG	minutusArt	2013	2023			2	7	die einzigen Funde in der	in der NW-CH erst 6 Mal selber und 1 Mal von I. Salzmann gefunden	16
SilbermundwespeArt (Grabwespe)	Crabro	peltariusArt	2022	2022				1	Ab1	in der NW-CH erst 1 Mal an diesem Ort gefunden	64

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
GrabwespenArt	Crossocerus neu: Hoplocrabro	quadrimaculatusArt	2013	2022			4	1	max. Ab2	in der NW-CH mehrmals an nur 2 Orten gefunden	32
GrabwespenArt	Crossocerus (s.str.)	pusillusArt alt: varius	2013	2013			1		Ab1	selten gefunden , in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	16
GrabwespenArt	Crossocerus (s.str.)	ovalisArt	2014	2022			2	1	max. Ab2	wenig häufig gefunden	08
GrabwespenArt	Crossocerus (s.str.)	exiguusArt	2014	2014			1		Ab1 einziger Fund in der Region	in der NW-CH erst 1 Mal gefunden	64
GrabwespenArt	Lindenius	pygmaeusArt armatusUnterart	2013	2023			3	5	max. Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16
Weissfleckige FliegenspiesswespeQrt	Oxybelus	uniglumisArt	2014	2023			3		max. Ab2	wenig häufig gefunden	08
FliegenspiesswespeArt (Grabwespe)	Oxybelus	bipunctatusArt	2002	2023	2	1	8	12	max. Ab5	mässig häufig gefunden	4
FliegenspiesswespeArt (Grabwespe)	Oxybelus	trispinosusArt	2010	2023		2	3	2	max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Gewöhnliche MaskenbieneArt	Hylaeus	communisArt	2001	2013	1		1		max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 26	2
Verkannte MaskenbieneArt	Hylaeus	confususArt	2003	2003	1				Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2
Kurzfühler MaskenbieneArt	Hylaeus	brevicornisArt	2010	2010		1			Ab1	wenig häufig gefunden	08
Gredlers MaskenbieneArt	Hylaeus	gredleriArt	2010	2014		1	1		max. Ab2	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
Rainfarn SeidenbieneArt	Colletes	similisArt	2010	2015		2	2		max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Frühlings SeidenbieneArt	Colletes	cuniculariusArt	2013	2023			7	5	max. Ab5	mässig häufig gefunden, in Ausbreitung begriffen	4
Efeu SeidenbieneArt	Colletes	hederaeArt	2013	2023	&		6	6	max. Ab5	die erst 1993 neu beschriebene Art ist in der Schweiz erst seit wenigen Jahren	4
Rotbeinige FurchenbieneArt	Halictus	rubicundusArt	2011	2019		1	4		max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	2
Gelbbindige FurchenbieneArt	Halictus	scabiosaeArt	2001	2023	4		7	6	max. Ab3	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	1
Dickkopf FurchenbieneArt	Halictus	maculatusArt	2014	2014			1		Ab1	selten gefunden	16
Gewöhnliche FurchenbieneArt	Halictus	simplexArt	2009	2023		3	1	5	max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Langobarden FurchenbieneArt	Halictus	langobardicusArt	2014 2014				3		max. Ab1	mässig häufig gefunden, war bis vor wenigen Jahren noch selten	2
Dichtpunktierte GoldfurchenbieneArt	Halictus	subauratusArt	2010 2023			2	3	14	max. Ab3	in der NW-CH wenig häufig und nur an wenigen Orten gefunden	08*
Gewöhnliche GoldfurchenbieneArt	Halictus	tumulorumArt	2003 2023	1			3	7	max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Schmalbiene nicht bestimmt	Lasioglossum	non det.	2014 2014				2		max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Weissbinden SchmalbieneArt	Lasioglossum	leucozoniumArt	2001 2023	3	2		3	5	max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Breitbindige SchmalbieneArt	Lasioglossum	zonulumArt	2003 2023	1			1	3	max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 5	2
Schwarzbeinige SchmalbieneArt	Lasioglossum	nigripesArt	2001 2020	1			4		max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
Gewöhnliche SchmalbieneArt	Lasioglossum	calceatumArt	2001 2023	5	1		9	4	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Feldweg SchmalbieneArt	Lasioglossum	malachurumArt	2001 2023	1	1		6	1	max. Ab5	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 76	2
Breitkopf SchmalbieneArt	Lasioglossum	laticepsArt	2002 2023	1	2		8	2	max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 616	2
Acker SchmalbieneArt	Lasioglossum	pauxillumArt	2001 2014	2	2		2		max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 49	-
Braunfühler SchmalbieneArt	Lasioglossum	fulvicorneArt	2001 2010	1	2				max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 45	2
Geriefte Steilwand SchmalbieneArt	Lasioglossum	limbellumArt	2001 2023	1			8	8	max. Ab3	in der NW-CH mehrmals, aber nur an 3 Orten gefunden	08
Dickkopf SchmalbieneArt	Lasioglossum	glabriusculumArt	2022 2022					1	Ab1	häufig gefunden	2
Polierte SchmalbieneArt	Lasioglossum	politumArt	2001 2023	2	5		13	15	max. Ab3	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Punktierte SchmalbieneArt	Lasioglossum	punctatissimumArt	2011 2014			1	1		max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
Zottige SchmalbieneArt	Lasioglossum	villosulumArt	2001 2023	3	1		5	4	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Sechsstreifige SchmalbieneArt	Lasioglossum	sexstrigatumArt	2001 2023	3	4		7	3	max. Ab3	wenig häufig gefunden	08
Winzige SchmalbieneArt	Lasioglossum	minutissimumArt	2022 2022					1	Ab1	in der NW-CH erst 3 Mal gefunden	16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Leuchtende SchmalbieneArt	Lasioglossum lucidulumArt	2012	2014		1	1		2 Funde an nur 3 Orten in der Reg.	in der NW-CH selten gefunden	16
Mattglänzende SchmalbieneArt	Lasioglossum semilucensArt	2014	2022			3	2	max. Ab4	in der NW-CH selten gefunden , den Fallen der WSL nur 1 Individuum	08
Dunkelgrüne SchmalbieneArt	Lasioglossum morioArt	2010	2023		3	11	8	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 93	1
Dickkopf BlutbieneArt	Sphecodes monilicornisArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Netz BlutbieneArt	Sphecodes reticulatusArt	2013	2013			1		Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16
Leistenkopf BlutbieneArt	Sphecodes scabricollisArt	2011	2022		1		1	max. Ab1	mässig häufig gefunden, hat in den letzten jahren zugenommen	4
Riesen BlutbieneArt	Sphecodes albilabrisArt	2013	2023			7	2	max. Ab3	wenig häufig gefunden, aber in letzter Zeit häufiger geworden	08*
Buckel BlutbieneArt	Sphecodes gibbusArt	2001	2023	2		4	3	max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Schwarzhaarige BlutbieneArt	Sphecodes ruficrusArt	2013	2023			1	1	Ab1	wenig häufig gefunden	08
Gewöhnliche BlutbieneArt	Sphecodes ephippiusArt	2002	2023	1	2	5	4	max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Schwarze BlutbieneArt	Sphecodes nigerArt	2009	2009		1			Ab1	mässig häufig gefunden	4
Punktierte BlutbieneArt	Sphecodes puncticepsArt	2002	2023	2		4	4	max. Ab2	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 5	4
Längliche BlutbieneArt	Sphecodes longulusArt	2001	2023	2		5	2	max. Ab2	wenig häufig gefunden	08
Rostfarbene BlutbieneArt	Sphecodes ferruginatusArt	2011	2014		1	2		max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Dichtpunktierte BlutbieneArt	Sphecodes crassusArt	2003	2022	1	1	2		max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	4
Gewöhnliche Zwerg BlutbieneArt	Sphecodes miniatusArt	2022	2022				1	Ab1	in der NW-CH erst 2 Mal gefunden	32
Kroatische BlutbieneArt	Sphecodes croacicusArt	2022	2022				1	Ab1	in der NW-CH erst 1 Mal gefunden	64
Glanzlose ZergsandbieneArt	Andrena subopacaArt	2011	2011		1			Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	2
Blaue Ehrenpreis SandbieneArt	Andrena viridescensArt	2020	2022			1	1	Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Grauschwarze Weiden SandbieneArt	Andrena vagaArt	2011	2022		1	6	4	max. Ab5	in der NW-CH selten gefunden	16
Zweifarbige SandbieneArt	Andrena bicolorArt	2014	2014			1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	2
Gewöhnliche Dörnchen SandbieneArt	Andrena humilisArt	2001	2014	1		2		max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Bärtige SandbieneArt	Andrena barbilabrisArt	2011	2023		1	1	1	max. Ab1	in der NW-CH mehrmals, aber nur an 2 Orten gefunden, auf Sandböden	32
Rotbauch SandbieneArt	Andrena ventralisArt	2014	2023			3	3	max. Ab2	in der NW-CH selten gefunden	16
Witwenblumen SandbieneArt	Andrena hattorfianaArt	2014	2022			1	1	max. Ab1	wenig häufig gefunden, an Wittwenblumen	08
Ovale Klee SandbieneArt	Andrena ovatulaArt	2003	2023	1	1	3	4	max. Ab5	häufig gefunden	2
Gewöhnliche Binden SandbieneArt	Andrena flavipesArt	2014	2014			1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2
Rotbeinige Körbchen SandbieneArt	Andrena dorsataArt	2011	2011		1			Ab1	wenig häufig gefunden	08
Garten WollbieneArt	Anthidium manicatumArt	2003	2023	1			2	max. Ab1	häufig gefunden	2
Felsspalten WollbieneArt	Anthidium oblongatumArt	2014	2023			1	2	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Zwerg HarzbieneArt	Anthidium strigatumArt	2003	2003	1				Ab1	mässig häufig gefunden	4
Punktierte DusterbieneArt	Stelis punctulatissimaArt	2001	2001	1				Ab1	wenig häufig gefunden	08
Hahnenfuss ScherenbieneArt	Chelostoma florisomneArt	2022	2022				1	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	2
Glockenblumen ScherenbieneArt	Chelostoma rapunculiArt alt: fuliginosum	2003	2003	1				Ab1	häufig gefunden	2
Rote MauerbieneArt	Osmia rufaArt	2014	2014			1		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen	2
Schwarzspornige StängelbieneArt	Osmia leucomelanaArt	2001	2014	1		1		max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
Gewöhnliche NatterkopfbieneArt	Osmia aduncaArt	2022	2023				4	Ab2	mässig häufig gefunden	4
Platterbsen MörtelbieneArt	Megachile ericetorumArt	2003	2003	1				Ab2	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Garten BlattschneiderbieneArt	Megachile	willoughbiellaArt	2014 2014			1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Mandibel KegelbieneArt	Coelioxys	mandibularisArt	2022 2022				1	Ab1	in der NW-CH erst 1 Mal gefunden	64
Jun LanghornbieneArt	Eucera	longicornisArt	2003 2003	1				Ab1	häufig gefunden	2
Feld WespenbieneArt	Nomada	goodenianaArt neu: succincta	2014 2014			1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2
Gelbe WespenbieneArt	Nomada	flavaArt	2014 2014			1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Rothaarige WespenbieneArt	Nomada	lathburianaArt	2013 2023			5	4	max. Ab2	wenig häufig gefunden, in letzter Zeit häufiger geworden	4
Weissfleckige WespenbieneArt	Nomada	alboguttataArt	2014 2023			2	5	max. Ab4	in der NW-CH selten gefunden	16
Gewöhnliche FilzbieneArt	Epeolus	variegatusArt	2015 2015			1		Ab1	in der NW-CH erst 2 Mal gefunden	32
Heide FilzbieneArt	Epeolus	crucigerArt	2013 2023			4	5	Ab3 1. Fund in der CH nördl. der Alpen	in der NW-CH 2 Mal gefunden	16
Dunkle ErdhummelArt	Bombus	terrestrisArt	2001 2023	2	3	6	2	max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Helle ErdhummelArt	Bombus	lucorumArt	2001 2011	2	2			max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1
WiesenhummelArt	Bombus	pratorumArt	2013 2014			2		max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1
SteinhummelArt	Bombus	lapidariusArt	2001 2023	1	2	3	4	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
AckerhummelArt	Bombus	pascuorumArt	2001 2023	5	5	14	13	max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche HummelArt	Bombus	humilisArt	2001 2023	3	1	5	3	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
GartenhummelArt	Bombus	hortorumArt	2013 2022			2	1	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Feld KuckuckshummelArt (der Ackerhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	campestrisArt	2001 2015	1		1		max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1
Wald KuckuckshummelArt (der Wiesenhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	sylvestrisArt	2014 2014			1		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1
HonigbieneArt	ApisG	melliferaArt	2001 2023	5	10	11	15	max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3 BP4				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
KÖCHERFLIEGEN	TRICHOPTERA ORDNUNG		2001								
KöcherfliegenArt	Hydropsyche	incognitaArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 35 Quadrate	4
SCHMETTERLINGE	LEPIDOPTERA ORDNUNG		2001								
LangfühlermottenArt	NemophoraG	metallicaArt	2014	2023			1	3	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
SackträgermottenArt	Coleophora	ornatipenellaArt	2003	2003	1				Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen GlasflüglerArt	BembeciaG	ichneumoniformisArt	2012	2023		1		1	Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 10, 5	4
Blutströpfchen	ZygaenaeUf Unterfamilie		2013	3020			1		Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliches Sechspunkt widderchenArt, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulaeArt	2001	2023	1	3	6	3	max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
WicklerArt	Cnephasia	stephensianaArt	2014	2014			1		Ab1	selten gefunden	08
WicklerArt	Celypha	strianaArt	2022	2022				1	Ab1	häufig gefunden	2
WicklerArt	Celypha	lacunanaArt	2014	2014			1		Ab1	sehr häufig gefunden	1
WicklerArt	Celypha	rivulanaArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden, hat in den letzten jahren zugenommen	4
WicklerArt	Epiblema	sticticanaArt	2001	2014	1		1		max. Ab1	mässig häufig gefunden, Raupen an Huflattich	4
WicklerArt	Epiblema	graphanaArt	2002	2002	1				Ab1, einer von 3 Funden in der	selten gefunden	16
FedermottenArt	Oxyptilus	pilosellaeArt	2017	2017			1		Ab1	häufig gefunden	2
Skabiosen FedermottenArt	Stenoptilia	bipunctidactylaArt	2003	2015	1		1		max. Ab1	sehr häufig gefunden	2
FedermottenArt	MarasmarchaG	lunaedactylaArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Winden FedermottenArt , SchlehengeistchenArt	PterophorusG	pentadactylaArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
ZünslerArt	SynapheG	punctalisArt	2010	2011		3			max. Ab1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
FruchtzünslerArt	OncoceraG	semirubellaArt	2001 2023	2	2	5	3		max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
RispengraszünslerArt	ChrysoteuchiaG	culmellaArt	2014 2014			1			Ab1	sehr häufig gefunden	1
GraszünslerArt	CrambusG	pascuellaArt	2003 2023	1	1	1	1		max. Ab2	mässig häufig gefunden	2
GraszünslerArt	Crambus	lathoniellusArt	2002 2014	1		2			max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Weisser GraszünslerArt	Crambus	perlellaArt	2022 2022					1	Ab1	sehr häufig gefunden	1
GraszünslerArt	AgriphilaG	tristella	2014 2023			3	1		max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
GraszünslerArt	Agriphila	inquinatellaArt	2001 2023	1	2	3	4		max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
GraszünslerArt	Agriphila	straminellaArt	2001 2015	1	1	1			max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
GraszünslerArt	Agriphila	geniculeaArt	2009 2009		1				Ab1	häufig gefunden	2
GraszünslerArt	Platytes	alpinellaArt	2010 2012		2				max. Ab2	in der NW-CH selten gefunden	16
SeerosenzünslerArt	ElophilaG	nymphaeataArt	2009 2022		4	4			max. Ab2	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, hier oft in grosser Zahl	4
GoldzünslerArt	Pyrausta	aurataArt	2022 2022					1	Ab1	häufig gefunden	2
Purpurroter ZünslerArt, PurpurzünslerArt	Pyrausta	purpuralisArt	2001 2023	3	4	6	2		max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner ZünslerArt	Pyrausta	despicataArt	2012 2023		1	3	7		max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
ZünslerArt	MicrostegaG Gattung neu:	pandalisArt	2015 2023			1	3		max. Ab1	sehr häufig gefunden	2
ZünslerArt	Udea	ferrugalisArt	2022 2022					1	Ab1	mässig häufig gefunden, besonders im Herbst	4
WanderzünslerArt	NomophilaG	noctuellaArt	2001 2022	1	2	1	4		max. Ab2	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	2
TaubenschwänzchenArt	MacroglossumG	stellatarumArt	2003 2023	1	1	2	5		max. Ab2	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1
Braunkolbiger Braun DickkopffalterArt	ThymelicusG	sylvestrisArt	2001 2022	2	1			1	max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	Anzahl BP3	Anzahl BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Schwarzkolbiger Braun DickkopffalterArt	Thymelicus	lineolaArt	2001 2022	2			1	max. Ab2	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 164	4
Mattfleckiger KommafalterArt	OchlodesG	venataArt	2014 2023			2	2	max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Dunkler DickkopffalterArt	ErynnisG	tagesArt	2001 2023	1	2	3	6	max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	2
Malven DickkopffalterArt , EibischfalterArt	CarcharodusG	alceaeArt	2011 2022		1	1	1	max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 19	4
Kleiner Nördlicher WürfelfalterArt	Pyrgus	malvaeArt	2001 2023	1		1	1	max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 338	2
Zweibrütiger WürfelfalterArt	Pyrgus	armoricanusArt	2022 2022				1	Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 12, 104	2
SchwalbenschwanzArt	PapilioG	machaonArt	2001 2022	4	2	3	2	max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	2
Weissling nicht bestimmt	Pieridae Familie	non det.	2001 2023	5	10	13	18	max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	1
TintenfleckweisslingArtengruppe	LeptideaG	sinapis-Komplex	2001 2023	1	6	7	4	max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser KohlweisslingArt	PierisG	brassicaeArt	2014 2022			1	1	max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1
Kleiner KohlweisslingArt	Pieris	rapaeArt	2001 2023	3	5	6	5	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
GrünaderweisslingArt, RapsweisslingArt	Pieris	napiArt	2003 2023	1	3	10	8	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
AurorafalterArt	AnthocarisG	cardaminesArt	2001 2023	1	1	3	4	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Gelblinge, Heufalter	ColiasG Gattung		2015 2020			1		Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
PostillonArt, WandergelblingArt, AchterArt	Colias	croceaArt	2001 2023	1	1	5	6	max. Ab3	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	2
Gelbling Komplex, HeufalterArtengruppe	Colias	hyale-Komplex	2012 2022		1	1	3	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Hufeisenklee GelblingArt Hufeisenklee HeufalterArt	Colias	alfacariensisArt	2009 2022		1	1	6	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1
ZitronenfalterArt	GonepteryxG	rhamniArt	2011 2023		1	5	8	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
TagpfauenaugeArt	InachisG	ioArt	2003 2023	1	4	3	6	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
AdmiralArt	VanessaG	atalantaArt	2012	2022		1	2	2	max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	2
DistelfalterArt	Vanessa	carduiArt	2001	2022	2	1		1	max. Ab1	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	2
Kleiner FuchsArt	AglaisG	urticaeArt	2003	2023	1	3	6	4	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-FalterArt	PolygoniaG	c-albumArt	2011	2022		1	3	1	max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	2
LandkärtchenArt	AraschniaG	levanaArt	2001	2014	1		1		max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2
KaisermantelArt	Argynnis	paphiaArt	2021	2021			1		Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531	1
Kleiner PerlmutterfalterArt	IssoriaG	lathoniaArt	2003	2023	1		1	1	max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 89	2
Perlmutterfalter	BoloriaG	Gattung	2022	2022				1	Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	2
Weisser WaldportierArt	BrintesiaG	circeArt	2022	2022				1	Ab1	häufig gefunden, aber erst (wieder) seit diesem Jahrhundert, R.Bas.: 22, 341	2
Grosses OchsenaugeArt , KuhaugeArt	ManiolaG	jurtinaArt	2009	2023		4	4	8	max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner WaldvogelArt	AphantopusG	hyperantusArt	2001	2023	2	2	1	1	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines WiesenvögelchenArt	Coenonympha	pamphilusArt	2001	2023	2	5	5	8	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
WaldbrettspielArt , LaubfalterArt	ParargeG	aegeriaArt	2015	2017			2		max. Ab1	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1
MauerfuchsArt	LasiommataG	megeraArt	2010	2023		4	7	4	max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Kleiner FeuerfalterArt	Lycaena	phlaeasArt	2012	2022		1	4	2	max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 88	2
Brauner FeuerfalterArt	Lycaena	tityrusArt	2013	2013			1		Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
ZwergbläulingArt	CupidoG	minimusArt	2011	2022		1	3	1	max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 332	2
Kurzschwänziger BläulingArt	Cupido alt: Cyaniris	argiadesArt	2009	2023	&	3	4	5	max. Ab3	häufig gefunden, erst vor wenigen Jahren wieder in der Schweiz nördlich der Alpen,	2
Südlicher Kurzschwänziger BläulingArt	Cupido alt: Cyaniris	alcetasArt	2014	2022	&	&	3	5	max. Ab2	selten gefunden, erst seit kurzem in der Schweiz nördlich der Alpen	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kleiner SonnenröschenbläulingArt	AriciaG	agestisArt	2017	2023				3	8	max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 27, 250	2
Violetter WaldbläulingArt	CyanirisG	semiargusArt	2001	2022	1	1	3		1	max. Ab1	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Silbergrüner BläulingArt	Polyommatus alt: Lysandra	coridonArt	2010	2022		2				max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416	2
Himmelblauer BläulingArt	Polyommatus alt: Lysandra	bellargusArt	2010	2015		2	5		1	max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1
HauhechelbläulingArt	Polyommatus	icarusArt	2001	2023	2	8	10		12	max. Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Marmorierter KleinspannerArt	Scopula	immorataArt	2012	2023		1	3		1	max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1
Eckflügel- KleinspannerArt	Scopula	nigropunctataArt	2010	2010		1				Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 8	4
Schmuck- KleinspannerArt	Scopula	ornataArt	2001	2023	1	2	7		10	max. Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 111	2
Vierpunkt-KleinspannerArt	Scopula	immutataArt	2009	2014		1	1			max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 17, 18	2
AmpferspannerArt	TimandraG alt: Calothysanis	comaeArt alt: griseata	2020	2022			1		1	Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 7	2
Spanner-Art	Epirrhoe	alternataArt	2013	2022			1		1	Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
LöwenzahnspannerArt	CamptogrammaG	bilineataArt	2002	2002	1					Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
GrauspannerArt	AploceraG	plagiataArt	2012	2012		1				Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 45	4
Klee-GitterspannerArt	ChiasmiaG alt: Semiothisa	clathrataArt	2009	2023		1	2		2	max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1
HeidespannerArt	EmaturgaG	atomariaArt	2001	2023	2		6		10	max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1
Braunstirn-WeisspannerArt	Cabera	exanthemataArt	2012	2012		1				Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 23	2
Einstreifiger TrockenranspannerArt	AspitatesG alt: Aspilates	gilvariaArt	2022	2022					1	Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 144	4
Flachflügel-Flechtenbär Art	Eilema	deplanaArt alt: depressa	2014	2014			1			Ab1	am Tag 5 schlafende Falter und 3 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 20, 105	08
RotrandbärArt	DiacrisiaG	sannioArt	2015	2015			1			Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 45	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
AmpfereuleArt	Acronicta rumicisArt	2002	2002	1				Ab1	am Tag mässig viele Raupen gefunden, aber erst 1 schlafenden Falter gefangen,	4
Braune TageuleArt	EuclidiaG glyphicaArt	2010	2022		1	4	1	max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
SeideneulchenArt	RivulaG sericealisArt	2001	2001	1				Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 104	2
EulenfalterArt	MacdunnoughiaG confusaArt	2013	2013			1		Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 16	2
GammaeuleArt	AutographaG gammaArt	2012	2023		1	3	2	max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
EulenfalterArt	EublemmaG ostrinaArt	2009	2009		1			max. Ab1 1 von 3 Funden in der R.	in der NW-CH am Tag 3 Falter gefangen, R.Bas.: 0, 0	16
Weissfleckige SchilfgraseuleArt	Mythimna albipunctaArt	2015	2015			1		Ab1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 81	4
ZWEIFLÜGER	DIPTERA ORDNUNG	2001	2021							
KohlschnakeArt	TipulaUg Tipula s.str.	2020	2020			1		Ab1	häufig gefunden	2
Gemeine WiesenschnakeArt	TipulaUg Tipula s.str.	2013	2013			1	1	max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
FrühlingsschnakeArt	TipulaUg Lunatipula	2014	2023			1	2	max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Krähenschnaken	NephrotomaG Gattung	2001	2014	1				Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
KrähenschnakenArt	Nephrotoma aculeataArt	2021	2021			1		Ab1	in der NW-CH erst 1 Mal gefunden	64
Gefleckte KrähenschnakeArt	Nephrotoma appendiculataArt	2014	2014			1		Ab1	häufig gefunden	2*
KrähenschnakenArt	Nephrotoma scurraArt	2001	2014	1	1	1		max. Ab2	wenig häufig gefunden, vor allem in Kiesgruben	08*
Wintermücken	TrichoceraG Gattung	2014	2014			1		Ab3	Gattung im Winter sehr häufig gefunden	1
StelzmückenArt	EpiphragmaG ocellareArt	2002	2002	1				Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kriebelmücken	SimuliidaeF Familie	2011	2014		2	1		max. Ab2	sehr häufig gefunden	2
JohannismückeArt	Bibio johannisArt	2013	2014			3		max. Ab5	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	Anz. BP3	Ereignisse BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
MärzmückenArt	Bibio marciArt	2014	2014			1		Ab1	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
HaarmückenArt	Bibio varipesArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Langhorn WaffenfliegeArt	Stratiomys neu: Hirtea longicornisArt	2001	2014	1		1		max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
RegenbremseArt	HaematopotaG alt: Chrysozona pluvialisArt	2001	2023	3	1	2	1	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
BremsenArt	Heptatoma pellucensArt	2011	2011		1			Ab1 1 von 2 Funden in der Reg.	in der NW-CH ein der NW-CH erst 2 Mal gefunden	32
PferdebremseArt	Tabanus bovinusArt	2003	2003	1			1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine ViehbremseArt	Tabanus bromiusArt	2001	2022	2				max. Ab1	häufig gefunden	2
Grosser WollschweberArt	Bombylius majorArt	2014	2023			3	4	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Gefleckter WollschweberArt	Bombylius discolorArt	2013	2014			3		max. Ab1	häufig gefunden	2
WollschweberArt	Bombylius cinerascensArt	2014	2022			1	1	max. Ab2	häufig gefunden	2
TrauerschweberArt	Anthrax variusArt	2003	2022	1	1	3	1	max. Ab2	selten gefunden	16
TrauersschweberArt	Villa cingulataArt	2015	2015			1		Ab1	häufig gefunden	2
TanzfliegenArt	OcydromiaG glabriculaArt	2014	2014			1		Ab1	in der NW-CH erst 1 Mal gefunden, det. M. Chvala 2015	64
TanzfliegenArt	Empis levisArt	2014	2014			1		Ab4	wenig häufig gefunden, weil klein und unscheinbar	08*
TanzfliegenArt	Empis tesselataArt	2014	2014			1		Ab1	sehr häufig gefunden	1
TanzfliegenArt	Empis lividaArt	2013	2014			1		Ab1	sehr häufig gefunden	2
Tanzfliegen	RhamphomyiaG Gattung	2022	2022				1	Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Breitband FeldschwebfliegeArt	Eupeodes latifasciatusArt	2022	2022				1	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Kurze oder Bogenader FeldschwebfliegeArt	Eupeodes lapponicusArt	2013	2013			1		Ab1	häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
FrühlingsschwebfliegeArt	Melangyna cingulataArt	2022	2022				1	Ab1	in der NW-CH selten gefunden	16
Gemeine Winter oder ParkschwebfliegeArt	EpisyrphusG balteatusArt	2001	2022	2	1	4	3	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1
Frühe GrossstirnschwebfliegeArt, Gelbe DickkopfschwebfliegeArt	Scaeva seleniticaArt	2001	2001	1				Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Gemeiner KugelträgerArt , Gemeine StiftschwebfliegeArt	Sphaerophoria scriptaArt	2001	2023	1	3	5	4	max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Kleine GartenschwebfliegeArt	Syrphus vitripennisArt	2019	2019			1		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Kahle oder Südliche WespenschwebfliegeArt	Chrysotoxum intermediumArt	2001	2022	3		1	1	max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Gemeine SchwarzkopfschwebfliegeArt oder	Melanostoma mellinumArt	2014	2023			1	1	Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1
Graue oder Schwarze BreitfussschwebfliegeArt	Platycheirus albimanusArt	2022	2022				1	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Gemeine BreitfussschwebfliegeArt	Platycheirus clypeatusArt	2013	2013			1		Ab1	häufig gefunden	2
Europäische BreitfussschwebfliegeArt	Platycheirus europaeusArt	2021	2021			1		Ab1	häufig gefunden	2
HeideschwebfliegeArt	Paragus haemorrhousArt	2009	2011		2			max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine ZwergschwebfliegeArt	Pipizella viduataArt	2012	2012		1			Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Weissfuss ErzschwebfliegeArt Antigua-Gruppe	Cheilosia albitarsisArt	2013	2013			1		Ab1	sehr häufig gefunden	1
Trüffel ErzschwebfliegeArt Pagana-Gruppe	Cheilosia rufipesArt alt: soror	2001	2001	1				Ab1	sehr häufig gefunden	2
Frühe ErzschwebfliegeArt Bergenstammi-Gruppe	Cheilosia praecoxArt	2014	2014			1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine SchnauzenschwebfliegeArt , Feld	Rhingia campestrisArt	2013	2022			1	2	max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Gemeine WaldschwebfliegeArt Gemeine HummelschwebfliegeArt	Volucella pellucensArt	2009	2009		1			Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Gemeine Smaragd SchwebfliegeArt oder Gelbbauch SchwebfliegeArt	ChrysogasterG solstitialisArt	2010	2012		3			max. Ab1	häufig gefunden	2
Glänzende FaulschlammschwebfliegeArt oder	Eristalinus aeneusArt	2001	2001	1				Ab1	mässig häufig gefunden	4*

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kleine BienenschwebfliegeArt	Eristalis arbustorumArt	2001	2001	1					Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
KeilfleckschwebfliegeArt	Eristalis interruptaArt	2013	2013				1		Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Distel-BienenenschwebfliegeArt	Eristalis jugorumArt	2013	2020				2		max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Grosse “Mistbiene”, WandererArt	Eristalis tenaxArt	2001	2023	3	3	4		9	max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Grosse SumpfschwebfliegeArt , Grosse SonnenschwebfliegeArt	Helophilus parallelusArt alt: trivittata	2009	2012			2			max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1
Gemeine SumpfschwebfliegeArt , Gemeine SonnenschwebfliegeArt	Helophilus pendulusArt	2001	2013	1			1		max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2
TotenkopfschwebfliegeArt	MyathropaG floreaArt	2001	2023	4	2	4		4	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Kleine “Mistbiene”, Gemeine KeulenwchwebliegeArt oder	SyrittaG pipiensArt	2001	2022	2	3	1		1	max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
SchwebfliegenArt	TropidiaG scitaArt	2013	2013				1		Ab1	in der NW-CH erst 2 Mal gefunden	32
Gemeine LangbauchschwebfliegeArt	Xylota segnisArt	2001	2014	2			1		max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	2
DickkopffliegenArt	Thecophora atraArt	2010	2023			2		1	max. Ab1	unsicher bestimmt	2
DickkopffliegenArt	Thecophora pusillaArt	2001	2013	1	2	1			max. Ab1	mässig häufig gefunden	2
DickkopffliegenArt	Thecophora distinctaArt	2019	2023				1	1	Ab1	häufig gefunden	2
DickkopffliegenArt	SicusG ferrugineusArt	2011	2023			1	2	1	max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Augenfliegen	PipunculusG Gattung	2003	2003	1					Ab1	Gattung selten registriert	08
NetzfliegenArt	Limnia unguicornisArt	2013	2023				1	1	Ab1	häufig gefunden	2
Salzfliegen oder Sumpffliegen	EphydridaeF Familie	2022	2022					1	Ab5	Familie im Chilpen-Reservat häufig gefunden, aber anderso kaum registriert	4
Salzfliegen oder Sumpffliegen	ParydraG Gattung	2013	2013				1		Ab1	Gattung erst 1 Mal gefunden, aber später kaum mehr registriert	64
TaufliegenArt	Phortica semivirgoArt	2022	2022					1	Ab1	erst 1 Mal gefunden, aber später kaum mehr registriert	16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3 BP4				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
KotfliegenArt	Scatophaga	stercorariaArt	2013	2013			1		Ab2	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	2
Schmeissfliegen	PolleniaG	Gattung	2021	2021			1	1	max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
SchmeissfliegenArt	StomorhinaG	lunataArt	2017	2023			1	1	Ab1	wenig häufig gefunden, weil zu wenig beachtet, aber vermutlich häufig	4
Fleischfliegen	SarcophagaG	Gattung	2001	2015	6	4	1**		max. Ab4, ab 2012 nicht mehr registriert	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Fleischfliegen	MetopiaG	Gattung	2022	2023				5	max. Ab2	Gattung selten gefunden, aber später nicht mehr registriert	16
FleischfliegenArt	Metopia	italianaArt	2002	2002	1				Ab1, wegen mangelnder	erst 1 Mal gefunden, aber später nicht mehr registriert	16
RaupenfliegenArt	Tachina alt: Echinomyia	feraArt	2012	2023		1	2	3	Max. Ab2	häufig gefunden, aber oft nicht registriert	2
RaupenfliegenArt	Tachina alt: Echinomyia	magnicornisArt	2022	2022				1	Ab1	häufig gefunden	2
RaupenfliegenArt	Nowickia	feroxArt	2020	2023			1	1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
RaupenfliegenArt	EriothrixG	rufomaculataArt	2022	2023				2	Ab1	häufig gefunden	2
Raupenfliegen	GymnosomaG	Gattung	2012	2002		1			Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	2
RaupenfliegenArt	Gymnosoma	clavatumArt	2021	2023			1	1	Ab1	selten gefunden	4
RaupenfliegenArt	Gymnosoma	rotundatumArt	2014	2021			1		Ab1	bis etwa 2013 nur selten auf die Art bestimmt, sehr häufig	2
RaupenfliegenArt	EctophasiaG	crassipennisArt	2009	2015		3	3		Max. Ab2	häufig gefunden	2
RaupenfliegenArt	Cylindromyia alt: Ocyptera	brassicariaArt	2001	2023	1			1	Ab2	unsicher bestimmt	2
WIRBELTIERE	VERTEBRATA	STAMM	2001	2022				1			
GeburtshelferkröteArt	AlytesG	obstetricansArt	2021	2021			1		Ab2	mässig häufig gefunden	4
ErdkröteArt	BufoG	bufoArt	2011	2022		1	2	1	Adulte max. Ab2 Kaulquappen max.	häufig gefunden	2
KreuzkröteArt	Bufo	calamitaArt	2022	2022				2	max. Ab2	mässig häufig gefunden, vorwiegend in Kiesgruben	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
GrasfroschArt	RanaG	temporariaArt	2013 2022			2	2	Max. Ab2	häufig gefunden	2
SeefroschArt	Rana	ridibundaArt	2013 2013			1		Ab1, unsicher bestimmt	in der NW-CH selten gefunden	2
Kleiner GrünfroschArt	Rana	lessoneArt	2022 2022				1	Ab1	häufig gefunden, aber meist als R. esculenta registriert	32
WasserfroschArt	Rana	esculentaArt	2001 2023	9	5	12	12	Adulte max. Ab4	häufig beobachtet	2
BlindschleicheArt	AnguisG	fragilisArt	2001 2001	2				Max. Ab1	häufig gefunden	2
Eidechse nicht bestimmt	Lacerta cf. Podarcis	non det.	2010 2023		2	6	4	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
MauereidechseArt	PodarcisG	muralisArt	2003 2023	1	2		2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	2
ZauneidechseArt	LacertaG	agilisArt	2001 2023	2	6	6	6	max. Ab3	sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)	2
GraureiherArt	ArdeaG	cinereaArt	2011 2013		1	1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
StockenteArt	Anas	platyrhynchusArt	2001 2022	1		2	1	Max. Ab2	häufig beobachtet	2
Schwarzer MilanArt , SchwarzmilanArt	MilvusG	migransArt	2013 2013			1		Ab1	häufig beobachtet	2
Roter MilanArt, RotmilanArt	Milvus	milvusArt	2001 2023	2	4	9	4	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
TurmfalkeArt	FalcoG	tionnunculusArt	2001 2013	1		1		mehrere Ereignisse registriert	häufig beobachtet	2
BläsralleArt, BlässhuhnArt	FulicaG	atraArt	2001 2001	2				max. Ab2	häufig beobachtet	2
KuckuckArt	CuculusG	canorusArt	2001 2014	1	1	2		Max. Ab1	früher häufig gehört, aber in letzter Zeit selten geworden	2
WiedehopfArt	UpupaG	epopsArt	2001 2022	1			1	max. Ab1	in der NW-CH selten beobachtet	16*
GrünspechtArt	Picus	viridisArt	2011 2023		1	5	6	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
SchwarzspechtArt	DryocopusG	martiusArt	2011 2023		1	3	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	2
KleinspechtArt	Dendrocopos	minorArt	2013 2013			1		Ab1	mässig häufig beobachtet	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen		Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3 BP4				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
RauchschwalbeArt		HirundoG rusticaArt	2010	2010	()	(1)			Ab3, erst seit wenigen Jahren	häufig beobachtet, erst in der dritten Beobachtungsperiod inventarisiert	2
MehlschwalbeArt		DelichonG urbicaArt	2010	2010		1			Ab3	häufig beobachtet	2
GebirgsstelzeArt		Motacilla cinereaArt	2014	2014			1		Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur mässig häufig registriert	4
MisteldrosselArt		Turdus viscivorusArt	2001	2014	2	1	1		max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
TeichrohrsängerArt		Acrocephalus scirpaceusArt	2001	2002	3				Max. Ab1	häufig beobachtet	2
GartengrasmückeArt		Sylvia borinArt	2001	2022	3		1	2	max. Ab1	häufig beobachtet	2
FitisArt		Phylloscopus trochilusArt	2001	2013	2	2	2		max. Ab1	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten	2
GrauschnäpperArt		MuscicapaG striataArt	2021	2021			1		Ab1	mässig häufig beobachtet	4
SchwanzmeiseArt		AegitalusG caudatusArt	2002	2014	1	2	3		max. Ab2	häufig beobachtet	2
GartenbaumläuferArt		Certhia brachydactylaArt	2011	2013		1	1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
ElsterArt		PicaG picaArt	2014	2023	()	**	1	1	Ab1	sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert	2
KolkrabeArt		Corvus coraxArt	2009	2014		1	2		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
StieglitzArt, DistelfinkArt		Carduelis carduelisArt	2013	2014			3		Max. Ab2	häufig beobachtet	1
GoldammerArt		EmberizaG citrinellaArt	2001	2023	5	4	5	8	max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
BiberArt		CastorG fiberArt	2022	2022				1	Ab2	Spuren wenig häufig beobachtet	4
DachsArt		MelesG melesArt	2011	2023		1	7	7	Max. Ab2 , (mehrere Baueingänge ev. aber	Anhand der Spuren häufig festgestellt, aber Baue oft auch vom Fuchs bewohnt	2
WildschweinArt		SusG scrovaArt	2001	2001	1				Ab1, (Trittsiegel im Sand)	anhand der Spuren zunehmend häufiger festgestellt	2
RehArt		CapreolusG capreolusArt	2001	2023	3	3	3	4	max. Ab2 (nur Fährten)	häufig beobachtet und auch anhand der Spuren festgestellt	2
Pflanzen Auswahl			2001							Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrasen sind registriert	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheitswerte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Becherflechten-Art	Cladonia	pyxidataArt	2013					lokal h (1 leg. et det. G.A., conf. Ch. Keller		
Becherflechten-Art	Cladonia	cyanipesArt	2013					lokal mh vid. E. Grütter, det. Chr.		
Blualgen-Art	NostocG	communeArt	2001 2002					sehr häufig (massenhaft)	mässig viele Fundorte	
Bunter SchachtelhalmArt	Equisetum	variegatumArt	2001 2010					lokal häufig	einziger Fundort in der Region	
Überwinternder SchachtelhalmArt	Equisetum	hyemaleArt	2001 2011					lokal sehr häufig (massenhaft)	wenig Fundorte, aber an den Fundstellen oft massenhaft	
Sumpf-SchachtelhalmArt	Equisetum	palustreArt	2009					lokal häufig	wenig Fundorte	
Überwinternder SchachtelhalmArt	Equisetum	hyemaleArt	2011					lokal häufig	wenig Fundorte, aber an den Fundstellen oft massenhaft	
KräuselmoosArt	TortellaG	inclinataArt	2011					häufig	wenig häufig registriert, aber vermutlich in allen Kiesgruben häufig bis sehr häufig	
MohnArt	PapaverG		2013					1 am Grubenrand	(sehr zart, 4 schmale Kronblätter, Narbe 4-zählig, 9 Staubblätter) 1 Grubenrand	
Milder MauerpfefferArt	Sedum	sexangulareArt	2001 2014					lokal häufig am Rand	viele Fundorte	
Kleiner WiesenknopfArt	Sanguisorba	minorArt	2001					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Echter WiesenknopfArt	Sanguisorba	officinalisArt	2015					1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
ErdbeerFingerkrautArt	Potentilla	sterilisArt	2011					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Frühlings-FingerkrautArt	Potentilla	vernaArt alt: neumanniana	2014					lokal sehr häufig auf Damm	viele Fundorte	
WaldErdbeereArt	Fragaria	vescaArt	2001 2011					lokal häufig	sehr viele Fundorte	
GartenSteinmispelArt	Cotoneaster	horizontalisArt	2009 2014					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, unsicher bestimmt	
FärberGinsterArt	Genista	tinctoriaArt	2014					lokal sehr häufig am Rand	mässig viele Fundorte	
Kriechende HauhechelArt	Ononis	repensArt	2003 2014					lokal häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher WundkleeUnterart	AnthyllisG	vulnerariaArt vulnerariaUnterart	2001					lokal häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Bunte KronwickeArt	CoronillaG	variaArt	2013	2014				lokal häufig auf Damm	viele Fundorte	
Schopfiger HufeisenkleeArt	HippocrepisG	comosaArt	2014	2014				lokal sehr häufig am Rand	viele Fundorte	
Saat-EspарsetteArt	Onobrychis	viciifoliaArt	2014					lokal mässig häufig am Rand	viele Fundorte	
Schmalblättrige Wicke Unterart	Vicia	sativaArt nigra incl.	2002					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Blut-WeiderichArt	LythrumG	salicariaArt	2009					am Rand lokal häufig	viele Fundorte	
Sumpf-WeidenröschenArt	Epilobium	palustreArt	2013					lokal mh am N-rand des grossen Weiher		
Lamarcks NachtkerzeArt	Oenothera	glazovianaArt alt: erythrosepala	2010	2014				vereinzelt	mässig viele Fundorte	
Wiesen-Lein, Purgier-LeinArt	LinumG	catharticumArt	2002					lokal häufig Wiese am Rand	viele Fundorte	
Gewöhnliche Kreuzblume Unterart	Polygala	vulgarisArt vulgarisUnterart	2013	2014				lokal häufig	viele Fundorte	
Wilde MöhreArt	DaucusG	carotaArt	2010					lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Echtes Johanniskraut Art	HypericumG	perforatumArt	2001	2010				lokal sehr häufig		
Niederliegendes JohanniskrautArt	Hypericum	humifusumArt	2001					auf Kies lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Ovalblättriges Sonnenröschen Unterart	Helianthemum	nummulariumArt obscurumUnterart	2012	2014				am Rand lokal häufig	viele Fundorte	
Rauhhaarige GänsekresseArt	Arabis	hirsutaArt	2011					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Französische RampeArt	ErucastrumG	gallicumArt	2010					einer von 2 Fundorten in der	sehr wenig Fundorte	
HederichArt	RaphanusG	raphanistrumArt	2013					lokal mässig häufig am Grubenrand	wenig Fundorte	
Acker-GauchheiArt	AnagallisG	arvensisArt	2013					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Karthäuser-NelkeArt	Dianthus	carthusianorumArt	2011	2014				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Gewöhnliches Leimkraut Unterart	Silene	vulgarisArt vulgarisUnterart	2009					lokal mässig häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Nickendes LeimkrautArt	Silene nutansArt	2014						lokal mässig häufig am Rand	mässig viele Fundorte	
Weisse WaldnelkeArt	Silene pratensisArt alt: alba	2014						lokal mässig häufig		
Kuckucks-LichtnelkeArt	Lychnis flos-cuculiArt	2014						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Echtes TausenguldenkrautArt	CentaureumG erythraeaArt	2010 2014						1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
SchwalbenwurzArt	VincetoxicumG hirundinariaArt	2013 2014						lokal mässig häufig auf Damm	viele Fundorte	
Echtes LabkrautArt	Galium verumArt	2013						lokal häufig auf Damm	viele Fundorte	
Acker-WitwenblumeArt	Knautia arvensisArt	2002 2014						lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-WitwenblumeArt	Knautia dipsacifoliaArt	2011						am Waldrand lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Tauben-SkabioseArt	Scabiosa columbariaArt	2001						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher NatterkopfArt	EchiumG vulgareArt	2001 2014						lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Kleines LeinkrautArt	ChaenorrhinumG minusArt	2022						1 Pflanze	wenig Fundorte	
Grosser EhrenpreisArt	Veronica teucriumArt	2013						lokal häufig Wiese am Rand	viele Fundorte	
Später ZahntrostArt	Odontites vulgarisArt	2022							in der NW-CH erst 1 Mal gefunden	
Wiesen-Augentrost Gebräuchlicher AugentrostArt	EuphrasiaG rostkovianaArt	2001 2009						lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Zottiger AugentrostArt	Euphrasia hirtellaArt	2003						einzigster, aber unsicherer Fund in		
Behaarter KlappertopfArt	Rhinanthus alectorolophusArt	2011 2011						lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Übersehener WasserschlauchArt	Utricularia australisArt	2001 2015						im vorderen Weiher lokal sehr häufig	sehr wenig Fundorte	
Übersehener WasserschlauchArt	Utricularia australisArt	2022						wenige Pflanzen	sehr wenig Fundorte	
Langstenglige KugelblumeArt	GlobulariaG punctataArt	2014						1 auf Damm		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Echter GamanderArt	Teucrium	chamaedrysArt	2014					lokal mh auf Damm	viele Fundorte	
Grosse BrunelleArt	PrunellaG	grandifloraArt	2001 2014					lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Gefleckte TaubnesselArt	LamiumG	maculatumArt	2011					am Waldrand lokal sehr häufig	viele Fundorte	
WiesensalbeiArt	Salvia	pratensisArt	2014					lokal häufig am Rand		
Arznei-Feld-ThymianArt	Thymus	pulegioidesArt	2001 2009					häufig	sehr viele Fundorte	
Europäischer Wolfsfuss Unterart	LycopusG	europaeusArt europaeusUnterart	2001					1 Pflanze	wenig Fundorte	
Acker-MinzeArt	Mentha	arvensisArt	2010					lokal häufig	wenig Fundorte	
WasserdostArt	EupatoriumG	cannabinumArt	2001 2009					lokal häufig	viele Fundorte	
Scharfes Berufkraut Unterart	ErigeronG	acerArt acer Unterart	2001					vereinzelt	wenig Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-MargeriteArt	Leucanthemum	vulgareArt	2001 2014					mässig häufig	sehr viele Fundorte	
HuflattichArt	TussilagoG	farfaraArt	2011					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gewöhnliche EberwurzArt, GolddistelArt	CarlinaG	vulgarisArt	2001					1 alter Fruchtstand	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume im weiteren Sinn	Centaurea	jaceaArt s.l.	2001					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Schmalblättrige Flockenblume Unterart	Centaurea	jaceaArt angustifoliaUnterart	2001					häufig	mässig viele Fundorte	
Gew. Rauhes MilchkrautArt	Leontodon	hispidusArt	2001					häufig, lokal sehr häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Florentiner HabichtskrautArt	Hieracium	piloselloidesArt	2001 2014					häufig	wenig Fundorte, unauffällige, aber beachtenswerte Pflanzenart!	
Langhaariges HabichtskrautArt	Hieracium	pilosellaArt	2001 2009					lokal häufig	viele Fundorte	
Öhrchen-HabichtskrautArt	Hieracium	lactucellaArt	2001					häufig	viele Fundorte	
Schwimmendes LaichkrautArt	Potamogeton	natansArt	2001 2009					im Weiher lokal sehr häufig	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte, aber hier oft in grosser Anzahl	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	BP4	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Langblättriges WaldvögeleinArt	Cephalanthera longifoliaArt	2014							1 Pflanze am Rand	wenig Fundorte	
Weisse SumpfwurzfArt	EpipactisG palustrisArt	2014							lokal mh am Rand des grossen Weiher	wenig Fundorte	
SeebinsArt	Schoenoplectus lacustrisArt	2011							lokal mässig häufig im grossen Weiher	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte	
Gewöhnliche SumpfbinsArt	Eleocharis palustrisArt	2002	2010						am Weiherufer lokal häufig	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Vogelfuss-SeggeArt	Carex ornithopodaArt	2001							lokal häufig	mässig viele Fundorte, aber wahrscheinlich oft übersehen	
Schlaffe SeggeArt	Carex flaccaArt	2002							lokal häufig	viele Fundorte	
Aufrechte TrespeArt	Bromus erectusArt	2014							in den Wiesen am Rand sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Rot-SchwingelArt	Festuca rubraArt	2001							1 Horst	viele Fundorte registriert, wahrscheinlich sehr viele	
Platthalm-RispengrasArt	Poa compressaArt	2010							lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Mittleres ZittergrasArt	BrizaG mediaArt	2010	2014						lokal häufig	viele Fundorte	
Blaues PfeifengrasArt	MoliniaG caeruleaArt	2010							mehrere Horste	wenig Fundorte	
SchilfArt	PhragmitesG australisArt	2009							sehr häufig	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Land-ReitgrasArt	Calamagrostis epigeiosArt	2010							sehr häufig	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
SchirmtintlingArt	CoprinusG comatusArt	2001							1 Fruchtstand	viele Fundorte, aber wenig registriert	
KörnchenröhrlingArt	Suillus granulatusArt	2022							lokal mässig häufig unter Föhre	mässig viele Fundorte	