

Alte Kiesgrube beim EW Wynau Schwarzhäusern (BE) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 625875 233900 Höhe ü. M.: 416 m

Beobachtungsdauer: BP1 = 2001 bis 2003: 26 Stunden BP2 = 2009 bis 2012 : 25 Stunden

Berechnung des	Anzahl:	BP1	BP2	Summe:	BP1	BP2	Index:	BP1	BP2
Seltenheits-Index der Fauna:	Arten:	227	215	809	801		3,56	3,73	
	Ereignisse:	426	447	1'333	1'479		3,13	3,31	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	BP1	BP2	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-Index
WEICHTIERE									
Gemeine Schlammschnecke	Radix	peregra	2001						
Gemeine Achatschnecke	Cochlicopa	lubrica	2002	2002	1 E		Ab1, bisher einziger Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden, nach Literatur überall in der Schweiz, aber nirgends häufig	8
Gefleckte Schüsselschnecke	Discus	rotundatus	2001	2003	6 E		max. Ab4	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Wegschnecke Gattung	Arion	sp.	2001	2001	1 E		Ab1	Gattung sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	-
Weitmündige Glanzschnecke	Aegopinella	nitens	2001	2001	1 E		Ab2	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Genabelte Strauchschnecke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	2011	2011		2 E	Ab1	sehr häufig gefunden	1
Riemenschnecke	Helicodonta	obvoluta	2010	2010		1 E	Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Kartäuserschnecke	Monacha	cartusiana	2001	2012	1 E	1 E	Ab1	häufig gefunden, kann lokal in grossen Massen auftreten, gilt nach Literatur als wenig häufig	2
Seidenhaarschnecke	Trochulus = Trichia	sericeus	2001	2001	1 E		Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Quendelschnecke	Candidula	unifasciata	2010	2012		4 E	max. Ab2	häufig gefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz als häufig, aber verletzlich	2

F = Fundort BP= Beobachtungsperiode

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe (max. Ab): 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse, Index: 1 mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse, Index: 4 selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse, Index: 16
häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse, Index: 2 wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse, Index: 8 sehr selten gefunden: 1 bis 2 Ereignisse, Index: 32

Regio Basiliensis: Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste		letzte		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Rötliche Laubschnecke	Monachoides = Perforatella	incarnatus	2001	2012	1 E	3 E	Ab1	häufig ngefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig	1	
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	2001	2012	3 E	4 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
GLIEDERFÜSSLER			2001							
SPINNENTIERE			2001							
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(Phalangidae)	non det.	2001	2002	2 E		max. Ab2, registriert	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	-	
Herbstspinnen-Art	Metellina	segmentata	2001	2001	1 E		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 10	1	
Glanzkreuzspinnen-Art	Singa	hamata	2002	2002	1 E		Ab1, ausser diesem nur noch ein weiterer Fundort in der Region	erst 2 Mal gefunden	32	
Glanzkreuzspinnen-Art	Singa	nitidula	2012	2012		1 E	Ab1	erst 2 Mal am selben Ort gefunden	32	
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	2001	2011	4 E	1 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 219	1	
Wolfsspinne Gattung	Trochosa	sp.	2001	2001	1 E		Ab1	Gattung häufig gefunden	2	
Wolfsspinnen-Art	Xerolycosa	nemoralis	2010	2010		1 E	Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	2001	2011	2 E	5 E	max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1	
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	kochi	2010	2010		1 E	Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2	
Springspinnen-Art	Evarcha	arcuata	2001	2001	1 E		Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2	
Springspinnen-Art	Phlegra	fasciata	2002	2002	1 E		Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	8	
KREBSTIERE			2001							
Assel-Art	Hyloniscus	riparius	2001	2001	1 E		Ab3, ausser diesem nur noch ein weiterer Fundort in der Region	erst 2 Mal gefunden, weil kaum danach gesucht, nicht inventarisiert	-	
Assel-Art	Trachelipus	ratzeburgi	2001	2001	1 E		Ab2	mässig häufig registriert, wahrscheinlich im Versteckten häufig	2	
Assel-Art	Trachelipus	rathkei	2001	2001	1 E		Ab2	häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig	1	
VIELFÜSSLER			2001							
Steinläufer Gattung	Lithobius	sp.	2001	2002	3 E		max. Ab2	Gattung häufig gefunden, aber nie auf die Art bestimmt und oft nicht registriert	-	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste		letzte		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Gesprenkelter Saftkugler	Glomeris	undulata f. conspersa	2001	2001	1 E		Ab1		häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig	1
Tausendfüsser-Art	Cylindrojulus	caeruleocinctus	2001	2001	2 E		Ab1		unter Steinen und Totholz am Boden häufig gefunden	2
INSEKTEN			2001							
Libellen			2001							
Gebänderte Prachtlibelle	Calopteryx	splendens	2001	2011	2 E	2 E	Ab1		Gattung an Flüssen und Bächen häufig gefunden	2
Weidenjungfer	Lestes	viridis	2001	2001	1 E		Ab3		an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, besonders im Herbst	4
Gemeine Winterlibelle	Sympecma	fusca	2001	2012	2 E	3 E	max. Ab2		mässig häufig gefunden, weil unauffällig	4
Gemeine Federlibelle	Platycnemis	pennipes	2009	2012		6 E	max. Ab2		an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,	4
Grosse Pechlibelle	Ischnura	elegans	2001	2002	2 E		Ab1		an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Kleine Pechlibelle	Ischnura	pumilio	2001	2001	1 E		Ab1		mässig häufig gefunden, vor allem in flachen Kiesgrubentümpeln	4
Becher-Azurjungfer	Enallagma	cyathigerum	2001	2011	3 E	2 E	max. Ab3		an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Hufeisen-Azurjungfer	Coenagrion	puella	2001	2011	4 E	1 E	max. Ab3		an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Blaugrüne Mosaikjungfer	Aeshna	cyanea	2001	2011	3 E	4 E	max. Ab2		sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	1
Keilflecklibelle	Anaciaeshna	isosceles	2001	2001	1 E		Ab1, aber unsicherer Nachweis, weil nur aus Distanz beobachtet		erst 1 Mal gefunden, aber unsicher bestimmt	-
Grosse Königslibelle	Anax	imperator	2001	2012	5 E	3 E	max. Ab2		häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern	2
Gemeine Smaragdlibelle	Cordulia	aenea	2003	2003	1 E		Ab1		an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,	4
Vierfleck	Libellula	quadrimaculata	2001	2011	4 E	2 E	max. Ab3		an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Plattbauch	Libellula	depressa	2011	2011		1 E	Ab1		an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Grosser Blaupfeil	Orthetrum	cancellatum	2001	2003	4 E		max. Ab3		an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Feuerlibelle	Crocothemis	erythraea	2001	2001	1 E		Ab2		an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, aber hier manchmal in grösserer	4
Gemeine Heidelibelle	Sympetrum	vulgatum	2001	2001	2 E		max. Ab2		wenig häufig gefunden	8

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste		letzte		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Grosse Heidelibelle	Sympetrum	striolatum	2001	2012	4 E	4 E	max. Ab3	häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst	2	
Blutrote Heidelibelle	Sympetrum	sanguineum	2001	2010	1 E	1 E	max. Ab2	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,	4	
Schwarze Heidelibelle	Sympetrum	danae	2001	2001	1 E		Ab1, einziger mir bekannter Fund , aber unsicher bestimmt		-	
Heuschrecken			2001							
Gemeine Sichelschrecke	Phaneroptera	falcata	2001	2012	3 E	3 E	max. Ab2	früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen und häufig	2	
Grünes Heupferd	Tettigonia	viridissima	2001	2002	6 E		max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Westliche Beissschrecke	Platycleis	albopunctata	2011	2011		2 E	Ab1	im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig	1	
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roeselii	2003	2003	1 E		Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gewöhnliche Strauchschrecke	Pholidoptera	griseoptera	2011	2011		1 E	Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Feldgrille	Gryllus	campestris	2001	2011	4 E	5 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1	
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	2001	2012	4 E	4 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1	
Langfühler-Dornschrecke	Tetrix	tenuicornis	2001	2010	3 E	1 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Blauflüglige Ödlandschrecke	Oedipoda	caerulescens	2009	2012		8 E	max. Ab4, einziger Fundort in der Region!	ausschliesslich, aber mehrmals am selben Ort gefunden	32	
Brauner Grashüpfer	Chorthippus	brunneus	2001	2001	7 E	8 E	max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	2001	2012	6 E	9 E	max. Ab5	sehr häufig gefunden	1	
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	2001	2010	3 E	1 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Wanzen			2001							
Wasserläufer Gattung	Gerris	sp.	2002	2002	1 E		Ab2	Gattung in stehenden Gewässern häufig gefunden	2	
Schildkrötenwanze	Eurygaster	testudinaria	2001	2001	2 E		Ab1	häufig gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2	
Streifenwanze	Graphosoma	lineatum	2010	2012		4 E	max. Ab2	häufig gefunden	2	
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	2011	2011		1 E	Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	1	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Bemerkungen zur Art im			Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet			
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	2011	2011		1 E	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	2001	2012	1 E	4 E	Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	1
Ginster-Baumwanze	Piezodorus	lituratus	2003	2003	1 E		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Kohlwanze	Eurydema	oleraceum	2001	2009	1 E	1 E	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	2
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalus	subrufus	2010	2011		2 E	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	2
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus	punctatonervosus	2001	2012		2 E	Ab1	häufig gefunden	2
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus	abutilon	2011	2011		1 E	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Behaarte Wiesenwanze	Lygus	rugulipennis	2001	2001	1 E		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21	4
Gelbsaum-Zierwanze	Adelphocoris	seticornis	2003	2003	1 E		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	2
Gemeine Zierwanze	Adelphocoris	lineolatus	2001	2003	2 E		max. Ab2	häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	1
Weichwanzen-Art	Plagiognathus	chrysanthemi	2002	2002	1 E		Ab2, einer von 3 Fundorten in der Region	selten gefunden	16
Gleichflügler			2001						
Europäischer Laternenträger	Dictyophara = Fulgora	europaea	2012	2012		1 E	Ab1	selten gefunden	16
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	2001	2003	2 E		max. Ab2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus	spumarius	2002	2011		2 E	Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Schaumzikaden-Art	Lepyronia	coleoprata	2001	2001	1 E		Ab1	häufig gefunden	2
Grüne Zwergzikade	Cicadella	viridis	2001	2012	6 E	2 E	max. Ab5	sehr häufig gefunden, in Feuchtlebensräumen oft massenhaft	1
Käfer			2001						
Dünen-Sandläufer	Cicindela	hybrida	2011	2011		1 E	Ab3, Anwesenheit fraglich, wäre aber zu erwarten	mässig häufig gefunden, nur auf Sandböden	4
Feld-Sandläufer	Cicindela	campestris	2009	2011		4 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Ahlenläufer-Art	Bembidion	pygmaeum	2001	2012	7 E	1 E	max. Ab3	selten gefunden , ausschliesslich auf Sandböden	16

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index	
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet			
Schöner Ahlenläufer	Bembidion	quadrimaculatum	2001	2001	2 E		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 51	4
Ahlenläufer-Art	Bembidion	articulatum	2002	2002	1 E		Ab1	selten gefunden	16
Nebelfleckenläufer-Art	Asaphidion	pallipes	2001	2002	5 E		einer von nur 2 Fundorten in der Region, der andere in Zell	selten gefunden	16
Schnellläufer-Art	Harpalus	latus	2011	2011		1 E	Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 131	2
Kupferiger Schulterläufer, Listkäfer-Art	Poecilus	cupreus	2001	2001	1 E		Ab2	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 598	1
Müllers Putzläufer	Agonum	muelleri	2001	2001	1 E		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 328	2
Ovaler Kanalkäfer-, Kamelläufer	Amara s.str.	ovata	2001	2001	1 E		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18	4
Kleiner Bombardierkäfer	Brachinus	explosens	2011	2011		1 E	Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	4
Stutzkäfer-Art	Atholus	duodecimstriatus	2001	2001	1 E		Ab1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden	32
Schmalräuber-Art	Stenus	comma	2002	2002	1 E		Ab1	selten gefunden , vermutlich in geeigneten Habitaten häufig	8
Schmalräuber-Art	Stenus	longipes	2001	2001	3E		Ab1,einer von nur 3 Fundorten in der Region!	selten gefunden , gilt in Mitteleuropa als selten	16
Gemeiner Uferräuber	Paederus	litoralis	2002	2002	1 E		Ab2	mässig häufig gefunden	4
Braunfüssiger Uferräuber	Paederus	fuscipes	2002	2002	1 E		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kurzflügelkäfer-Art	Philonthus	varians	2001	2001	1 E		Ab1	selten gefunden	16
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	2011	2011		1 E	Ab1	sehr häufig gefunden	1
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	2001	2010		2 E	b2	sehr häufig gefunden	1
Weichkäfer Gattung	Malthodes	sp.	2003	2003	1 E		Ab1	Gattung wenig häufig gefunden	8
Grosser Blasenkäfer	Malachius	aeneus	2002	2002	1 E		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	ustulatus	2003	2003	1 E		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Glanzkäfer-Art	Glischrochilus	hortensis	2010	2010		1 E	Ab1	selten gefunden , weil klein und versteckt	16
Veränderlicher Marienkäfer	Adonia	variegata	2001	2011		2 E	Ab1	mässig häufig gefunden	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste		letzte		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	2010	2011		2 E	Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	2001	2001	2 E		max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Gartenlaubkäfer	Phyllopertha	horticola	2001	2001	1 E		Ab4	häufig gefunden	2	
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	2001	2003	2 E		Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Rosenkäfer-Verwandter	Tropinota	hirta	2011	2011		1 E	Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	2001	2001	1 E		Ab1	häufig gefunden	2	
Gefleckter Schmalbock	Leptura = Strangalia	maculata	2001	2001	1 E		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21	1	
Rothalsiges Getreidehähnchen	Oulema	melanopus	2010	2010		3 E	Ab1	sehr häufig gefunden, hier handelt es sich um zwei sehr ähnliche Arten	1	
Hieroglyphenkäfer	Pachybrachys	sinuatus	2002	2002	1 E		Ab1	selten gefunden	16	
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	2001	2012	1 E	2 E	Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	2002	2013	2 E	1 E	Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Hautflügler			2001							
Halmwespen-Art	Cephus	spinipes = cultratus	2001	2001	1 E		Ab1	Gattung mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6	4	
Blattwespen-Art	Dolerus	germanicus	2001	2001	1 E		Ab2	mässig häufig gefunden	4	
Blattwespen-Art	Allantus	didymus	2001	2010		2 E	Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Brackwespe Gattung (Puppenkokon)	Apanteles	sp. (Puppenkokon)	2001	2001	1 E		Ab1	Gattung häufig gefunden	2	
Brackwespe Gattung	Chelonus	sp.	2003	2003	1 E		Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4	
Schlupfwespe Artenkomplex	Ichneumon	albiger-Komplex	2001	2001	1 E		Ab1	häufig gefunden	2	
Sichelwespen-Art	Erigorgus	cerinops	2009	2009		1 E	Ab1	häufig gefunden	2	
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	2001	2001	1 E		Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Goldwespen-Art	Hedychrum	gerstäckeri	2011	2012		2 E	max. Ab2	wenig häufig gefunden	8	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index	
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet			
Sand-Goldwespe	Hedychrum	nobile	2003	2011	1 E	2 E	max. Ab2, einer von 5 Fundorten in der Region	selten gefunden	16
Zweifarbige Goldwespe	Chrysis	bicolor	2003	2003	1 E		Ab1	selten gefunden	16
Rollwespen-Art	Tiphia	unicolor = ruficornis	2010	2010		1 E	Ab1, einer von 2 Funden in der Region	selten gefunden	16
Knotenameisen-Art	Manica	rubida	2001	2012	9 E	5 E	max. Ab5	mässig häufig, auf Sandböden lokal sehr häufig	4
Trockenrasen-Knotenameise	Myrmica	scabrinodis	2001	2001	3 E	1 E	max. Ab4	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 3906 Individuen	2
Drüsenameise Artengruppe	Tapinoma	erraticum cf. ambiguum Emery	2002	2012		3 E	max. Ab3	häufig gefunden	2
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	2011	2011		1 E	Ab3, aber nicht jedesmal registriert	sehr häufig gefunden in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 1248 Individuen	1
Grauschwarze Sklavenameise	Formica	fusca	2009	2009		1 E	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 236	2
Pillenwespen-Art	Eumenes	coronatus	2009	2009		1 E	Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	4
Pillenwespen-Art	Eumenes	pedunculatus	2009	2009		1 E	Ab1	wenig häufig gefunden	8
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	2001	2013	2 E	1 E	Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Hornisse	Vespa	crabro	2003	2003	1 E		Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	2001	2012	3 E	2 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 359	1
Wegwespe Gattung	Arachnospila	sp.	2010	2010		1 E	Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Wegwespen-Art	Arachnospila	anceps	2001	2001	1 E		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Wegwespen-Art	Anoplius	infuscatus	2001	2011	3 E	2 E	max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Sandwespe	Amophila	sabulosa	2010	2010		1 E	Ab1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden	32
Bienenjagende Knotenwespe	Cerceris	rybiensis	2001	2010	1 E	1 E	Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Sand-Knotenwespe	Cerceris	arenaria	2003	2003	1 E	3 E	max. Ab5	wenig häufig gefunden	8
Grabwespen-Art	Gorytes (s.s.)	fallax	2011	2011		1 E	Ab1, einziger Fund in der Region!	erst 2 Mal gefunden , Im Naturmuseum Solothurn ist 1 Tier deponiert (der Fundort ist mir	32
Kotwespen-Art (Grabwespe)	Mellinus	arvensis	2012	2012		1 E	Ab1	wenig häufig gefunden	8

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte			Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Heuschreckenwespen-Art	Tachysphex	lativalvis	2001	2011	3 E	3 E	max. Ab3	wenig häufig gefunden	8	
Heuschreckenwespen-Art	Tachysphex	pompiliformis	2003	2011	1 E	2 E	max. Ab4	mässig häufig gefunden	4	
Heuschreckenwespen-Art	Tachysphex	unicolor	2010	2010		1 E	Ab1, einer von 2 Fundorten in der Region	selten gefunden	16	
Fliegenspiesswespen-Art (Grabwespe)	Oxybelus	bipunctatus	2002	2010	2 E	1 E	Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Fliegenspiesswespen-Art (Grabwespe)	Oxybelus	trispinosus	2010	2011		2 E	Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4	
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communis	2001	2001	1 E		Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 26	2	
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus	confusus	2003	2003	1 E		Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 16	2	
Kurzfühler-Maskenbiene	Hylaeus	brevicornis	2010	2010		1 E	Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Gredlers Maskenbiene	Hylaeus	gredleri	2010	2010		1 E	Ab2	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	4	
Rainfarn-Seidenbiene	Colletes	similis	2010	2011		2 E	Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Rotbeinige Furchenbiene	Halictus	rubicundus	2011	2011		1 E	Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	2	
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosae	2001	2003	4 E		max. Ab2	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2	
Furchenbienen-Art	Halictus	simplex	2001	2012	1 E	3 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 17	1	
Goldene Furchenbiene	Halictus	subauratus	2010	2011		2 E	Ab1, einer von 3 Fundorten in der Region	selten gefunden	16	
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	tumulorum	2003	2013		1 E	Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 29	1	
Schmalbienen-Art	Lasioglossum	leucozonium	2001	2012	3 E	2 E	Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2	
Schmalbienen-Art	Lasioglossum	zonulum	2003	2003	1 E		Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	2	
Matte Schmalbiene	Lasioglossum	nigripes	2001	2001	1 E		Ab1	selten gefunden	16	
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	2001	2011	5 E	1 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 50	1	
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum	malachurum	2001	2011	1 E	1 E	Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 76	2	
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	2002	2011	1 E	2 E	Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 616	1	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte			Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Lappenspornige Schmalbiene	Lasioglossum	pauillum	2001	2011	2 E	2 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 49	1	
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum	fulvicorne	2001	2010	1 E	2 E	Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 45	2	
Steilwand-Schmalbiene	Lasioglossum	limbellum	2001	2001	1 E		Ab1	selten gefunden	16	
Polierte Schmalbiene	Lasioglossum	politum	2001	2012	2 E	5 E	max. Ab3	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4	
Punktierte Schmalbiene	Lasioglossum	punctatissimum	2011	2011		1 E	Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	2001	2010	3 E	1 E	Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	1	
Sechsbändige Schmalbiene	Lasioglossum	sexstrigatum	2001	2011	3 E	4 E	max. Ab2	wenig häufig gefunden	8	
Schmalbienen-Art	Lasioglossum	lucidulum	2012	2012		1 E	Ab1, einer von 3 Funden in der Region	selten gefunden	16	
Dunkelgrüne Goldschmalbiene	Lasioglossum	morio	2010	2011		3 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 93	1	
Blutbienen-Art	Sphecodes	scabricollis	2011	2011		1 E	Ab1	wenig häufig gefunden, ist aber in letzter Zeit häufiger geworden	8	
Blutbienen-Art	Sphecodes	gibbus	2001	2003	2 E		Ab2	mässig häufig gefunden	4	
Blutbienen-Art	Sphecodes	ephippius	2002	2011	1 E	2 E	Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2	
Blutbienen-Art	Sphecodes	longulus	2001	2003	2 E		Ab1	selten gefunden	16	
Blutbienen-Art	Sphecodes	puncticeps	2002	2002	2 E		Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	4	
Blutbienen-Art	Sphecodes	ferruginatus	2011	2011		1 E	Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2	
Schwarze Blutbiene	Sphecodes	niger	2009	2009		1 E	Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Blutbienen-Art	Sphecodes	crassus	2003	2011	1 E	1 E	Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	4	
Sandbienen-Art	Andrena	subopaca	2011	2011		1 E	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 24	2	
Sandbienen-Art	Andrena	humilis	2001	2001	1 E		Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	2	
Grauschwarze Weiden-Sandbiene	Andrena	vaga	2011	2011		1 E	Ab4, einer von 5 Fundorten in der Region	selten gefunden	16	
Sandbienen-Art	Andrena	dorsata	2011	2011		1 E	Ab1	wenig häufig gefunden	8	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte			Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet			
Sandbienen-Art	Andrena	ovatula	2003	2010	1 E	1 E	max. Ab2		mässig häufig gefunden	4
Sandbienen-Art	Andrena	barbilabris	2011	2011		1 E	Ab1, einer von 2 Fundorten, der andere in Zell (LU)		sehr selten gefunden, nur auf Sandböden	16
Gemeine Wollbiene	Anthidium	manicatum	2003	2003	1 E		Ab1		häufig gefunden	2
Kleine Harzbiene	Anthidium	strigatum	2003	2003	1 E		Ab1		mässig häufig gefunden	4
Punktierte Dusterbiene	Stelis	punctulatissima	2001	2001	1 E		Ab1		wenig häufig gefunden	8
Glockenblumen-Scherenbiene	Chelostoma	rapunculi = fuliginosum	2003	2003	1 E		Ab1		häufig gefunden	2
Schwarzspornige Stengel-Mauerbiene	Osmia	leucomelana	2001	2001	1 E		Ab1		wenig häufig gefunden	8
Platterbsen-Mörtelbiene	Megachile	ericetorum	2003	2003	1 E		Ab2		mässig häufig gefunden	4
Juni-Langhornbiene	Eucera	longicornis	2003	2003	1 E		Ab1		häufig gefunden	2
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	2001	2011	2 E	4 E	max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 71	1
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum	2001	2011	2 E	2 E	max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 262	1
Steinhummel	Bombus	lapidarius	2001	2011	1 E	2 E	max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	2001	2012	5 E	5 E	max. Ab3		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	2001	2011	3 E	1 E	max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	1
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Psithyrus	campestris	2001	2001	1 E		Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Honigbiene	Apis	mellifera	2001	2012	5 E	10E	max. Ab4		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 489	1
Schmetterlinge			2001							
Sackträgermotten-Art	Coleophora	ornatipenella	2003	2003	1 E		Ab1		häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Glasflügler	Bembecia	ichneumoniformis	2012	2012		1 E	Ab1		mässig häufig gefunden, R.Bas.: 10, 5	4
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	2001	2012	1 E	3 E	max. Ab3		sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
Wickler-Art	Epiblema	sticticana	2001	2001	1 E		Ab1		mässig häufig gefunden, Raupen an Huflattich	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte			Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Wickler-Art	Epiblema	graphana	2002	2002	1 E			Ab1, einer von 3 Funden in der Region, aber unsicher bestimmt	selten gefunden	-
Skabiosen-Federgeistchen	Stenoptilia	bipunctidactyla	2003	2003	1 E			Ab1	häufig gefunden	2
Zünsler-Art	Synaphe	punctalis	2010	2011			3 E	Ab1	häufig gefunden	2
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	2001	2012	2 E	2 E		Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	pascuellus	2003	2011	1 E	1 E		max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	2002	2002	1 E			Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	2001	2010	1 E	2 E		max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	2001	2010	1 E	1 E		Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	geniculea	2009	2009		1 E		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Graszünsler-Art	Platytes	alpinella	2010	2012		2 E		max. Ab2	selten gefunden	16
Seerosenzünsler	Elophila	nymphaeata	2009	2012		4 E		max. Ab2	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, hier oft in grosser Zahl	4
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	2001	2011	3 E	4 E		max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2012	2012		1 E		Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wanderzünsler	Nomophila	noctuella	2001	2012	1 E	2 E		Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	1
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2003	2011	1 E	1 E		Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	2001	2011	2 E	1 E		Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	lineola	2001	2002	2 E			max. Ab2	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 164	4
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	2001	2011	1 E	2 E		Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	1
Malven-Dickkopffalter, Eibischfalter	Carcharodus	alceae	2011	2011		1 E		Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 19	4
Kleiner Nördlicher Würfelfalter	Pyrgus	malvae	2001	2001	1 E			Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 338	2
Schwalbenschwanz	Papilio	machaon	2001	2010	4 E	2 E		Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index	
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet			
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	2001	2012	5 E	10E	max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	1
Tintenfleckweissling-Komplex	Leptidea	sinapis-Komplex	2001	2011	1 E	6 E	max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	2001	2012	3 E	5 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	2003	2012	1 E	3 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	2001	2011	1 E	1 E	Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	croceus	2001	2012	1 E	1 E	max. Ab2	Wanderrfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	2012	2013		1 E	Ab1	sehr häufig gefunden	1
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis	2009	2009		1 E	Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2011	2011		1 E	Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Tagpfauenauge	Inachis	io	2003	2011	1 E	4 E	Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	Vanessa	atalanta	2012	2012		1 E	Ab1	Wanderrfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Distelfalter	Vanessa = Cynthia	cardui	2001	2009	2 E	1 E	Ab1	sehr häufiger Wanderrfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	1
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	2003	2012	1 E	3 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	Polytonia	c-album	2011	2011		1 E	Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Landkärtchen	Araschnia	levana	2001	2001	1 E		Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2
Kleiner Perlmutterfalter	Issoria	lathonia	2003	2003	1 E		Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 30, 89	4
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	2009	2012		4 E	Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	2001	2011	2 E	2 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	2001	2012	2 E	5 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megea	2010	2011		4 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Kleiner Feuerfalter	Lycaena	phlaeas	2012	2012		1 E	Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 88	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte			Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Zweiflügler			2001							
Krähenschnake Gattung	Nephrotoma	sp.	2001	2001	1 E		Ab1		Gattung sehr häufig gefunden	1
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	scurra	2001	2010	1 E	1 E	max. Ab2		wenig häufig gefunden, vor allem in Kiesgruben	8
Stelzmücken-Art	Epiphragma	ocellare	2002	2002	1 E		Ab1		mässig häufig gefunden	4
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	non det.	2011	2011			2 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Waffenfliegen-Art	Stratiomys = Hirtea	longicornis	2001	2001	1 E		Ab1		wenig häufig gefunden	8
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	pluvialis	2001	2012	3 E	1 E	max. Ab2		sehr häufig gefunden	1
Bremsen-Art	Hepatoma	pellucens	2011	2011		1 E	Ab1, einziger Fund in der Region!		erst 1 Mal gefunden	32
Bremsen-Art	Tabanus	bovinus	2003	2003	1 E		Ab1		mässig häufig gefunden	4
Bremsen-Art	Tabanus	bromius	2001	2003	2 E		Ab1		häufig gefunden	2
Trauerschweber-Art	Anthrax	varius	2003	2010	1 E	1 E	max. Ab2, einer von 2 Fundorten in der Region		selten gefunden	16
Gemeine Winter- oder Parkswebfliege	Episyrphus	balteatus	2001	2012	2 E	1 E	Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 200	1
Frühe Grossstirnschwebfliege, Gelbe Dickkopfschwebfliege	Scaeva	selenitica	2001	2001	1 E		Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebfliege	Sphaerophoria	scripta	2001	2012	1 E	3 E	Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1
Kahle oder Südliche Wespenschwebfliege	Chrysotoxum	intermedium	2001	2002	3 E		Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) stlen: 3	2
Heideschwebfliegen-Art	Paragus	haemorrhous	2009	2011			2 E	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Zwergschwebfliege	Pipizella	viduata	2012	2012			1 E	Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	1
Trüffel-Erzswebfliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	rufipes = soror	2001	2001	1 E		Ab1		häufig gefunden	2
Gemeine Waldschwebfliege, Gemeine Hummelschwebfliege	Volucella	pellucens	2009	2009			1 E	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2
Gemeine Smaragd- oder Gelbbauch-Schwebfliege	Chrysogaster	solstitialis	2010	2012			3 E	Ab1	häufig gefunden	2
Glänzende Faulschlammwebfliege,	Eristalinus	aeneus	2001	2001	1 E		Ab1		mässig häufig gefunden	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste		letzte		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Kleine Keilfleckschwebfliege, Kleine Bienenschwebfliege	Eristalis	arbustorum	2001	2001	1 E		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	1	
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	2001	2012	3 E	3 E	max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 57	1	
Grosse Sumpfschwebfliege, Grosse Sonnenschwebfliege	Helophilus	parallelus	2009	2012		2 E	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2	
Gemeine Sumpfschwebfliege, Gemeine Sonnenschwebfliege	Helophilus	pendulus	2001	2001	1 E		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	2	
Totenkopfschwebfliege	Myathropa	florea	2001	2012	4 E	2 E	max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18	1	
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebfliege, Gemeine	Syritta	pipiens	2001	2012	2 E	3 E	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	2	
Gemeine Langbauchschwebfliege Gemeine Holzschwebfliege	Xylota	segnis	2001	2002	2 E		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 160	2	
Augenfliege Gattung	Pipunculus	sp.	2003	2003	1 E		Ab1	Gattung selten registriert	-	
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atra	2001	2011	1 E	2 E	Ab1	häufig gefunden	2	
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	pusilla	2011	2011		2 E	Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	2011	2011		1 E	Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	2001	2011	6 E	4 E	max. Ab4, ab 2012 nicht mehr registriert	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1	
Fleischfliegen-Art	Metopia	italiana	2002	2002	1 E		Ab1, einziger Fund in der Reg., wegen mangelnder Beachtung	erst 1 Mal gefunden, aber später nicht mehr registriert	-	
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	2012	2002		1 E	Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Raupenfliegen-Art	Ectophasia	crassipennis	2009	2012		3 E	Ab1	häufig gefunden	2	
Raupenfliegen-Art	Cylindromyia = Ocyptera	brassicaria	2001	2001	1 E		Ab2	mässig häufig gefunden	4	
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	fera	2012	2012		1 E	Ab1	häufig gefunden, aber oft nicht registriert	1	
WIRBELTIERE	Auswahl	ohne sehr häufige Arten	2001							
Erdkröte	Bufo	bufo	2011	2011		1 E	Ab1	häufig gefunden	2	
Wasserfrosch	Rana	esculenta	2001	2012	9 E	5 E	max. Ab4	häufig beobachtet	2	
Blindschleiche	Anguis	fragilis	2001	2001	2 E		Ab1	häufig gefunden	2	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste		letzte		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet				
Eidechse (nicht bestimmt)	Lacerta cf. Podarcis	non det.	2001	2010	1 E		max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Mauereidechse	Podarcis	muralis	2003	2011	1 E	2 E	Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Zauneidechse	Lacerta	agilis	2001	2012	2 E	6 E	max. Ab3	sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)	2	
Graureiher	Ardea	cinerea	2011	2011		1 E	Ab1	häufig beobachtet	2	
Stockente	Anas	platyrhynchus	2001	2001	1 E		Ab2	häufig beobachtet	2	
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2001	2012	2 E	4 E	Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Bläsralle, Blässhuhn	Fulica	atra	2001	2001	2 E		max. Ab2	häufig beobachtet	2	
Kuckuck	Cuculus	canorus	2001	2011	1 E	1 E	Ab1, zur Zeit in der Region fast nur noch hier und in Wolfwil	früher häufig gehört, aber in letzter Zeit selten geworden	4	
Wiedehopf	Upupa	epops	2001	2001	1 E		Ab1	selten beobachtet	16	
Grünspecht	Picus	viridis	2011	2011		1 E	Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Schwarzspecht	Dryocopus	martius	2011	2011		1 E	Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Rauchschwalbe	Hirundo	rustica	2010	2010		1 E	Ab1, erst seit wenigen Jahren registriert	häufig beobachtet	2	
Mehlschwalbe	Delichron	urbica	2010	2010		1 E	Ab3	häufig beobachtet	2	
Misteldrossel	Turdus	viscivorus	2001	2011	2 E	1 E	Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Teichrohrsänger	Acrocephalus	scirpaceus	2001	2002	3 E		Ab1	häufig beobachtet	2	
Schwanzmeise	Aegitalus	caudatus	2002	2012	1 E	2 E	max. Ab2	häufig beobachtet	2	
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactyla	2011	2011		1 E	Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Kolkrabe	Corvus	corax	2009	2009		1 E	Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Goldammer	Emberiza	citrinella	2001	2011	5 E	4 E	max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1	
Dachs	Meles	meles	2011	2011		1 E	Ab1, (Baueingang, ev. aber vom Fuchs bewohnt)	anhand der Spuren häufig festgestellt	2	
Wildschwein	Sus	scrova	2001	2001	1 E		Ab1, (Trittsiegel)	anhand der Spuren zunehmend häufiger festgestellt	2	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung		letzte Beobachtung		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region		Index
			BP1	BP2	BP1	BP2					
Reh	Capreolus	capreolus	2001	2011	3 E	3 E	max. Ab2 (nur Spuren)		häufig beobachtet und anhand der Spuren festgestellt		2
BLAUALGEN	Auswahl		2001								
Blaualgen-Art	Nostoc	commune	2001				sehr häufig (massenhaft)		mässig viele Fundorte		
PILZE	Auswahl		2001								
Schirmtintling	Coprinus	comatus	2001				1 Fruchtstand		viele Fundorte, aber wenig registriert registriert		
MOOSE	Auswahl										
Kräuselmoos	Tortella	inclinata	2011				häufig		wenig häufig registriert, aber vermutlich in allen Kiesgruben häufig bis sehr häufig		
FARNPFLANZEN			2001								
Sumpf-Schachtelhalm	Equisetum	palustre	2009				lokal häufig		wenig Fundorte		
Überwinternder Schachtelhalm	Equisetum	hyemale	2001				lokal sehr häufig (massenhaft)		wenig Fundorte, aber an den Fundstellen oft massenart		
Bunter Schachtelhalm	Equisetum	variegatum	2001				lokal häufig, einziger Fund in der Region, nicht ganz sicher best.				
SAMENPFLANZEN			2001								
Milder Mauerpfeffer	Sedum	sexangulare	2001				lokal häufig am Rand		viele Fundorte		
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	2001				lokal mässig häufig		sehr viele Fundorte		
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	2011				lokal mässig häufig		sehr viele Fundorte		
Wald-Erdbeere	Fragaria	vesca	2001				lokal häufig		sehr viele Fundorte		
Garten-Steinmispel	Cotoneaster	horizontalis	2009				lokal mässig häufig		mässig viele Fundorte, unsicher bestimmt		
Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis	vulneraria vulneraria	2001				lokal häufig		viele Fundorte		
Schmalblättrige Wicke	Vicia	sativa ssp. nigra incl. angustifolia	2002				lokal mässig häufig		viele Fundorte		
Blut-Weiderich	Lythrum	salicaria	2009				am Rand lokal mässig häufig		viele Fundorte		
Lamarcks Nachtkerze	Oenothera	glazoviana = erythrosepala	2010				vereinzelt		mässig viele Fundorte		

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Bemerkungen zur Art im			Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	BP1	BP2	Beobachtungsgebiet			
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	Linum	catharticum	2002				lokal häufig	viele Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2010				lokal häufig	viele Fundorte	
Niederliegendes Johanniskraut	Hypericum	humifusum	2001				auf Kies lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Echtes Johanniskraut	Hypericum	perforatum	2001				lokals sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Ovalblättriges Sonnenröschen	Helianthemum	nummularium ssp. obscurum	2012				am Rand lokal häufig	viele Fundorte	
Rauhhaarige Gänsekresse	Arabis	hirsuta	2011				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Französische Rampe	Erucastrum	gallicum	2010				einer von 2 Fundorten in der Region, lokal häufig	sehr wenig Fundorte	
Karthäuser-Nelke	Dianthus	carthusianorum	2011				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Gewöhnliches Leimkraut	Silene	vulgaris vulgaris	2009				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Echtes Tausenguldenkraut	Centaurium	erythraea	2010				1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	2002				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Witwenblume	Knautia	dipsacifolia	2011				am Waldrand lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Tauben-Skabiose	Scabiosa	columbaria	2001				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Natterkopf	Echium	vulgare	2001				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Wiesen-Augentrost Gebräuchlicher Augentrost	Euphrasia	rostkoviana	2001				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Zottiger Augentrost	Euphrasia	hirtella	2003				einzigster, aber unsicherer Fund in der Region		
Behaarter Klappertopf	Rhinanthus	alectorolophus	2011				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Übersehener Wasserschlauch	Utricularia	australis	2001				im vorderen Weiher lokal sehr häufig	sehr wenig Fundorte	
Grosse Brunelle	Prunella	grandiflora	2001				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Gefleckte Taubnessel	Lamium	maculatum	2011				am Waldrand lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	2001				häufig	sehr viele Fundorte	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Beobachtung				Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			BP1	BP2					
Europäischer Wolfsfuss	Lycopus	europaeus europaeus	2001				1 Pflanze	wenig Fundorte	
Acker-Minze	Mentha	arvensis	2010				lokal häufig	wenig Fundorte	
Wasserdost	Eupatorium	cannabinum	2001				lokal häufig	viele Fundorte	
Scharfes Berufkraut	Erigeron	acer acer	2001				vereinzelt	wenig Fundorte	
Gewöhnliche Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	2001				mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Huflattich	Tussilago	farfara	2011				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gewöhnliche Eberwurz, Golddistel	Carlina	vulgaris	2001				1 alter Fruchtstand	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	2001				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Schmalblättrige Flockenblume	Centaurea	jacea angustifolia	2001				häufig	mässig viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milkkraut	Leontodon	hispidus	2001				häufig, lokal sehr häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Langhaariges Habichtskraut	Hieracium	pilosella	2001				lokal häufig	viele Fundorte	
Öhrchen-Habichtskraut	Hieracium	lactucella	2001				häufig	viele Fundorte	
Florentiner Habichtskraut	Hieracium	piloselloides	2001				häufig	wenig Fundorte, unauffällige, aber beachtenswerte Pflanzenart!	
Schwimmendes Laichkraut	Potamogeton	natans	2001				im Weiher lokal sehr häufig	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte, aber hier oft in grosser Anzahl	
Seebirse	Schoenoplectus	lacustris	2011				lokal mässig häufig im grossen Weiher	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte	
Gewöhnliche Sumpfbirse	Eleocharis	palustris	2002				am Weiherufer lokal häufig	in stehenden Gewässern, wenig Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Schlaffe Segge	Carex	flacca	2002				lokal häufig	viele Fundorte	
Vogelfuss-Segge	Carex	ornithopoda	2001				lokal häufig	mässig viele Fundorte, aber wahrscheinlich oft übersehen	
Rot-Schwengel	Festuca	rubra	2001				1 Horst	viele Fundorte registriert, wahrscheinlich sehr viele	
Platthalm-Rispengras	Poa	compressa	2010				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Mittleres Zittergras	Briza	media	2010				lokal häufig	viele Fundorte	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet			Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beobachtung	Beobachtung					
Blaues Pfeifengras	Molinia	caerulea	2010				mehrere Horste	wenig Fundorte	
Schilf	Phragmites	australis	2009				sehr häufig	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Land-Reitgras	Calamagrostis	epigeios	2010				sehr häufig	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	