

Wiese Feldli Nord Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 634175 246450 Höhe ü. M.: 460 m Exposition: SE Fläche: 110 Neigung: 20% 30%

	BP1 (1997 und 2001)	BP2 (2007)	BP3 (2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	7	5	8	20
Beobachtungsdauer:	04 Std. 40 Min.	03 Std. 20 Min.	06 Std. 45 Min.	11Std. 45 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:		237	095	172	409		330	153	292	622		1,39	1,61	1,70	1,52
Bewertete Taxa:		105	078	121	304		138	135	235	508		1.31	1,73	1,94	1,67

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------

WEICHTIERE

			1997							
Weitmündige Glanzzschnecke	Aegopinella	nitens	1997	1997	1		*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Genabelte Strauchschnecke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	1997	2007	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Seidenhaarschnecke oder Quendelschnecke (nicht bestimmt)	Trochulus = Trichia	sericea cf. Candidula	1997	1997	2			Max. Ab2	häufig gefunden, wahrscheinlich meist T. sericea	1
Gemeine Heideschnecke	Helicella	itala	2001	2017	1	1	5	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Kantige Laubschnecke	Hygromia	cinctella	2007	2007	&	2		Max. Ab1	häufig gefunden, Neozoon, seit 1997 häufiger, bes. im Siedlungsraum	2

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
 Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

Index 1: sehr häufig gefunden:	mehr als 500 Ereignisse
Index 2: häufig gefunden:	100 bis 499 Ereignisse
Index 4: mässig häufig gefunden:	31 bis 100 Ereignisse
Index 8: wenig häufig gefunden:	10 bis 30 Ereignisse
Index 16: selten gefunden:	3 bis 9 Ereignisse
Index 32: sehr selten gefunden:	2 Ereignisse an verschiedenen Orten
Index 64: äusserst selten gefunden:	1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen	

() in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
 & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
 * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
 ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:

Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen		Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung				letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Rötliche Laubschnecke	Monachoides = Perforatella	incarnatus	2007	2007		1	*			Max. Ab2	häufig ngefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig	1
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	1997	2007	1	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
GLIEDERFÜSSLER			1997									
SPINNENTIERE			1997									
Herbstspinnen-Art	Metellina	segmentata	2007	2007		1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	1
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	2007	2007		1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	hortensis	1997	1997	1		*			Max. Ab2	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	2
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	2017	2017			1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	amentata	1997	1997	1		*			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 204	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	2007	2007		2	*			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 219	1
Listspinne	Pisaura	mirabilis	1997	2017	3	1	3			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2017	3		1			Max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	2017	2017			1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1
Krabbenspinne Gattung	Xysticus	sp.	1997	1997	2		*			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	cristatus	1997	1997	1		*			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	2
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	kochi	1997	1997	1		*			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 3	2
INSEKTEN			1997									
Libellen												
Grosse Königslibelle	Anax	imperator	2001	2007	1	1				Max. Ab1	häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern	2
Schaben			1997									
Gemeine Waldschabe	Ectobius	lapponicus	1997	1997	1					Max. Ab1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	Anz. Ereignisse BP2	Anz. Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seitenhefts-werte	
Heuschrecken		1997								
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia	sp. J	2017	2017			1	Max. Ab2	Jungtiere häufig gefunden	
Grünes Heupferd (nur Stridulation)	Tettigonia	viridissima Gesang	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gehört	1
Grünes Heupferd	Tettigonia	viridissima	2007	2017		1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Zwitscherschrecke	Tettigonia	cantans	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Westliche Beissschrecke	Platycleis	albopunctata albopunctata	2017	2017			1	Max. Ab2	im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig	1
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roeselii	1997	2007	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliche Strauschschrecke	Pholidoptera	griseoaptera	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Feldgrille	Gryllus	campestris	1997	2017	2	3	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	2017	3	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Langfühler-Dornschrecke	Tetrix	tenuicornis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Lauschschrecke	Mecostethus = Parapleurus	parapleurus = alliaceus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren	1
Kleine Goldschrecke	Euthystira = Chrysochraon	brachyptera	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus	rufus	1997	1997	3			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1997	2017	3	3	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Brauner Grashüpfer	Chorthippus	brunneus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2017	4	2	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Wanzen			1997							
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Schwarzrückige Gemüsewanze	Eurydema	ornatum	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Leder- oder Randwanzen-Art	Coreus marginatus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Leder- oder Saumwanzen-Art	Coriomeris denticulatus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Glasflügelwanzen-Art	Corizus hyoscyami	2017	2017			2	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus punctato-nervosus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Weichwanzen-Art	Deraeocoris ruber	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 74	2
Behaarte Wiesenwanze	Lygus rugulipennis	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	4
Gelbsaum-Zierwanze	Adelphocoris seticornis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	2
Gemeine Zierwanze	Adelphocoris lineolatus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Weichwanzen-Art	Notostira erratica	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	2
Weichwanzen-Art	Leptopterna dolobrata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	1
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	1997	2017	2		1	Max. Ab2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1
Kamelhalsfliegen-Art	Phaeostigma = Raphidia	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Käfer		1997							
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Trichodes alvearius	1997	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schnellkäfer-Art	Cidnopus pilosus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Glanzkäfer Gattung	Meligethes sp.	1997	1997	1		*	Max. Ab3	Gattung sehr häufig gefunden	1
Siebenpunkt	Coccinella septempunctata	1997	2007	2	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Marienkäfer-Art	Harmonia axyridis	2017	2017	&		1	Max. Ab1	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera femorata	2001	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera lurida	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda villosa	2001	2001	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	brevicauda	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Silbriger Purzelkäfer	Hoplia	argentea = farinosa	2017	2001			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Rosenkäfer-Verwandter	Oxythyrea	funestra	2017	2001			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, aber in starker Zunahme begriffen	8
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	2017	2001			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Roter Spitzdeckenbock	Stenopterus	rufus	2001	2001	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina	salina	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1997	2017	2		1	Max. Ab3	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	1997	2017			1	Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	violaceus	1997	2017	1		1	Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Breiter Birnengrünrüssler, Kupfriger Blattrüssler	Phyllobius	pyri	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Hautflügler			1997							
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Campoletis	varians	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Stilbops	ruficornis	2017	2017			1	Max. Ab2	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Rhorus	binotatus	2017	2017			1	Max. Ab1	selten gefunden	16
Zehrwespe Familie	(Diapriidae)	non det.	2017	2017			1	Max. Ab1	Familie erst 1 Mal gefunden	
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1997	2017	1		1	Max. Ab3	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1997	1997	1		*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1
Zweifarbige Sklavenameise	Formica	rufibarbis	2007	2017		1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 89	1
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	trifasciatus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 9	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	1997	2017	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Waldwespe	Dolichovespula	sylvestris	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Deutsche Wespe	Vespula	germanica	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 83	1
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	2017	2017			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Bienenjagende Knotenwespe	Cerceris	rybiensis	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Clytochrysus)	lapidarius	2007	2017		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Rainfarn-Maskenbiene	Hylaeus	nigritus	2001	2001	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gebuchtete Maskenbiene	Hylaeus	sinuatus	2001	2001	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	4
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosae	2017	2017			2		Max. Ab2	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	1997	2017	1		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum	leucozonium	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1997	2017	1		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum	malachurum	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 76	2
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauxillum	2007	2017		1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1
Dickkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	glabriusculum	2007	2017		1	1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	1997	2017	1		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum	morio	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 93	1
Netz-Blutbiene	Sphecodes	reticulatus	2007	2007		1			Max. Ab1	selten gefunden	16
Durchscheinende Blutbiene	Sphecodes	hyalinatus	2007	2007		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Gewöhnliche Bindensanbiene	Andrena	flavipes	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2
Grobpunktiere Kleesandbiene	Andrena	wilkella	2007	2007		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, an Schmetterlingsblüten, in den Fallen der WSL	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Grosse Harzbiene, Bastardbiene	Anthidium = Trachusa	byssinum	2007	2007			1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Felsspalten-Wollbiene	Anthidium	oblongatum	2017					1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Punktierte Dusterbiene	Stelis	punctulatissima	2007	2007			1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gewöhnliche Löcherbiene	Heriades	truncorum	2007	2007			1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 15	2
Platterbsen-Mörtelbiene	Megachile	ericetorum	2017	2017				1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schwarzbürstige Blattschneiderbiene	Megachile	nigriventris	2007	2007			1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Mai-Langhornbiene	Eucera	nigrescens = tuberculata	2007	2007			1			Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Rotbäuchige Wespenbiene	Nomada	bifasciata lepeletieri	1997	1997	1					Max. Ab1	häufig gefunden	2
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	2017	2017				1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Baumhummel	Bombus	hypnorum	2017	2017				1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1997	2017	2			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2017	3	1	3			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	1997	2017	1	1	2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus	hortorum	2007	2007			1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Honigbiene	Apis	mellifera	1997	2017	4	2	4			Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge			1997									
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	1997	2007	1			2		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Sackträgermotten-Art	Coleophora	ornatipenella	1997	1997	1					Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	1997	2007	1			1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
Wickler-Art	Aethes	tesserana	2001	2001	1					Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Aethes	hartmanniana	1997	2017	1	1	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Wickler-Art	Celypha	lacunana	2007	2017			1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Synaphe	punctalis	2017	2017				1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	2017	2017				2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1997	1997	1					Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	1997	2017	1			1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	1997	1					Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	2007	2007			1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2007	2017			1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	2017	2017				1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	2017	2017				1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	1997	1997	1					Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	1
Malven-Dickkopffalter, Eibischfalter	Carcharodus	alceae	2017	2017				1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 19	4
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	2017	5	4		5		Max. Ab2	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	2017	2017				1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1997	2007	1	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	2017	1	3		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	1997	2017	2	1		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Heufalter Gattung	Colias	sp.	2017	2017				1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	crocea	2017	2017				1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	1997	2017	1			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2017	2017				2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kleiner Eisvogel	Limenitis camilla	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 31, 124	2
Grosser Fuchs	Nymphalis polychloros	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 33	4
Tagpfauenauge	Inachis io	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Kleiner Fuchs	Aglais urticae	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	Polygonia c-album	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Kleiner Perlmutterfalter	Issoria lathonia	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 89	2
Brombeer-Perlmutterfalter	Brenthis daphne	2017	2017			1	von weiten unsicher bestimmt	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 41	
Schachbrettfalter	Melanargia galathea	2001	2017	1	3	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola jurtina	1997	2017	1	2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus hyperantus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha pamphilus	1997	2017	2	1	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Mauerfuchs	Lasiommata megera	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Brauner Feuerfalter	Lycaena tityrus	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	Aricia agestis	2007	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 27, 250	2
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris semiargus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra bellargus	1997	2017	1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus icarus	1997	2017	4		5	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Marmorierter Kleinspanner	Scopula immorata	2017	2017			1	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1
Spanner-Art	Epirrhoe alternata	2017	2017			1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Klee-Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa clathrata	1997	2017	1		1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1
Heidespanner	Ematurga atomaria	1997	1997	1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997	2017	2017	2017	2017	2017			
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1997	2017	2	1	3		Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Gammaeule	Autographa	gamma	1997	2017	2		1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Weissfleckige Schilfgraseule	Mythimna	albipuncta	2017	2017			1		Max. Ab1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 81	4
Schnabelfliegen			1997								
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa	vulgaris	1997	1997	1				unsicher bestimmt	sehr häufig gefunden	
Zweiflügler			1997								
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. s.str.	Tipula paludosa	2017	2017			1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1997	2017	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	non det.	2017	2017			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Trauermücken-Art	Sciara	hemerobioides = thomae	2017	2017			1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Johannismücke	Bibio	johannis	1997	1997	1				Max. Ab2	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	2007	2017		1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	pluvialis	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Raubfliegen-Art	Dioctria	rufipes	1997	2017	1		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Wollschweber-Art	Bombylius	discolor	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Trauersschweber-Art	Villa	cingulata	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	1997	2017	1		2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus	balteatus	1997	2017	1	1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta	2001	2017	1	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Kugelträger-Art (Schwebefliege)	Sphaerophoria	taeniata	2001	2001	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	2007	2017		1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

erste letzte Anz. Ereignisse Bemerkungen zur Art
Beobachtung BP1 BP2 BP3 am Beobachtungsort

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen								Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Zweiband- Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	bicinctum	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum		2
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58		1
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	2001	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8		1
Frühlings- oder Aster-Erzschwebefliege Bergenstammi-	Cheilosia	vernalis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden		2
Gemeine oder Helle Goldschwebefliege	Ferdinandea	cuprea	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden		4
Grosse Waldschwebefliege, Riesen-Hummelschwebefliege	Volucella	zonaria	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden		8
Gemeine Smaragd- oder Gelbbauch-Schwebefliege	Chrysogaster	solstitialis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden		2
Matte Faulschlammschwebefliege, Schwarze	Eristalinus	sepulchralis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden		4
Kleine Bienenschwebefliege	Eristalis	arbustorum	2001	2001	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum		1
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1997	2017	2		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis	pertinax	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2007	1	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57		1
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	2007	2007		2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18		1
Gemeine Langbauchschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnis	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160		1
Dickkopffliege Gattung	Thecophora	sp.	2017	2017			1	unsicher bestimmt	Gattung sehr häufig gefunden		
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	pusilla	1997	2017	1		1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden		4
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	distincta	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden		2
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	2017	2017			1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden		1
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1997	2007	1	2	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert		1
Raupenfliegen-Art	Eriothrix	rufomaculata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden		2
			1997								

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte	
		Beobachtung	BP1	BP2	BP3					
WIRBELTIERE		1997								
Eidechse (nicht bestimmt)	Lacerta cf. Podarcis	non det.	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	
Zauneidechse	Lacerta	agilis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)	1
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	1997	2017	1	2	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Turmfalke	Falco	tionnunculus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Mauersegler	Apus	apus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Grünspecht	Picus	viridis	1997	2017	1	1	2	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Rauchschwalbe	Hirundo	rustica	2017	2017	()	()	1	Max. Ab1	häufig beobachtet, erst in der dritten Beobachtungsperiod inventarisiert	2
Gartengrasmücke	Sylvia	borin	2001	2001	1			Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Trauerschnäpper	Ficedula	hypoleuca	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Elster	Pica	pica	2007	2017	()	1	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert	1
Kolkrabe	Corvus	corax	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Stieglitz, Distelfink	Carduelis	carduelis	1997	2001	2			Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Maulwurf	Talpa	europaea	1997	2007	2	2	**	Max. Ab2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Dachs	Meles	meles	2001	2017	1		5	Max. Ab2	Anhand der Spuren häufig festgestellt, aber Baue oft auch vom Fuchs bewohnt	2
SAMENPFLANZEN	Auswahl		2001						Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	1997					sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Milder Mauerpfeffer	Sedum	sexangulare	1997					lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1997					sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna = neumanniana	1997					lokal häufig	viele Fundorte	
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa	2007					lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort			
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	1997					lokal sehr häufig, bes. nahe Waldrand	viele Fundorte	
Mittlerer Klee	Trifolium	medium	1997					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Schopfiger Hufeisenklee	Hippocrepis	comosa	1997					lokal häufig	viele Fundorte	
Saat-Esparsette	Onobrychis	viciifolia	1997					1 Pflanze	viele Fundorte	
Schmalblättrige Wicke	Vicia	sativa ssp. nigra incl. angustifolia	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	Linum	catharticum	2001					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Tauben-Storchenschnabel	Geranium	columbinum	2001					vereinzelt	viele Fundorte	
Mandelblättrige Wolfsmilch	Euphorbia	amygdaloides	2007					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1997					lokal häufig, bes. am Waldrand	sehr viele Fundorte	
Knoblauchhederich, Lauchkraut	Alliaria	petiolata	2007					lokal sehr häufig am Waldrand und im Wald	viele Fundorte	
Rauhhaarige Gänsekresse	Arabis	hirsuta	1997					mässig häufig	viele Fundorte	
Wald-Schlüsselblume	Primula	elatior	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	1997					lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1997					vereinzelt	sehr viele Fundorte	
Immenblatt, Waldmelisse	Melittis	melissophyllum	1997					1 Pflanze am Waldrand	viele Fundorte	
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	1997					häufig	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	1997					mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1997					vereinzelt	sehr viele Fundorte	
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaea	2007					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	2001					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	Leontodon	hispidus	1997					sehr häufig	sehr sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

			erste letzte Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort			
Östlicher Wiesen-Bocksbart	Tragopogon	orientalis	1997				mässig häufig	viele Fundorte		
Langhaariges Habichtskraut	Hieracium	pilosella	1997				lokal häufig	viele Fundorte		
Weinberg-Lauch	Allium	vineale	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Feld-Hainsimse	Luzula	campestris	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Berg-Segge	Carex	montana	1997				häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte		
Frühlings-Segge	Carex	caryophyllea	2017				häufig	viele Fundorte, typisch für Magerrasen		
Taube Trespe	Bromus	sterilis	1997				lokal sehr häufig	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert		
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	Anthoxanthum	odoratum	2007				mässig häufig	viele Fundorte		
Gefleckter Aronstab	Arum	maculatum	2007				lokal häufig	viele Fundorte		