Waldrand und Wiese Paradiesli Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 634275 246500 Höhe ü. M.: 470 m Exposition: SE Strecke: 200 m Neigung: 10% 20%

	BP1 (1997 bis 2001)	BP2 (2007)	BP3 (2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	6	10	7	23
Beobachtungsdauer:	06 Std. 25 Min.	05 Std. 30 Min.	07 Std. 20 Min.	19 Std. 15 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:

Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:	097	146	141	445
Bewertete Taxa:	**324**	**150**	**097**	**324**

Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP
	133	615	279	1088
	919	579	227	919

Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
	1,37	4,27	1,98	2,44
	2,84	**3,86**	**2,34**	**2,84**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
WEICHTIERE			1997							
Wegschnecke Gattung	Arion	sp.	2001	2007	1	2		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Genabelte Strauchschnecke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Riemenschnecke	Helicodonta	obvoluta	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	**1**
Kartäuserschnecke	Monacha	carhusiana	2007	2007		2		Max. Ab2	häufig gefunden, kann lokal in grossen Massen auftreten, gilt nach Literatur als wenig häufig	**2**
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum. Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

( ) in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
& Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
* in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:
Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
GLIEDERFÜSSLER			1997							
SPINNENTIERE			1997							
Pseudoskorpion			2007	2007		1		Max. Ab1		
Streckerspinnen-Art	Tetragnatha	extensa	1997	1997	1			unsicher bestimmt	an Bächen mässig häufig gefunden, vermutlich aber häufig	
Herbstspinnen-Art	Metellina	segmentata	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	1
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	1997	2017	1	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	2007	2017		1	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1
Wolfsspinne Familie	(Lycosidae)	non det.	2007	2007		1	*	Max. Ab4	Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Tarantel , Wolfsspinne Gattung	Alopecosa	sp.	2007	2007		1	*	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Wolfsspinne Gattung	Pardosa	sp.	1997	1997	1		*	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	amentata	2007	2007		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 204	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	1997	1997	1		*	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 219	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	pullata	1997	1997	1		*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 498	1
Listspinne	Pisaura	mirabilis	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2017	2	3	3	Max. Ab5	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	audax	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 3	8
INSEKTEN			1997							
Libellen			1997							
Gebänderte Prachtlibelle	Calopteryx	splendens	1997	2007	1	1		Max. Ab1	Gattung an Flüssen und Bächen häufig gefunden	2
Heidelibelle Gattung	Sympetrum	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	
Grosse Heidelibelle	Sympetrum	striolatum	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Schaben										
Podas Waldschabe	Ectobius	sylvestris	2007	2017		1	1	Max. Ab2	häufig gefunden	**2**
Bernstein-Waldschabe	Ectobius	vittiventris	2001	2001	1			Max. Ab1	noch wenig häufig gefunden, aber vor allem im Siedlungsraum zunehmend häfiger	**4**
Heuschrecken			1997							
Punktierte Zartschrecke	Leptophyes	punctatissima	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	**2**
Grünes Heupferd	Tettigonia	viridissima	2007	2017		1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roeselii	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Gewöhnliche Strauchschrecke	Pholidoptera	griseoaptera	2001	2017	1	2	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	**1**
Feldgrille	Gryllus	campestris	1997	2017	2	1	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	**1**
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	2017	3	4	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	**1**
Rote Keulenschrecke	Gompho-cerippus	rufus	2007	2007		2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1997	2007	2	4		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	**1**
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2007	3	3		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	**1**
Wanzen										
Dunkler Dickwanst	Eusarcoris	fabricii	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	**8**
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	**1**
Schwarzrückige Gemüsewanze	Eurydema	ornatum	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	**4**
Leder- oder Randwanzen-Art	Coreus	marginatus	2007	2007		2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	**1**
Feuerwanze	Pyrrhocoris	apterus	2007	2007		3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	**1**
Bodenwanzen-Art	Rhyparochromus	vulgaris	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, vor allem in der Wohnung	**8**
Raubwanzen-Art	Rhinocoris	annulatus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**2**

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Weichwanzen-Art	Deraeocoris	ruber	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 74	**2**
Gleichflügler			1997							
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	1997	1997	1			Max. Ab1	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	**1**
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Netzflügler			1997							
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla	carnea	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	**1**
Käfer			1997							
Kurzflügelkäfer-Art	Quedius	cruentus	2017	2017			1	Max. Ab1		
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Weichkäfer-Art	Cantharis	livida	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	**2**
Ameisen-Buntkäfer	Thanasimus	formicarius	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	**4**
Prachtkäfer-Art	Anthaxia	salicis	2007	2007		2		Max. Ab1	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL selten: 6	**8**
Prachtkäfer-Art	Anthaxia	helvetica	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 27	**2**
Vierpunktprachtkäfer	Anthaxia	quadripunctata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden , in den Fallen der WSL mässig häufig: 51	**2**
Prachtkäfer-Art	Chrysobothris	affinis	2007	2007		1		Max. Ab2	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	**16**
Prachtkäfer-Art	Agrilus	biguttatus	2007	2007		1		Max. Ab1	**selten gefunden**	**16**
Prachtkäfer-Art	Agrilus	sulcicollis	2007	2007		1		Max. Ab2	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL selten: 5	**16**
Prachtkäfer-Art	Agrilus	angustulus	2007	2007		1		Max. Ab3	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL selten: 9	**16**
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Augenfleckiger Marienkäfer	Anatis	ocellata	2017	2017			1	Max. Ab1	**selten gefunden**	**16**
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
Kotkäfer-Art	Onthophagus	coenobita	2007	2007		1		Max. Ab1	**selten gefunden**	**16**
Blatthornkäfer-Art	Valgus	hemipterus	2007	2007		1		Max. Ab1	seit einigen Jahren in Ausbreitung, derzeit häufig gefunden	**2**
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Bissiger Zangenbock	Rhagium	mordax	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**4**
Gefleckter Schmalbock	Rutpela = Strangalia =	maculata	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	**1**
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	**1**
Rothaarbock	Pyrrhidium	sanguineum	2007	2007		2		Max. Ab2	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**16**
Buchen-Widdercock, Echter Widderbock	Clytus	arietis	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	**2**
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1997	1997	1			Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	**1**
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	1997	1997	1			Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	**1**
Querbindiger Fallkäfer	Cryptocephalus	morei	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	**8**
Bunter oder Prächtiger Blattkäfer	Chrysolina = Dlochrysa	fastuosa	2007	2017		2	2	Max. Ab2	häufig gefunden	**2**
Eselsdistel-Spitzmausrüssler	Ceratapion = Apion	onopordi	1997	1997	1			Max. Ab1	erst 2 Mal gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	**1**
Kleiner Bunter Eschenbastkäfer	Leperisinus	varius	2007	2007		1		Max. Ab1	selten gefunden, nicht inventarisiert	
Hautflügler			1997							
Keulenblattwespen-Art	Abia = Zaraea	mutica	2007	2007		1		Max. Ab1	**selten gefunden**	**16**
Blattwespe Gattung	Empria	sp.	2017	2017			1	Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	**4**
Weissgürtelige Rosensägewespe	Allantus	cinctus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 51	**4**
Blattwespen-Art	Tenthredo	brevicornis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**2**
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata = ligata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	**2**
Blattwespen-Art	Macrophya	ribis	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 15	**8**

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Brackwespe Unterfamilie	(Braconinae)	non det.	2007			3		Max. Ab2	Unterfamilie mässig häufig gefunden	
Brackwespe Gattung	Bracon	sp.	2007	2007		3		Max. Ab2	Gattung mässig häufig gefunden	4
Brackwespe Gattung	Aleiodes	sp.	2017	2017			1	Max. Ab1	Gattung wenig häufig gefunden	8
Brackwespe Gattung	Chelonus	sp.	2017	2017			1	Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4
Brackwespen-Art	Helcon	angustator	2007	2007		1		Max. Ab 2	mässig häufig gefunden, bes. an Holzstapeln	4
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	albiger s.str.	2017	2017			2	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Patrocloides = Patroclus	sputator	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Amblyteles	armatorius	2017	2017			2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Diphyus	quadripunctorius	2017	2017			2	Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Dirophanes	fulvitarsis	2017	2017			1	**1 von nur 2 Funden in der Region**	**erst 2 Mal gefunden**	32
Schlupfwespen-Art	Latibulus	argiolus	2007	2007		1		**1 von nur 2 Funden in der Region**	**erst 2 Mal gefunden**	32
Schlupfwespen-Art	Sphecophaga	vesparum	2007	2007		1		Max. Ab1	**selten gefunden**	16
Schlupfwespen-Art	Lissonota	cruentator = insignita	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Pimpla	spuria	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Xorides	praecatorius	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, parasitiert Totholz bewohnende Käfer	4
Erzwespe Ordnung	(Chalcidoidea)	non det.	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Erzwespen-Art	Cheiropachus	quadrum	2007	2007		1		**einziger Fund in der Region**	**erst 1 Mal gefunden**	64
Erzwespen-Art	Mesopolobus	amaenus	2007	2007		1		unsicher bestimmt	**erst 1 Mal gefunden**	
Erzwespe Gattung	Eurytoma	sp.	2007	2007		1		unsicher bestimmt	**Gattung selten gefunden**	
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Feuergoldwespe, Gemeine Goldwespe	Chrysis	ignita	2007	2007		2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 16, an Totholz	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Drüsenameise-Art	Dolichoderus (Hypoclinea)	quadripunctatus	2007	2007		1		Max. Ab1	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL selten: 3	**16**
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1997	2007	1	1	*	Max. Ab4	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	**1**
Gelbe Wegameise	Lasius	flavus	2007	2007		1	*	Max. Ab2	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL häufig: 495 Individuen	**1**
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1997	2007	1	1	*	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	**1**
Wiesen-Waldameise	Formica	pratensis	2007	2007		1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	**1**
Lehmwespen-Art	Allodynerus	rossi	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	**8**
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	nigricornis	2007	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 12	**2**
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	2007	2017		1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	**1**
Waldwespe	Dolichovespula	sylvestris	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	**2**
Sächsische Wespe	Dolichovespula	saxonica	2017	2017			2	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 11	**2**
Rote Wespe	Vespula	rufa	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 35	**2**
Deutsche Wespe	Vespula	germanica	2007	2017		1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 83	**1**
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	1997	2017	1	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	**1**
Wegwespen-Art	Dipogon	subinter- medius	2007	2007		1		Max. Ab1	**selten gefunden**, in den Fallen der WSL selten: 8	**16**
Tönnchen-Wegwespe	Auplopus	carbonarius	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 19	**4**
Wegwespen-Art	Agenioideus	cinctellus	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	**8**
Grabwespen-Art	Dolichurus	corniculus	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in Olten häufig, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	**8**
Holzbohrwespen-Art oder Töpfergrabwespe	Trypoxylon	figulus	2007	2007		2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	**4**
Grabwespen-Art	Psen (Mimumesa)	dahlbomi	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	**8**
Grabwespen-Art	Pemphredon	rugifera	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	**8**
Grabwespen-Art	Ectemnius (Clytochrysus)	lapidarius	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**2**

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Grabwespen-Art	Crossocerus (Coelocrabro)	annulipes = ambiguus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mäsig häufig: 27	4
Grabwespen-Art	Crossocerus (Coelocrabro)	cetratus	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 11	8
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communis	2007	2007		2		Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 26	2
Verkannnte Maskenbiene	Hylaeus	confusus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2
Gredlers Maskenbiene	Hylaeus	gredleri	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosae	2017	2017			1	Max. Ab1	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum	leucozonium	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	2007	2017		1	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauxillum	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1
Glanzlose Zergsandbiene	Andrena	subopaca	2007	2017		2		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	2
Gewöhnliche Zergsandbiene	Andrena	minutula	2007	2017		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Östliche Zangensandbiene	Andrena	fulvata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 242	2
Gewöhnliche Löcherbiene	Heriades	truncorum	2007	2017		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 15	2
Goldene Schneckenhausbiene	Osmia	aurulenta	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schwarzspornige Stängelbiene	Hoplitis = Osmia	leucomelana	2007	2007		2		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Frühlings-Pelzbiene	Anthophora	plumipes	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Gewöhnliche Keulenhornbiene	Ceratina	cyanea	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Wiesenhummel	Bombus	pratorum	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1997	2007	3	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2017	1	3	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus	hortorum	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	Bombus = Psithyrus	sylvestris	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1
Honigbiene	Apis	mellifera	1997	2017	4	6	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge			1997							
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Langfühlermotten-Art	Cauchas	rufimitrella	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Sackträger-Art	Proutia	betulina	2017	2017			1	Max. Ab2	**selten gefunden, R.Bas.: 4, 1**	8
Sackträger-Art	Psyche	casta	2007	2017		1	1	Max. Ab1	Säcke sehr häufig, männliche Falter aber selten gefunden, R.Bas.: 25, 95	1
Pfaffenhütchen-Gespinstmotte	Yponomeuta	cagnagella	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Palpenmotte Gattung	Syncopagma	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung wenig häufig gefunden	8
Spreizflügelfalter-Art	Anthophila	fabriciana	2001	2001	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Celypha	striana	2001	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Wickler-Art	Celypha	lacunana	2001	2017	1	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Wickler-Art	Epinotia	tenerana	2001	2001	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Wickler-Art	Cydia	fagiglandana	2001	2001	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	1997	2017	1	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Nesselzünsler	Pleuroptya	ruralis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, besonders an Brennnesseln	2
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	2017	5	5	2	Max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Karstweissling	Pieris	mannii	2017	2017	&		1	Max. Ab1	im August 2008 erstmals nachgewiesen, zur Zeit häufig, R.Bas.: 0, 0	2
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	2017	3	4	4	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	1997	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	crocea	1998	1998	1			Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2007	2017		1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Kleiner Eisvogel	Limenitis	camilla	2017	2017			2	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 31, 124	2
Tagpfauenauge	Inachis	io	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	Vanessa	atalanta	2007	2007		1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	1997	2017	1	3	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	Polygonia	c-album	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Kaisermantel	Argynnis	paphia	2017	2017			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531	1
Brombeer-Perlmutterfalter	Brenthis	daphne	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 41	4
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1997	2017	2	2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	2001	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
Mauerfuchs	Lasiommata	megera	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	1997	1997	2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Faulbaum-Bläuling	Celastrina	argiolus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris	semiargus	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Spanner-Art	Epirrhoe	alternata	1997	1997	1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1997	1997	1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Seideneulchen	Rivula	sericealis	1997	1997	1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 104	1
Eulenfalter-Art	Macdunnoughia	confusa	1997	1997	1			Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 16	2
Gammaeule	Autographa	gamma	1997	1997	1			Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Schnabelfliegen										
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa	germanica	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliche Skorpionsfliege	Panorpa	communis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zweiflügler			1997							
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. Tipula s.str.	paludosa	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1997	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	appendiculata	1997	2017	1		1	Max. Ab3	häufig gefunden	2
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	non det.	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Trauermücke Gattung	Sciara	sp.	2017	2017			1	Max. Ab2	Gattung mässig häufig gefunden, aber oft nicht beachtet	–
Johannismücke	Bibio	johannis	1997	2007	1	1		Max. Ab5	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Waffenfliegen-Art	Actina	chalybea	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Waffenfliegen-Art	Sargus	cuprarius	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	pluvialis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Raubfliegen-Art	Choerades	fimbriata	2007	2007		2		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Raubfliegen-Art	Tolmerus	atricapillus	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius	major	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius	discolor	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Trauersschweber-Art	Villa	cingulata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	1997	2017	1		1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Schwarzhaarige Wiesenschwebefliege	Epistrophe	nitidicollis	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus	balteatus	2007	2017		3	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1
Breitband- Feldschwebefliege	Eupeodes	latifasciatus	2007	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Feldschwebefliegen-Art	Eupeodes	luniger	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kurze oder Bogenader-Feldschwebefliege	Eupeodes	lapponicus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark	2
Späte Frühlingsschwebefliege, Gemeine Zartschwebefliege	Meliscaeva	cinctella	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 20	2
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	2017	2017			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus	vitripennis	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Frühe Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	festivum	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Späte Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	pedissequum	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Kahle oder Südliche Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	intermedium	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	1997	2017	1	3	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1
Europäische Breitfussschwebefliege	Platycheirus	europaeus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Gebänderte Waldschwebefliege, Gelbe Hummelschwebfliege	Volucella	inanis	2007	2017		1	1	Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Grosskopf-Zwiebelschwebe-fliege	Eumerus	ornatus	2007	2017		1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 12	4
Matte Faulschlammschwebefliege, Schwarze	Eristalinus	sepulchralis	2007	2017		1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Keilfleckschwebefliegen- Art	Eristalis	interrupta	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Grosse “Mistbiene”, Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2017	2	4	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebfliege	Helophilus	parallelus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	2007	2017	3	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Kleine “Mistbiene”, Gemeine Keulenschwebefliege, Gemeine	Syritta	pipiens	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Gemeine Langbauchschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnis	2007	2017		3	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	1
Goldhaar-Langbauchschwebefliege,	Xylota	sylvarum	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	2
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercoraria	2007	2007		1		Max. Ab5	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Stubenfliegen-Verwandte	Mesembrina	meridiana	2007	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis	1997	2017	2	4		Max. Ab5	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	
Stubenfliege Gattung	Neomyia = Orthellia	sp.	1998	1998	1		*	Max. Ab2	Gattung sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen	
Kaisergoldfliege	Lucilia	caesar	1997	1997	1			unsicher bestimmt	vermutlich sehr häufig, aber nur selten registriert	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1997	2017	2	1	1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1997	2007	2	3	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1997	2007	1	1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
WIRBELTIERE			1997							
Eidechse (nicht bestimmt)	Lacerta cf. Podarcis	non det.	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	
Mauereidechse	Podarcis	muralis	2007	2017		3	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Grünspecht	Picus	viridis	2007	2017		4	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Gartengrasmücke	Sylvia	borin	2001	2001		1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Trauerschnäpper	Ficedula	hypoleuca	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Waldbaumläufer	Certhia	familiaris	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Elster	Pica	pica	2017	2017	( )		3	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert	1
Gimpel, Dompfaff	Pyrrhula	pyrrhula	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren seltener	2
Maulwurf	Talpa	europaea	1997	1997	1		**	Max. Ab2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Fuchs	Vulpes	vulpes	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig festgestellt	2
SAMENPFLANZEN	**Auswahl**		2001						Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Stinkende Nieswurz	Helleborus	foetidus	2007					vereinzelt	viele Fundorte	
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	1997					häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte	
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	1997					sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	1997					mässig häufig, lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Walnussbaum	Juglans	regia	2007					mehrere Jungbäume am Waldrand	viele Fundorte	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	1997					häufig	sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Wald-Erdbeere	Fragaria	vesca	2007					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Feldrose	Rosa	arvensis	2007					1 Pflanze am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Kirschlorbeer	Prunus	laurocerasus	2007					1 junger Strauch am Waldrand	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Tauben-Storchenschnabel	Geranium	columbinum	2007					lokal häufig	viele Fundorte	
Schlitzblättriger Storchenschnabel	Geranium	dissectum	2007					lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Pfaffenhütchen	Euonymus	europaea	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Purgier-Kreuzdorn	Rhamnus	cathartica	2007					2 Pflanzen am Waldrand	viele Fundorte	
Aufrechte Wolfsmilch	Euphorbia	stricta	2007					lokal mässig häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Mandelblättrige Wolfsmilch	Euphorbia	amygdaloides	2001					lokal häufig, bes. am Waldrand	viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1997					lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	2007					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Veilchen	Viola	reichenbachiana = sylvestris	1997					lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wiesen-Schaumkraut	Cardamine	pratensis	1997					1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Pfennigkraut	Lysimachia	nummularia	2001					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte, aber meist nicht inventarisiert	
Singrün, Kleines Immergrün	Vinca	minor	1997					lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1997					vereinzelt	sehr viele Fundorte	
Tauben-Skabiose	Scabiosa	columbaria	1997					1 Pflanze	viele Fundorte	
Echtes Eisenkraut	Verbena	officinalis	2007					lokal häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	1997					sehr häufig in der Wiese	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	2007					häufig, bes. am Waldrand, lokal mässig häufig in der	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	1997					1 Pflanze	sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Wegwarte, Zichorie	Cichorium	intybus	2007					lokal sehr häufig in der Weide	viele Fundorte	
Östlicher Wiesen-Bocksbart	Tragopogon	orientalis	1997					mässig häufig	viele Fundorte	
Weinberg-Lauch	Allium	vineale	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Bärlauch	Allium	ursinum	2007					lokal häufig	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Rosslauch	Allium	oleraceum	2001					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Traubige Bisamhyazinthe	Muscari	racemosum	2007					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Gewöhnliche Schmerwurz	Tamus	communis	2007					1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
Aufrechte Trespe	Bromus	erectus	1997					sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Rot-Schwingel	Festuca	rubra	2007					lokal häufig	viele Fundorte registriert, wahrscheinlich sehr viele	
Gefleckter Aronstab	Arum	maculatum	2007					mässig häufig	viele Fundorte	