

Wiese westlich Golfplatz Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 632900 246500 Höhe ü. M.: 490 m Exposition: SW Fläche: 40 a Neigung: 0% 40%

	BP1 (1997)	BP2 (2007 und 2011)	BP3 (2016 und 2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	5	8	7	20
Beobachtungsdauer:	05 Std. 15 Min.	08 Std. 35 Min.	06 Std. 50 Min.	20 Std. 40 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:		135	266	157	558	218	403	232	853			1,61	1,52	1,48	1,53
Bewertete Taxa:		109	167	109	385	191	293	175	659			1,75	1,75	1,61	1,71

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------	------------------

WEICHTIERE

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
WEICHTIERE		1997					
Weitmündige Glanzschnecke	Aegopinella nitens	1997	2017	1 1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Genabelte Strauschnecke	Fruticicola = Bradybaena fruticum	1997	1997	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Seidenhaarschnecke oder Quendelschnecke (nicht bestimmt)	Trochulus = Trichia sericea cf. Candidula	1997	1997	2	Max. Ab2	häufig gefunden, wahrscheinlich meist T. sericea	2
Gemeine Heideschnecke	Helicella itala	1997	1997	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schwarzmündige Bänderschnecke	Cepaea nemoralis	2007	2016	1 1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
 Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

- Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
- Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
- Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
- Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
- Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
- Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
- Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
- Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

- () in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
- & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
- * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
- ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:
 Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
 Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997	2007	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3				
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
GLIEDERFÜSSLER			1997								
SPINNENTIERE			1997								
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(Phalangidae)	non det.	2007	2007		1	**	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert		
Herbstspinnen-Art	Metellina	segmentata	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	1	
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1	
Wolfsspinne Familie	(Lycosidae)	non det.	2007	2007		1	*	Max. Ab4	Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert		
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	Alopecosa	pulverulenta	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 585	1	
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	1997	2007	1	2	*	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 219	1	
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	pullata	2007	2007		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 498	1	
Listspinne	Pisaura	mirabilis	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1	
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2007	1	1		Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1	
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1	
KREBSTIERE											
Assel-Art	Philoscia	muscorum	2007	2007		1	*	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten häufig	4	
INSEKTEN			1997								
Steinfliegen											
Steinfliege Gattung	Nemoura	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden		
Libellen											
Blaugrüne Mosaikjungfer	Aeshna	cyanea	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2007	2007		2007	2007					
Ohrwürmer												
Gebüsch-Ohrwurm	Apterygida	media	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gemeiner Ohrwurm	Forficula	auricularia	2007	2007		2			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Heuschrecken												
Punktierte Zartschrecke	Leptophyes	punctatissima	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia	sp. J	1997	1997	1				Max. Ab1	Jungtiere häufig gefunden		
Grünes Heupferd (nur Stridulation)	Tettigonia	viridissima Gesang	1997	2007	2	1			Max. Ab1	sehr häufig gehört	1	
Zwitscherschrecke	Tettigonia	cantans	1997	2017	2	5	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Gewöhnliche Strauschschrecke	Pholidoptera	griseoptera	1997	2007	2	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Feldgrille	Gryllus	campestris	2007	2017		4	4		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1	
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	2016	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1	
Säbeldornschrecke	Tetrix	subulata	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Lauschschrecke	Mecostethus = Parapleurus	parapleurus = alliaceus	1997	2017	1	3	2		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren	1	
Grosse Goldschrecke	Chrysochraon	dispar	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Heidegrashüpfer	Stenobothrus	lineatus	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus	rufus	1997	2017	2	3	2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1997	2017	2	4	4		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Wiesengrashüpfer	Chorthippus	dorsatus	2016	2016			1		Max. Ab1	häufig gefunden, aber im Bezirk Thal selten	2	
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2017	2	5	4		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Wanzen												
Streifenwanze	Graphosoma	lineatum	2007	2007		1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2007	2007		BP1	BP2	BP3			
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	2007	2007			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Leder- oder Randwanzen-Art	Coreus	marginatus	2007	2007			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Glasflügelwanzen-Art	Corizus	hyoscyami	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Feuerwanze	Pyrrhocoris	apterus	2007	2007			2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1
Ritterwanzen-Art	Lygaeus	equestris	2007	2007			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Wiesenwanze	Lygus	pratensis	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 46	2
Gelbsaum-Zierwanze	Adelphocoris	seticornis	1997	2017	1		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	2
Gemeine Zierwanze	Adelphocoris	lineolatus	2007	2017			2	1	Max. Ab2	häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Weichwanzen-Art	Megaloceraea	recticornis	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2
Weichwanzen-Art	Leptopterna	dolobrata	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	1
Gleichflügler			1997								
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	1997	2007	1	1			Max. Ab2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus	spumarius	2011	2011			1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	2007	2017			1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schaumzikaden-Art	Lepyronia	coleoprata	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Blutzikaden-Art	Cercopis	vulnerata	1997	2007	1	2			Max. Ab3	häufig gefunden	2
Netzflügler											
Florfliegen-Art	Chrysopa	perla	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Käfer			1997								
Gemeiner Weichkäfer	Cantharis	fusca	1997	2007	1	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2017	2017		BP1	BP2	BP3			
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1997	2017	1	2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Weichkäfer-Art	Rhagonycha	limbata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Trichodes	alvearius	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	Athous	haemorrhoidalis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Glanzkäfer Gattung	Eपुरaea	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung selten gefunden, nicht inventarisiert		
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Marienkäfer-Art	Halyzia	sedecimguttata	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	1997	2017	1	3	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Bleicher Blütenbock (Schmalbock)	Pseudovadonia = Leptura	livida	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1	
Metallglänzender Distelbock	Agapanthia	violacea	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina	salina	1997	2007	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1997	2007	1	1		Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	1997	1997	1			Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Kleiner Weidenblattkäfer	Phratora = Phyllodecta Kirby	vitellinae	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, aber manchmal in grösserer Anzahl	8	
Kleiner Blattrüssler	Phyllobius	subdentatus = parvulus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2007	2007			BP1	BP2			
Weissdorn-Blattrüssler	Phyllobius	betulinus = betulae	2007	2007			1		Max. Ab2	häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig	2
Kurzzähniger Dickmaulrüssler	Otiorhynchus	subdentatus = pupillatus	2007	2007			1		Max. Ab1	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Einschätzung von Ch. Germann als häufig	2
Gewürfelter Staubrüßler, Würfelfleckrüßler	Liophloeus	tesselatus	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen, nach Lit. häufig	2
Hautflügler			1997								
Blattwespen-Art	Dolerus	picipes	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Blattwespen-Art	Monophadnus	pallescens	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 54	4
Blattwespen-Artkomplex	Tenthredo	marginella-Komplex	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, möglicherweise zwei verschiedene Arten	2
Blattwespe Artengruppe	Tenthredo	arcuata-Gruppe	1997	1997	1				Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Blattwespen-Art	Tenthredo	arcuata	2007	2007			4		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	brevicornis	2007	2007			1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata = ligata	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2
Blattwespen-Art	Macrophya	montana	1997	1997	1				Max. Ab2	häufig gefunden	2
Brackwespen-Art	Macrocentrus	nidulator	2007	2007			1		Max. Ab1	selten gefunden	16
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	2007	2007			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Sussaba	erigator	2007	2007			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schmalbauchwespe Gattung	Gasteruption	sp.	2007	2007			1		Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Goldwespen-Art	Chrysis	viridula	1997	1997	1				Max. Ab1	selten gefunden , in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	16
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1997	1997	1		*		Max. Ab3	sehr häufig gefunden in den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1997	2007	2	1	*		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1
Blutrote Raubameise	Formica	sanguinea	1997	1997	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Pillenwespen-Art	Eumenes	coronatus	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		1997	2011		BP1	BP2	BP3			
Französische Feldwespe	Polistes dominulus	1997	2011		1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Deutsche Wespe	Vespula germanica	2011				1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 83	1
Gemeine Wespe	Vespula vulgaris	2007	2016			2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Gescheckte Wegwespe	Dipogon variegatum	2007	2007			1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	8
Wegwespen-Art	Arachnospila spissa	1997	1997		1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 70	2
Grabwespen-Art	Gorytes (s.s.) quadrifasciatus	1997	1997		1			Max. Ab1	selten gefunden	16
Grabwespen-Art	Gorytes (s.s.) quinquecinctus	1997	1997		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Grabwespen-Art	Ectemnius (Metacrabro) lituratus	1997	2017		1	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Hypocrabro) continuus	1997	1997		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Hypocrabro) rubicola	1997	1997		1			Max. Ab2	wenig häufig gefunden	8
Grabwespen-Art	Ectemnius (s.str.) dives	1997	1997		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	4
Grabwespen-Art	Ectemnius (s.str.) borealis = nigrinus	2007	2007			1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8
Silbermundwespen-Art (Grabwespe)	Lestica clypeata	1997	1997		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus communis	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 26	2
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus confusus	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2
Rotbeinige Furchenbiene	Halictus rubicundus	2011	2011			1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	2
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus simplex	2007	2017			1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Langobarden-Furchenbiene	Halictus langobardicus	2017	2007				1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, war bis vor wenigen Jahren noch selten	4
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus tumulorum	2007	2017			2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum leucozonium	2007	2017			3	1	Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Breitbindige Schmalbiene	Lasioglossum zonulum	2007	2017			1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 5	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Anz. Ereignisse						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2			
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum calceatum	1997	2017	2	3	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1	
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum malachurum	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 76	2	
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum laticeps	1997	2011	1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1	
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum pauxillum	2007	2017		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1	
Dickkopf-Schmalbiene	Lasioglossum glabriusculum	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum villosulum	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1	
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum morio	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 93	1	
Rostfarbene Blutbiene	Sphecodes ferruginatus	1997	2017	1	1	2	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	
Schwarze Blutbiene	Sphecodes niger	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Zweifarbige Sandbiene	Andrena bicolor	2007	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	2	
Glänzende Düstersandbiene	Andrena nitida	1997	2007	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 129	2	
Weisse Bindensandbiene	Andrena gravida	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 35	2	
Ovale Klee-Sandbiene	Andrena ovatula	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Zwerg- oder Kurzfransige Scherenbiene	Chelostoma campanularum	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	2	
Langfransige Scherenbiene	Chelostoma distinctum	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4	
Zweifarbige Schneckenhausbiene	Osmia bicolor	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Bunte Blattschneiderbiene	Megachile versicolor	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Feld-Wespenbiene	Nomada goodeniana = succincta	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2	
Wiesen-Wespenbiene	Nomada marshamella	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gelbe Wespenbiene	Nomada flava	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2	
Rauhfüssige Wespenbiene	Nomada hirtipes	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997	2007	2017	BP1	BP2	BP3			
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	1997	2017		1	2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum	2007	2011			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1
Wiesenhummel	Bombus	pratorum	2007	2007			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1997	2017		1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2017		3	3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	2007	2017			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus	hortorum	2007	2007			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Rotschwarze oder Felsen-Kuckuckshummel	Bombus = Psithyrus	rupestris	2017	2017				1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Honigbiene	Apis	mellifera	1997	2017		4	8	5	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge			1997								
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	1997	2011		2	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Sackträgermotten-Art	Coleophora	frischella	2007	2007			1		unsicher bestimmt	erst 2 Mal gefunden	
Schlupfwespen-Glasflügler	Bembecia	ichneumoni-formis	2017	2017				1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 10, 5	4
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	1997	2017		1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
Wickler-Art	Aethes	hartmanniana	1997	2007		1	1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Wickler-Art	Celypha	striana	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Wickler-Art	Celypha	lacunana	1997	1997		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wickler-Art	Dichrorampha	aeratana	1997	1997		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Kleinschmetterling Familie	(Epermeniidae)	non det.	1997	1997		1			Max. Ab1	Familie erst 1 Mal gefunden	
Skabiosen-Federgeistchen	Stenoptilia	bipunctidactyla	2007	2007			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	1997	2017		1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1997	2007	1	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	1997	2017	1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	2011	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	1997	2017	1	3	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2007	2017		3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega	pandalis	1997	2017	1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	1
Roter Würfelfalter	Spialia	sertorius	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438	1
Kleiner Nördlicher Würfelfalter	Pyrgus	malvae	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 338	2
Zweibrütiger Würfelfalter	Pyrgus	armoricanus	2016	2016			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 12, 104	2
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	2017	3	6	3	Max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	2007	2017		4	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1997	2017	1	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	2017	2	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	crocea	2007	2017		1	1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2007	2017		1	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Grosser Fuchs	Nymphalis	polychloros	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 33	4
Admiral	Vanessa	atalanta	2016	2016			1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	Polygonia	c-album	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Kaisermantel	Argynnis	paphia	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531	1
Hainveilchen-Perlmutterfalter	Boloria = Clossiana	dia	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 22, 977	2
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1997	2017	1	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1997	2017	1	3	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1997	2017	2	4	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria	2007	2007		1		Max. Ab1	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megea	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Kleiner Feuerfalter	Lycaena	phlaeas	2007	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 88	2
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	1997	2017	2	3	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Kurzschwänziger Bläuling	Cupido	argiades	2017	2017	&		1	Max. Ab1	häufig gefunden, erst vor wenigen Jahren wieder in der Schweiz nördlich der Alpen,	2
Südlicher Kurzschwänziger Bläuling	Cupido	alcetas	2017	2017	&	&	2	Max. Ab1	selten gefunden, erst seit kurzem in der Schweiz nördlich der Alpen	8
Faulbaum-Bläuling	Celastrina	argiolus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	Aricia	agestis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 27, 250	2
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris	semiargus	1997	2017	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Silbergrüner Bläuling	Polyommatus = Lysandra	coridon	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416	1
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra	bellargus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1997	2017	3	5	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Marmorierter Kleinspanner	Scopula	immorata	1997	2011	2	1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1
Spanner-Art	Epirrhoe	tristata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 14, 122	2
Spanner-Art	Epirrhoe	alternata	2017	2017			1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Klee-Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa	clathrata	1997	2017	1	2	2	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1
Heidespanner	Ematurga	atomaria	2007	2017		1	1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1
Rotrandbär	Diacrisia	sannio	2007	2017		1	1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 45	2
Russischer Bär, Spanische Flagge	Euplagia	quadripunctaria	2017	2017			1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 25, 118	2
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1997	2017	2	4	2	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Seideneulchen	Rivula	sericealis	2007	2007		2		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 104	1
Eulenfalter-Art	Hypena	proboscidalis	2007	2007		1		Max. Ab1	am Tag schlafende Falter mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 44	4
Messingeulen-Art	Diachrysia	chrysitis	2007	2007		1		Max. Ab1	am Tag erst 8 Falter gefunden, R.Bas.: 11, 9	16
Gammaeule	Autographa	gamma	1997	2017	1	1	2	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Eulenfalter-Art	Panemeria	tenebrata	1997	1997	1			Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 2, 8	2
Weissfleckige Schilfgraseule	Mythimna	albipuncta	2007	2007		1		Max. Ab1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 81	4
Schnabelfliegen										
Gewöhnliche Skorpionsfliege	Panorpa	communis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa	vulgaris	1997	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	
Zweiflügler										
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1997	2007	1	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	flavescens	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Johannismücke	Bibio	johannis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3			
Raubfliegen-Art	Tolmerus atricapillus	1997	2016	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius major	1997	2007	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis tesselata	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis livida	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Blaue Breitbandschwebefliege	Ischyrosyrphus glaucius	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria scripta	1997	2017	1	3	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus ribesii	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma mellinum	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1
Graue oder Schwarze Breitfusschwebefliege	Platycheirus albimanus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella viduata	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Weissfuss-Erzswebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia albitarsis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Bärtige Erzswebefliege Illustrata-Gruppe	Cheilosia barbata	1997	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia campestris	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Schwebefliegen-Art	Orhonevra nobilis	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Gelbband- Torfschwebefliege	Sericomyia silentis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Keilfleckschwebefliegen- Art	Eristalis interrupta	1997	2007	2	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis jugorum	1997	2017	2	2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis pertinax	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis tenax	1997	2017	2	5	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebefliege	Helophilus parallelus	1997	2007	1	1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Gemeine Sumpfschwebefliege, Gemeine Sonnenschwebefliege	Helophilus pendulus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997	2017								
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	1997	2017	1	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1	
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebefliege, Gemeine	Syritta	pipiens	2017	2017			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Dickkopffliegen-Art	Physocephala	rufipes	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Dickkopffliegen-Art	Conops	flavipes	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Dickkopffliegen-Art	Conops	scutellatus	2017	2017			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atra	2007	2007		1			unsicher bestimmt	unsicher bestimmt		
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	distincta	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercoraria	2017	2017			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert		
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis	2017	2017			1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert		
Kaisergoldfliege	Lucilia	caesar	1997	1997	1				unsicher bestimmt	vermutlich sehr häufig, aber nur selten registriert		
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	2007	2007		1	**		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1	
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1997	1997	1				Max. Ab3	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Raupenfliegen-Art	Gymnosoma	rotundatum	2017	2017			1		Max. Ab1	bis etwa 2013 nur selten auf die Art bestimmt, sehr häufig	1	
Raupenfliegen-Art	Ectophasia	crassipennis	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Raupenfliegen-Art	Cylindromyia = Ocyptera	brassicaria	2007	2017		1	1		Max. Ab1	unsicher bestimmt	2	
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	magnicornis	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
WIRBELTIERE			1997									
Zauneidechse	Lacerta	agilis	1997	2007	1	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)	1	
Schwarzer Milan (Schwarzmilan)	Milvus	migrans	2007	2007		1			Max. Ab2	häufig beobachtet	2	
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2007	2007		2			Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1	
Turmfalke	Falco	tionnunculus	2017	2017			2		Max. Ab1	häufig beobachtet	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Grünspecht	Picus	viridis	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Schwarzspecht	Dryocopus	martius	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Misteldrossel	Turdus	viscivorus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Trauerschnäpper	Ficedula	hypoleuca	1997	2007	1	1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2	
Schwanzmeise	Aegialus	caudatus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2	
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactyla	2007	2017		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Elster	Pica	pica	2007	2017	()	2	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert	1	
Maulwurf	Talpa	europaea	2007	2007		1	**	Max. Ab2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1	
Schermaus	Arvicola	terrestris	1997	2007	1	4	**	Max. Ab3	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1	
Mauslöcher	(Mauslöcher)	non det.	2007	2007		3	**	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Wildschwein	Sus	scrova	2007	2007		2		Max. Ab3	anhand der Spuren zunehmend häufiger festgestellt	2	
MOOSE	Auswahl								Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrasen sind registriert		
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	1997					sehr häufig, bes. an der Bäschung	viele Fundorte		
SAMENPFLANZEN	Auswahl								Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen		
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	1997					lokal mässig häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte		
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	2007					lokal mässig häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte		
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1997					häufig	sehr viele Fundorte		
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	1997					lokal häufig	sehr viele Fundorte		
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna = neumanniana	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia	cracca	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3								
Gelbfrüchtiger Kälberkopf	Chaerophyllum	aureum	2007								lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Grosse Bibernelle	Pimpinella	major	1997								1 Pflanze	viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert	
Wilde Brustwurz	Angelica	sylvestris	1997								1 Pflanze am Waldrand	viele Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2007								vereinzelt, lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia	verrucosa	1997								lokal häufig, bes.. am Waldrand	viele Fundorte	
Zypressen-Wolfsmilch	Euphorbia	cyparissias	2007								lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Lorbeer-Seidelbast	Daphne	laureola	2007								vereinzelt am Waldrand	viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1997								häufig, bes. an der Böschung	sehr viele Fundorte	
Wald-Veilchen	Viola	reichenbachiana = sylvestris	2007								lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wiesen-Schaumkraut	Cardamine	pratensis	2007								2 Pflanzen am Waldrand	sehr viele Fundorte	
Wilde Malve	Malva	sylvestris	2007								lokal mässig häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Primel, Stengellose Schlüsselblume	Primula	vulgaris	2017								1 Pflanze am Waldrand	mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert	
Wald-Schlüsselblume	Primula	elatior	2007								lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	1997								vereinzelt, lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Grossblumige Sternmiere	Stellaria	holostea	1997								lokal mässig häufig, bei Nachkontrolle am 28. 4.	sehr wenig Fundorte	
Gewöhnliches Leimkraut	Silene	vulgaris vulgaris	2007								lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Waldmeister	Galium	odoratum	2007								lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Zwerg-Holunder, Attich	Sambucus	ebulus	2007								lokal häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1997								lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Vergissmeinnicht	Myosotis	sylvatica	2007								lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Schuppenwurz	Lathraea	squamaria	2007								3 Pflanzen auf Holzmulm am Waldrand	sehr wenig Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2			
Berg-Goldnessel	Lamium = Lamiastrum	galeoptolon montanum	2007				vereinzelt	viele Fundorte	
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	1997				sehr häufig, bes. an der Böschung	viele Fundorte	
Wald-Bergminze = Echter Bergthymian	Calamintha	menthifolia = sylvatica	1997				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	1997				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	1997				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1997				häufig	sehr viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	1997				häufig	sehr viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	Leontodon	hispidus	1997				mässig häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Langhaariges Habichtskraut	Hieracium	pilosella	1997				häufig	viele Fundorte	
Herbstzeitlose	Colchicum	autumnale	2007				lokal häufig	viele Fundorte	
Weinberg-Lauch	Allium	vineale	1997				häufig am Waldrand., lokal mässig häufig in der Wiese	viele Fundorte	
Bärlauch	Allium	ursinum	2007				lokal sehr häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Rosslauch	Allium	oleraceum	1997				1 Pflanze	viele Fundorte	
Vielblütige Weisswurz	Polygonatum	multiflorum	2007				lokal häufig am Waldrand	im Wald viele Fundorte	
Vierblättrige Einbeere	Paris	quadrifolia	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert	
Feld-Hainsimse	Luzula	campestris	1997				mässig häufig	viele Fundorte	
Berg-Segge	Carex	montana	1997				mässig häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Frühlings-Segge	Carex	caryophyllea	1997				sehr häufig	viele Fundorte, typisch für Magerrasen	
Gefingerte Segge	Carex	digitata	2007				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Aufrechte Trespe	Bromus	erectus	1997				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Nickendes Perlgras	Melica	nutans	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

erste letzte Anz. Ereignisse Bemerkungen zur Art
Beobachtung BP1 BP2 BP3 am Beobachtungsort

Bemerkungen zur Art in der Region

Deutsche Namen

Wissenschaftliche Namen

Ruchgras, Wohlriechendes
Geruchgras

Anthoxanthum odoratum

2007

sehr häufig

viele Fundorte

Gefleckter Aronstab

Arum maculatum

2007

lokal mässig häufig am
Waldrand

viele Fundorte