Wiese südlich Luegisland Luegisland Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 635025 246275 Höhe ü. M.: 460 m Exposition: SE Fläche: 50 a Neigung: 20% 50%

	BP1 (1997)	BP2 (2007 und 2011)	BP3 (2016 und 2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	6	7	7	20
Beobachtungsdauer:	10 Std. 30 Min.	11 Std. 10 Min.	06 Std. 45 Min.	28 Std. 25 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:		207	249	155	600		276	393	261	930		1,33	1,58	1,68	1,55
Bewertete Taxa:		129	160	100	326		206	291	102	623		1,60	1,82	2,02	1,91

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------

WEICHTIERE

			1997												
Genabelte Strauchschncke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	1997	2017	1	3	1	Max. Ab2		sehr häufig gefunden					1
Kartäuserschncke	Monacha	carhusiana	2007	2011		2		Max. Ab4		häufig gefunden, kann lokal in grossen Massen auftreten, gilt nach Literatur als wenig häufig					2
Seidenhaarschncke	Trochulus = Trichia	sericeus	1997	2017	1		*	Max. Ab1		sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig					1
Weinbergschncke	Helix	pomatia	2007			2	1	Max. Ab1		sehr häufig gefunden					1
			1997												

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
 Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

- Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
- Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
- Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
- Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
- Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
- Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
- Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
- Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

- () in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
- & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
- * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
- ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:
 Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
 Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
GLIEDERFÜSSLER			1997		1					
SPINNENTIERE			1997		1					
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	1997	2017	1	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1
Wespenspinne, Zebraspinne	Argiope	bruennichi	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	hortensis	1997	1997	1		*	Max. Ab2	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	2
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	1997	2011	1	1		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1
Baldachinspinnen-Art	Microlinyphia	pusilla	1997	1997	1		*	unsicher bestimmt	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	
Wolfsspinne Familie	(Lycosidae)	non det.	2007	2007		1	*	Max. Ab3	Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	Alopecosa	aculeata	1997	1997	1		*	unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden	
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	Alopecosa	cuneata	2007	2007		1	*	unsicher bestimmt	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 216	2
Wolfsspinne Gattung	Pardosa	sp.	1997	1997	1		*	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	1997	2007	3	1	*	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 219	1
Wolfsspinnen-Artkomplex	Pardosa	lugubris- Komplex	2007	2007		2	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 1571	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	pullata	2007	2007		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 498	1
Wolfsspinnen-Art	Trochosa	terricola	2007	2007			*	Max. Ab3	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 1037	1
Listspinne	Pisaura	mirabilis	1997	2017	3	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2017	2	4	2	Max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Grüne Krabbenspinne	Diaea	dorsata	1997	1997	1		*	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 2 Individuen	4
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	1997	2017	2		2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1
Krabbenspinne Gattung	Xysticus	sp.	2007	2007		1	*	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
			1997							

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	Anz. Ereignisse BP2	Anz. Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
INSEKTEN			1997		1					
Libellen			1997		1					
Blaugrüne Mosaikjungfer	Aeshna	cyanea	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	1
Schaben										
Bernstein-Waldschabe	Ectobius	vittiventris	2007	2007		1		Max. Ab1	noch wenig häufig gefunden, aber vor allem im Siedlungsraum zunehmend häufiger	4
Heuschrecken			1997		1					
Gemeine Sichelschrecke	Phaneroptera	falcata	2007	2017		3	2	Max. Ab3	früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen und häufig	2
Punktierte Zartschrecke	Leptophyes	punctatissima	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia	sp. J	1997	2017	1		1	Max. Ab2	Jungtiere häufig gefunden	
Grünes Heupferd (nur Stridulation)	Tettigonia	viridissima Gesang	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gehört	1
Zwischerschrecke	Tettigonia	cantans	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliche Strauschschrecke	Pholidoptera	griseoptera	1997	2017	3	4	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Feldgrille	Gryllus	campestris	1997	2017	4	3	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus	rufus	1997	2016	2	4	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Feld-Grashüpfer	Chorthippus	apricarius	1997	1997	1			Max. Ab12	häufig gefunden	2
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1997	2017	2	3	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2017	3	4	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Wanzen			1997							
Streifenwanze	Graphosoma	lineatum	2007	2011		3		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Baumwanzen-Art	Carpocoris	fuscispinus	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	2011	2011		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Leder- oder Randwanzen-Art	Coreus	marginatus	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Feuerwanze	Pyrrhocoris	apterus	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1
Rotrückiger Irrwisch	Alydus	calcaratus	2011	2011		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Bodenwanzen-Art	Rhyparochromus	pinii	2007	2007		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 32	4
Raubwanzen-Art	Rhinocoris	annulatus	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Weichwanzen-Art	Deraeocoris	ruber	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 74	2
Weichwanzen-Art	Stenodema	laevigatum	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 42	2
Weichwanzen-Art	Notostira	elongata	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	4
Gleichflügler											
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus	spumarius	2016	2016			1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	2007	2007		2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Schaumzikaden-Art	Lepyronia	coleoprata	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Blutzikaden-Art	Cercopis	vulnerata	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Netzflügler											
Ameisenjunger-, -löwen-Art	Myrmeleon	formicarius	2007	2007		2			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Käfer											
Feld-Sandläufer	Cicindela	campestris	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Kurzflügelkäfer-Art	Quedius	nigrocoeruleus	2016	2016			1		Max. Ab1	selten gefunden	16
Grosser Blasenkäfer	Malachius	aeneus	2007	2007		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Grüner Warzenkäfer	Malachius	viridis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Trichodes	alvearius	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia	nitidula	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 117	2	
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1997	2007	3	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Marienkäfer-Art	Harmonia	axyridis	2007	2017	&	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig	2	
Zweiundzwanzigpunkt	Thea	vigintiduo-punctata	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Echter Schenkelkäfer	Oedemera	podagrariae	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	2007	2007		2		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	2007	2007		2		Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	brevicauda	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Purzelkäfer-Art	Hoplia	philanthus	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Rosenkäfer-Verwandter	Oxythyrea	funestra	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, aber in starker Zunahme begriffen	8	
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gefleckter Schmalbock	Rutpela = Strangalia =	maculata	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	1	
Kleiner Eichenbock, Buchenbock, Kleiner Spiessbock	Cerambyx	scopolii	2007	2007		1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Roter Spitzdeckenbock	Stenopterus	rufus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Buchen-Widdercock, Echter Widderbock	Clytus	arietis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	2	
Rothalsiges Getreidehähnchen	Oulema	melanopus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, hier handelt es sich um zwei sehr ähnliche Arten	1	
Zweifleckiger Fallkäfer	Cryptocephalus	biguttatus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1997	2017	1		1	Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	1997	2017	2	3	1	Max. Ab3	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	violaceus	2007	2007		1		Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Schneeballblattkäfer	Pyrrhalta	viburni	1997	1997	2			Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Weissdorn-Blattrüssler	Phyllobius	betulinus = betulae	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig	2
Hautflügler			1997		1					
Bürstenhornblattwespen-Art	Arge	melanochroa	2007	2007		1		Max. Ab2	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Monophadnus	spinolae	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8
Blattwespen-Art	Tenthredo	brevicornis	2011	2011		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Blattwespen-Art	Macrophya	montana	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Brackwespe Gattung (Puppenkokon)	Apanteles	sp. (Puppen kokon)	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Brackwespe Gattung	Chelonus	sp.	2017	2017			1	Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	bucculentus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Patrocloides = Patroclus	sputator	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Amblyteles	armatorius	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Amblyjoppa	fuscipennis	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Ischnus	inquisitorius	2007	2007		1		Max. Ab1		8
Sichelwespen-Art	Erigorgus	cerinops	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Lagarotis	debitor	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Rollwespe	Tiphia	femorata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1997	2007	3	1	*	Max. Ab3	sehr häufig gefunden in den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3			
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica cunicularia	1997	1997	3		*	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1
Zweifarbige Sklavenameise	Formica rufibarbis	1997	1997	2		*	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 89	1
Pillenwespen-Art	Eumenes subpomiformis	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus claripennis	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus gazella	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Französische Feldwespe	Polistes dominulus	1997	2017	1	1	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Deutsche Wespe	Vespula germanica	1997	2011	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 83	1
Gemeine Wespe	Vespula vulgaris	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Holzbohrwespen-Art oder Töpfergrabwespe	Trypoxylon figulus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Grabwespen-Art	Pemphredon lethifera	2007	2011		2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Grabwespen-Art	Ectemnius (s.str.) dives	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	4
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus confusus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2
Gredlers Maskenbiene	Hylaeus gredleri	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus scabiosae	2007	2017		2	2	Max. Ab4	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus simplex	1997	2017	2	3	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Langobarden-Furchenbiene	Halictus langobardicus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, war bis vor wenigen Jahren noch selten	4
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus tumulorum	1997	2007	2	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum leucozonium	1997	1997	2			Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum calceatum	1997	2017	2		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum malachurum	1997	2007	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 76	2
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum laticeps	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		1997	2016		BP1	BP2	BP3			
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum pauxillum	1997	2016		2	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum fulvicorne	1997	1997		1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 45	2
Dickkopf-Schmalbiene	Lasioglossum glabriusculum	2007	2011			2		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum villosulum	1997	2016		3	2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1
Rostfarbene Blutbiene	Sphecodes ferruginatus	1997	2007		1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Glanzrücken Zergsandbiene	Andrena minutuloides	2007	2007			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Gewöhnliche Dörnchensandbiene	Andrena humilis	1997	1997		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Östliche Zangensandbiene	Andrena fulvata	1997	1997		2			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 242	2
Glänzende Düstersandbiene	Andrena nitida	1997	1997		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 129	2
Weisse Bindensandbiene	Andrena gravida	1997	1997		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 35	2
Gelbbeinige Kieselsandbiene	Andrena chrysoceles	1997	1997		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Glockenblumen- Sägehornbiene	Melitta haemorrhoidalis	2017	2017				1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Rote Mauerbiene	Osmia bicornis = rufa	2017	2017				1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen	1
Blaugrüne Mauerbiene	Osmia caerulescens	2007	2007			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	4
Goldene Schneckenhausbiene	Osmia aurulenta	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Röttliche Kegelbiene	Coelioxys rufescens	1997	1997		1			Max. Ab1	selten gefunden	16
Frühlings-Pelzbiene	Anthophora plumipes	1997	1997		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Mai-Langhornbiene	Eucera nigrescens = tuberculata	1997	2017		2	1	1	Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Blauschwarze Holzbiene	Xylocopa violacea	2007	2007			1		unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden	
Gewöhnliche Keulenhornbiene	Ceratina cyanea	2017	2017				1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Feld-Wespenbiene	Nomada goodeniana = succincta	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Rotschwarze Wespenbiene	Nomada	fabriciana	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1997	2017	3	3	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2017	4	4	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	1997	2017	3	3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus	hortorum	1997	2007	2	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	Bombus = Psithyrus	barbutellus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Bombus = Psithyrus	campestris	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1
Rotschwarze oder Felsen-Kuckuckshummel	Bombus = Psithyrus	rupestris	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gefleckte oder Keusche Kuckuckshummel (der Dunklen)	Bombus = Psithyrus	vestalis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, hat in den letzten Jahren zugenommen	4
Honigbiene	Apis	mellifera	1997	2017	3	5	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge			1997							
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	1997	2017	1	3	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Sackträger-Art	Psyche	casta	2007	2007		1		Max. Ab1	Säcke sehr häufig, männliche Falter aber selten gefunden, R.Bas.: 25, 95	1
Pfaffenhütchen-Gespinstmotte	Yponomeuta	cagnagella	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	1997	2017	1	3	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
Wickler-Art	Aethes	hartmanniana	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Wickler-Art	Celypha	striana	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Wickler-Art	Ancylis	badiana	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Skabiosen-Federgeistchen	Stenoptilia	bipunctidactyla	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997	2017		BP1	BP2	BP3			
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	1997	2017	1	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Seerosenzünsler	Elophila	nymphaeata	2007	2007		1		Max. Ab1	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden, hier oft in grosser Zahl	4	
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	2007	2011		2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2007	2017		5	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Zünsler-Art	Paracorsia	repandalis	2017	2017			1	Max. Ab1	selten gefunden	16	
Buchsbaum-Zünsler	Cydalima = Diaphania	perspectalis	2016	2016			1	Max. Ab1	bis jetzt noch mässig häufig gefunden, Neozoon, breitet sich seit wenigen Jahren aus	4	
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2007	2007		1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1	
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	2017	2017			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1	
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	1	
Roter Würfelfalter	Spialia	sertorius	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438	1	
Roter Würfelfalter	Spialia	sertorius	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438	1	
Schwalbenschwanz	Papilio	machaon	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1	
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	2017	5	4	6	Max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert		
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	2017	2017			3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1	
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae	1997	2017	1	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1	
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	2007	2017		3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1	
Karstweissling	Pieris	mannii	2011	2016	&	1	1	Max. Ab2	im August 2008 erstmals nachgewiesen, zur Zeit häufig, R.Bas.: 0, 0	2	
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	2017	2	2	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1	
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1	
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	crocea	2007	2007		1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis	1997	2017	1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Kleiner Eisvogel	Limenitis	camilla	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 31, 124	2
Tagpfauenauge	Inachis	io	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	1997	2017	2		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	Polygonia	c-album	2007	2007		1		von weitem unsicher bestimmt	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	
Brombeer-Perlmutterfalter	Brenthis	daphne	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 41	4
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	2017	2017			2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1997	2017	2	1	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1997	2017	3	1	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megeera	1997	2011	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Nierenfleck, Birken-Zipfelfalter	Thecla	betulae	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 68	2
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	1997	2017	2		3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris	semiargus	1997	2011	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Esparssetten-Bläuling	Polyommatus = Plebicula	thersites	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 16, 102	2
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra	bellargus	2017	2017			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1997	2017	3	3	4	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Marmorierter Kleinspanner	Scopula	immorata	1997	1997	1			Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1
Braunrandiger Zwergspanner	Idaea	humiliata	2007	2007		2		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 338	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3				
Spanner-Art	Scotopteryx chaenopodiata	1997	1997	1				Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 155	1
Spanner-Art	Epirrhoe alternata	1997	2017	2	1	3		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Klee-Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa clathrata	1997	1997	2				Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1
Heidespanner	Ematurga atomaria	1997	2007	3	3			Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1
Braune Tageule	Euclidia glyphica	1997	17	2	3	3		Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Eulenfalter-Art	Macdunnoughia confusa	1997	2017	1	1	1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 16	2
Gammaeule	Autographa gamma	1997	1997	1				Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Gemeine Graseule	Agrotis exclamationis	1997	1997	1				Max. Ab1	am Tag mässig häufig gefunden und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 24, 108	2
Schnabelfliegen		1997								
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa germanica	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Skorpionsfliege (nicht genau bestimmt)	Panorpa vulgaris cf. communis	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa vulgaris	1997	1997	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Zweiflügler		1997								
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula vernalis	1997	2017	2	1	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma appendiculata	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae) non det.	2007	2017		2	2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius major	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius cinerascens	2007	2007		1			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Trauerschweber-Art	Hemipenthes maurus	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Tanzfliegen-Art	Empis tesselata	2017	2017			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis confusa	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Gemeine Winter- oder Parkswebfliege	Episyrphus	balteatus	1997	2007	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1
Gemeine Feldschwebefliege	Eupeodes	corollae	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta	1997	2017	2	2	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Kugelträger-Art (Schwebefliege)	Sphaerophoria	taeniata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus	vitripennis	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Zweiband- Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	bicinctum	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Kahle oder Südliche Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	intermedium	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	1997	2017	2	4	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1
Schmale Breitfusschwebefliege	Platycheirus	angustatus	2017	2017			1	Max. Ab1	selten gefunden	16
Europäische Breitfusschwebefliege	Platycheirus	europaeus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Zwergschwebfliege Gattung	Pipizella	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	1997	2007	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Weissfuss-Erzschwebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Trüffel-Erzschwebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	rufipes = soror	2007	2007		1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Frühlings- oder Aster-Erzschwebefliege Bergenstammi-	Cheilosia	vernalis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	1997	2017	2	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Gebänderte Waldschwebefliege, Gelbe Hummelschwebfliege	Volucella	inanis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kleine Bienenschwebefliege	Eristalis	arbustorum	1997	2016	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Keifleckschwebefliegen- Art	Eristalis	interrupta	1997	2017	1	1	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1997	2017	2	2	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2017	1	5	2	Max. Ab5	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Gemeine Sumpfschwebefliege, Gemeine Sonnenschwebefliege	Helophilus	pendulus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	2007	2017		3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebefliege, Gemeine	Syritta	pipiens	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Gemeine Langbauchschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	1
Dickkopffliegen-Art	Physocephala	vittata	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atra	1997	1997	1			Max. Ab1	unsicher bestimmt	2
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	1997	2017	1	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercoraria	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	1
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	
Kaisergoldfliege	Lucilia	caesar	1997	1007	1			unsicher bestimmt	vermutlich sehr häufig, aber nur selten registriert	
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliege Familie	(Sarcophagidae)	non det.	2007	2007		1		Max. Ab1	Familie sehr häufig gefunden, aber nur unvollständig registriert	
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1997	2011	2	2	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1997	2007	1	2		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliegen-Art	Ectophasia	crassipennis	2007	2017		2	2	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	fera	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, aber oft nicht registriert	2
WIRBELTIERE			1997							
Eidechse (nicht bestimmt)	Lacerta cf. Podarcis	non det.	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Mauereidechse	Podarcis	muralis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Turmfalke	Falco	tinnunculus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Mauersegler	Apus	apus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Grünspecht	Picus	viridis	1997	2017	3	1	1	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
Heckenbraunelle	Prunella	modularis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Fitis	Phylloscopus	trochilus	1997	1997	1			Max. Ab1	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten	4
Sommergoldhähnchen	Regulus	ignicapillus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Baumläufer Gattung	Certhia	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig beobachtet	1
Elster	Pica	pica	2016	2016	()		1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert	1
Kolkrabe	Corvus	corax	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Stieglitz, Distelfink	Carduelis	carduelis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Gimpel, Dompfaff	Pyrrhula	pyrrhula	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren seltener	2
Kernbeisser	Coccothraustes	coccothraustes	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig nachgewiesen	4
Mauslöcher	(Mauslöcher)	non det.	2007	2007		1	**	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Fuchs	Vulpes	vulpes	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig festgestellt	2
Dachs	Meles	meles	1997	2017	1		2	Max. Ab2	Anhand der Spuren häufig festgestellt, aber Baue oft auch vom Fuchs bewohnt	2
Reh	Capreolus	capreolus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig beobachtet und auch anhand der Spuren festgestellt	2
MOOSE	Auswahl								Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrassen sind registriert	
Echtes Goldmoos	Homalothecium	lutescens	1997					häufig	viele Fundorte	
SAMENPFLANZEN	Auswahl								Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	1997					sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Klatsch-Mohn	Papaver	rhoeas	2007					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2			
Walnussbaum	Juglans	regia	2007				1 grosser Baum am Rand und Jungbäume lokal	viele Fundorte	
Grosser Mauerpfeffer (im weiteren Sinne)	Sedum	telephium s.l.	1997				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Saubohnen-Mauerpfeffer	Sedum	telephium fabaria	2007				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Gewöhnlicher Odermennig	Agrimonia	eupatoria	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1997				sehr häufig (massenhaft)	sehr viele Fundorte	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	1997				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Erdbeere	Fragaria	vesca	2007				lokal häufig an Heckenrand	sehr viele Fundorte	
Mittlerer Klee	Trifolium	medium	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis	vulneraria vulneraria	1997				lokal häufig, bes. am Waldrand	viele Fundorte	
Robinie, Falsche Akazie	Robinia	pseudacacia	2007				junge Bäume lokal häufig in der Wiese	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia	cracca	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	Linum	catharticum	2007				1 Pflanze	viele Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2007				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Pfaffenhütchen	Euonymus	europaea	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Süsse Wolfsmilch	Euphorbia	dulcis	2007				1 Pflanze am Waldrand	viele Fundorte	
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia	verrucosa	1997				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1997				häufig	sehr viele Fundorte	
Primel, Stengellose Schlüsselblume	Primula	vulgaris	1997				lokal mässig häufig am Waldrand (verwildert)	mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert	
Punktierter Gilbweiderich	Lysimachia	punctata	2007				lokal häufig am Waldrand	wenig Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1997				mässig häufig, lokal häufig an Hecken- und Waldrand	sehr viele Fundorte	
Berg-Goldnessel	Lamium = Lamiastrum	galeoptolon montanum	2007				lokal häufig an Hecken- und Waldrand	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte BP1	Anz. BP2	Ereignisse BP3			
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	1997				mässig häufig	viele Fundorte	
Wald-Bergminze = Echter Bergthymian	Calamintha	menthifolia = sylvatica	1997				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	2007				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	2007				mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaea	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	Leontodon	hispidus	1997				häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Östlicher Wiesen-Bocksbart	Tragopogon	orientalis	1997				häufig	viele Fundorte	
Kompass-Lattich	Lactuca	serriola	2007				lokal mässig häufig an Wegböschung	mässig viele Fundorte	
Langhaariges Habichtskraut	Hieracium	pilosella	2007				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Weinberg-Lauch	Allium	vineale	1997				mässig häufig	viele Fundorte	
Bärlauch	Allium	ursinum	2007				lokal sehr häufig im Wald	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Spitzorchis, Pyramidenorchis	Anacamptis	pyramidalis	1997				1 Pflanze	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Berg-Segge	Carex	montana	1997				häufig am Waldrand	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Schlaffe Segge	Carex	flacca	2007				lokal häufig	viele Fundorte	
Aufrechte Trespe	Bromus	erectus	1997				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Rot-Schwingel	Festuca	rubra	2007				lokal häufig	viele Fundorte registriert, wahrscheinlich sehr viele	
Mittleres Zittergras	Briza	media	2007				lokal häufig	viele Fundorte	
Gefleckter Aronstab	Arum	maculatum	2007				lokal mässig häufig an Hecken- und Waldrand	viele Fundorte	