

Rumpelweide Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 632850 245600 Höhe ü. M.: 630 m Expositionen: WSW SE Fläche: 500 a Neigung: 10% 60%

	BP1 (1997 und 2001)	BP2 (2007 und 2008)	BP3 (2016 und 2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	5	6	6	17
Beobachtungsdauer:	12 Std. 45 Min.	08 Std. 35 Min.	08 Std. 50 Min.	30 Std. 10 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:		204	183	194	581		380	287	331	998		1,86	1,57	1,71	1,72
Bewertete Taxa:		147	125	128	400		313	317	214	787		2.16	1,71	2,00	1,97

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	Anz. Ereignisse BP2	Anz. Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
WEICHTIERE		1997							
Wegschnecke Gattung	Arion sp.	1997	997	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Gefälte Schliessmundschnecke	Macrogastra plicatula	1997	997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig, vor allem	2
Gemeine Heideschnecke	Helicella itala	1997	2007	2	1		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Weinbergschnecke	Helix pomatia	1997	997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
		1997							

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
 Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

Index 1: sehr häufig gefunden:	mehr als 500 Ereignisse
Index 2: häufig gefunden:	100 bis 499 Ereignisse
Index 4: mässig häufig gefunden:	31 bis 100 Ereignisse
Index 8: wenig häufig gefunden:	10 bis 30 Ereignisse
Index 16: selten gefunden:	3 bis 9 Ereignisse
Index 32: sehr selten gefunden:	2 Ereignisse an verschiedenen Orten
Index 64: äusserst selten gefunden:	1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen	

() in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
 & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
 * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
 ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:

Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte BP1	Anz. Ereignisse BP2	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte			
GLIEDERFÜSSLER		1997								
SPINNENTIERE		1997								
Baldachinspinne Familie	(Linyphiidae)	non det.	2008	2008		1	Max. Ab4	Familie sehr häufig gefunden		
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	1997	1997	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1	
Wolfsspinne Familie	(Lycosidae)	non det.	1997	1997	1		*	Max. Ab4	Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Tarantel-Art (Wolfsspinne)	Alopecosa	cuneata	2007	2007		1	*	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 216	2
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	amentata	1997		1	1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 204	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	1997	2007	2	1	*	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 219	1
Wolfsspinnen-Artkomplex	Pardosa	lugubris- Komplex	1997	1997	1		*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 1571	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	pullata	2007	2007		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 498	1
Listspinne	Pisaura	mirabilis	2007	2017		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2017	4	3	3	Max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Grasgrüne Huschspinne	Micrommata	virescens	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 2 Individuen	2
Krabbenspinne Gattung	Xysticus	sp.	1997	1997	1		*	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Springsspinnen-Art	Evarcha	arcuata	2008	2008		1	*	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	2
VIELFÜSSER		1997								
Steinläufer Gattung	Lithobius	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung häufig gefunden, aber nie auf die Art bestimmt und oft nicht registriert	
Schweizer Saftkugler	Glomeris	helvetica	1997	1997	1		*	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gesprenkelter Saftkugler	Glomeris	undulata forma conspersa	1997	1997	1		*	Max. Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig	1
Gerandeter Saftkugler	Glomeris	marginata	1997	1997	1		*	Max. Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig	1
			1997							

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits-werte	
INSEKTEN		1997								
Heuschrecken		1997								
Gemeine Sichelschrecke	Phaneroptera	falcata	2016	2017			3	Max. Ab2	früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen und häufig	2
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia	sp. J	2017	2017			1	Max. Ab2	Jungtiere häufig gefunden	
Grünes Heupferd (nur Stridulation)	Tettigonia	viridissima Gesang	1997	2008	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gehört	1
Zwitscherschrecke	Tettigonia	cantans	1997	2017	3	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Westliche Beissschrecke	Platycleis	albopunctata albopunctata	2016	2017			3	Max. Ab2	im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig	1
Zweifarbige Beissschrecke	Metrioptera	bicolor	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roeselii	2008	2017		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliche Strauchschrecke	Pholidoptera	griseoaptera	1997	2008	2	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Feldgrille	Gryllus	campestris	1997	2017	2	2	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	2008	2	2		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Langfühler-Dornschrecke	Tetrix	tenuicornis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Lauschschrecke	Mecostethus = Parapleurus	parapleurus = alliaceus	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren	1
Buntbäuchiger Grashüpfer	Omocestus	rufipes = ventralis	1997	1997	2			Max. Ab1	im Jura häufig gefunden, aber anspruchsvolle Art	2
Heidegrashüpfer	Stenobothrus	lineatus	1997	2016	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus	rufus	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1997	2017	2	3	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2017	3	2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Wanzen		1997								
Leder- oder Saumwanzen-Art	Coriomeris	denticulatus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Weichwanzen-Art	Hadrodemus M-flavum	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gelbsaum-Zierwanze	Adelphocoris seticornis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	2
Gemeine Zierwanze	Adelphocoris lineolatus	2001	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Weichwanzen-Art	Notostira erratica	2001	2001	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	2
Weichwanzen-Art	Leptopterna dolobrata	2008	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	1
Gleichflügler									
Schaumzikade Familie	(Cercopidae) non det. (Nest)	2007	2007		1		Max. Ab2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1
Netzflügler									
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla carnea	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1
Käfer		1997							
Feld-Sandläufer	Cicindela campestris	2007	2017		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Dammläufer-Art	Nebria brevicollis	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 469	2
Schnellläufer-Art	Harpalus dimidiatus	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 86	4
Kupferiger Schulterläufer, Listkäfer-Art	Poecilus cupreus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 598	1
Frühlings-Grabkäfer	Pterostichus vernalis	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 35	4
Gemeiner Uferräuber	Paederus litoralis	2007	1997		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kurzflügelkäfer-Art	Philonthus tenuicornis = carbonarius	1997	1997	1			Max. Ab1	selten gefunden	16
Gemeiner Weichkäfer	Cantharis fusca	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Weichkäfer-Art	Cantharis rustica	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha fulva	1997	2008	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia nitidula	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 117	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung		letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	2008	2008		1	1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Graugrüner Schenkelkäfer	Oedemera	virescens	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	2008	2017		2	1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Oelkäfer-Art	Stenoria	analys	2017	2017			1		einziger Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	brevicauda	1997	2017	1		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Dunkelbrauner Junikäfer	Amphimallon	atrum	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden, oft in grosser Zahl	2
Purzelkäfer-Art	Hoplia	philanthus	2008	2008		1			Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Variabler Stubbenbock	Stenocorus	meridianus	2017	2017			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	2008	2008		1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Zweibindiger Halsbock	Stenurella = Strangalia	bifasciata	1997	1997	1				Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina	salina	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1997	1997	1	2			Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypocheridis	1997	2008	1	2			Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	violaceus	1997	2017	1	2	1		Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Kohlerdfloh Gattung	Altica	sp.	1997	1997	1				Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden, aber meist übersehen oder nicht inventarisiert	
Weissdorn-Blattrüssler	Phyllobius	betulinus = betulae	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig	2
Hautflügler			1997								
Halmwespen-Art	Cephus	spinipes = cultratus	2008	2008		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Blattwespen-Art	Dolerus	nigratus	2008	2008		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2007	2007		1					
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	sordida	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 40	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	brevicornis	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata = ligata	1997	2007	1	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2
Blattwespen-Art	Macrophya	montana	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	sarcitorius	2016	2016			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Amblyteles	armatorius	2001	2008	1	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Diphyus	quadripunctorius	2008	2017		1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Ctenichneumon	funereus	1997	1997	1				1 von nur 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32
Sichelwespen-Art	Trichomma	fulvidens	2007	2007		1			1 von nur 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	1997	2017	4		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Rollwespen-Art	Myrmosa	atra	2007	2007		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 9	8
Knotenameisen-Art	Myrmica	rubra	1997	1997	1		*		Max. Ab3	häufig gefundenin, den Fallen der WSL häufig: 243 Individuen	2
Knotenameisen-Art	Myrmica	ruginodis	1997	1997	1		*		Max. Ab3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 1799 Individuen	2
Trockenrasen-Knotenameise	Myrmica	scabrinodis	1997	2008	1		*		Max. Ab3	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 3906 Individuen	2
Gemeine Rossameise	Camponotus	ligniperda	2008	2008		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Fremde Wegameise	Lasius	alienius	1997	1997	1		*		Max. Ab3	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 192 Individuen	4
Gelbe Wegameise	Lasius	flavus	1997	2008	1	1	*		Max. Ab3	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL häufig: 495 Individuen	1
Grauschwarze Sklavenameise	Formica	fusca	1997	1997	2		*		Max. Ab3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 236	2
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1997	2017	2	2	1		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1
Zweifarbige Sklavenameise	Formica	rufibarbis	1997	2008	1	1	*		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 89	1
Wiesen-Waldameise	Formica	pratensis	2007	2017		3	2		Max. Ab5	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Blutrote Raubameise	Formica	sanguinea	1997	1997	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	2017	2017				1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Hornisse	Vespa	crabro	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	1
Holzbohrwespen-Art oder Töpfergrabwespe	Trypoxylon	figulus	2007	2008		2			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Geringelte oder Rundfleck-Maskenbiene	Hylaeus	dilatatus = annularis	1997	1997	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus	confusus	2008	2008		1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosae	2017	2017				1	Max. Ab1	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	1997	2017	4			2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum	leucozonium	1997	1997	2				Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Breitbauch-Schmalbiene	Lasioglossum	lativentre	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1997	2017	3	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Weissbeinige Schmalbienenene	Lasioglossum	albipes	1997	1997	3				Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	1997	2017	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauxillum	1997	2017	2	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1
Dickkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	glabriusculum	2017	2017				2	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	1997	2017	1	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1
Punktierte Blutbiene	Sphecodes	puncticeps	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 5	4
Rostfarbene Blutbiene	Sphecodes	ferruginatus	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Glänzende Düstersandbiene	Andrena	nitida	1997	1997	2				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 129	2
Weisse Bindensandbiene	Andrena	gravida	1997	2007	1	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 35	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Anz. Ereignisse Bemerkungen zur Art						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		Beobachtung	BP1	BP2	BP3					
Gewöhnliche Bindensanbiene	Andrena	flavipes	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2
Gelbbeinige Kieselsandbiene	Andrena	chrysosceles	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Gewöhnliche Löcherbiene	Heriades	truncorum	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 15	2
Gelbspornige Stängelbiene	Hoplitis = Osmia	claviventris	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gewöhnliche Keulenhornbiene	Ceratina	cyanea	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Feld-Wespenbiene	Nomada	goodeniana = succincta	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	1997	2008	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Wiesenhummel	Bombus	pratorum	1997		1	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1
Glockenblumenhummel oder Distelhummel	Bombus	soroeensis	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1997	2017	4		2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2017	4	3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	1997	2017	1		2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus	hortorum	2008	2008		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Bombus = Psithyrus	bohemicus	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Bombus = Psithyrus	campestris	1997	1997	1				sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1
Honigbiene	Apis	mellifera	1997	2017	5	5	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge			1997							
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	2001	2017	1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Schwarzdorn-Gespinstmotte	Yponomeuta	padella	1997	1997	1			Max. Ab5	mässig häufig gefunden	4
Sackträgermotten-Art	Coleophora	ornatipenella	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Wickler-Art	Celypha	striana	2008	2017		1	1		Max. Ab1	häufig gefunden		2
Wickler-Art	Celypha	lacunana	2017	2017			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1
Federgeistchen-Art	Stenoptilia	zophodactyla	1997	1997	1				1 von nur 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden		32
Zünsler-Art	Synaphe	punctalis	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden		2
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	1997	2017	1	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	2001	2017	1	2	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden		1
Graszünsler-Art	Crambus	pascuellus	2017	2017			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden		2
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1997	2017	2	1	1		Max. Ab4	sehr häufig gefunden		1
Weisser Graszünsler	Crambus	perlellus	2001	2017	1	1	4		Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	1997	2017	1		2		Max. Ab4	sehr häufig gefunden		1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	2007	2017		1	1		Max. Ab4	sehr häufig gefunden		1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	2017	1	1	1		Max. Ab5	sehr häufig gefunden		1
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	1997	2017	2	1	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2007	2017		2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1
Zünsler-Art	Microstega	pandalis	2008	2008		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2017	2017			1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114		1
Gelbwürfliger Dickkopffalter	Carterocephalus	palaemon	1997	2017	1		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 32, 183		2
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	2008	2017		1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243		1
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	1997	2017	2		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516		1
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631		1
Roter Würffalter	Spialia	sertorius	2007	2017		1	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438		1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kleiner Nördlicher Würfelfalter	Pyrgus	malvae	2007	2008		2			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 338		2
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	2017	4	1	4		Max. Ab2	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert		
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	2007	2017		2	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53		1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	2017	2		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549		1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	2017	2017			2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757		1
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	1997	1997	2				Max. Ab1	sehr häufig gefunden		
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis	2007	2017		1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628		1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2007	2017		1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845		1
Tagpfauenauge	Inachis	io	2017	2017			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734		1
Admiral	Vanessa	atalanta	1997	2007	1				Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224		1
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	2017	2017			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238		1
Kaisermantel	Argynnis	paphia	2008	2008		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531		1
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1997	2017	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065		1
Weisser Waldportier	Brintesia	circe	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden, aber erst (wieder) seit diesem Jahrhundert, R.Bas.: 22, 341		2
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1997	2017	2	3	3		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476		1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	2001	2017	1	1	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287		1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1997	2017	2	4	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818		1
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria	2008	2008		1			Max. Ab1	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688		1
Mauerfuchs	Lasiommata	megera	1997	1997	2				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139		1
Braunauge	Lasiommata	maera	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 175		2
Nierenfleck, Birken-Zipfelfalter	Thecla	betulae	1997	1997	1				Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 68		2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kleiner Feuerfalter	Lycaena	phlaeas	2007	2017		1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 88		2
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627		1
Kurzschwänziger Bläuling	Cupido	argiades	2017	2017	&		1		Max. Ab2	häufig gefunden, erst vor wenigen Jahren wieder in der Schweiz nördlich der Alpen,		2
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris	semiargus	2017	2017			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904		1
Silbergrüner Bläuling	Polyommatus = Lysandra	coridon	1997	1997	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416		1
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra	bellargus	1997	2017	1		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142		1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1997	2017	3	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315		1
Vierpunkt-Kleinspanner	Scopula	immutata	2008	2017		1	4		Max. Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 17, 18		2
Spanner-Art	Scotopteryx	luridata = plumbaria	1997	1997	1				unsicher bestimmt, ev. Petrophora chlorosata	am Tag selten gefunden, im Tafeljura mässig häufig, R.Bas.: 8, 38		
Spanner-Art	Epirrhoe	alternata	2016	2016			1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69		1
Löwenzahnspanner	Camptogramma	bilineata	2008	2017		1	3		Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270		1
Klee-Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa	clathrata	2017	2017			1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122		1
Moorwald-Adlerfarnspanner	Petrophora	chlorosata	2007	2008		2			Max. Ab2	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 5, 5		8
Pantherspanner	Pseudo-panthera	macularia	2007	2007		1			Max. Ab3	am Tag sehr häufig gefunden gefunden, R.Bas.: 10, 95		1
Heidespanner	Ematurga	atomaria	2007			2	1		Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206		1
Braunstirn-Weisspanner	Cabera	exanthemata	2008	2008		1			Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 23		2
Rotrandbär	Diacrisia	sannio	2017	2017			1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 45		2
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1997	2017	1	2	1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495		1
Eulenfalter-Art	Phytometra	viridaria	2017	2017			1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 11, 37		2
Schnabelfliegen			1997									
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa	germanica	1997	2008	2	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
				BP1	BP2	BP3			
Skorpionsfliege (nicht genau bestimmt)	Panorpa vulgaris cf. communis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa vulgaris	2001	2001	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zweiflügler		1997							
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. s.str. Tipula paludosa	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula vernalis	2007	2007		1	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma appendiculata	2007			1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Stelzmücken-Art	Epiphragma ocellare	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae) non det.	2007	2017		2	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Waffenfliegen-Art	Chloromyia formosa	2008	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona pluvialis	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius major	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius discolor	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Trauerschweber-Art	Anthrax anthrax	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Tanzfliegen-Art	Empis tesselata	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis livida	2008	2008		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis trigramma	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gestreifte Waldschwebfliege Waldschneisenschwebefliege	Dasysyrphus albostriatus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	4
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus balteatus	1997		1	3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1
Späte Grossstirnschwebefliege, Weisse Dickkopfschwebefliege	Scaeva pyrastris	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Frühe Grossstirnschwebefliege, Gelbe Dickkopfschwebefliege	Scaeva selenitica	2008	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria scripta	1997	2016	1	1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte
Kugelträger-Art (Schwebefliege)	Sphaerophoria	taeniata	2001	2001	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	2007	2017		1	4	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1
Behaarte Schwebefliege, Grosse Gartenschwebefliege	Syrphus	torvus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	2
Späte Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	pedissequum	2008	2008		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Zweiband- Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	bicinctum	1997	2017	2		1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Wiesen- Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	arcuatum	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	2001	2016	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Schwarze Erzschwebefliege Impressa-Gruppe	Cheilosia	impressa	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Weissfuss-Erzschwebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	2008	2008		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Trüffel-Erzschwebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	rufipes = soror	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Ererschwebefliegen-Art Proxima-Gruppe	Cheilosia	proxima	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Keilfleckschwebefliegen- Art	Eristalis	interrupta	2007	2016		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1997	2007	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2017	3	3	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebfliege	Helophilus	parallelus	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	2007	2017		2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Gemeine Langbauchschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnis	2001	2001	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	1
Dickkopffliege Gattung	Thecophora	sp.	2017	2017			1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	2
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercoraria	1997	1997	1			Max. Ab4	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. BP1	Ereignisse BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte
Stubenfliegen-Verwandte	Mesembrina meridiana	1997	1997			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Herbst-Stubenfliege	Musca autumnalis	2008	2008		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	
Stubenfliege Gattung	Neomyia = Orthellia	1997	1997	2		*	Max. Ab2	Gattung sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen	
Stubenfliegen-Verwandte	Polietes lardarius	1997	1997	1			Max. Ab4	sehr häufig gefunden, auf Kuhfladen, im Herbst auch auf Blättern am Waldrand	1
Kaisergoldfliege	Lucilia caesar	1997	1997	1			unsicher bestimmt	vermutlich sehr häufig, aber nur selten registriert	
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	1997	2016	2		1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	1997	2007	1	2	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliegen-Art	Eriothrix	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Raupenfliege Gattung	Tachina	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, aber oft nicht registriert	2
WIRBELTIERE		1997							
Blindschleiche	Anguis fragilis	2008	2008		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Eidechse (nicht bestimmt)	Lacerta cf. Podarcis	2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	
Zauneidechse	Lacerta agilis	2017				2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)	1
Grauspecht	Picus canus	1997	1997	1			Max. Ab1	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch wenig häufig	4
Grünspecht	Picus viridis	1997	2017	2	2	5	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
Schwarzspecht	Dryocopus martius	2008	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Heckenbraunelle	Prunella modularis	1997	2007	1	1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Singdrossel	Turdus philomelos	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Misteldrossel	Turdus viscivorus	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Gartengrasmücke	Sylvia borin	1997	2008	1	2		Max. Ab1	häufig beobachtet	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung		letzte BP1	Anz. BP2	Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte
Berglaubsänger	Phylloscopus	bonelli	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Sommergoldhähnchen	Regulus	ignicapillus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Schwanzmeise	Aegitalus	caudatus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Schwanzmeise	Aegitalus	caudatus	2001	2001	1			Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Tannenmeise	Parus	ater	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactyla	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Neuntöter, Rotrückiger Würger	Lanius	collurio	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Kolkrabe	Corvus	corax	1997	2017	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
Stieglitz, Distelfink	Carduelis	carduelis	1997	2017	1		1	Max. Ab2	häufig beobachtet	2
Goldammer	Emberiza	citrinella	1997	2017	1	4	1	Max. Ab2	sehr häufig beobachtet	1
Scherm Maus	Arvicola	terrestris	2007	2007		1	**	Max. Ab2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Fuchs	Vulpes	vulpes	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig festgestellt	2
Wildschwein	Sus	scrova	2007	2017		3	2	Max. Ab2	anhand der Spuren zunehmend häufiger festgestellt	2
Reh	Capreolus	capreolus	1997	2017	1		3	Max. Ab1	häufig beobachtet und auch anhand der Spuren festgestellt	2
PILZE	Auswahl		2001							
Parasolpilz	Macrolepiota	procera	2017					1 Fruchkörper	mässig viele Fundorte	
MOOSE	Auswahl								Hauptsächlich Arten der Halbtrockenransen sind registriert	
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Grosses Kranzmoos	Rhytidiadelphus	triquetrus	2007					lokal häufig	viele Fundorte	
FARNPFLANZEN	Auswahl									
Adlerfarn	Pteridium	aquilinum	2008					sehr häufig	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Anzahl	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte BP1	Anz. Ereignisse BP2	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort BP3	Bemerkungen zur Art in der Region		
SAMENPFLANZEN	Auswahl						Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen		
Gewöhnliche Akelei	Aquilegia	vulgaris	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	2007				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	2007				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	1997				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Walnussbaum	Juglans	regia	2007				1 Jungbaum	viele Fundorte	
Stachelbeere	Ribes	uva-crispa	2007				1 Strauch	mässig viele Fundorte	
Milder Mauerpfeffer	Sedum	sexangulare	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Odermennig	Agrimonia	eupatoria	1997				vereinzelt, lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1997				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	1997				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Aufrechtes Fingerkraut	Potentilla	erecta	1997				sehr häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna = neumanniana	1997				häufig	viele Fundorte	
Gemeiner Frauenmantel, Gelbgrüner Frauenmantel	Alchemilla	xanthochlora aggr. = vulgaris =	2008				mässig häufig	viele Fundorte, aber vermutlich oft übersehen	
Birnbaum	Pyrus	piraster	2007				Jungbäume vereinzelt	viele Fundorte	
Apfelbaum	Malus	sylvestris	2007				1 Baum am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa	2007				sehr häufig	viele Fundorte	
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	1997				mässig häufig	viele Fundorte	
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gelblicher Klee	Trifolium	ochroleucum	2001				vereinzelt, lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Berg-Klee	Trifolium	montanum	1997				häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte BP1	BP2	BP3			
Bunte Kronwicke	Coronilla	varia	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Schopfiger Hufeisenklee	Hippocrepis	comosa	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	Linum	catharticum	1997				häufig	viele Fundorte	
Bittere Kreuzblume	Polygala	amarella	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Gewöhnliche Kreuzblume	Polygala	vulgaris vulgaris	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Echter Kümmel	Carum	carvi	1997				sehr häufig	viele Fundorte	
Silgenähnlicher Rosskümmel	Silaum	silaus	2007				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2007				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Aufrechte Wolfsmilch	Euphorbia	stricta	2007				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia	verrucosa	1997				mässig häufig	viele Fundorte	
Echtes Johanniskraut	Hypericum	perforatum	2008				vereinzelt	sehr viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1997				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Veilchen	Viola	reichenbachiana = sylvestris	1997				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Ovalblättriges Sonnenröschen	Helianthemum	nummularium ssp. obscurum	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Wald-Schlüsselblume	Primula	elatior	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	1997				häufig	sehr viele Fundorte	
Echtes Tausenguldenkraut	Centaurium	erythraea	1997				mässg häufig	mässig viele Fundorte	
Echtes Labkraut	Galium	verum	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Niedriges Labkraut	Galium	pumilum	2008				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wilde Karde	Dipsacus	fullonum = silvestris	1997				häufig	viele Fundorte	
Teufelsabbiss, Abbisskraut	Succisa	pratensis	1997				mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3						
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1997						vereinzelt	sehr viele Fundorte	
Tauben-Skabiose	Scabiosa	columbaria	1997						häufig	viele Fundorte	
Echter Steinsame	Lithospermum	officinale	2016						lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Grosser Ehrenpreis	Veronica	teucrium	1997						lokal häufig	viele Fundorte	
Echter Ehrenpreis	Veronica	officinalis	1997						mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Mittlerer Wegerich	Plantago	media	2007						häufig	viele Fundorte	
Echter Gamander	Teucrium	chamaedrys	2008						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Grosse Brunelle	Prunella	grandiflora	1997						lokal häufig	viele Fundorte	
Echte Betonie	Stachys = Betonica	officinalis	1997						mässig häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	1997						häufig	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	1997						1 Pflanze	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	1997						sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Rundblättrige Glockenblume	Campanula	rotundifolia	1997						1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1997						sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaea	2008						vereinzelt	viele Fundorte	
Silberdistel = Einf. Eberwurz	Carlina	acaulis ssp. caulescens =	1997						mässig häufig	viele Fundorte	
Sumpf-Kratzdistel	Cirsium	palustre	2008						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	1997						vereinzelt	sehr viele Fundorte	
Wegwarte, Zichorie	Cichorium	intybus	1997						1 Pflanze	viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milkkraut	Leontodon	hispidus	1997						sehr häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Langhaariges Habichtskraut	Hieracium	pilosella	1997						sehr häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Öhrchen-Habichtskraut	Hieracium	lactucella	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Herbstzeitlose	Colchicum	autumnale	2007					vereinzelt, lokal häufig	viele Fundorte	
Grünliches Brechkölbchen	Platanthera	chlorantha	2008					1 Pflanze	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Mücken-Handwurz	Gymnadenia	conopsea	2008					2 Pflanzen	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Geflecktes Knabenkraut	Dactylorhiza	maculata s.l.	1997					1 Pflanze	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Männliche Orchis	Orchis	mascula	1997					vereinzelt	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Feld-Hainsimse	Luzula	campestris	1997					mässig häufig	viele Fundorte	
Berg-Segge	Carex	montana	1997					loakl sehr häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Frühlings-Segge	Carex	caryophyllea	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte, typisch für Magerrasen	
Schlaffe Segge	Carex	flacca	2007					mässig häufig	viele Fundorte	
Hirsenfrüchtige Segge	Carex	panicea	2007					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Aufrechte Trespe	Bromus	erectus	1997					sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Fieder-Zwenke	Brachypodium	pinnatum	2008					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Mittleres Zittergras	Briza	media	1997					häufig	viele Fundorte	
Pyramiden-Kammschmiele	Koeleria	pyramidata	2008					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	Anthoxanthum	odoratum	2007					sehr häufig	viele Fundorte	