

"Obstgarten" / Weide Regenhübel Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 634900 246400 Höhe ü. M.: 510 m Expositionen: SEE S Fläche: 30 a Neigung: 10% 20%

	BP1 (1997 und 1998)	BP2 (2007 und 2011)	BP3 (2016 und 2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	5	8	8	21
Beobachtungsdauer:	09 Std. 15 Min.	09 Std. 45 Min.	07 Std. 10 Min.	26 Std. 10 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:		155	166	173	494		215	307	252	774		1,39	1,85	1,46	1,57
Bewertete Taxa:		121	111	108	340		179	250	155	609		1.48	2.25	1.67	1,79

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------

WEICHTIERE

			1997									
Weitmündige Glanzschnecke	Aegopinella nitens		1997	2007	1	1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig			1
Genabelte Strauschnecke	Fruticicola = Bradybaena fruticum		2016	2016			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden			1
Gemeine Heideschnecke	Helicella itala		2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden			1
Weinbergschnecke	Helix pomatia		1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden			1
			1997									

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum. Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.
 Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

- Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
- Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
- Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
- Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
- Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
- Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
- Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
- Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

- () in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
- & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
- * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
- ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:
 Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
 Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	Anz. Ereignisse BP2	Anz. Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
GLIEDERFÜSSLER			1997							
SPINNENTIERE			1997							
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(Phalangidae)	non det.	1997	2007	1	1	**	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	
Streckerspinne Gattung	Tetragnatha	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1
Wolfsspinne Familie	(Lycosidae)	non det.	2007	2007		1	*	Max. Ab2	Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Tarantel , Wolfsspinne Gattung	Alopecosa	sp.	2007	2007		1	*	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	1997	2017	1	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 219	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2011	1	2		Max. Ab4	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	cristatus	1997	1997	1		*	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	2
INSEKTEN			1997							
Libellen			1997							
Grosse Königslibelle	Anax	imperator	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern	2
Heuschrecken										
Gemeine Sichelschrecke	Phaneroptera	falcata	2017	2017			1	Max. Ab1	früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen und häufig	2
Grünes Heupferd (nur Stridulation)	Tettigonia	viridissima Gesang	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gehört	1
Westliche Beissschrecke	Platycleis	albopunctata albopunctata	2017	2017			1	Max. Ab1	im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig	1
Feldgrille	Gryllus	campestris	1997	2017	1	2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	2007	3	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Grosse Goldschrecke	Chrysochraon	dispar	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheitswerte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997				BP1	BP2			
Netzflügler			1997								
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla	carnea	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1	
Käfer			1997								
Gemeiner Weichkäfer	Cantharis	fusca	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Weichkäfer-Art	Cantharis	livida	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Grosser Blasenkäfer	Malachius	aeneus	1997	2007	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Zweifleckiger Warzenkäfer	Malachius	bipustulatus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schnellkäfer-Art	Cidnopus	pilosus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia	nitidula	1997	1997	2			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 117	2	
Glanzkäfer Gattung	Meligethes	sp.	1997	1997	1		*	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Marienkäfer-Art	Harmonia	axyridis	2017	2017	&		1	Max. Ab1	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig	2	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	brevicauda	1997	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schwarzrandiger oder Zweifelhafter Halsbock	Anastrangalia = Leptura	dubia	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2	
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Roter Spitzdeckenbock	Stenopterus	rufus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeiner Langbeinkäfer	Labidostomis	longimana	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina	salina	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1997	2017	1		1	Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	2017	2017			1	Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	violaceus	1997	1997	1			Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Hautflügler			1997							
Bürstenhornblattwespen-Art	Arge	cyanocrocea	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Rosen-Bürstenhornblattwespe	Arge	ochropus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Blattwespen-Art	Athalia	cordata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Kohlrübsenblattwespe	Athalia	rosae	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	zonula	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata = ligata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2
Blattwespen-Art	Macrophya	montana	1997	1997	1			Max. Ab3	häufig gefunden	2
Brackwespe Gattung	Microgaster	sp. D	2011	2011		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Gattung	Ichneumon s.str.	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	bucculentus	2007	2007		2		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespe Gattung	Bathythrix	sp.	2017	2017			1	Max. Ab1	Gattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespe Gattung	Campoplex	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Pimpla	spuria	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schmalbauchwespen-Art	Gasteruption	assectator	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997	2017	BP1	BP2	BP3	BP1			
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1997	2017	2		1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden in den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1	
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1997	1997	1		*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1	
Zweifarbige Sklavenameise	Formica	rufibarbis	1997	1997	1		*	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 89	1	
Rote Waldameise	Formica	rufa	2007	1997			1	Max. Ab3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 3037 Individuen	2	
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	claripennis	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	gazella	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	1997	2017	1	3	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1	
Hornisse	Vespa	crabro	2011	2017			1	1	Max. Ab1 sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	1	
Deutsche Wespe	Vespula	germanica	1997	2017	1	3	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 83	1	
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	2007	2007			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1	
Wegwespen-Art	Caliadurgus	fasciatellus	2007	2007			1	unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4		
Gescheckte Wegwespe	Dipogon	variegatum	2007	2007			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	8	
Mexikanischer Heuschreckenjäger	Isodontia	mexicana	2017	2017	&		1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, erst seit wenigen Jahren in die Schweiz nördlich der Alpen	4	
Grabwespen-Art	Passaloecus	insignis = roettgeni	2007	2007			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallender WSL mässig häufig: 36	8	
Grabwespen-Art	Passaloecus	corniger	2007	2007			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 20	8	
Grabwespen-Art	Ectemnius (Metacrabro)	lituratus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2	
Silbermundwespen-Art (Grabwespe)	Lestica	clypeata	2007	2007			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Grabwespen-Art	Crossocerus (Ablepharipus)	podagricus	2007	2007			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 7	8	
Grabwespen-Art	Crossocerus (Ablepharipus)	congener	2007	2007			1	Max. Ab1	selten gefunden , in den Fallen der WSL wenig häufig: 15	16	
Grabwespen-Art	Crossocerus (Coelocrabro)	barbipes	2007	2007			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	8	
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 26	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosae	2011	2011		1		Max. Ab2	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	1997	2017	2	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum	malachurum	1997	2017	1		2	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 76	2
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauxillum	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum	fulvicorne	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 45	2
Dickkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	glabriusculum	2017	2017			3	Max. Ab4	häufig gefunden	2
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum	morio	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 93	1
Gewöhnliche Dörnchensandbiene	Andrena	humilis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Grüne Dörnchen-Sandbiene	Andrena	nigroolivacea	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Frühe Doldensandbiene, Giersch-Sandbiene	Andrena	proxima	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gelbbeinige Kieselsandbiene	Andrena	chrysoceles	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Garten-Wollbiene	Anthidium	manicatum	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Felsspalten-Wollbiene	Anthidium	oblongatum	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Hahnenfuss-Scherenbiene	Chelostoma	florisomne	1997	2007	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	2
Platterbsen-Mörtelbiene	Megachile	ericetorum	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Juni-Langhornbiene	Eucera	longicornis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Mai-Langhornbiene	Eucera	nigrescens = tuberculata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Blauschwarze Holzbiene	Xylocopa	violacea	2017	2017			2	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	2007	2017		1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum	1997	2017	1		2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1
Bergwaldhummel	Bombus	wurfleini	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Wiesenhummel	Bombus	pratorum	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1997	2017	2	4	4	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2017	2	4	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	1997	2017	2	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus	hortorum	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	Bombus = Psithyrus	barbutellus	1997	2017	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Rotschwarze oder Felsen-Kuckuckshummel	Bombus = Psithyrus	rupestris	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Honigbiene	Apis	mellifera	1997	2017	4	5	7	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge			1997							
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Pfaffenhütchen-Gespinstmotte	Yponomeuta	cagnagella	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Silbermotte Gattung	Argyresthia	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4
Ziermotte Gattung	Scythris	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	2011	2011		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
Wickler-Art	Celypha	striana	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Wickler-Art	Celypha	lacunana	2007			1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	2017	2017			3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1997	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	1997	2016	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	2017	2017			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	2007	2017		2	4	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2007	2017		5	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Pyrausta	cingulata	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2007	2017		1	1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1
Gelbwüfliger Dickkopffalter	Carterocephalus	palaemon	1997	2017	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 32, 183	2
Roter Würfelfalter	Spialia	sertorius	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438	1
Zweibrütiger Würfelfalter	Pyrgus	armoricanus	2016	2016			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 12, 104	2
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	2017	3	3	7	Max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	1997	2017	1	1	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1997	2007	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	1997	3			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	crocea	2007	2017		1	1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Tagpfauenauge	Inachis	io	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2	BP3			
Distelfalter	Vanessa = Cynthia	cardui	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	1
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	1997	2007	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
Kaisermantel	Argynnis	paphia	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531	1
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1997	2017	1	1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1997	2017	1	2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1997	2017	2	4	5	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megea	2007	2017		4	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Nierenfleck, Birken-Zipfelfalter	Thecla	betulae	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 68	2
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	1997	2017	1	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Kurzschwänziger Bläuling	Cupido	argiades	2017	2017	&		1	Max. Ab1	häufig gefunden, erst vor wenigen Jahren wieder in der Schweiz nördlich der Alpen,	2
Faulbaum-Bläuling	Celastrina	argiolus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	Aricia	agestis	1997	2011	2	2		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 27, 250	2
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris	semiargus	1997	1997	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1997	2017	3	4	7	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Marmorierter Kleinspanner	Scopula	immorata	1997	2017	1		1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1
Löwenzahnspanner	Camptogramma	bilineata	2011	2017		1	2	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
Heidespanner	Ematurga	atomaria	1997	1997	1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Gammaeule	Autographa	gamma	1997	1997	2			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Zweiflügler			1997							
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1997	2007	1	1		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		2007	2017		BP1	BP2	BP3			
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma appendiculata	2007	2017		1	1	Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Waffenfliegen-Art	Sargus flavipes	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Wollschweber-Art	Bombylius major	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Trauersschweber-Art	Villa cingulata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Tanzfliegen-Art	Empis tesselata	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus balteatus	1997	2007	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1	
Gemeine Feldschwebefliege	Eupeodes corollae	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2	
Breitband- Feldschwebefliege	Eupeodes latifasciatus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Helle Blattlausschwebefliege, Helle Buschschwebefliege	Parasyrphus annulatus	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria scripta	1997	2017	2	2	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Kugelträger-Art (Schwebefliege)	Sphaerophoria taeniata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus ribesii	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1	
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus vitripennis	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1	
Kahle oder Südliche Wespenschwebefliege	Chrysotoxum intermedium	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma mellinum	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1	
Matte Schwarzkopfschwebefliege, Lange Grasschwebefliege	Melanostoma scalare	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 34	2	
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella viduata	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1	
Schwarze Erzswebefliege Impressa-Gruppe	Cheilosia impressa	1997	2016	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Weissfuss-Erzswebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia albitarsis	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Trüffel-Erzswebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia rufipes = soror	1997	2017	1	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Frühlings- oder Aster-Erzswebefliege Bergenstammi-	Cheilosia vernalis	1997	2007	1	1		Max. Ab2	häufig gefunden	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6			
Hummel- Gebirgsschwebefliege, Gelbe Bärenschwebefliege	Arctophila	bombiformis	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Gemeine Narzissenschwebefliege, Gemeine Zwiebelschwebefliege	Merodon	equestris	1997	1997	1				Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Kleine Bienenschwebefliege	Eristalis	arbustorum	2016	2017			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Keilfleckschwebefliegen- Art	Eristalis	interrupta	2007	2007		2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	2007	2011		2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis	pertinax	2017	2017			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2017	3	3	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebefliege	Helophilus	parallelus	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Gemeine Sumpfschwebefliege, Gemeine Sonnenschwebefliege	Helophilus	pendulus	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	1997	2017	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebefliege, Gemeine	Syritta	pipiens	1997	1997			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Dickkopffliegen-Art	Physocephala	rufipes	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	pusilla	1997	2007	1	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	distincta	2011	2011		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	1997	2017	1		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Kotfliegen-Art	Scatophaga	lutaria	2007	2007		1			unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden	
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercoraria	1998	1998	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Stubenfliegen-Verwandte	Mesembrina	meridiana	2007	2007		1			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Stubenfliege Gattung	Neomyia = Orthellia	sp.	1998	1998	1		*		Max. Ab2	Gattung sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen	
Stubenfliegen-Verwandte	Polietes	lardarius	1998	2007	1	1			Max. Ab3	sehr häufig gefunden, auf Kuhfladen, im Herbst auch auf Blättern am Waldrand	1
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1998	2007	1	2			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2017	2017		BP1	BP2	BP3			
Schmeissfliegen-Art	Stomorhina	lunata	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, weil zu wenig beachtet, aber vermutlich häufig	4	
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1997	2011	2	2	**	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1	
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1997	2007	1	1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Raupenfliegen-Art	Gymnosoma	rotundatum	2017	2017			1	Max. Ab1	bis etwa 2013 nur selten auf die Art bestimmt, sehr häufig	1	
Raupenfliegen-Art	Phasia	aurigera	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Raupenfliegen-Art	Ectophasia	crassipennis	2007	2017		1	1	Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Raupenfliege Gattung	Tachina	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	magnicornis	2007	1997		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
WIRBELTIERE			1997								
Mauereidechse	Podarcis	muralis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Sperber	Accipiter	nisus	2016	2007			1	Max. Ab1	mässig häufig beobachtet	4	
Mauersegler	Apus	apus	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig beobachtet	2	
Grauspecht	Picus	canus	1998	1998	1			unsicher bestimmt	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch wenig häufig		
Grünspecht	Picus	viridis	1997	2017	3	2	2	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Trauerschnäpper	Ficedula	hypoleuca	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig beobachtet	2	
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactyla	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1	
Elster	Pica	pica	2007	2017	()	2	5	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert	1	
Stieglitz, Distelfink	Carduelis	carduelis	2007	2017		1	1	Max. Ab2	häufig beobachtet	2	
Dachs	Meles	meles	2017	2017			2	Max. Ab2	Anhand der Spuren häufig festgestellt, aber Baue oft auch vom Fuchs bewohnt	2	
MOOSE									Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrassen sind registriert		
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	2007					vereinzelt	viele Fundorte		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte BP1	BP2	BP3			
Echtes Goldmoos	Homalothecium	lutescens	1997				sehr häufig	viele Fundorte	
SAMENPFLANZEN	Auswahl							Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte	
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	2007				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	1997				lokal sehr häufig am Waldrand, sonst mässig	sehr viele Fundorte	
Walnussbaum	Juglans	regia	2007				1 Baum	viele Fundorte	
Milder Mauerpfeffer	Sedum	sexangulare	2007				lokal häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Odermennig	Agrimonia	eupatoria	1997				mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1997				häufig, lokal sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna = neumanniana	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Wald-Erdbeere	Fragaria	vesca	2007				lokal häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte	
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	2007				lokal mässig häufig am Rand	viele Fundorte	
Mittlerer Klee	Trifolium	medium	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Robinie, Falsche Akazie	Robinia	pseudacacia	2011				Jungbäume lokal häufig am Rand	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Saat-Esparsette	Onobrychis	viciifolia	2011				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia	cracca	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Schmalblättrige Wicke	Vicia	sativa ssp. nigra incl. angustifolia	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Breitblättrige Platterbse	Lathyrus	latifolius	2016				lokal mässig häufig im Naturgarten	wenig Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2007				mässig häufig, lokal häufig	sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region		
			letzte	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3				
Stechpalme	Ilex	aquifolium	2007					vereinzelt am Waldrand	viele Fundorte		
Pfaffenhütchen	Euonymus	europaea	2007					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte		
Purgier-Kreuzdorn	Rhamnus	cathartica	2007					1 grosser Strauch am Waldrand	viele Fundorte		
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia	verrucosa	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1997					lokal häufig	sehr viele Fundorte		
Sigmarskraut	Malva	alcea	2007					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Moschusmalve	Malva	moschata	2007					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Primel, Stengellose Schlüsselblume	Primula	vulgaris	2007					vereinzelt	mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert		
Primel, Stengellose Schlüsselblume	Primula	vulgaris	2017					lokal häufig am Gartenrand	mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert		
Singrün, Kleines Immergrün	Vinca	minor	2007					lokal sehr häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte		
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1997					mässig häufig	sehr viele Fundorte		
Gewöhnliches Leinkraut	Linaria	vulgaris	2011					lokal mässig häufig am Rand	viele Fundorte		
Mittlerer Wegerich	Plantago	media	2007					häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	1997					lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	2007					lokal häufig	sehr viele Fundorte		
Acker-Glockenblume	Campanula	rapunculoides	1998					1 Pflanze	viele Fundorte		
Wasserdost	Eupatorium	cannabinum	2011					lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Färber-Hundskamille	Anthemis	tinctoria	2007					lokal mässig häufig	wenig Fundorte, aus Gärten verwildert oder angesät		
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1997					sehr häufig	sehr viele Fundorte		
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaea	2007					vereinzelt, lokal mässig häufig am Rand	viele Fundorte		

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
			erste Beobachtung	letzte	Anz. Ereignisse	BP1			
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea</i>	<i>jacea</i> s.l.	1998				vereinzelt	sehr viele Fundorte	
Wegwarte, Zichorie	<i>Cichorium</i>	<i>intybus</i>	2011				lokal mässig häufig am Rand	viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	<i>Leontodon</i>	<i>hispidus</i>	1997				1 Pflanze	sehr sehr viele Fundorte	
Östlicher Wiesen-Bocksbart	<i>Tragopogon</i>	<i>orientalis</i>	1997				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Langhaariges Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>pilosella</i>	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Weinberg-Lauch	<i>Allium</i>	<i>vineale</i>	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Traubige Bisamhyazinthe	<i>Muscari</i>	<i>racemosum</i>	2017				lokal mässig häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Osterglocke, Gelbe Narzisse	<i>Narcissus</i>	<i>pseudo-narcissus</i>	2007				lokal häufig in der Wiese (geflanzt)	Gartenpflanze, mässig viele Fundorte in der Natur, aber ausgeflanzt	
Berg-Segge	<i>Carex</i>	<i>montana</i>	1997				lokal sehr häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Frühlings-Segge	<i>Carex</i>	<i>caryophyllea</i>	2007				lokal häufig	viele Fundorte, typisch für Magerrasen	
Aufrechte Trespe	<i>Bromus</i>	<i>erectus</i>	1997				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	<i>Anthoxanthum</i>	<i>odoratum</i>	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gefleckter Aronstab	<i>Arum</i>	<i>maculatum</i>	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	