

Miesernbach Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 632700 246150 Höhe ü. M.: 430 m Expositionen: NE DIV. Strecke: 700 m Neigung: 20%

	BP1 (1997)	BP2 (2003 bis 2008)	BP3 (2012 bis 2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	4	37	9	50
Beobachtungsdauer:	09 Std. 35 Min.	70 Std. 30 Min.	13 Std. 25 Min.	105 Std. 20 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
	Ereignisse:	167	1521	267	1955		543	4031	607	5181		3,25	2,85	2,27	2,65
	Bewertete Taxa:	124	535	170	830		475	2496	492	3479		3,83	4,67	2,89	4,19

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------

WEICHTIERE

			1997													
Gemeine Bernsteinschnecke	Succinea	putris	2006	2007		3		Max. Ab.2		in Feuchtlebensräumen häufig gefunden						2
Wegschnecke Gattung	Arion	sp.	2003	2005		3		Max. Ab.1		Gattung sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert						
Weitmündige Glanzschnecke	Aegopinella	nitens	2006	2006		1	*	Max. Ab.1		sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig						1
Schwarzer Schnegel	Limax	cinereoniger	2005	2005		1		Max. Ab.1		mässig häufig gefunden weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig						4
Genabelte Strauchschncke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	2005	2007		3		Max. Ab.1		sehr häufig gefunden						1

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
 Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

- Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
- Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
- Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
- Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
- Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
- Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
- Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
- Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

- () in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
- & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
- * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
- ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:
 Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
 Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Kantige Laubschnecke	Hygromia	cinctella	2007	2007	&	1		Max. Ab.1	häufig gefunden, Neozoon, seit 1997 häufiger, bes. im Siedlungsraum	2	
Rötliche Laubschnecke	Monachoides = Perforatella	incarnatus	2005	2007		2	*	Max. Ab.2	häufig ngefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig	1	
Gefleckte Schnirkelschnecke	Arianta	arbustorum	1997	2007	3	17		Max. Ab.4	in beschatteten und/oder feuchten Lebensräumen häufig gefunden, gilt nach	1	
Schwarzmündige Bänderschnecke	Cepaea	nemoralis	1997	2008	1	2		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1	
Weissmündige Bänderschnecke	Cepaea	hortensis	2004	2006		2		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	1997	2012	2	11	1	Max. Ab.3	sehr häufig gefunden	1	
GLIEDERFÜSSLER			1997								
SPINNENTIERE			1997								
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(Phalangidae)	non det.	1997	2007	2	5	**	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert		
Streckerspinn Gattung	Tetragnatha	sp.	2003	2006		2		Max. Ab.1	Gattung häufig gefunden	2	
Streckerspinnen-Art	Tetragnatha	montana	2006	2017		1	1	unsicher bestimmt	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum		
Herbstspinnen-Art	Metellina	mengei	2006	2006		1		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 4	4	
Herbstspinnen-Art	Metellina	segmentata	1997	2016	1	3	3	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	1	
Eichblatt-Radspinnne	Aculepeira	ceropegia	2004	2006		3		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gartenkreuzspinnne	Araneus	diadematus	1997	2016	1	3	3	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1	
Kürbiskreuzspinnen-Art	Araniella	cucurbitina	2005	2007		2		Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	2	
Wespenspinne, Zebraspinne	Argiope	bruennichi	2017	2017			1	Max. Ab.2	häufig gefunden	2	
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	1997	2012	1	7	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1	
Kugel- oder Haubennetzspinnen-Art	Enoplognatha	ovata	2007	2007		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 12	4	
Wolfsspinnne Familie	(Lycosidae)	non det.	2006	2007		2	*	Max. Ab.5	Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert		
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	amentata	1997	2007	2	5	*	Max. Ab.4	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 204	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3			
Listspinne	Pisaura	mirabilis	2004	2007		6		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2017	2	12	5	Max. Ab.3	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Zartspinne	Anyphaena	accentuata	2005	2017		1	1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 35	4
Laufspinnen-, Flachstrecker-Art	Philodromus	dispar	2005	2005		1		Max. Ab.1	selten gefunden , in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	16
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	2007	2007		1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1
Krabbenspinne Gattung	Xysticus	sp.	2005	2006		3	*	Max. Ab.1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	acerbus	2017	2017			1	Max. Ab.1	selten gefunden	16
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	cristatus	2004	2004		1	*	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	2
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	kochi	2004	2004		1	*	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 3	2
Springspinnen-Art	Evarcha	arcuata	2004	2004		1	*	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	2
KREBSTIERE										
Assel-Art	Philoscia	muscorum	2006	2006		1	*	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten häufig	4
VIELFÜSSER										
Gesprenkelter Saftkugler	Glomeris	undulata	2006	2006		1	*	Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Tausendfüsser-Art	Polydesmus	angustus	2006	2006		1	*	Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten häufig, nicht inventarisiert	
INSEKTEN										
Eintagsfliegen										
Eintagsfliege Familie	(Heptagenidae)	non det.	1997	1997	1			Max. Ab.1	häufig gefunden, nicht inventarisiert	
Eintagsfliegen-Art	Rhithrogena	picteti = iridina	2003	2017		5	1	Max. Ab.3	wenig häufig gefunden, aber lokal oft in grossen Schwärmen	4
Steinfliegen										
Steinfliege Gattung	Nemoura	sp.	1997	2007	1	2		Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheitswerte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region		
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3						
Steinfliegen-Art	Nemoura	marginata	1997	2006	1	1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden			
Steinfliegen-Art	Perlodes	jurassinus = jurassica	2005	2005		1		unsicher bestimmt	erst 3 Mal am selben Ort gefunden			
Steinfliegen-Art	Isoperla	rivulorum	2005	2005		1		Max. Ab.2	selten gefunden			
Libellen			1997									
Gebänderte Prachtlibelle	Calopteryx	splendens	2003	2003		2		Max. Ab.1	Gattung an Flüssen und Bächen häufig gefunden		2	
Gemeine Winterlibelle	Sympecma	fusca	2003	2003		1		Max. Ab.1	häufig gefunden		2	
Frühe Adonislibelle	Pyrrhosoma	nymphula	1997	1997	1			Max. Ab.1	an stehenden Gewässern häufig gefunden		2	
Grosse Heidelibelle	Sympetrum	striolatum	2006	2006		1		Max. Ab.1	häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst		2	
Blutrote Heidelibelle	Sympetrum	sanguineum	2007	2007		1		Max. Ab.1	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,		4	
Ohrwürmer												
Gebüsch-Ohrwurm	Apterygida	media	2004	2008		3		Max. Ab.1	häufig gefunden		2	
Gemeiner Ohrwurm	Forficula	auricularia	2004	2005		3		Max. Ab.1	häufig gefunden		2	
Heuschrecken			1997									
Punktierte Zartschrecke	Leptophyes	punctatissima	2003	2007		4		Max. Ab.1	häufig gefunden		2	
Gemeine Eichenschrecke	Meconema	thalassinum	2003	2017		5	1	Max. Ab.2	mässig häufig gefunden		4	
Südliche Eichenschrecke	Meconema	meridionale	2005	2005		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, Neueinwanderer aus dem Süden		8	
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia	sp. J	2004	2017		2	1	Max. Ab.3	Jungtiere häufig gefunden			
Grünes Heupferd (nur Stridulation)	Tettigonia	viridissima Gesang	1997	2017	2	12	1	Max. Ab.2	sehr häufig gehört		1	
Zwitscherschrecke	Tettigonia	cantans	1997	2017	2	15	1	Max. Ab.4	sehr häufig gefunden		1	
Westliche Beissschrecke	Platycleis	albopunctata albopunctata	2004	2004		1		Max. Ab.1	im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig		1	
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roeselii	1997	2004	2	4		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden		1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Ereignisse				
Gewöhnliche Strauchschrecke	Pholidoptera	griseoptera	1997	2017	3	21	2	Max. Ab.4	sehr häufig gefunden	1	
Feldgrille	Gryllus	campestris	2003	2017		7	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1	
Säbeldornschrecke	Tetrix	subulata	1997	2017	3	7	2	Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Langfühler-Dornschrecke	Tetrix	tenuicornis	2007	2007		1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1	
Lauschschrecke	Mecostethus = Parapleurus	parapleurus = alliaceus	1997	2017	1	13	5	Max. Ab.5	sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren	1	
Kurzfühlerschrecke Familie	(Acrididae)	non det.	2004	2004		*	**	Max. Ab.5	Familie sehr häufig gefunden		
Grosse Goldschrecke	Chrysochraon	dispar	1997	2017	1	8	2	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1	
Kleine Goldschrecke	Euthystira = Chrysochraon	brachyptera	1997	1997	2			Max. Ab.4	sehr häufig gefunden	1	
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus	rufus	1997	2016	2	14	2	Max. Ab.4	sehr häufig gefunden	1	
Feld-Grashüpfer	Chorthippus	apricarius	2003	2003		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1997	2017	2	7	4	Max. Ab.3	sehr häufig gefunden	1	
Wiesengrashüpfer	Chorthippus	dorsatus	1997	2017	2	5	2	Max. Ab.5	häufig gefunden, aber im Bezirk Thal selten	2	
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2017	2	13	5	Max. Ab.5	sehr häufig gefunden	1	
Wanzen			1997								
Streifenwanze	Graphosoma	lineatum	2004	2006		2		Max. Ab.3	sehr häufig gefunden	1	
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	2003	2004		3		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	2004	2004		1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1	
Stinkwanze Gattung	Palomena	sp.	2003	2006		3		Max. Ab.1	Gattung sehr häufig gefunden, aber Jungtiere nicht registriert	1	
Grüne Stinkwanze	Palomena	prasina	2007	2017		5	1	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2	
Rotbeinige Baumwanze	Pentatoma	rufipes	2007	2007		2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, Waldrandbewohner, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	
Leder- oder Randwanzen-Art	Coreus	marginatus	1997	2017	1	13	4	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	am Beobachtungsort				
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalus	subrufus	2005	2012		1	1	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2	
Feuerwanze	Pyrrhocoris	apterus	2005	2007		3		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1	
Bodenwanzen-Art	Rhyparochromus	pini	2012	2012			1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 32	4	
Sichelwanzen-Art	Aptus	mirmicoides	2003	2012		8	1	Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36	2	
Sichelwanze Artengruppe	Nabis	rugosus-Gruppe	2004	2005	3			unsicher bestimmt	häufig gefunden		
Weichwanzen-Art	Deraeocoris	ruber	2007	2007	2			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 74	2	
Weichwanzen-Art	Capsus	ater	2017	2017				Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	4	
Weichwanzen-Art	Polymerus	unifasciatus	2003	2005	1			Max. Ab.2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Wiesenwanzen-Art	Lygocoris	spinolai	2007	2012	2			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Wiesenwanzem-Art	Lygocoris	pabulinus	2003		1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8	
Weichwanzen-Art	Calocoris	sexguttatus	1997	2005	1	2		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Weichwanzen-Art	Calocoris	biclavatus	2003	2003		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	4	
Weichwanzen-Art	Calocoris	alpestris	1997	1997	1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Gelbsaum-Zierwanze	Adelphocoris	seticornis	2003	2007	2			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	2	
Gemeine Zierwanze	Adelphocoris	lineolatus	1997	1997	1			Max. Ab.1	häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL selten: 3	1	
Weichwanzen-Art	Stenodema	laevigatum	2003	2012		3	1	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 42	2	
Weichwanzen-Art	Notostira	elongata	2007	2012		1	2	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	4	
Weichwanzen-Art	Notostira	erratica	2004	2008	4			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	2	
Weichwanzen-Art	Megaloceraea	recticornis	2003	2003	1			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2	
Weichwanzen-Art	Leptopterna	dolobrata	2007	2017	1	1		Max. Ab.2	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	1	
Weichwanze Gattung	Dryophilocoris	sp.	2007	2007		1		Max. Ab.1	Gattung wenig häufig gefunden	8	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Gleichflügler			1997								
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	1997	2008	1	4		Max. Ab.2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1	
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus	spumarius	2003	2017		4	3	Max. Ab.2	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	1997	2017	2	11	3	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1	
Schaumzikaden-Art	Lepyronia	coleoprata	2004	2004		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Blutzikaden-Art	Cercopis	vulnerata	2004	2007		5		Max. Ab.2	häufig gefunden	2	
Büffelzirpe	Stictocephala	bisonia	2004	2004		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, Neozoon	4	
Schlammfliegen			1997								
Wasserflorfliegen-Art	Sialis	fuliginosa	1997	2006	1	2		Max. Ab.1	an fliessenden Gewässern mässig häufig gefunden	4	
Netzflügler			2002								
Bachhaft	Osmylus	fulvicephalus	2007	2007		2		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Blattlauslöwen-Art	Micromus	angulatus	2017	2017			1	Max. Ab.1	selten gefunden	16	
Florfliegen-Art	Chrysopa	perla	2003	2003		5		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla	carnea	2005	2007				Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1	
Käfer			1997								
Kurzflügelkäfer-Art	Anthophagus	bicornis	1997	1997	1			2 von 3 Funden in der Region!	selten gefunden	16	
Gemeiner Uferräuber	Paederus	litoralis	2003	2007		2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Schnellräuber-Art (Kurzflügler)	Tachinus	scapularis	2007	2007		1		einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64	
Schnellräuber-Art (Kurzflügler)	Tachyporus	chrysomelinus	1997	1997	1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Gemeiner Weichkäfer	Cantharis	fusca	1997	2017	1	3	1	Max. Ab.3	sehr häufig gefunden	1	
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	1997	2006	1	1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2005	2006		BP1	BP2	BP3			
Weichkäfer-Art	Cantharis	nigricans	2005	2006		2			Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Weichkäfer-Art	Cantharis	livida	1997	2007	1	4			Max. Ab.3	häufig gefunden	2
Weichkäfer-Art	Cantharis	decipiens	2004	2004		1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1997	2017	1	6			Max. Ab.5	sehr häufig gefunden	1
Weichkäfer-Art	Rhagonycha	limbata	1997	2007	1	4			Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Blauer Wollhaarkäfer	Dasytes	caeruleus	2006	2006		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Trichodes	alvearius	2017	2017			2		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	pilosellus	2005	2005		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Mausgrauer Schnellkäfer	Argypnus = Adelocera	murinus	2017	2017			1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Rindenschnellkäfer-Art	Ctenicera	pectinicornis	2004	2005		2			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Rindenschnellkäfer-Art	Actenicerus	sjelandicus	2005	2005		1			Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schnellkäfer-Art	Cidnopus	pilosus	2007	2007		1			Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Schnellkäfer-Art	Hemicrepidius = Athous =	niger	2003	2003		1			Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Rauhhaariger Schnellkäfer	Hemicrepidius = Athous =	hirtus	2004	2004		1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	Athous	haemorrhoidalis	2005	2005		2			Max. Ab.2	häufig gefunden	2
Schnellkäfer-Art	Athous	vittatus	2004	2007		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia	nitidula	2003			4			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 117	2
Prachtkäfer-Art	Agrilus	cyanescens	2004	2004		1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Blütenfresser	Byturus	aestivus	2006	2007		2			Max. Ab.2	häufig gefunden	2
Glanzkäfer Gattung	Meligethes	sp.	2004	2006		3	*		Max. Ab.5	Gattung sehr häufig gefunden	1
Glanzkäfer-Art	Cychramus	luteus	2007	2007		16			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3				
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	2004	2007				Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1
Marienkäfer-Art	Halyzia	sedecimguttata	2005	2007		3		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Zweiundzwanzigpunkt	Thea	vigintiduo-punctata	2012	2006			1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Vierzehnpunktiger Marienkäfer	Propylaea	quadridecem-punctata	1997		1	4		Max. Ab.2	häufig gefunden	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	2003	2017		3	3	Max. Ab.2	häufig gefunden	2
Graugrüner Schenkelkäfer	Oedemera	virescens	2007	2007		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	2003	3		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	tristis	2006	2006		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Feuerkäfer-Art	Pyrochroa	serraticornis	1997	2007	1	7		Max. Ab.2	häufig gefunden	2
Feuerkäfer-Art	Schizotus	pectinicornis	2006	2006		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	2003	2007		3		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	brevicauda	2017	2017			1	Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Stachelkäfer-Art	Mordellochroa	abdominalis	2005	2005		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Purzelkäfer-Art	Hoplia	philanthus	2003	2003		1		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	2004	2004		4	1	Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Zweibindiger oder Gelbbindiger Zangenbock	Rhagium	bifasciatum	2007	2007		1		Max. Ab.1	selten gefunden , in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	16
Bissiger Zangenbock	Rhagium	mordax	2003	2005		3		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Variabler Stubbenbock	Stenocorus	meridianus	1997	2017	1	2	2	Max. Ab.2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Bunter Kugelhalsbock	Dinoptera = Acmaeops	collaris	2005	2005		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 5	4
Rothörniger oder Mattschwarzer Blütenbock	Grammoptera	ruficornis	1997	2005	1	4		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 40	4
Feldhornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	Alosterna	tabacicolor	1997		1			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 4	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Bleicher Blütenbock (Schmalbock)	Pseudovadonia = Leptura	livida	2017	2017			1	Max. Ab.1	wenig häufig gefunden			8	
Roter Schmalbock, Roter Halsbock	Stictoleptura = Leptura	rubra	1997	2003	1	1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36			2	
Schwarzrandiger oder Zweifelhafter Halsbock	Anastrangalia = Leptura	dubia	2003	2003		1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3			2	
Gefleckter Schmalbock	Rutpela = Strangalia =	maculata	2003	2017		4	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21			1	
Kleiner Eichenbock, Buchenbock, Kleiner Spiessbock	Cerambyx	scopolii	2003	2006		3		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum			4	
Roter Spitzdeckenbock	Stenopterus	rufus	2003	2003		1		Max. Ab.1	häufig gefunden			2	
Moschusbock	Aromia	moschata	1997	1997	1			Max. Ab.1	selten gefunden, weil versteckte Lebensweise			8	
Buchen-Widdercock, Echter Widderbock	Clytus	arietis	2004	2017		2	1	Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58			2	
Bärenklaubock, Scheckhornbock, Distelbock	Agapanthia	villosoviri- descens	2005	2005		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum			4	
Lilienhähnchen-Art	Lilioceris	merdigera	1997	2007	1	7		Max. Ab.2	wenig häufig gefunden			8	
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina	salina	1997	2007	1	1		Max. Ab.1	häufig gefunden			2	
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	2003	2006		3		Max. Ab.1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben			1	
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	violaceus	2004	2004		1		Max. Ab.1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben			1	
Querbindiger Fallkäfer	Cryptocephalus	morei	2017	2017			1	Max. Ab.1	wenig häufig gefunden			8	
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	pusillus	2007	2007		1		einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden			64	
Bunter oder Prächtiger Blattkäfer	Chrysolina = Dlochrysa	fastuosa	2003	2017		4	2	Max. Ab.3	häufig gefunden			2	
Schneeballblattkäfer	Pyrrhalta	viburni	1997	2017	3	7	3	Max. Ab.5	sehr häufig gefunden			1	
Schildkäfer-Art	Cassida	rubiginosa	2003	2005		3		Max. Ab.3	wenig häufig gefunden			8	
Wicken-Samenkäfer	Bruchus	atomarius	2005	2005		1		Max. Ab.1	selten gefunden, aber vermutlich oft übersehen				
Haselblattroller, Haselnuss-Dickkopfröller	Apoderus	coryli	1997	2017	1	3	1	Max. Ab.1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig			2	
Kleiner Blattrüssler	Phyllobius	subdentatus = parvulus	2007	2007		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig			2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2004	2005			BP1	BP2			
Gespornter Blattrüssler	Phyllobius	glaucus = calcaratus	2004	2005			2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, stellenweise in grosser Anzahl, gilt nach Literatur als häufig	2
Seidiger Glanzrüssler	Polydrusus	formosus = sericeus	2005	2005			1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als häufig	2
Gewürfelter Staubrüßler, Würfelfleckrüßler	Liophloeus	tesselatus	2005	2007			3		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen, nach Lit. häufig	2
Hautflügler			1997								
Bürstenhornblattwespen-Art	Arge	cyanocrocea	2005	2005			1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Blattwespen-Art	Duplophanes = Neoselandria	morio	2007	2007			2		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Blattwespen-Art	Dolerus	nitens	2007	2007			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Dolerus	nigratus	2007	2007			1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Blattwespen-Art	Dolerus	varispinus	2006	2006			1		Max. Ab.1	selten gefunden	16
Blattwespen-Art	Athalia	cordata	1997	2006	1	1			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Blattwespe Gattung	Empria	sp.	2003	2003			1		Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	4
Blattwespen-Art	Empria	longicornis	2006	2006			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Ametastegia = Protemphytus	tenera	2003	2003			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	8
Blattwespen-Art	Allantus	rufocinctus	2007	2007			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 25	8
Weissgürtelige Rosensägewespe	Allantus	cinctus	2003	2007			2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 51	4
Blattwespen-Art	Allantus	truncatus	2008	2008			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	8
Blattwespen-Art	Claremontia	alternipes	1997	1997	1				Max. Ab.1	selten gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	8
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	sordida	2006	2006			1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 40	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	temula	1997	2007	1	2			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	mesomela	1997	2006	1	1			Max. Ab.2	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	livida	1997	1997	1				Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	8

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Blattwespen-Art	Tenthredo	zonula	2005	2005		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Blattwespen-Art	Tenthredo	zona	2007	2007		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Blattwespen-Art	Tenthredo	vespa	2005	2005		1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2	
Blattwespen-Art	Tenthredo	arcuata	2005	2005		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Blattwespen-Art	Tenthredo	notha	2005	2005		1		Max. Ab.1	unsicher bestimmt	2	
Blattwespen-Art	Tenthredo	brevicornis	2003	2005		2		Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Blattwespen-Art	Macrophya	sanguinolenta = quadrimaculata	2007	2007		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	4	
Blattwespen-Art	Macrophya	rufipes	2017	2017			1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata = ligata	2006	2017		2	1	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2	
Blattwespen-Art	Macrophya	montana	2003	2003		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Blattwespen-Art	Macrophya	alboannulata	2004	2004		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4	
Blattwespen-Art	Macrophya	albicineta	1997	1997	1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8	
Blattweepsen-Art	Pristiphora	subbifida	2006	2006		1		2 von nur 3 Funden in der Region	erst 3 Mal an 2 Orten gefunden	32	
Blattwespen-Art	Euura	gemmacinereae	2007	2007		1		einziger Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64	
Blattwespe Gattung	Pontania	sp.	1997	1997	1			Max. Ab.4	Gattung mässig häufig gefunden: Gallen an Weiden	4	
Brackwespe Gattung	Bracon	sp.	2007	2007		1		Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	4	
Brackwespen-Art	Aleiodes	ruficornis	2017	2017			1	Max. Ab.1	selten gefunden	16	
Brackwespe Gattung	Microgaster	sp.	2007	2007		1		Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	4	
Brackwespe Gattung (Puppenkokon)	Apanteles	sp. (Puppen kokon)	2003	2003		1		Max. Ab.1	Gattung häufig gefunden	2	
Brackwespe Unterfamilie	(Euphorinae)	non det.	2007	2007		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Brackwespe Gattung	Chelonus	sp.	2004	2004		1		Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	4	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2007	2007		1							
Schlupfwespen-Art	Stenobarichneumon	basiglyptus	2007	2007		1					Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Cratichneumon	flavifrons = fabricator	1997	1997	1						Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Cratichneumon	culex	2006	2006		1					Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespe Gattung	Ichneumon s.str.	sp.	2004	2004		1					Max. Ab.1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	extensorius	2007	2007		3					Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	suspiciosus	2005	2007		3					Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	bucculentus	2003	2016		4	1				Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Schlupfwespe Artenkomplex	Ichneumon	albiger-Komplex	2003	2003		1					Max. Ab.2	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Stenichneumon	militarius	2007	2007		1					Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Probolus	culpatorius	2007	2007		1					Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Amblyteles	armatorius	2003	2017		1	1				Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Diphyus	quadripunctorius	2003	2006		2					Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Diphyus	palliatorius	1997	2007	1	2					Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Coelichneumon	cyaniventris	2003	2003		1					Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Platylabus	odiosus	2007	2007		1					Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Asthenolabus	vitatorius	2007	2007		1					Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Asthenolabus	latiscapus	2007	2007		1					1 von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	Eparces	grandiceps	2005	2005		1					einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64
Schlupfwespen-Art	Alomya	semiflava	2004	2012		1	1				Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespe Unterfamilie	(Cryptinae)	non det.	2007	2007		1					Max. Ab.1	Unterfamilie sehr häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	Ethelurgus	sodalis	2007	2007		1					1 von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6			
Schlupfwespe Gattung	Bathythrix	sp.	2012	2012			1	Max. Ab.1	Gattung wenig häufig gefunden	8	
Schlupfwespe Gattung	Phygadeuon	sp.	2007	2017		2	1	Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	4	
Schlupfwespen-Art	Mesoleptus	laevigatus	2007	2007		2		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Schlupfwespen-Tribus	(Hemigasterini)	non det.	2007	2007		1		Max. Ab.1	Tribus häufig gefunden		
Schlupfwespe Gattung	Plectocryptus	sp.	2005	2005		1		Max. Ab.1	Gattung wenig häufig gefunden	8	
Schlupfwespen-Art	Aptesis	nigrocincta	2006	2006		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Schlupfwespen-Art nicht bestimmt	Aptesis	sp. X	2007	2007		1		Max. Ab.1	selten gefunden	16	
Schlupfwespen-Art	Enclisis	macilenta	2006	2006		1		Max. Ab.1	selten gefunden	16	
Schlupfwespen-Art	Buathra	laborator	2003	2008		2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Schlupfwespen-Art	Eremotylus	marginatus	2005	2007		2		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Schlupfwespen-Art	Enicospilus	ramidulus	2003	2003		2		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	2003	2007		2		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1	
Sichelwespen-Art	Erigorgus	cerinops	2003	2003		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Schlupfwespen-Unterfamilie	(Campopleginae)	non det.	2006	2006		1		Max. Ab.1	Unterfamilie häufig gefunden		
Schlupfwespen-Art	Dusona	annexa	2007	2007		1		Max. Ab.1	selten gefunden	16	
Schlupfwespen-Art nicht bestimmt	Campoletis	sp. B	2006	2006		1		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4	
Schlupfwespen-Art	Campoletis	latrator	2005	2006		3		unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden	4	
Schlupfwespe Gattung	Diadegma	sp.	2006	2006		1		Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	4	
Schlupfwespe Gattung	Diadegma	sp.	2007	2007		1		Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	4	
Schlupfwespe Gattung	Diadegma	sp.	2007	2007		1		Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	4	
Schlupfwespe Gattung	Cymodusa	sp.	2012	2006			1	Max. Ab.1	Gattung wenig häufig gefunden	8	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2			
Schlupfwespe Gattung	Olesicampe	sp.	2006	2006			1		unsiher bestimmt	Gattung selten gefunden	
Schlupfwespen-Art	Rynchobanchus	bicolor	2005	2005			1		Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Exetastes	fornicator	2003	2003			2		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Apophua	bipunctoria	2007	2007			1		Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Lissonota	fundator	2005	2016			3	1	Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Gattung	Cryptopimpla	sp.	2016	2016				1	Max. Ab.1	Gattung selten gefunden	16
Schwarze Schlupfwespe	Pimpla	rufipes	2006	2008			2		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Pimpla	flavicoxis	2005	2005			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Pimpla	contemplator	2005	2007			4		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Tribus	(Ephialtini)	non det.	2005	2005			1		Max. Ab.1	Tribus häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	Scambus	planatus	2005	2005			1		unsicher bestimmt	selten gefunden	
Schlupfwespe Gattung	Endromopoda	sp.	2006	2006			1		Max. Ab.1	Gattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Zaglyptus	varipes	2007	2007			2		Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Rhyssella	approximator	2006	2006			1		Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Neoxorides	nitens	2007	2007			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Colpotrochia	cincta	2007	2017			1	2	Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Exochus	vexator	2007	2007			1		Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespe Unterfamilie	(Ctenopelmatinae)	non det.	2007	2007			1		Max. Ab.1	Unterfamilie sehr häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	Olethrodotis	modesta	2005	2005			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Rhorus	antennalis	2005	2005			1		Max. Ab.1	erst 2 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	Perilissus	rufoniger	2017	2017				1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2007	2007		BP1	BP2	BP3			
Schlupfwespen-Art	Lagarotis	debitor	2007	2007		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Scopesis	gesticator	2007	2007		1			Max. Ab.1	selten gefunden	8
Schlupfwespe Gattung	Hyperbatus	sp.	2007	2007		1			Max. Ab.1	Gattung erst 1 Mal gefunden	64
Schlupfwespe Gattung	Campodorus	sp.	2007	2007		2			Max. Ab.1	Gattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespe Gattung	Anoncus	sp.	2005	2005		1			1 von nur 2 Funden in der Region	Gattung erst 2 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	Hadrodactylus	graminicola	2006	2006		1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Euryproctus	nemoralis	2005	2005		1			Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Acrotomus	succinctus	2005	2005		1			Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Phytodietus	polyzonias	2007	2007		1			Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	Netelia	ocellaris	2003	2007		3			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Netelia	testacea	2007	2007		1			Max. Ab.3	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Untergattung	Netelia (Paropheltes)	sp.	2012	2012			1		Max. Ab.1	Untergattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Tryphon	atriceps = ehippium	2004	2007		3			Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Tryphon	trochanteratus	2004	2017		2	1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Dyspetes	luteomarginatus = praerogator	2007	2007		1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Sussaba	erigator	2007	2007		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Syrphophilus	bizonarius	2006	2006		1			Max. Ab.1	selten gefunden	16
Schmalbauchwespen-Art	Gasteruption	assectator	2005	2005		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Erzwespen-Art	Haltichella	rufipes	2005	2005		1			Max. Ab.2	selten gefunden	16
Gallwespe Familie	(Cynipidae)	non det.	2005	2005		1			Max. Ab.2	Familie: Imagines wenig häufig gefunden, Gallen aber sehr häufig	
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	2005	2006		3			Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997	1997	1		BP1	BP2			
Ahorn-Gallwespe	Pediaspis	aceris	1997	1997	1				Max. Ab.4	Gallen überall häufig, wo Bergahorn wächst	1
Zehrwespen-Art	Vanhornia	leileri	1997	1997	1				Erstfund für Mitteleuropa	selber erst 1 Mal gefunden, neue Art für Mitteleuropa!!	128
Goldwespen-Art	Chrysis	cyanea	2004	2004		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 16, an Totholz	4
Drüsenameise-Art	Dolichoderus (Hypoclinea)	quadripunctatus	2007	2007		1			Max. Ab.1	selten gefunden , in den Fallen der WSL selten: 3	16
Braune Wegameise	Lasius	brunneus	2004	2007		3			Max. Ab.3	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 257 Individuen	4
Glänzenschwarze Holzameise	Lasius	fuliginosus	2005	2007		2			Max. Ab.3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 54 Individuen	2
Grauschwarze Sklavenameise	Formica	fusca	2007	2007		1	*		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 236	2
Pillenwespen-Art	Eumenes	coronatus	2005	2005		1			Max. Ab.1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	2
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	trifasciatus	2007	2007		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 9	4
Lehmwespen-Art	Symmorphus	gracilis	2004	2004		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Hornisse	Vespa	crabro	2003	2007		11			Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	1
Sächsische Wespe	Dolichovespula	saxonica	2005	2005		2			Max. Ab.1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Rote Wespe	Vespula	rufa	2003	2007		2			Max. Ab.1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 35	2
Deutsche Wespe	Vespula	germanica	2004	2004		1			Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 83	1
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	2007	2016		3	1		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Wegwespen-Art	Caliadurgus	fasciatellus	2008	2008		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	4
Wegwespen-Art	Anoplius	nigerrimus	2005	2005		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	4
Grabwespen-Art	Gorytes (s.s.)	quinquecinctus	2006	2006		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Holzbohrwespen-Art oder Töpfergrabwespe	Trypoxylon	figulus	2005	2007		2			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	Trypoxylon	minus	2005	2007		3			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36, nistet an Totholz	2
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	Trypoxylon	attenuatum	2005	2007		3			Max. Ab.2	wenig häufig gefunden	8

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	Trypoxylon	clavicerum	2005	2005		1		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13, nistet an Totholz	4
Grabwespen-Art	Pemphredon	inornata	2007	2007		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	8
Grabwespen-Art	Pemphredon	lethifera	2004	2007		2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Grabwespen-Art	Ectemnius (Metacrabro)	lituratus	2012	2012			1	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Clytochrysus)	lapidarius	2005	2005		1		Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Cameronitus)	nigritarsus	2006	2006		1		Max. Ab.1	selten gefunden , in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	16
Silbermundwespen-Art (Grabwespe)	Lestica	clypeata	2005	2007		2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Grabwespen-Art	Crossocerus (Blepharipus)	vagabundus	2005	2005		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8
Grabwespen-Art	Rhopalum	coarctatum	2007	2007		1		Max. Ab.1	selten gefunden , in den Fallen der WSL selten: 3	16
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communis	2003	2017		3	1	Max. Ab.1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 26	2
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus	confusus	2003	2007		5		Max. Ab.1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	1997	2017	1	2	1	Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Breitbindige Schmalbiene	Lasioglossum	zonulum	2007	2017		1	1	Max. Ab.1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 5	2
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1997	2017	3	6	2	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Weissbeinige Schmalbienen	Lasioglossum	albipes	1997	2013	1	1		Max. Ab.1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum	malachurum	2003	2003		1		Max. Ab.1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 76	2
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	2007	2007		1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauillum	2017	2017			1	Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1
Polierte Schmalbiene	Lasioglossum	politum	2003	2003		2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	2003	2012		1	1	Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1
Gewöhnliche Blutbiene	Sphecodes	ephippius	2005	2005		1		Max. Ab.1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Glanzlose Zergsandbiene	<i>Andrena subopaca</i>	1997	2004		1	1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	2
Gewöhnliche Zergsandbiene	<i>Andrena minutula</i>	2005	2006			3		Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Grauschwarze Düstersandbiene	<i>Andrena cineraria</i>	2004	2005			2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Rotschopfige Sandbiene	<i>Andrena haemorrhoa</i>	1997	2007		1	3		Max. Ab.4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 234	2
Gewöhnliche Dörnchensandbiene	<i>Andrena humilis</i>	2006	2006			1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Östliche Zangensandbiene	<i>Andrena fulvata</i>	1997	1997		1			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 242	2
Glänzende Düstersandbiene	<i>Andrena nitida</i>	2005	2017			2	1	Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 129	2
Schlehen-Lockensandbiene	<i>Andrena helvola</i>	2006	2006			1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 427	4
Schlehen-Lockensandbiene	<i>Andrena helvola</i>	2017	2017				1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 427	4
Gesellige Sandbiene	<i>Andrena carantonica = jacobi</i>	2004	2006			2		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Gelbbeinige Kieselsandbiene	<i>Andrena chrysosceles</i>	1997	2007		1	4		Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Glockenblumen- Sägehornbiene	<i>Melitta haemorrhoidalis</i>	2003	2003			1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Rote Mauerbiene	<i>Osmia bicornis = rufa</i>	2006	2006			2		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen	1
Zweifarbige Schneckenhausbiene	<i>Osmia bicolor</i>	2004	2004			1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Schwarzspornige Stängelbiene	<i>Hoplitis = Osmia leucomelana</i>	2007	2007			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Frühlings-Pelzbiene	<i>Anthophora plumipes</i>	1997	2003		1	1		Max. Ab.3	häufig gefunden	2
Juni-Langhornbiene	<i>Eucera longicornis</i>	2005	2005			1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Mai-Langhornbiene	<i>Eucera nigrescens = tuberculata</i>	2004	2017			1	1	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Gelbe Wespenbiene	<i>Nomada flava</i>	2004	2006			5		Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Panzers Wespenbiene	<i>Nomada panzeri</i>	1997	2006		1	1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 20	4
Rotfühler- oder Gespaltene Wespenbiene	<i>Nomada ruficornis = bifida</i>	2004	2006			2		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		1997											
Schmetterlinge		1997											
Langfühlermotten-Art	Nematopogon	adansoniella	2003	2005			2			Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4	
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	2003	2003			1			Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1	
Grüne Langfühlermotte	Adela	reaumurella	2004	2006			3			Max. Ab.3	häufig gefunden	2	
Kleinschmetterlings-Art	Nemapogon	granella	2007	2007			1			Max. Ab.1	selten gefunden	16	
Pfaffenhütchen-Gespinstmotte	Yponomeuta	cagnagella	2005	2007			2			Max. Ab.2	häufig gefunden	2	
Kohlmotte, Schleiermotte	Plutella	xylostella	2003	2003			1			Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Grasminiermotte Gattung	Elachista	sp.	2017	2017				1		Max. Ab.1	Gattung mässig häufig gefunden	4	
Palpenmotten-Art	Acompsia	cinerella	2003	2003			1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	2003	2007			2			Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1	
Ampfer-Grünwidderchen	Adscita	statices	2004	2004			1			Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 23, 255	1	
Spreizflügel Falter-Art	Anthophila	fabriciana	2007	2007			4			Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4	
Wickler-Art	Olindia	schumacherana	2007	2007			1			Max. Ab.1	selten gefunden	16	
Wickler-Art	Aethes	hartmanniana	2005	2005			1			Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Wickler-Art	Pseudargyrotoza	conwagana	1997	1997	1	2	1			Max. Ab.3	wenig häufig gefunden	8	
Wickler-Art	Celypha	striana	2003	2016						Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Wickler-Art	Celypha	lacunana	1997	2017	1	4	1			Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1	
Wickler-Art	Phiaris	scoriana	2006	2006			1			unsicher bestimmt	erst 1 Mal gefunden		
Wickler-Art	Epinothia	immundana	2007	2007			1			einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64	
Wickler-Art	Lathronympha	strigana	2005	2012			1	1		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4	
Wickler-Art	Pammene	aurita	2007	2007			1			Max. Ab.1	selten gefunden	16	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region		
		Beobachtung	BP1	BP2	BP3					
Federgeistchen-Art	Amblyptilia	acanthodactyla	2007	2007		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Skabiosen-Federgeistchen	Stenoptilia	bipunctidactyla	2003	2017		1	1	Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1
Federgeistchen-Art	Emmelina	monodactyla	1997	1997	1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	2003	2003		1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	2003	2017		1	1	Max. Ab.3	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	2004	2005		2		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1
Weisser Graszünsler	Crambus	perlellus	2003	2003		2		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	2003	2017		2	2	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	2017	1	4	2	Max. Ab.5	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Scoparia	pyralella	2004	2004		1		Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	2006	2006		1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2003	2017		3	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega	pandalis	2007	2007		1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega	hyalinata	1997	2006	1	2		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Brennesselzünsler	Eurrhyncha	hortulata	2005	2005		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Wanderzünsler	Nomophila	noctuella	2003	2003		2		Max. Ab.2	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	1
Nesselzünsler	Pleuroptya	ruralis	2007	2012		3	1	Max. Ab.2	häufig gefunden, besonders an Brennesseln	2
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2003	2017		2	1	Max. Ab.1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1
Gelbwüfliger Dickkopffalter	Carterocephalus	palaemon	2005	2006		3		Max. Ab.1	häufig gefunden, R.Bas.: 32, 183	2
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	2003	2017		2	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	2003	2006		2		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte	BP1	BP2	BP3			
Schwalbenschwanz	Papilio machaon	2003	2003		1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1
Weissling Familie	(Pieridae)	1997	2017	3	18	6	Max. Ab.1	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea sinapis- Komplex	2003	2017		8	4	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser Kohlweissling	Pieris brassicae	2003	2006		2		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris rapae	2003	2012		4	1	Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris napi	1997	2012	2	14	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris cardamines	2003	2006		5		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias hyale Komplex	2012	2012			1	Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1
Zitronenfalter	Gonepteryx rhamni	2003	2017		2	2	Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Grosser Fuchs	Nymphalis polychloros	2005	2007		3		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 33	4
Tagpfauenauge	Inachis io	1997	2017	1	3	2	Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	Vanessa atalanta	2003	2016		4	1	Max. Ab.1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Distelfalter	Vanessa = Cynthia cardui	2003	2004		4		Max. Ab.1	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	1
Kleiner Fuchs	Aglais urticae	2003	2017		10	2	Max. Ab.5	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	Polygonia c-album	2003	2017		2	1	Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Landkärtchen	Araschnia levana	2003			2		Max. Ab.1	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2
Hainveilchen-Perlmutterfalter	Boloria = Clossiana dia	2003	2003		2		Max. Ab.1	häufig gefunden, R.Bas.: 22, 977	2
Schachbrettfalter	Melanargia galathea	1997	2017	1	3	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola jurtina	1997	2017	1	14	3	Max. Ab.4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus hyperantus	1997	2017	1	4	1	Max. Ab.4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha pamphilus	1997	2017	3	9	4	Max. Ab.3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		1997	2008	BP1	BP2	BP3	BP1	BP2			
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge aegeria	1997	2008		1	9		Max. Ab.2	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1	
Ulmen-Zipfelfalter	Satyrrium w-album	2017	2017				1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 42	4	
Brauner Feuerfalter	Lycaena tityrus	2003	2017			5	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1	
Kurzschwänziger Bläuling	Cupido argiades	2017	2017	&			1	Max. Ab.1	häufig gefunden, erst vor wenigen Jahren wieder in der Schweiz nördlich der Alpen,	2	
Faulbaum-Bläuling	Celastrina argiolus	2007	2007			1		Max. Ab.1	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2	
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris semiargus	1997	2007		1	3		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1	
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus icarus	2003	2017			7	2	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1	
Marmorierter Kleinspanner	Scopula immorata	2003	2003			1		Max. Ab.1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1	
Vierpunkt-Kleinspanner	Scopula immutata	2004	2017			2	3	Max. Ab.2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 17, 18	2	
Ampferspanner	Timandra = Calothysanis comae = griseata	2003	2017			3		Max. Ab.1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 7	2	
Spanner-Art	Xanthorhoe spadicearia	1997	2012		1	3	1	Max. Ab.1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 57	2	
Spanner-Art	Epirrhoe alternata	1997	2017		1	14	3	Max. Ab.4	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1	
Löwenzahnspanner	Camptogramma bilineata	2003	2012			10	1	Max. Ab.2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1	
Spanner-Art	Thera britannica	2004	2004			1		Max. Ab.1	am Tag 4 Falter gefunden, R.Bas.: 19, 74	4	
Spanner-Art	Colostygia olivata	2012	2012				1	Max. Ab.1	am Tag erst 6 Falter gefunden, R.Bas.: 18. 19	8	
Spanner-Art	Colostygia pectinataria	2005	2005			1		Max. Ab.1	am Tag erst 6 schlafende Falter und 3 Falter am Licht gefunden, R.Bas.: 18, 40	4	
Mausspanner	Minoa murinata	2003	2003			1		Max. Ab.1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 41	2	
Klee-Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa clathrata	2003	2017			5	1	Max. Ab.2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1	
Pantherspanner	Pseudo-panthera macularia	2004	2004			1		Max. Ab.2	am Tag sehr häufig gefunden gefunden, R.Bas.: 10, 95	1	
Heidespanner	Ematurga atomaria	2003	2017			7	2	Max. Ab.1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1	
Weissstirn-Weisspanner	Cabera pusaria	2005	2005			1		Max. Ab.1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 16 27	4	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3				
Frühlings-Flechtenbär	Eilema	sororcula	2004	2004		1			Max. Ab.1	am Tag 24 Falter und mehrere Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 17, 179	2	
Rotrandbär	Diacrisia	sannio	2003	2017		3	2		Max. Ab.1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 45	2	
Gescheckte Tageule	Callistege	mi	2004	2004		1			Max. Ab.1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 70	2	
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	2003	2003		5	2		Max. Ab.2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1	
Seideneulchen	Rivula	sericealis	2003	2008		3			Max. Ab.1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 104	1	
Gammaeule	Autographa	gamma	2003	2012		5	1		Max. Ab.1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1	
Eulenfalter-Art	Panemeria	tenebrata	2004	2005		2			Max. Ab.2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 2, 8	2	
Schnabelfliegen			1997									
Alpen-Skorpionsfliege	Panorpa	alpina	1997	2005	1	1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa	germanica	1997	2002	1	8			Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1	
Gewöhnliche Skorpionsfliege	Panorpa	communis	2003			8	1		Max. Ab.3	sehr häufig gefunden	1	
Skorpionsfliege (nicht genau bestimmt)	Panorpa	vulgaris cf. communis	1997	1997	2	14	2		Max. Ab.3	sehr häufig gefunden		
Zweiflügler			1997									
Schnaken-Art	Tipula U.g. Yamatotipula	lateralis	2006	2012		1	1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Acutipula	fulvipennis	2005	2005		1			Max. Ab.2	wenig häufig gefunden	8	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Acutipula	luna	2005	2005		1			Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Acutipula	maxima	2003	2006		5			Max. Ab.2	häufig gefunden	2	
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. s.str.	Tipula paludosa	1997	2016	1	3	2		Max. Ab.4	sehr häufig gefunden	1	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Savtshenkia	pagana	2005	2017		3	1		Max. Ab.3	häufig gefunden, Männchen oft lokal massenhaft	2	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	lunata	2007	2007		1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1997	2017	1	5	1		Max. Ab.4	sehr häufig gefunden	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		1997	2006	2007	BP1	BP2	BP3			
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	appendiculata	1997	2006	1	2		Max. Ab.2	häufig gefunden	2
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	flavescens	2003	2003		1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1
Kammschnaken-Art	Dictenidia	bimaculata	2003	2007		2		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz als selten	8
Moosmücken-Art	Diogma	glabrata	2012	2012			1	Max. Ab.1	selten gefunden	16
Stelzmücken-Art	Ormosia	lineata	2007	2007		2		Max. Ab.1	selten gefunden, aber oft nicht inventarisiert	
Stelzmücke Unterfamilie	(Limnophilinae = Hexatominiae)	non det.	1997	1997	1			Max. Ab.5	Unterfamilie mässig häufig gefunden, aber nicht inventarisiert	
Stelzmücken-Art	Epiphragma	ocellare	2007	2007		2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Stelzmücken-Art	Prionolabis	hospes = platyptera	2007	2007		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, aber wahrscheinlich oft übersehen oder nicht beachtet	4
Stelzmücken-Art	Dicranomyia	modesta	2007	2007		1		unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden, aber oft nicht inventarisiert	
Stelzmücken-Art	Limonia	hercegovinae	2006	2007		2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Stelzmücken-Art	Limonia	phragmitidis = tripunctata	1997	2007	1	3		Max. Ab.4	häufig gefunden	2
Stelzmücken-Art	Dicranota	subtilis	2017	2017			1	einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64
Stelzmücken-Art	Pedicia	litoralis	1997	2017	2	7	1	Max. Ab.4	wenig häufig gefunden	8
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	non det.	2005	2017		2	2	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1
Märzmücke	Bibio	marci	2005	2005		1		Max. Ab.3	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Schnepfenfliegen-Art	Rhagio	scolopaceus	2005	2005		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Waffenfliegen-Art	Beris	chalybata	2007	2007		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Waffenfliegen-Art	Pachygaster	leachii	2005	2005		1		einzigster Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	64
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	2003	2005		3		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1
Waffenfliegen-Art	Sargus	bipunctatus	2005	2007		2		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Waffenfliegen-Art	Sargus	flavipes	2012	2012			1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	pluvialis	1997	2017	1	7	2	Max. Ab.3	sehr häufig gefunden	1	
Bremsen-Art	Tabanus	bromius	2008	2008		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Raubfliegen-Art	Dioctria	linearis	2005	2005		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Raubfliegen-Art	Leptogaster	cylindrica	2003	2003		2		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Raubfliegen-Art	Eutolmus	rufibarbis	2003	2003		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Raubfliegen-Art	Tolmerus	atricapillus	1997	2017	1	5	3	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1	
Wollschweber Gattung	Bombylius	sp.	1997	1997	2			Max. Ab.2	Gattung sehr häufig gefunden	1	
Wollschweber-Art	Bombylius	major	1997	2007	1	3		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1	
Wollschweber-Art	Bombylius	discolor	2017	2017			1	Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Wollschweber-Art	Bombylius	cinerascens	2003	2004		2		Max. Ab.2	häufig gefunden	2	
Trauerschweber-Art	Hemipenthes	maurus	2006	2006		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Trauersschweber Gattung	Villa	sp.	2006	2006		1		Max. Ab.1	Gattung häufig gefunden	2	
Tanzfliege Gattung	Empis	sp.	2017	2017			1	Max. Ab.1	Gattung sehr häufig gefunden		
Tanzfliegen-Art	Empis	pseudonuntia	1997	2007	1	3		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	1997	2017	1	7	1	Max. Ab.4	sehr häufig gefunden	1	
Tanzfliegen-Art	Empis	livida	1997	2007	1	2		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1	
Tanzfliegen-Art	Empis	stercorea	2003	2007		3		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Tanzfliegen-Art	Empis	trigramma	1997	2017	1	5	1	Max. Ab.5	häufig gefunden	2	
Tanzfliegen Gattung	Rhamphomyia	sp.	2012	2012			1	Max. Ab.1	Gattung häufig gefunden	2	
Tanzfliegen-Art	Rhamphomyia	sulcata	1997	1997	1			Max. Ab.2	mässig häufig gefunden	4	
Tanzfliegen-Art	Rhamphomyia	sulcatina	2006	2017		2	1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		2004	2004		2005	2005		1					
Tanzfliegen-Art	Rhamphomyia	crassirostris	2004	2004			1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, lokal oft in grosser Zahl	4	
Langbeinfliegen-Art	Chrysotus	blepharosceles	2005	2005			1			Max. Ab.1	selten gefunden	16	
Langbeinfliege Gattung	Dolichopus	sp.	2003	2003			1			Max. Ab.1	Gattung häufig gefunden	2	
Langbeinfliegen-Art	Dolichopus	trivialis	2005	2005			1			unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden		
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus	balteatus	1997	2017	2	14	2			Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1	
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebfliege	Sphaerophoria	scripta	1997	2017	1	1	1			Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	1997	2006	1	1				Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1	
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus	vitripennis	2004	2007			2			Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1	
Späte Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	pedissequum	2005	2008			5			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Zweiband- Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	bicinctum	2004	2008			2			Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	2003	2017			9	3		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1	
Matte Schwarzkopfschwebefliege, Lange Grasschwebefliege	Melanostoma	scalare	2003	2017			5	1		Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 34	2	
Rotgelbe Raupenschwebefliege	Xanthandrus	comptus	2007	2007			1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Graue oder Schwarze Breitfusschwebefliege	Platycheirus	albimanus	2005	2017			4	1		Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2	
Europäische Breitfusschwebefliege	Platycheirus	europaeus	2005	2012			3	1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Breitfusschwebefliegen- Art	Platycheirus	tarsalis	2006	2006			1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	1997	2007	1	5				Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1	
Bärlauch- Erzswebefliege Impresa-Gruppe	Cheilosia	fasciata	2005	2007			2			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Weissfuss-Erzswebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	1997	2006	1	3				Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1	
Erzswebefliegen-Art Antigua-Gruppe	Cheilosia	grisella	2006	2006			1			Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Kerbel-Erzswebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	pagana	2005	2007			6			Max. Ab.1	häufig gefunden	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Grauschimmer-Erzswebefliege Variabilis-Gruppe	Cheilosia	lasiopa = honesta	2017	2017			1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Bärtige Erzswebefliege Illustrata-Gruppe	Cheilosia	barbata	2017	2017			1	Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Grüne Erzswebefliege Canicularis-Gruppe	Cheilosia	chloris	1997	2004	1	1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Erzswebefliegen Artengruppe Bergenstammi-Gruppe	Cheilosia	bergenstammi	2017	2017			1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Frühlings- oder Aster- Erzswebefliege	Cheilosia	vernalis	2006	2006		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2	
Gefleckte Erzswebefliege, Gefleckte Lauchschwebfliege	Portevinia	maculata	1997	2005	1	1		Max. Ab.3	mässig häufig gefunden	4	
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	1997	2017	4	14	3	Max. Ab.4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	
Schnauzenschwebefliegen-Art	Rhingia	rostrata	2007	2007		1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	8	
Gebänderte Waldschwebefliege, Gelbe Hummelschwebfliege	Volucella	inanis	2007	2007		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Gelbfleck- Waldschwebefliege, Zweifleck-Hummelschwebfliege	Volucella	inflata	2005	2006		2		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Schwebefliegen-Art	Orthonevra	nobilis	2004	2004		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Gemeine Keulenschwebefliege	Neoascia	podagrica	2007	2007		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4	
Gemeine Taillenschwebefliege	Sphegina	clunipes	2005	2007		2		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8	
Gelbband- Torfschwebefliege	Sericomyia	silentis	1997	1997	1			Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Matte Faulschlammschwebefliege, Schwarze	Eristalinus	sepulchralis	2005	2005		1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4	
Kleine Bienenschwebefliege	Eristalis	arbustorum	2004	2005		2		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1	
Keilfleckschwebefliegen- Art	Eristalis	interrupta	2003	2012		7	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1997	2004	1	1		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis	pertinax	1997	2008	1	4		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1	
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2017	2	18	5	Max. Ab.3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1	
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebfliege	Helophilus	parallelus	1997	1997	1			Max. Ab.2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997	2005	2017	BP1	BP2	BP3			
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	1997	2017		1	14	3	Max. Ab.3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Gelbhaarige Hummelschwebefliege	Brachymyia = Criorhina	berberina	2005	2005			1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	4
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebefliege, Gemeine	Syritta	pipiens	1997	2017		1	3	1	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Schwebefliegen-Art	Brachypalpus	laphriformis	2003	2003			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Langbauchschwebefliege, Lange Holzschwebefliege	Xylota	florum	2005	2005			1		Max. Ab.1	selten gefunden	16
Gemeine Langbauchschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnis	1997	2007		1	13		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	1
Goldhaar-Langbauchschwebefliege,	Xylota	sylvarum	2017	2017				1	Max. Ab.1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	2
Dickkopffliegen-Art	Physocephala	rufipes	2003	2003			1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	2003	2003			1		Max. Ab.1	sehr häufig gefunden	1
Stelzfliegen-Art	Calobata	petronella	1997	1997		2			einzigster Fundort in der Region	mehrmals am selben Ort gefunden	64
Stelzfliegen-Art	Neria = Compsobata	cibaria	1997	1997					Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Nacktfliegen-Art	Psila	fimetaria	2007	2007			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Netzfliegen-Art	Pherbellia	cinerella	2007	2007			1		Max. Ab.1	mässig häufig gefunden, unscheinbar und oft übersehen oder nicht registriert, vermutlich sehr	1
Netzfliegen-Art	Coremacera	marginata	2005	2005			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Netzfliegen-Art	Limnia	unguicornis	2003	2017			3	2	Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Polier- od. Faulfliegen-Art	Calliopum	aeneum	2004	2004			1		Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Polier- od. Faulfliegen-Art	Sapromyza	sexpunctata	2007	2007			1		1 von nur 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32
Saft- od. Wiesenfliegen-Art	Opomyza	florum	2012	2012				1	Max. Ab.1	wenig häufig gefunden	8
Kotfliegen-Art	Phrosia	albilabris	2007	2007			1		Max. Ab.1	selten gefunden	16
Kotfliegen-Art	Scatophaga	lutaria	2007	2007			1		unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden	
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercoraria	1997	2017		2	6	1	Max. Ab.3	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte	
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3				
Stubenfliegen-Verwandte	Mesembrina	meridiana	2003	2007		6		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis	1997	2008	1	3		Max. Ab.2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	
Stubenfliegen-Verwandte	Polietes	lardarius	2006	2007		3		Max. Ab.4	sehr häufig gefunden, auf Kuhfladen, im Herbst auch auf Blättern am Waldrand	1
Hirschlausfliege	Lipoptena	cervi	2016	2016			1	Max. Ab.1	mässig häufig gefunden	4
Schmeissfliegen-Art	Cynomyia	mortuorum	1997	2006	1	6		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Kaisergoldfliege	Lucilia	caesar	1997	1997	1			unsicher bestimmt	vermutlich sehr häufig, aber nur selten registriert	
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	2004	2017		6	2	Max. Ab.2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1997	2008	3	21	**	Max. Ab.4	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliegen-Art	Eriothrix	rufomaculata	2006	2017		1	1	Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	2003	2004		2		Max. Ab.1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliege Gattung	Tachina	sp.	2003	2006		3		Max. Ab.2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	fera	2004	2007		3		Max. Ab.1	häufig gefunden, aber oft nicht registriert	2
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	magnicornis	2017	2017			1	Max. Ab.1	häufig gefunden	2
WIRBELTIERE			1997							
Grasfrosch	Rana	temporaria	2005	2005		1		Max. Ab.1	häufig gefunden	2
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2003	2017		7	1	Max. Ab.1	sehr häufig beobachtet	1
Turmfalke	Falco	tionnunculus	2017	2017			1	Max. Ab.1	häufig beobachtet	2
Hohltaube	Columba	oenas	2017	2017			1	Max. Ab.1	mässig häufig beobachtet	4
Grünspecht	Picus	viridis	1997	2012	1	4	1	Max. Ab.1	sehr häufig beobachtet	1
Schwarzspecht	Dryocopus	martius	2005	2017		2	2	Max. Ab.1	sehr häufig beobachtet	1
Rauchschwalbe	Hirundo	rustica	2008	2008	()	1		Max. Ab.2	häufig beobachtet, erst in der dritten Beobachtungsperiod inventarisiert	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte BP1	Anz. Ereignisse BP2	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
PILZE	Auswahl							
Habichtspilz, Rehpilz	Sarcodon	imbricatus	2005			lokal häufig auf morschem Baumstrunk	sehr wenig Fundorte	
Rotbrauner Scheidenstreifling	Amanita	fulva	2004			lokal mässig häufig	sehr wenig Fundorte, aber oft nicht registriert	
Parasolpilz	Macrolepiota	procera	2012			lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
MOOSE	Auswahl						Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrannen sind registriert	
Drehmoos	Funaria	hygrometrica	2006			lokal häufig auf Brandstelle	mässig viele Fundorte	
Echter Wolfsfuss	Anomodon	viticulosus	2007			lokal häufig an Baumstrunk	mässig viele Fundorte	
Grosses Kranzmoos	Rhytidiadelphus	triquetrus	2005			lokal häufig	viele Fundorte	
FARNPFLANZEN	Auswahl							
Riesen-Schachtelhalm	Equisetum	telmateia	1997			lokal mässig häufig	mässig vile Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
SAMENPFLANZEN	Auswahl						Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Sumpf-Dotterblume	Caltha	palustris	1997			lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	2005			sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	2005			lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Gold-Hahnenfuss	Ranunculus	auricomus	2006			lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Hopfen	Humulus	lupulus	2005			lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Walnussbaum	Juglans	regia	2004			1 grosser und 1 junger Baum	viele Fundorte	
Stachelbeere	Ribes	uva-crispa	2007			lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Waldgeissbart	Aruncus	dioicus = silvester	2004			lokal häufig	wenig Fundorte	
Bach-Nelkenwurz	Geum	rivale	1997			sehr häufig	mässig viele Fundorte	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	2004			lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte BP1	BP2	BP3			
Aufrechtes Fingerkraut	Potentilla	erecta	1997				lokal mässig häufig in der Wiese	viele Fundorte	
Gemeiner Frauenmantel, Gelbgrüner Frauenmantel	Alchemilla	xanthochlora aggr. = vulgaris =	2004				lokal häufig	viele Fundorte, aber vermutlich oft übersehen	
Apfelbaum	Malus	sylvestris	2006				1 Baum	mässig viele Fundorte	
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa	2005				lokal häufig	viele Fundorte	
Robinie, Falsche Akazie	Robinia	pseudacacia	2003				lokal mässig häufig	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Behaartes Weidenröschen	Epilobium	hirsutum	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Rosskastanie	Aesculus	hippocastanum	2007				1 junger Baum	Neophyt, in der Natur wenig Fundorte	
Rupprechtskraut Stinkender Storchenschnabel	Geranium	robertianum	1964				kommt vor	sehr viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert	
Schlitzblättriger Storchenschnabel	Geranium	dissectum	2005				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Wiesen-Kerbel	Anthriscus	sylvestris	2003				lokal sehr häufig	viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert	
Grosse Bibernelle	Pimpinella	major	2005				lokal mässig häufig	viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert	
Geissfuss, Baumtropfen	Aegopodium	podagraria	2004				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Pfaffenhütchen	Euonymus	europaea	2004				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Purgier-Kreuzdorn	Rhamnus	cathartica	2003				1 Strauch	viele Fundorte	
Aufrechte Wolfsmilch	Euphorbia	stricta	2007				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	2005				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Veilchen	Viola	reichenbachiana = sylvestris	1964				häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Knoblauchhederich, Lauchkraut	Alliaria	petiolata	2003				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Schaumkraut	Cardamine	pratensis	2004				lokal häufig in der Wiese	sehr viele Fundorte	
Korb-Weide	Salix	viminalis	1997				2 Sträucher	mässig viele Fundorte	
Grauweide	Salix	cinerea	2004				lokal häufig	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3			
Wald-Schlüsselblume	Primula	elatior	1997					sehr häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	2005					sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Pfennigkraut	Lysimachia	nummularia	2003					lokal häufig	viele Fundorte, aber meist nicht inventarisiert	
Rote Waldnelke	Silene	dioeca	2005					lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Gewöhnliches Kreuzlabkraut	Cruciata	laevipes	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Echter Baldrian	Valeriana	officinalis	2003					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Zweihäusiger Baldrian	Valeriana	dioeca	1997					lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Wald-Witwenblume	Knautia	dipsacifolia	1964					kommt vor	viele Fundorte	
Wald-Vergissmeinnicht	Myosotis	sylvatica	2005					häufig	viele Fundorte	
Dunkelgrünes Lungenkraut	Pulmonaria	obscura	1997					lokal häufig	viele Fundorte, aber oft nicht inventarisiert	
Efeublättriger Ehrenpreis	Veronica	hederifolia	2004					lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Gefleckte Taubnessel	Lamium	maculatum	2003					lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Berg-Goldnessel	Lamium = Lamiastrum	galeoptolon montanum	1964					häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Kohldistel	Cirsium	oleraceum	1997					lokal häufig	viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	Leontodon	hispidus	2005					lokal sehr häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Herbstzeitlose	Colchicum	autumnale	2004					lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Weinberg-Lauch	Allium	vineale	1997					lokal häufig	viele Fundorte	
Bärlauch	Allium	ursinum	2005					sehr häufig, lokal masenhaft	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Doldiger Milchstern	Ornithogalum	umbellatum	2006					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Traubige Bisamhyazinthe	Muscari	racemosum	2006					lokal mässig häufig, unsicher bestimmt	mässig viele Fundorte	
Osterglocke, Gelbe Narzisse	Narcissus	pseudo- narcissus	2007					lokal häufig nahe Pflanzblätz	Gartenpflanze, mässig viele Fundorte in der Natur, aber ausgeflanzt	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

erste letzte Anz. Ereignisse Bemerkungen zur Art
Beobachtung BP1 BP2 BP3 am Beobachtungsort

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	Anz. Ereignisse BP2	Anz. Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
Feld-Hainsimse	Luzula	campestris	2004					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Berg-Segge	Carex	montana	2005					lokal mässig häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Filzfrüchtige Segge	Carex	tomentosa	2004					lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Hirsenfrüchtige Segge	Carex	panicea	2006					lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Wald-Segge	Carex	sylvatica	2004					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Aufrechte Trespe	Bromus	erectus	1997					mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Rot-Schwingel	Festuca	rubra	2006					lokal häufig	viele Fundorte registriert, wahrscheinlich sehr viele	
Fieder-Zwenke	Brachypodium	pinnatum	2003					lokal häufig	viele Fundorte	
Wald-Zwenke	Brachypodium	sylvaticum	2005					lokal häufig	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Mittleres Zittergras	Briza	media	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Horstbildende Schmieie, Rasenschmieie	Deschampsia	caespitosa	2005					lokal häufig	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	Anthoxanthum	odoratum	2003					häufig	viele Fundorte	
Gefleckter Aronstab	Arum	maculatum	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	