

Wiese beim alten Scheibenstand Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 634125 246175 Höhe ü. M.: 475 m Exposition: S Fläche: 30 Neigung: 20%

	BP1 (1997 und 1998)	BP2 (2007 und 2012)	BP3 (2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	6	7	7	20
Beobachtungsdauer:	05 Std. 10 Min.	06 Std.	05 Std. 20 Min.	16 Std. 30 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:		155	162	130	447		195	259	197	651		1,26	1,60	1,52	1,46
Bewertete Taxa:		110	120	091	318		148	214	152	514		1.35	1,78	1,67	1,62

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------

WEICHTIERE

			1997							
Genabelte Strauschschnecke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	1997	2007	1	4		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Seidenhaarschnecke	Trochulus = Trichia	sericeus	2007	2007		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Seidenhaarschnecke oder Quendelschnecke (nicht bestimmt)	Trochulus = Trichia	sericea cf. Candidula	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich meist T. sericea	
Gemeine Heideschnecke	Helicella	itala	1997	2007	3	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Weissmündige Bänderschnecke	Cepaea	hortensis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
 Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

Index 1: sehr häufig gefunden:	mehr als 500 Ereignisse
Index 2: häufig gefunden:	100 bis 499 Ereignisse
Index 4: mässig häufig gefunden:	31 bis 100 Ereignisse
Index 8: wenig häufig gefunden:	10 bis 30 Ereignisse
Index 16: selten gefunden:	3 bis 9 Ereignisse
Index 32: sehr selten gefunden:	2 Ereignisse an verschiedenen Orten
Index 64: äusserst selten gefunden:	1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen	

() in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
 & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
 * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
 ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:

Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen		Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	2017	2017			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
GLIEDERFÜSSLER			1997							
SPINNENTIERE			1997							
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	amentata	2007			1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 204	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	2007	2007		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 219	1
Wolfsspinnen-Artkomplex	Pardosa	lugubris- Komplex	2007	2007		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 1571	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	palustris	2012	2012		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 42	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	pullata	2007	2017		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 498	1
Listspinne	Pisaura	mirabilis	2007			3	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2007	2	2		Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	1997	2017	2	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	kochi	2007	2007		1	*	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 3	2
KREBSTIERE										
Assel-Art	Philoscia	muscorum	2007	2007		1	*	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten häufig	4
VIELFÜSSLER										
Tausendfüsser-Art	Tachypodojulus	niger	2007	2007		1	*	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, wahrscheinlich im Versteckten häufig	2
INSEKTEN			1997							
Libellen			1997							
Gemeine Winterlibelle	Sympecma	fusca	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seitenheftswerte
Königslibelle Gattung	Anax	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	
Grosse Königslibelle	Anax	imperator	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern	2
Heidelibelle Gattung	Sympetrum	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	
Grosse Heidelibelle	Sympetrum	striolatum	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst	2
Heuschrecken			1997		1					
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia	sp. J	1997	1997	1			Max. Ab1	Jungtiere häufig gefunden	
Grünes Heupferd	Tettigonia	viridissima	1997	2007	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roeselii	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliche Strauchschrecke	Pholidoptera	griseoaptera	1997	2017	2	1	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Feldgrille	Gryllus	campestris	2007	2017		4	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	2017	3	4	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus	rufus	1997	1997	2			Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Brauner Grashüpfer	Chorthippus	brunneus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2007	3	1		Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Wanzen			1997		1					
Leder- oder Saumwanzen-Art	Coriomeris	denticulatus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus	abutilon	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Feuerwanze	Pyrrhocoris	apterus	2007	2007		2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1
Weichwanzen-Art	Deraeocoris	ruber	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 74	2
Gemeine Wiesenwanze	Lygus	pratensis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 46	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Schätzungs-werte	
Weichwanzen-Art	Stenodema laevigatum	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 42	2	
Gleichflügler		1997		1						
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	1997	2017	1		1	Max. Ab2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1
Blutzikaden-Art	Cercopis	vulnerata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Zwergzikaden-Art	Aphrodes	bicinctus- Gruppe	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Netzflügler										
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla	carnea	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1
Käfer			1997							
Feld-Sandläufer	Cicindela	campestris	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zweifleckiger Warzenkäfer	Malachius	bipustulatus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	gallicus	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Mausgrauer Schnellkäfer	Argypnus = Adelocera	murinus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schnellkäfer-Art	Cidnopus	pilosus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Marienkäfer-Art	Harmonia	axyridis	2017	2017	&		1	Max. Ab1	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig	2
Vierzehnpunktiger Marienkäfer	Propylaea	quadridecem-punctata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Feuerkäfer-Art	Schizotus	pectinicornis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Triungulinus-Larve, Oelkäfer-Larve (nicht bestimmt)	(Meloidae)	non det. (Larve)	2017	2017			1	Max. Ab4	selten gefunden, weil nicht danach gesucht	
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1997	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seiten- heits- werte	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	brevicauda	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Stachelkäfer-Art	Anaspis	frontalis	2007	2007		1		Max. Ab1	selten gefunden, weil unscheinbar, deshalb meist übersehen und kaum registriert	
Gebänderter Pinsekäfer	Trichius	fasciatus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gefleckter Schmalbock	Rutpela = Strangalia =	maculata	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	1
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina	salina	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1997	2017	1		1	Max. Ab3	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus	hypochoeridis	1997	2017	1		1	Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Rainfarnblattkäfer	Galeruca	tanaceti	2017	2017			1	Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Kleiner Blattrüssler	Phyllobius	subdentatus = parvulus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig	2
Hautflügler			1997		1					
Bürstenhornblattwespen-Art	Arge	berberidis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Blattwespen-Art	Athalia	cordata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Blattwespen-Art	Athalia	liberta	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	4
Blattwespen-Art	Tenthredo	vespa	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Blattwespen-Art	Macrophya	punctumalbum	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	4
Blattwespen-Art	Macrophya	montana	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Pristiphora	ruficornis	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Colpotrochia	cincta	2007	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte	
				BP1	BP2	BP3				
Knotenameisen-Art	Myrmica	rubra	1997	1997	1		*	Max. Ab1	häufig gefundenin, den Fallen der WSL häufig: 243 Individuen	2
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1997	2007	1	1	*	Max. Ab3	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1997	1997	2		*	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1
Zweifarbige Sklavenameise	Formica	rufibarbis	2017	2017			2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 89	1
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Hornisse	Vespa	crabro	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	1
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Bienenjagende Knotenwespe	Cerceris	rybiensis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Metacrabro)	lituratus	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Hypocrabro)	rubicola	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 26	2
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosae	2007	2017		1	3	Max. Ab1	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum	leucozonium	1997	2017	2	1	1	Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Breitbauch-Schmalbiene	Lasioglossum	lativentre	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	1997	2017	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauillum	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum	morio	1998	1998	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 93	1
Glanzlose Zergsandbiene	Andrena	subopaca	1997	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Anz. Ereignisse						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte
		Beobachtung	BP1	BP2	BP3					
Gewöhnliche Dörnchensandbiene	Andrena	humilis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Gewöhnliche Löcherbiene	Heriades	truncorum	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 15	2
Glockenblumen-Scherenbiene	Chelostoma	rapunculi = fuliginosum	1997	2007	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Rote Mauerbiene	Osmia	bicornis = rufa	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen	1
Zweifarbige Schneckenhausbiene	Osmia	bicolor	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Bunte Blattschneiderbiene	Megachile	versicolor	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gewöhnliche Keulenhornbiene	Ceratina	cyanea	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	2007	2017		3	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1
Baumhummel	Bombus	hypnorum	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Wiesenhummel	Bombus	pratorum	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 30	1
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1997	2012	2	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2017	5	1	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Gartenhummel	Bombus	hortorum	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	Bombus = Psithyrus	barbutellus	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Bombus = Psithyrus	bohemicus	1997	2017	1	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Bombus = Psithyrus	campestris	1997	2017	2		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	Bombus = Psithyrus	sylvestris	1997	1997	2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1
Honigbiene	Apis	mellifera	1997	2017	5	2	5	Max. Ab5	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
			1997							
Schmetterlinge			1997		1					

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Exemplarheitswerte
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	1997	2017	1	1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Langfühlermotten-Art	Cauchas	rufimitrella	2007	2017		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Palpenmotten-Art	Bryotropha	terrella	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Celypha	lacunana	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Skabiosen-Federgeistchen	Stenoptilia	bipunctidactyla	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	1997	2017			2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Goldzünsler	Pyrausta	aurata	1997	2007	1	1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	2017	2017			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2007	2017		2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Nesselzünsler	Pleuroptya	ruralis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, besonders an Brennnnesseln	2
Waldreben- Fensterschwärmerchen	Thyris	fenestrella	2017	2017			1	Max. Ab1	am Tag 17 Falter gefunden, R.Bas.: 1, 1	8
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2017	2017			1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1
Nagelfleck	Aglia	tau	2007	2007		1		Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 17, 49	1
Gelbwürfliger Dickkopffalter	Carterocephalus	palaemon	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 32, 183	2
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	1997	2017	1	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	1997	4	5	5	Max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	1
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	1997	2017	1	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae	1997	2012	2	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1997	2017	1	2	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043		1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	2017	5	5	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549		1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	1997	2017	2	3	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757		1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2012	2017		1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845		1
Tagpfauenauge	Inachis	io	1997	2012	3	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734		1
Admiral	Vanessa	atalanta	2007	2007		1			Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224		1
C-Falter	Polygonia	c-album	1997	2017	1	1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185		1
Landkärtchen	Araschnia	levana	2017	2017			1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261		2
Kaisermantel	Argynnis	paphia	1997	2017	1		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531		1
Brombeer- Perlmutterfalter	Brenthis	daphne	2017	2017			1		von weitem unsicher bestimmt	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 41		
Veilchen- Perlmutterfalter	Boloria = Clossiana	euphrosyne	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 21, 143		2
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1997	2017	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065		1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1997	2017	1	2	2		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476		1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	1997	1997	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287		1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1997	2017	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818		1
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria	2007	2007		1			Max. Ab1	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688		1
Mauerpfau	Lasiommata	megera	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139		1
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	2017	2017			2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627		1
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra	bellargus	2007	2007		1			Max. Ab3	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142		1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1997	2017	2		3		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315		1
Marmorierter Kleinspanner	Scopula	immorata	2017	2017			1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118		1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Anz. Ereignisse						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte
		Beobachtung	BP1	BP2	BP3					
Rotbuchen- Gürtelpuppenspanner	Cyclophora	linearia	2012	2012		1		Max. Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 20, 62	4
Spanner-Art	Scotopteryx	chaenopodiata	1997	1997	1			Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 155	1
Spanner-Art	Epirrhoe	alternata	1997	2017	1		1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Löwenzahnspanner	Camptogramma	bilineata	1997	2017	1		1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
Klee-Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa	clathrata	2017	2017			2	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1997	1997	2			Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Gammaeule	Autographa	gamma	1997	2007	1	1		Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Schnabelfliegen										
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa	germanica	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zweiflügler			1997							
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. s.str.	Tipula paludosa	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schnaken-Art	Tipula U.g. Dendrotipula	flavolineata	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Stelzmücken-Art	Limonia	hercegovinae	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	non det.	1997	2012	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Trauermücke Gattung	Sciara	sp.	2017	2017			1	Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden, aber oft nicht beachtet	
Trauermücken-Art	Sciara	hemerobioides = thomae	1997	2007	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	pluvialis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber Gattung	Bombylius	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	
Wollschweber-Art	Bombylius	major	2007	2017		2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius	cinerascens	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Anz. Ereignisse						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte
		Beobachtung	BP1	BP2	BP3					
Trauersschweber Gattung	Villa	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Tanzfliegen-Art	Empis	ciliatopennata	1997	1997	1			Max. Ab2	wenig häufig gefunden	8
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Grosse Wiesenschwebefliege, Grosse Heckenschwebefliege	Epistrophe	grossulariae	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Schwarzhaarige Wiesenschwebefliege	Epistrophe	nitidicollis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus	balteatus	1997	2017	3	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1
Gelbhals- Frühlingsschwebefliege, Dreieck-Zartschwebfliege	Meliscaeva = Episyrphus	auricollis	1998	1998	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta	1997	2017	2	2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	1997	2017	1	3	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1
Behaarte Schwebefliege, Grosse Gartenschwebefliege	Syrphus	torvus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	2
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus	vitripennis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Frühe Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	festivum	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	2007	2007		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1
Matte Schwarzkopfschwebefliege, Lange Grasschwebefliege	Melanostoma	scalare	2017	2007			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 34	2
Graue oder Schwarze Breitfussschwebefliege	Platycheirus	albimanus	2017	2007			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Europäische Breitfussschwebefliege	Platycheirus	europaeus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Schwarze Erzschwebefliege Impressa-Gruppe	Cheilosia	impressa	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Weissfuss-Erzschwebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Weiden-Erzschwebefliege Canicularis-Gruppe	Cheilosia	albipila	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Grüne Erzschwebefliege Canicularis Gruppe Fraterna-Untergruppe	Cheilosia	chloris	2017	2017			1	unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte	
Erzschwebefliegen Artengruppe Bergenstammi-Gruppe	Cheilosia	bergenstammi	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Frühlings- oder Aster- Erzschwebefliege Bergenstammi-	Cheilosia	vernalis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Frühe Erzschwebefliege Bergenstammi-Gruppe	Cheilosia	praecox	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Braune Bärenschwebfliege	Arctophila	superbiens	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten:4	4
Matte Faulschlammschwebefliege, Schwarze	Eristalinus	sepulchralis	2017	2017			2	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kleine Bienenschwebefliege	Eristalis	arbustorum	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Keilfleckschwebefliegen- Art	Eristalis	interrupta	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1997	2017	3		2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis	pertinax	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2017	4	2	4	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebfliege	Helophilus	parallelus	1997	1997	2			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebefliege, Gemeine	Syritta	pipiens	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Gemeine Langbauschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnis	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	1
Dickkopffliegen-Art	Conops	flavipes	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Dickkopffliegen-Art	Conops	vesicularis	2007	2007		1		Max. Ab1	selten gefunden	16
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	pusilla	2007	2007		1		unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden	
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Fruchtfiegen-Art	Tephritis	crepidis	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	
Stubenfliege Gattung	Neomyia = Orthellia	sp.	1998	1998	1		*	Max. Ab1	Gattung sehr häufig, aber meist nicht registriert, weil ich die Arten nicht voneinander abgrenzen	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen		Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1998	2017	1		1	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Schmeissfliegen-Art	Stomorhina	lunata	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, weil zu wenig beachtet, aber vermutlich häufig	4
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1997	2007	1	3	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1997	1997	2			Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliege Gattung	Tachina	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
WIRBELTIERE										
Grünspecht	Picus	viridis	2012	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Schwarzspecht	Dryocopus	martius	2007	2017		2	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactyla	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Elster	Pica	pica	2017	2017	()		3	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert	1
Kolkrabe	Corvus	corax	2007	2017		2	1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Schermaus	Arvicola	terrestris	1998	2007	1	1	**	Max. Ab2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Dachs	Meles	meles	2012	2017		1	2	Max. Ab2	Anhand der Spuren häufig festgestellt, aber Baue oft auch vom Fuchs bewohnt	2
Wildschwein	Sus	scrova	2017	2017			1	Max. Ab2	anhand der Spuren zunehmend häufiger festgestellt	2
MOOSE	Auswahl								Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrannen sind registriert	
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Sparriges Kranzmoos	Rhytidiadel- phus	squarrosus	2007					lokal häufig	viele Fundorte	
SAMENPFLANZEN	Auswahl								Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Stinkende Nieswurz	Helleborus	foetidus	2007					1 Pflanze am Waldrand	viele Fundorte	
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	2012					1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	2012					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte BP1	Anz. BP2	Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	heits- werte
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus bulbosus	1997				häufig	sehr viele Fundorte	
Europäische Haselwurz	Asarum europaeum	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla sterilis	1997				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Erdbeere	Fragaria vesca	2007				häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte	
Feldrose	Rosa arvensis	2007				lokal häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Schmalblättrige Wicke	Vicia sativa ssp. nigra incl. angustifolia	1997				1 Pflanze	viele Fundorte	
Gelbfrüchtiger Kälberkopf	Chaerophyllum aureum	2007				lokal häufig, bes. am Waldrand	viele Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus carota	2007				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Aufrechte Wolfsmilch	Euphorbia stricta	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia verrucosa	1997				lokal sehr häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Mandelblättrige Wolfsmilch	Euphorbia amygdaloides	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Echtes Johanniskraut	Hypericum perforatum	1997				1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola hirta	2007				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Veilchen	Viola reichenbachiana = sylvestris	1997				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wiesen-Schaumkraut	Cardamine pratensis	2007				häufig	sehr viele Fundorte	
Sigmarskraut	Malva alcea	1997				lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Moschusmalve	Malva moschata	1997				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Primel, Stengellose Schlüsselblume	Primula vulgaris	2017				lokal mässig häufig (gepflanzt)	mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert	
Frühlings-Schlüsselblume	Primula veris	1997				vereinzelt, lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Gewöhnliches Leimkraut	Silene vulgaris vulgaris	2007				lokal häufig	viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia arvensis	1997				häufig	sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3			
Immenblatt, Waldmelisse	Melittis	melissophyllum	1997				1 Pflanze	viele Fundorte	
Berg-Goldnessel	Lamium = Lamiastrum	galeoptolon montanum	2007				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wald-Bergminze = Echter Bergthymian	Calamintha	menthifolia = sylvatica	1997				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	2007				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1997				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Skabiosen-Flockenblume	Centaurea	scabiosa	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	2007				vereinzelt, lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea jacea	1998				häufig	sehr viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milkkraut	Leontodon	hispidus	1997				1 Pflanze	sehr sehr viele Fundorte	
Weinberg-Lauch	Allium	vineale	2007				lokal häufig	viele Fundorte	
Kleines Schneeglöcklein	Galanthus	nivalis	2017				2 Stöcke (gepflanzt)	wenig Fundorte	
Osterglocke, Gelbe Narzisse	Narcissus	pseudo- narcissus	2007				vereinzelt (gepflanzt)	Gartenpflanze, mässig viele Fundorte in der Natur, aber ausgeflanzt	
Feld-Hainsimse	Luzula	campestris	2007				vereinzelt	viele Fundorte	
Aufrechte Trespe	Bromus	erectus	1997				mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Fieder-Zwenke	Brachypodium	pinnatum	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	Anthoxanthum	odoratum	2007				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Gefleckter Aronstab	Arum	maculatum	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	