Böschung Alter Hauensteintunnel Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 632750 246675 Höhe ü. M.: 550 m Expositionen: NW SE Fläche: 110 a Neigung: 10% 70%

	BP1 (1997)	BP2 (2007 und 2011)	BP3 (2016 und 2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	5	7	7	19
Beobachtungsdauer:	04 Std. 55 Min.	07 Std. 55 Min.	08 Std. 40 Min.	21 Std. 30 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:

Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:	138	201	177	516
Bewertete Taxa:	**234**	**140**	**119**	**373**

Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP
	222	387	381	990
	505	318	306	823

Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
	1,61	1,93	2,15	1,92
	2,16	**2,27**	**2,57**	**2,21**

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
WEICHTIERE			1997							
Weitmündige Glanzzschnecke	Aegopinella	nitens	1997	2007	1	1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	**1**
Glatte Glanzschnecke	Morlina = Oxychilus	glabra	2007	2007		1		Max. Ab1	erst 1 Mal gefunden, gilt nach Literatur als wenig häufig	**8**
Genabelte Strauchschnecke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	1997	2007	3	6		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	**1**
Seidenhaarschnecke	Trochulus = Trichia	sericeus	2007	2007		1	*	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	**1**
Kantige Laubschnecke	Hygromia	cinctella	2007	2007	&	1		Max. Ab1	häufig gefunden, Neozoon, seit 1997 häufiger, bes. im Siedlungsraum	**2**

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum. Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

( ) in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
& Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
* in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:
Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
Gefleckte Schnirkelschnecke	Arianta	arbustorum	2007	2007		1		Max. Ab1	in beschatteten und/oder feuchten Lebensräumen häufig gefunden, gilt nach	**1**
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
GLIEDERFÜSSLER			1997							
SPINNENTIERE			1997							
Herbstspinnen-Art	Metellina	segmentata	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	**1**
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	**1**
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	amentata	1997	1997	1		*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 204	**1**
Listspinne	Pisaura	mirabilis	1997	2017	1	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	**1**
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2007	2	1		Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	**1**
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	**1**
Springspinnen-Art	Heliophanus	aeneus	2017	2017			1	Max. Ab1	**selten gefunden**	**16**
INSEKTEN			1997							
Libellen										
Gemeine Federlibelle	Platycnemis	pennipes	2007	2017		1	1	Max. Ab2	an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,	**4**
Heuschrecken			1997							
Grünes Heupferd	Tettigonia	viridissima	1997	2007	2	1			sehr häufig gefunden	**1**
Zwitscherschrecke	Tettigonia	cantans	1997	2017	2	3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roeselii	1997	2011	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Gewöhnliche Strauchschrecke	Pholidoptera	griseoaptera	1997	2017	3	2	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	**1**
Feldgrille	Gryllus	campestris	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	**1**
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	**1**

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
Grosse Goldschrecke	Chrysochraon	dispar	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Rote Keulenschrecke	Gompho-cerippus	rufus	1997	2017	1	3	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	2007	2007		2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Brauner Grashüpfer	Chorthippus	brunneus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Wiesengrashüpfer	Chorthippus	dorsatus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, aber im Bezirk Thal selten	**2**
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2017	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Wanzen			1997							
Streifenwanze	Graphosoma	lineatum	1997	2017	1	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Leder- oder Randwanzen-Art	Coreus	marginatus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	**1**
Glasflügelwanzen-Art	Corizus	hyoscyami	1997	2017	1		2	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**2**
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus	punctato-nervosus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	**2**
Behaarte Wiesenwanze	Lygus	rugulipennis	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	**4**
Gelbsaum-Zierwanze	Adelphocoris	seticornis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	**2**
Weichwanzen-Art	Megaloceraea	recticornis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	**2**
Weichwanzen-Art	Leptopterna	dolobrata	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	**1**
Gleichflügler			1997							
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	1997	2007	1	1		Max. Ab2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	**1**
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	1997	2011	1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Blutzikaden-Art	Cercopis	vulnerata	1997	2007	1	2		Max. Ab4	häufig gefunden	**2**
Grüne Zwergzikade	Cicadella	viridis	1997	2007	2	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in Feuchtlebensräumen oft massenhaft	**1**
			1997							

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
Käfer			1997							
Käfer Ordnung	(Coleoptera)	non det.	2017	2017			1	Max. Ab1		
Weichkäfer-Art	Cantharis	nigricans	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Weichkäfer-Art	Cantharis	livida	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1997	2017	1	3	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Zweifleckiger Warzenkäfer	Malachius	bipustulatus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Trichodes	alvearius	2007	2017		1	1	Max. Ab2	häufig gefunden	2
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	ustulatus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Marienkäfer-Art	Harmonia	axyridis	2017	2017	&		1	Max. Ab2	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig	2
Vierzehnpunktiger Marienkäfer	Propylaea	quadridecem-punctata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Marienkäfer-Art	Subcoccinella	vigintiquattro-punctata	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	2007	2017		2	4	Max. Ab2	häufig gefunden	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Feuerkäfer-Art	Pyrochroa	serraticornis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Feldahornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	Alosterna	tabacicolor	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 4	2
Schwarzspitziger Halsboock	Stictoleptura = Leptura	fulva	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gefleckter Schmalbock	Rutpela = Strangalia =	maculata	1997	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	1
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Breiter Halsbock, Gefleckter Blütenbock	Pachytodes = Judolia	cerambyci- formis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina	salina	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1997	1997	1			Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Bunter oder Prächtiger Blattkäfer	Chrysolina = Dlochrysa	fastuosa	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Johanniskraut-Blattkäfer	Chrysolina = Chrysomela	varians	1997	1997	1			Max. Ab2	mässig häufig gefunden, an Johanniskraut	4
Hautflügler			1997							
Blattwespen-Art	Dolerus	eversmanni	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Dolerus	vestigialis	2007	2017		1	1	Max. Ab2	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Dolerus	germanicus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Blattwespen-Art	Aglaostigma	fulvipes	2007	2017		1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	4
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	sordida	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 40	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	mesomela	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	livida	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	8
Blattwespen-Artkomplex	Tenthredo	marginella-Komplex	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, möglicherweise zwei verschiedene Arten	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	vespa	1997	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Blattwespe Artengruppe	Tenthredo	arcuata-Gruppe	1997	1997	1			Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Blattwespen-Art	Tenthredo	notha	2017	2017			2	Max. Ab1	unsicher bestimmt	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	brevicornis	2016	2016			1	Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	bifasciata rossi	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Pachyprotasis	simulans	2017	2017			1	unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata = ligata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Blattwespen-Art	Macrophya	montana	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Macrophya	alboannulata	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Schlupfwespe Gattung	Ichneumon s.str.	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	extensorius	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Amblyteles	armatorius	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Aritranis	nigripes	2011	2011		1		Max. Ab1		16
Schlupfwespen-Art	Buathra	laborator	2007	2007		1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Exetastes	adpressorius	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Lissonota	cruentator = insignita	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Lagarotis	semicaligata	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Dyspetes	luteomarginatus = praerogator	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Knotenameisen-Art	Myrmica	rubra	1997	1997	1		*	Max. Ab3	häufig gefundenin, den Fallen der WSL häufig: 243 Individuen	2
Drüsenameise Artengruppe	Tapinoma	erraticum cf. ambiguum Emery	1997	1997	1		*	Max. Ab3	häufig gefunden	2
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1997	1997	2		*	Max. Ab4	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1
Rote Waldameise	Formica	rufa	1997	1997	1			Max. Ab3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 3037 Individuen	2
Pillenwespen-Art	Eumenes	coronatus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	2
Schornsteinwespem-Art	Gymnomerus = Odynerus	laevipes	2011	2011		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	2007	2017		2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Hornisse	Vespa	crabro	2017	2017			2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	1
Waldwespe	Dolichovespula	sylvestris	1997	2017	1	2	1	Max. Ab2	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
Sächsische Wespe	Dolichovespula	saxonica	2011	2011		1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	2007	2011		3		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Wegwespen-Art	Priocnemis	hyalinata	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	8
Mexikanischer Heuschreckenjäger	Isodontia	mexicana	2016	2016	&		1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, erst seit wenigen Jahren in die Schweiz nördlich der Alpen	4
Grabwespen-Art	Gorytes (s.s.)	quinquecinctus	2011	2011		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Grabwespen-Art	Ectemnius (Metacrabro)	lituratus	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Clytochrysus)	lapidarius	2017	2017			2	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Hypocrabro)	continuus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Hypocrabro)	continuus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Hypocrabro)	rubicola	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Silbermundwespen-Art (Grabwespe)	Lestica	clypeata	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Silbermundwespen-Art (Grabwespe)	Lestica	clypeata	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Fliegenspiesswespen-Art (Grabwespe)	Oxybelus	bipunctatus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 26	2
Gebuchtete Maskenbiene	Hylaeus	sinuatus	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	4
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	2016	2017			3	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Langobarden-Furchenbiene	Halictus	langobardicus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, war bis vor wenigen Jahren noch selten	4
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	1997	2017	2		2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum	leucozonium	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Breitbindige Schmalbiene	Lasioglossum	zonulum	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 5	2
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1997	2017	2	4	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Weissbeinige Schmalbienene	Lasioglossum	albipes	1997	2017	1		1	Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**2**
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum	malachurum	2016	2017			2	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 76	**2**
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	1997	2016	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	**1**
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauxillum	2011	2017		2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	**1**
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum	fulvicorne	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 45	**2**
Dickkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	glabriusculum	2017	2017			1	Max. Ab2	häufig gefunden	**2**
Polierte Schmalbiene	Lasioglossum	politum	2011	2017		1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**4**
Grünglanz-Schmalbiene	Lasioglossum	nitidulum	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	**4**
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum	morio	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 93	**1**
Netz-Blutbiene	Sphecodes	reticulatus	2017	2017			1	Max. Ab1	**selten gefunden**	**16**
Östliche Zangensandbiene	Andrena	fulvata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 242	**2**
Atlantische Sandbiene	Andrena	trimmerana	2017	2017			1	**einziger Fund in der Region!**	**erst 1 Mal gefunden**	**64**
Glockenblumen- Sägehornbiene	Melitta	haemorrhoidalis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**2**
Auen-Schenkelbiene	Macropis	europaea	2007	2011		2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in letzter Zeit seltener geworden	**4**
Wald-Schenkelbiene	Macropis	fulvipes	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in letzter Zeit häufiger geworden	**4**
Gewöhnliche Löcherbiene	Heriades	truncorum	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 15	**2**
Zwerg- oder Kurzfransige Scherenbiene	Chelostoma	campanularum	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	**2**
Rote Mauerbiene	Osmia	bicornis = rufa	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen	**1**
Zweifarbige Schneckenhausbiene	Osmia	bicolor	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**2**
Juni-Langhornbiene	Eucera	longicornis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	**2**
Rauhfüssige Wespenbiene	Nomada	hirtipes	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	**4**

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2017	1	4	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Gartenhummel	Bombus	hortorum	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Honigbiene	Apis	mellifera	1997	2017	2	2	3	Max. Ab5	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge			1997							
Spreizflügelfalter-Art	Anthophila	fabriciana	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Celypha	lacunana	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wickler-Art	Cydia	jungiella	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Zünsler-Art	Synaphe	punctalis	2011	2011		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	2017	1		1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Goldzünsler	Pyrausta	aurata	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega	hyalinata	2007	2007		1		unsicher bestimmt	häufig gefunden	
Nesselzünsler	Pleuroptya	ruralis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, besonders an Brennnesseln	2
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2007	2007		1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	1997	2017	1	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	1
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	2017	1	5	5	Max. Ab2	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	1
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	2017	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2017	2017			5	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Kleiner Eisvogel	Limenitis	camilla	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 31, 124	2
Tagpfauenauge	Inachis	io	1997	2017	2		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	Vanessa	atalanta	2007	2007		1		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
C-Falter	Polygonia	c-album	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Landkärtchen	Araschnia	levana	1997	2017	1	1	2	Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2
Kaisermantel	Argynnis	paphia	2017	2017			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531	1
Märzveilchenfalter	Argynnis = Fabriciana	adippe	2016	2016			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 7, 13	4
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1997	2017	1	2	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	1997	2017	1	3	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1997	2017	2	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	2011	2017		1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Faulbaum-Bläuling	Celastrina	argiolus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2
Silbergrüner Bläuling	Polyommatus = Lysandra	coridon	2011	2011		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	2016	2017			2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Spanner-Art	Scotopteryx	chaenopodiata	2011	2017		1	1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 155	1
Spanner-Art	Epirrhoe	tristata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 14, 122	2
Spanner-Art	Epirrhoe	alternata	2007	2017		1	2	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Flechtenbär-Art	Eilema	caniola	2017	2017			1	Max. Ab1	am Tag 40 schlafende Falter und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 11, 26	4
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1997	2017	2		2	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Gammaeule	Autographa	gamma	1997	2016	1		1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Schnabelfliegen										
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa	germanica	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Skorpionsfliege (nicht genau bestimmt)	Panorpa	vulgaris cf. communis	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa	vulgaris	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zweiflügler			1997							
Kohlschnake	Tipula U.g. Tipula s.str.	oleracea	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Stelzmücken-Art	Limonia	phragmitidis = tripunctata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Johannismücke	Bibio	johannis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Märzmücke	Bibio	marci	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Waffenfliegen-Art	Oplodontha	viridula	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	pluvialis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius	major	1997	2007	1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Tanzfliegen-Art	Empis	ciliatopennata	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	**8**
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Tanzfliegen-Art	Empis	livida	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus	balteatus	1997	2011	1	4		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	**1**
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta	1997	2017	2	4	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	**1**
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	**1**
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus	vitripennis	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	**1**
Gelbrandschwebefliege Gattung	Xanthogramma	sp.	1997	1997	1			Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	**2**
Späte Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	pedissequum	2007	2017		2	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**2**
Zweiband- Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	bicinctum	2011	2011		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	**2**
Kahle oder Südliche Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	intermedium	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	**2**
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	1997	2017	1	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	**1**
Matte Schwarzkopfschwebefliege, Lange Grasschwebefliege	Melanostoma	scalare	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 34	**2**
Europäische Breitfussschwebefliege	Platycheirus	europaeus	2017	2017			1	Max. Ab2	häufig gefunden	**2**
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	1997	2011	1	3		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	**1**
Zwergschwebefliegen-Art	Pipizella	virens	2007	2007		1		**1 von 2 Funden in der Region**	**erst 2 Mal gefunden**	**32**
Schwarze Erzschwebefliege Impressa-Gruppe	Cheilosia	impressa	1997	2011	1	1		Max. Ab4	häufig gefunden	**2**
Weissfuss-Erzschwebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	1997	1997	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	**1**
Trüffel-Erzschwebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	rufipes = soror	2017	2017			2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	**1**
Pilz-Erzschwebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	scutellata	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	**4**
Grauschimmer-Erzschwebefliege Variabilis-Gruppe Illustrata-Gruppe	Cheilosia	lasiopa = honesta	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	**4**

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Bärtige Erzschwebefliege Illustrata-Gruppe	Cheilosia	barbata	1997	2017	1		4	Max. Ab2	häufig gefunden	2
Korbblüten-oder Bienen-Erzschwebefliege Canicularis-Gr.	Cheilosia	canicularis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Frühlings- oder Aster-Erzschwebefliege Bergenstammi-	Cheilosia	vernalis	2016	2016			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	1997	2017	1	2	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Gemeine Waldschwebefliege, Gemeine Hummelschwebefliege	Volucella	pellucens	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Gelbband- Torfschwebefliege	Sericomyia	silentis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kleine Bienenschwebefliege	Eristalis	arbustorum	1997	2016	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Keilfleckschwebefliegen- Art	Eristalis	interrupta	1997	2017	2	3	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1997	1997	2				sehr häufig gefunden	1
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis	pertinax	1997	2017	1	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Schwarze Bienenschwebefliege	Eristalis	pratorum	2011	2011		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Grosse “Mistbiene”, Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2017	2	3	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebfliege	Helophilus	parallelus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	1997	2017	1	4	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Kleine “Mistbiene”, Gemeine Keulenschwebefliege, Gemeine	Syritta	pipiens	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Dickkopffliegen-Art	Physocephala	rufipes	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Dickkopffliegen-Art	Conops	quadrifasciatus	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	1997	2017	1	1	3	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Netzfliegen-Art	Pherbellia	cinerella	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, unscheinbar und oft übersehen oder nicht registriert, vermutlich sehr	1
Herbst-Stubenfliege	Musca	autumnalis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	
Schmeissfliegen-Art	Cynomyia	mortuorum	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
Kaisergoldfliege	Lucilia	caesar	1997	1997	1			unsicher bestimmt	vermutlich sehr häufig, aber nur selten registriert	
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1997	2017	1		2	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Schmeissfliegen-Art	Stomorhina	lunata	2017	2017				Max. Ab1	wenig häufig gefunden, weil zu wenig beachtet, aber vermutlich häufig	4
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1997	2007	2	3	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliegen-Art	Eriothrix	rufomaculata	1997	2017	1		1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1997	2011	1	2		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliegen-Art	Phasia = Alophora	hemiptera	2011	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Raupenfliegen-Art	Ectophasia	crassipennis	2017	2017			2	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	fera	2007	2017		1	2	Max. Ab1	häufig gefunden, aber oft nicht registriert	2
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	magnicornis	2017	2017			2	Max. Ab1	häufig gefunden	2
WIRBELTIERE			1997							
Eidechse (nicht bestimmt)	Lacerta cf. Podarcis	non det.	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Grünspecht	Picus	viridis	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Mehlschwalbe	Delichron	urbica	2011	2011		1		Max. Ab2	häufig beobachtet	2
Schwanzmeise	Aegitalus	caudatus	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig beobachtet	2
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactyla	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Kolkrabe	Corvus	corax	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Dachs	Meles	meles	2016	2016			1	Max. Ab1	Anhand der Spuren häufig festgestellt, aber Baue oft auch vom Fuchs bewohnt	2
MOOSE	**Auswahl**								Hauptsächlich Arten der Halbtockenransen sind registriert	
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	2007					loal sehr häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Sparriges Kranzmoos	Rhytidiadel- phus	squarrosus	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Grosses Kranzmoos	Rhytidiadelphus	triquetrus	2007					lokal häufig	viele Fundorte	
SAMENPFLANZEN	**Auswahl**								Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	1997					lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	2007					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Europäische Haselwurz	Asarum	europaeum	2007					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Waldgeissbart	Aruncus	dioicus = silvester	2007					lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Gewöhnlicher Odermennig	Agrimonia	eupatoria	1997					lokal häufig	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1997					sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla	sterilis	1997					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Erdbeere	Fragaria	vesca	2007					lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa	2007					lokal häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis	vulneraria vulneraria	1997					1 Pflanze	viele Fundorte	
Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia	cracca	1997					1 Pflanze	viele Fundorte	
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	Linum	catharticum	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gelbfrüchtiger Kälberkopf	Chaerophyllum	aureum	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Grosse Bibernelle	Pimpinella	major	1997					1 Pflanze	viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert	
Geissfuss, Baumtropfen	Aegopodium	podagraria	2007					lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Wilde Brustwurz	Angelica	sylvestris	1997					vereinzelt, lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Riesen-Bärenklau	Heracleum	mantegazzianum	2007					lokal häufig am Waldrand	Neophyt, wenig Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2011					lokal häufig	sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Süsse Wolfsmilch	Euphorbia	dulcis	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Echtes Johanniskraut	Hypericum	perforatum	1997					1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1997					mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Knoblauchhederich, Lauchkraut	Alliaria	petiolata	2007					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wiesen-Schaumkraut	Cardamine	pratensis	2007					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Primel, Stengellose Schlüsselblume	Primula	vulgaris	2007					lila Variante vereinzelt	mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert	
Wald-Schlüsselblume	Primula	elatior	1997					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	1997					mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Gewöhnlicher Gilbweiderich	Lysimachia	vulgaris	1997					lokal sehr häufig	mässig viele Fundorte	
Punktierter Gilbweiderich	Lysimachia	punctata	2007					lokal sehr häufig	wenig Fundorte	
Acker-Gauchheil	Anagallis	arvensis	2007					lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Gewöhnliches Leimkraut	Silene	vulgaris vulgaris	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Zugespitzter Knöterich	Reynoutria	japonica	2017					lokal sehr häufig	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Echter Baldrian	Valeriana	officinalis	1997					1 Pflanze	viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1997					kommt vor	sehr viele Fundorte	
Wald-Vergissmeinnicht	Myosotis	sylvatica	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Dunkelgrünes Lungenkraut	Pulmonaria	obscura	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte, aber oft nicht inventarisiert	
Berg-Goldnessel	Lamium = Lamiastrum	galeoptolon montanum	2007					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wald-Bergminze = Echter Bergthymian	Calamintha	menthifolia = sylvatica	1997					lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	1997					1 Pflanze	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	1997					lokal häufig	sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beobachtung	letzte	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-werte
Rundblättrige Glockenblume	Campanula	rotundifolia	1997					1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Wasserdost	Eupatorium	cannabinum	1997					1 Pflanze	viele Fundorte	
Kanadische Goldrute	Solidago	canadensis	2007					lokal sehr häufig	mässig viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1997					häufig	sehr viele Fundorte	
Huflattich	Tussilago	farfara	2007					2 Pflanzen	viele Fundorte	
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaea	2011					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	1997					1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	Leontodon	hispidus	1997					sehr häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Östlicher Wiesen-Bocksbart	Tragopogon	orientalis	1997					1 Pflanze	viele Fundorte	
Bärlauch	Allium	ursinum	2007					lokal sehr häufig am Waldrand und im Wald	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Vielblütige Weisswurz	Polygonatum	multiflorum	2007					lokal häufig am Waldrand	im Wald viele Fundorte	
Mücken-Handwurz	Gymnadenia	conopsea	2007					1 Pflanze	viele Fundorte, **nach NHV geschützt**	
Schlaffe Segge	Carex	flacca	2007					häufig	viele Fundorte	
Gefleckter Aronstab	Arum	maculatum	2007					lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	