

Bahnböschung Isebähnli Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 633375 246275 Höhe ü. M.: 480 m Exposition: N Fläche: 30 a Neigung: 10% 60%

	BP1 (1997 und 1998)	BP2 (2007 und 2011)	BP3 (2016 und 2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	6	7	7	20
Beobachtungsdauer:	11 Std. 25 Min.	09 Std. 35 Min.	05 Std. 40 Min.	26 Std. 40 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl Ereignisse:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheitsindex:	BP1	BP2	BP3	alle BP
Bewertete Taxa:		179	161	099	439		445	378	195	1018		2,49	2,35	1,97	2,32

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste	letzte	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
		Beobachtung	Beobachtung	BP1	BP2	BP3			
WEICHTIERE									
		1997							
Glatte Schliessmundschnecke	Cochlodina laminata	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig	2
Gefälte Schliessmundschnecke	Macrogastra plicatula	2007	2007		1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden, weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als häufig, vor allem	2
Genabelte Strauschnecke	Fruticicola = Bradybaena fruticum	1997	2017	5	5	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Riemenschnecke	Helicodonta obvoluta	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Seidenhaarschnecke	Trochulus = Trichia sericeus	2007	2007		1	*	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
 Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
 Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
 Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
 Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
 Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
 Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
 Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
 Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

() in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
 & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
 * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
 ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:

Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
 Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2017	2017				BP1	BP2			
Gemeine Winterlibelle	Sympecma	fusca	2017	2017				1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Frühe Adonislibelle	Pyrrhosoma	nymphula	1997	1997	1				Max. Ab1	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2	
Blaugüne Mosaikjungfer	Aeshna	cyanea	2007	2007		2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	1	
Ohrwürmer			1997									
Wald-Ohrwurm	Chelidurella	acanthopygia	2007	2007		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Gemeiner Ohrwurm	Forficula	auricularia	1999	1999	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schaben			1997									
Podas Waldschabe	Ectobius	sylvestris	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gemeine Waldschabe	Ectobius	lapponicus	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Heuschrecken			1997									
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia	sp. J	2007	2017		1	1		Max. Ab1	Jungtiere häufig gefunden		
Grünes Heupferd (nur Stridulation)	Tettigonia	viridissima Gesang	1997	2016	2	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gehört	1	
Zwitscherschrecke	Tettigonia	cantans	1997	2017	5	4	4		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roesellii	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gewöhnliche Strauschschrecke	Pholidoptera	griseoptera	1997	2011	5	4			Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Feldgrille	Gryllus	campestris	2017	2017			2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1	
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	2017	3	3	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1	
Lauschschrecke	Mecostethus = Parapleurus	parapleurus = alliaceus	1997	2017	1	2	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren	1	
Grosse Goldschrecke	Chrysochraon	dispar	1997	2017	1		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus	rufus	1997	2017	4	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1997	2017	2	3	4		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region		
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3						
Wiesengrashüpfer	Chorthippus	dorsatus	1997	1999	3				Max. Ab2	häufig gefunden, aber im Bezirk Thal selten		2
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2017	3	3	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden		1	
Wanzen			1997									
Kugelwanze	Coptosoma	scutellatum	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7		2	
Streifenwanze	Graphosoma	lineatum	2007	2017		2	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1	
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennis	2017	2017			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5		1	
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	2011	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11		1	
Schwarzückige Gemüsewanze	Eurydema	ornatum	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden		4	
Leder- oder Randwanzen-Art	Coreus	marginatus	1999	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5		1	
Ritterwanzen-Art	Lygaeus	equestris	2017	2017			1	unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden			
Weichwanzen-Art	Deraeocoris	ruber	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 74		2	
Weichwanzen-Art	Stenotus	binotatus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden		4	
Gelbsaum-Zierwanze	Adelphocoris	seticornis	1997	2017	1		3	Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4		2	
Gemeine Zierwanze	Adelphocoris	lineolatus	1999	2007	1	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, wahrscheinlich sehr häufig, in den Fallen der WSL selten: 3		1	
Weichwanzen-Art	Notostira	elongata	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5		4	
Weichwanzen-Art	Megaloceraea	recticornis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8		2	
Weichwanzen-Art	Leptopterna	dolobrata	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, vermutlich sehr häufig, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24		1	
Gleichflügler			1997									
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	1997	1997	1			Max. Ab2	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden			
Wiesen-Schaumzikade	Philaenus	spumarius	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden		1	
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	2011	2011		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Blutzikaden-Art	Cercopis	vulnerata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Netzflügler											
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla	carnea	2007			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1	
Käfer			1997								
Laufkäfer-Art	Diachromus	germanus	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 206	2	
Schwarzer Schneckenjäger	Phosphuga	atrata	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, im Versteckten sehr wahrscheinlich häufig	2	
Gemeiner Weichkäfer	Cantharis	fusca	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Weichkäfer-Art	Cantharis	livida	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Weichkäfer-Art	Cantharis	pallida	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1997	2011	1	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Weichkäfer-Art	Rhagonycha	limbata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Zweifleckiger Warzenkäfer	Malachius	bipustulatus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Trichodes	alvearius	2017	2017			1	Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Mausgrauer Schnellkäfer	Argypnus = Adelocera	murinus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	Athous	haemorrhoidalis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia	nitidula	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 117	2	
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	flavipes	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, im Chilpen-Reservat Diegten (BL) mässig häufig	8	
Echter Schenkelkäfer	Oedemera	podagrariae	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	1997	2017	2	2	3	Max. Ab2	häufig gefunden	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	ptysica = subulata	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda	villosa	1997	2017	1	1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Stachelkäfer-Art	Mordella	brachyura	2007	2007			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden aber oft nicht registriert	
Stachelkäfer-Art	Mordellistena	brevicauda	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Stachelkäfer-Art	Mordellochroa	abdominalis	2007	2007			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gartenlaubkäfer	Phyllopertha	horticola	1997	1997	1			Max. Ab3	häufig gefunden	2
Gebänderter Pinselkäfer	Trichius	fasciatus	2007	2007			1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Rosenkäfer-Verwandter	Oxythyrea	funestra	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, aber in starker Zunahme begriffen	8
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia	aurata	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Rothörniger oder Mattschwarzer Blütenbock	Grammoptera	ruficornis	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 40	4
Schwarzspitziger Halsboock	Stictoleptura = Leptura	fulva	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gefleckter Schmalbock	Rutpela = Strangalia =	maculata	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	1
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia	melanura	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Kleiner Eichenbock, Buchenbock, Kleiner Spiessbock	Cerambyx	scopolii	2007	2007			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Rothalsiges Getreidehähnchen	Oulema	melanopus	1997	1997	2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, hier handelt es sich um zwei sehr ähnliche Arten	1
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus	aureolus	1997	1997	1			Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Brauner Schmalbauch, Länglicher Blattrüssler	Phyllobius	oblongus	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Weissdorn-Blattrüssler	Phyllobius	betulinus = betulae	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als mässig häufig	2
Kupfriger oder Schimmernder Glanzrüssler	Polydrusus	mollis	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als mässig	4
Hautflügler			1997							

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			1997	1997	1997	1997	BP1	BP2			
Halmwespen-Art	Hartigia	nigra	1997	1997	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Bürstenhornblattwespen-Art	Arge	ustulata	1997	1997	1				Max. Ab1	selten gefunden , in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	16
Bürstenhornblattwespen-Art	Arge	cyanocrocea	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Keulenblattwespen-Art	Abia = Zараea	aurulenta	1997	1997	1				Max. Ab1	selten gefunden	16
Blattwespen-Art	Duplophanes = Neoselandria	morio	2007	2007			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Blattwespen-Art	Dolerus	vestigialis	1997	2007	1		1		Max. Ab3	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Dolerus	germanicus	1997	2017	1		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Blattwespen-Art	Empria	pallimacula = baltica	1997	1997	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	nassata	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 37	4
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	sordida	1997	1997	1				Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 40	2
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	ornata = excisa	1997	1997	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	8
Blattwespen-Art	Tenthredo	vespa	1997	1997	1				Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2
Blattwespe Artengruppe	Tenthredo	arcuata-Gruppe	1997	1997	2				Max. Ab2	sehr häufig gefunden	
Blattwespen-Art	Tenthredo	arcuata	2016	2016			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	notha	2007	2017			2	1	Max. Ab1	unsicher bestimmt	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	brevicornis	2007	2017			3	2	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Blattwespen-Art	Macrophya	montana	1997	2007	1		1		Max. Ab3	häufig gefunden	2
Blattwespe Unterfamilie	(Nematinae)	non det.	2017	2017				1	Max. Ab1	Unterfamilie häufig gefunden	
Schlupfwespe Artenkomplex	Ichneumon	albiger-Komplex	2016	2016				1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Coelichneumon	cyaniventris	1997	2011	1		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	2007	2007			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2007	2007		2007	2007					
Schwarze Schlupfwespe	Pimpla	rufipes	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schlupfwespen-Art	Phaenolobus	terebrator = arator	1997	1997	1				Max. Ab1	selten gefunden	16	
Schlupfwespen-Art	Colpotrochia	cincta	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Schlupfwespen-Art	Cosmoconus	nigriventris	2017	2017			1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Schlupfwespen-Art	Dyspetes	luteomarginatus = praerogator	2007	2007		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Schmalbauchwespe Gattung	Gasteruption	sp.	1997	1997	1				Max. Ab1	Gattung häufig gefunden	2	
Erzwespe Gattung	Eupelmus	sp.	2007	2007		1			erster Fund dieser Gattung in der Region	Gattung erst 1 Mal gefunden	64	
Knotenameisen-Art	Myrmica	rubra	1997	1997	2		*		Max. Ab1	häufig gefundenin, den Fallen der WSL häufig: 243 Individuen	2	
Drüsenameise Artengruppe	Tapinoma	erraticum cf. ambiguum Emery	1997	1997	1		*		Max. Ab3	häufig gefunden	2	
Gelbe Wegameise	Lasius	flavus	1997	1997	3		*		Max. Ab4	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL häufig: 495 Individuen	1	
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	nigricornis	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 12	2	
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	gazella	2007	2007		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	2011	2017		1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1	
Hornisse	Vespa	crabro	2007	2017		2	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	1	
Sächsische Wespe	Dolichovespula	saxonica	1997	2011	1	1			Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2	
Deutsche Wespe	Vespula	germanica	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 83	1	
Gemeine Wespe	Vespula	vulgaris	2007			4			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1	
Wegwespen-Art	Priocnemis	coriacea	1997	1997	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8	
Wegwespen-Art	Arachnospila	anceps	2011	2011		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Bienenjagende Knotenwespe	Cerceris	rybiensis	2011	2011		1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Grabwespen-Art	Ectemnius (Metacrabro)	lituratus	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung					letzte Beobachtung		Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		2017	2017			2	2017	2017	1	2			
Silbermundwespen-Art (Grabwespe)	Lestica	clypeata	2017	2017				2			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus	confusus	1997	2011	1	2					Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2
Gredlers Maskenbiene	Hylaeus	gredleri	2017	2017				1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	2016	2017				2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorum	1997	2017	4	2	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum	leucozonium	1997	1997	1						Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1997	2017	2	2	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum	malachurum	1997	2007	2	1					Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 76	2
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	1997	2011	1	3					Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauillum	1997	2017	2	1	1				Max. Ab4	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum	fulvicorne	1997	1997	1						Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 45	2
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum	morio	2011	2011		1					Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 93	1
Gewöhnliche Zergsandbiene	Andrena	minutula	2007	2007		1					Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Glanzrücken Zergsandbiene	Andrena	minutuloides	1997	1997	1						Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Rote Ehrenpreis-Sandbiene	Andrena	labiata	1997	1997	1						Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	8
Gelbbeinige Kieselsandbiene	Andrena	chrysosceles	1997	1997	1						Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Glockenblumen- Sägehornbiene	Melitta	haemorrhoidalis	1997	1997	1						Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Garten-Wollbiene	Anthidium	manicatum	2017	2017				1			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Zwerg- oder Kurzfransige Scherenbiene	Chelostoma	campanularum	1997	1997	1						Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	2
Schwarzbürstige Blattschneiderbiene	Megachile	nigriventris	2017	2017				1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Garten-Blattschneiderbiene	Megachile	willoughbiella	1997	1997	2						Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6	BP7			
Langschwanz-Kegelbiene	Coelioxys	elongata	2017	2017				1	Max. Ab1	selten gefunden , den Fallen der WSL nur 1 Individuum	16	
Rötliche Kegelbiene	Coelioxys	rufescens	1997	1997	1				Max. Ab1	selten gefunden	16	
Rotfühler- oder Gespaltene Wespenbiene	Nomada	ruficornis = bifida	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	1997	2017	1	2	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1	
Helle Erdhummel	Bombus	lucorum	1997	2011	2	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1	
Bergwaldhummel	Bombus	wurfleini	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1997	2011	2	1			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1	
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2016	4	4	1		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1	
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	2011	2011		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1	
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	Bombus = Psithyrus	barbutellus	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1	
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Bombus = Psithyrus	bohemicus	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1	
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Bombus = Psithyrus	campestris	2011	2016		1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1	
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummelel)	Bombus = Psithyrus	sylvestris	2017	2017					Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1	
Honigbiene	Apis	mellifera	1997	2017	4	5	5		Max. Ab5	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1	
Schmetterlinge			1997									
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	2007	2011		2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Langfühlermotten-Art	Adela = Cauchas	violella	2007	2007		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Weichgras-Sackträger-Art	Epichnopteryx	plumella	2007	2007		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 7, 6	4	
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	1997	2017	1	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1	
Wickler-Art	Aethes	hartmanniana	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Wickler-Art	Epiblema	sticticana	2011	2011		1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, Raupen an Huflattich	4	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Wickler-Art	Ancylis	badiana	1997	2017	2	1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Cydia	jungiella	1997	2007	1	1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Federgeistchen-Art	Platyptilia	gonodactyla	2011	2011		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, an Huflattich	4
Skabiosen-Federgeistchen	Stenoptilia	bipunctidactyla	2007	2011		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Federgeistchen-Art	Emmelina	monodactyla	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	2007	2017		1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	2007	2017		2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	2017	2017			2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1997	2011	2	1		Max. Ab5	sehr häufig gefunden	1
Goldzünsler	Pyrausta	aurata	2011	2011		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	2007	2007		1	3	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega	pandalis	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Nesselzünsler	Pleuroptya	ruralis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, besonders an Brennnesseln	2
Nagelfleck	Aglia	tau	2007	2007		1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 17, 49	1
Gelbwüfliger Dickkopffalter	Carterocephalus	palaemon	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 32, 183	2
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	2007	2017		2	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	acteon	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den letzten Jahren kaum mehr, R.Bas.: 14, 51	4
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	1997	2017	2	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Zweibrütiger Würfelfalter	Pyrgus	armoricanus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 12, 104	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region			
			letzte Beobachtung	BP1	BP2				BP3	
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	2017	5	2	3	Max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	2007	2017		4	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1997	1997	3			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	2017	2	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Tagpfauenauge	Inachis	io	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	Vanessa	atalanta	1997	1997	1			Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	1997	2017	1	1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
Brombeer-Perlmutterfalter	Brenthis	daphne	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 41	4
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1997	2017	2	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1997	2017	3	3	4	Max. Ab5	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	1997	2017	2	2	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1997	2017	4	2	3	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria	2007	2007		1		Max. Ab1	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megera	1997	2007	2	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	1997	2017	2	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Zwerg-Bläuling	Cupido	minus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 26, 332	2
Kurzschwänziger Bläuling	Cupido	argiades	2007	2017	&	1	2	Max. Ab1	häufig gefunden, erst vor wenigen Jahren wieder in der Schweiz nördlich der Alpen,	2
Faulbaum-Bläuling	Celastrina	argiolus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region		
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3						
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	<i>Aricia</i>	<i>agestis</i>	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 27, 250		2
Violetter Wald-Bläuling	<i>Polyommatus = Cyaniris</i>	<i>semiargus</i>	1997	2011	1	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904		1
Silbergrüner Bläuling	<i>Polyommatus = Lysandra</i>	<i>coridon</i>	1997	2011	1	1			Max. Ab3	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416		1
Hauhechel-Bläuling	<i>Polyommatus</i>	<i>icarus</i>	1997	2017	2	2	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315		1
Marmorierter Kleinspanner	<i>Scopula</i>	<i>immorata</i>	2011	2011		1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118		1
Vierpunkt-Kleinspanner	<i>Scopula</i>	<i>immutata</i>	2017	2017			1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 17, 18		2
Spanner-Art	<i>Scotopteryx</i>	<i>chaenopodiata</i>	2007	2017		2	1		Max. Ab3	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 155		1
Spanner-Art	<i>Epirrhoe</i>	<i>tristata</i>	1997	2017	2	1	1		Max. Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 14, 122		2
Spanner-Art	<i>Epirrhoe</i>	<i>alternata</i>	1997	2017	1	2	2		Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69		1
Löwenzahnspanner	<i>Camptogramma</i>	<i>bilineata</i>	2017	2017			1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270		1
Klee-Gitterspanner	<i>Chiasmia = Semiothisa</i>	<i>clathrata</i>	1997	2017	3	2	3		Max. Ab4	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122		1
Heidespanner	<i>Ematurga</i>	<i>atomaria</i>	2007	2007		1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206		1
Braune Tageule	<i>Euclidia</i>	<i>glyphica</i>	1997	2017	3	2	2		Max. Ab3	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495		1
Eulenfalter-Art	<i>Macdunnoughia</i>	<i>confusa</i>	2016	2016			1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 16		2
Gammaeule	<i>Autographa</i>	<i>gamma</i>	1997	1999	2				Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776		1
Schnabelfliegen			1997									
Skorpionsfliege (nicht genau bestimmt)	<i>Panorpa</i>	<i>vulgaris cf. communis</i>	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden		
Gemeine Skorpionsfliege	<i>Panorpa</i>	<i>vulgaris</i>	1997	2017	1	2	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden		1
Zweiflügler			1997									
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Yamatotipula</i>	<i>lateralis</i>	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden		2
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Acutipula</i>	<i>fulvipennis</i>	1997	1997	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden		8

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2007	2007		BP1	BP2	BP3			
Schnaken-Art	Tipula U.g. Acutipula	maxima	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Kohlschnake	Tipula U.g. s.str.	Tipula oleracea	1997	2007	1	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. s.str.	Tipula paludosa	1999	2007	1	1			Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Schnaken-Art	Tipula U.g. Pterelachisus	submarmorata	2007	2007		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schnaken-Art	Tipula U.g. Pterelachisus	varipennis	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1997	1997	1				Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	appendiculata	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	scurra	1997	1997	1				Max. Ab1	wenig häufig gefunden, vor allem in Kiesgruben	8
Moosmücken-Art	Diogma	glabrata	1997	1997	1				Max. Ab2	selten gefunden	16
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	non det.	1997	1997	1				Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Märzmücke	Bibio	marci	2007	2007		1			Max. Ab4	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Waffenfliegen-Art	Actina	chalybea	1997	1997	1				Max. Ab3	mässig häufig gefunden	4
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	2007	2017		1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	pluvialis	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Raubfliegen-Art	Eutolmus	rufibarbis	1997	1997	2				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wollschweber Gattung	Bombylius	sp.	1997	1997	1				Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius	major	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	1997	1997	1				Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis	livida	1997	2017	2	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis	trigramma	2007	2007		1			Max. Ab2	häufig gefunden	2
Tanzfliegen-Art	Rhamphomyia	atra	2007	2007		1			Max. Ab1	selten gefunden	16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	BP5				
Langbeinfliegen-Art	Dolichopus	festivus	2007	2007			1		Max. Ab1	selten gefunden	16	
Grosse Wiesenschwebefliege, Grosse Heckenschwebefliege	Epistrophe	grossulariae	2016	2016			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus	balteatus	1997	2016	3	3	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1	
Späte Grossstirnschwebefliege, Weisse Dickkopfschwebefliege	Scaeva	pyrastris	1999	1999	1				Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scripta	1997	2011	2	3			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	2007	2007			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1	
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus	vitripennis	1999	2017	1		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1	
Kahle oder Südliche Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	intermedium	1999	1999	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1	
Matte Schwarzkopfschwebefliege, Lange Grasschwebefliege	Melanostoma	scalare	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 34	2	
Graue oder Schwarze Breitfusschwebefliege	Platycheirus	albimanus	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2	
Zwergschwebefliegen-Art	Pipizella	annulata	2007	2007			1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	2007	2007			2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1	
Bärtige Erzswebefliege Illustrata-Gruppe	Cheilosia	barbata	2011	2011			1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Grüne Erzswebefliege Gruppe Fraterna-Untergruppe	Cheilosia	chloris	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	1999	2016	1		1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	
Gebänderte Waldschwebefliege, Gelbe Hummelschwebfliege	Volucella	inanis	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Schwebefliegen-Art	Orhonevra	nobilis	2011	2011			1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Kleine Bienenschwebefliege	Eristalis	arbustorum	1997	2016	1	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1	
Keifleckschwebefliegen- Art	Eristalis	interrupta	1997	2016	1	3	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	1997	2007	3	2			Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis	pertinax	1997	2011	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Schwarze Bienenschwebefliege	Eristalis	pratorum	1997	2011	1	2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2017	4	4	4	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Grosse Sumpfschwebefliege, Grosse Sonnenschwebefliege	Helophilus	parallelus	1997	1999	3			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	1997	2017	2	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulenschwebefliege, Gemeine	Syritta	pipiens	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Gemeine Langbauchschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnis	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	1
Dickkopffliegen-Art	Physocephala	rufipes	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Dickkopffliegen-Art	Physocephala	vittata	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Dickkopffliegen-Art	Conops	quadrifasciatus	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Dickkopffliegen-Art	Conops	flavipes	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Dickkopffliegen-Art	Conops	strigatus	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atra	1997	1997	1			Max. Ab1	unsicher bestimmt	2
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	1997	1997	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Stelzfliegen-Art	Micropeza	corrigiolata	1997	1997	1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Fruchtfliegen-Art	Oxyna	flavipennis	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kotfliegen-Art	Scatophaga	lutaria	1997	1997	1			unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden	
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1997	2007	2	2	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliegen-Art	Eriothrix	rufomaculata	1997	2011	1	1		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1997	1997	1			Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			letzte Beobachtung			Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			2017	2017				1	Max. Ab1	unsicher bestimmt			
Raupenfliegen-Art	Cylindromyia = Ocyptera	brassicaria	2017	2017				1	Max. Ab1	unsicher bestimmt		2	
Raupenfliege Gattung	Tachina	sp.	1997	1999	3				Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden		1	
WIRBELTIERE			1997										
Mauereidechse	Podarcis	muralis	2017	2017				1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden		1	
Zauneidechse	Lacerta	agilis	1997	1999	2				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)		1	
Schwarzer Milan (Schwarzmilan)	Milvus	migrans	2007	2007			1		Max. Ab1	häufig beobachtet		2	
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2007	2007			2		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet		1	
Turmfalke	Falco	tionnunculus	2017	2017				1	Max. Ab1	häufig beobachtet		2	
Grünspecht	Picus	viridis	1997	1997	2				Max. Ab1	sehr häufig beobachtet		1	
Wacholderdrossel	Turdus	pilaris	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig beobachtet, aber in letzter Zeit weniger		2	
Singdrossel	Turdus	philomelos	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert			
Trauerschnäpper	Ficedula	hypoleuca	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig beobachtet		2	
Schwanzmeise	Aegialus	caudatus	2011	2011			1		Max. Ab2	häufig beobachtet		2	
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactyla	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig beobachtet		1	
Kolkrabe	Corvus	corax	2007	2007			2		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet		1	
Girlitz	Serinus	serinus	1997	1997	1		**		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert			
Goldammer	Emberiza	citrinella	2007	2007			1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet		1	
MOOSE	Auswahl									Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrassen sind registriert			
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	2007						lokal häufig	viele Fundorte			
Sparriges Kranzmoos	Rhytidiadelphus	squarrosus	2007						lokal sehr häufig	viele Fundorte			
SAMENPFLANZEN	Auswahl		1999							Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen			

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6			
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	1997						sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Scharbockskraut, Feigwurz	Ranunculus	ficaria	2007						lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Klatsch-Mohn	Papaver	rhoeas	2007						lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Europäische Haselwurz	Asarum	europaeum	2007						häufig	viele Fundorte	
Walnussbaum	Juglans	regia	2007						1 Bäume	viele Fundorte	
Wiesen-Spierstaude, Mähdesüss	Filipendula	ulmaria	2007						lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1997						mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Apfelbaum	Malus	sylvestris	2007						1 Baum in der Hecke	mässig viele Fundorte	
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	1997						lokal häufig	viele Fundorte	
Sichelklee	Medicago	falcata	2011						lokal häufig	wenig Fundorte	
Saat-Luzerne	Medicago	sativa	2016						lokal mässig häufig (teilweise gelb blühende Pflanzen)	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Robinie, Falsche Akazie	Robinia	pseudacacia	2017						lokal mässig häufig	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia	cracca	1997						mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Platterbse	Lathyrus	vernus	2007						lokal häufig	viele Fundorte	
Tauben-Storchenschnabel	Geranium	columbinum	2007						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gelbfrüchtiger Kälberkopf	Chaerophyllum	aureum	2007						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Geissfuss, Baumtropfen	Aegopodium	podagraria	2007						sehr häufig	viele Fundorte	
Silgenähnlicher Rosskümmel	Silaum	silaus	1997						1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2011						lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Süsse Wolfsmilch	Euphorbia	dulcis	2007						lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Behaartes Johanniskraut	Hypericum	hirsutum	2007						lokal häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte	Anz. Ereignisse	BP1	BP2	BP3			
Echtes Johanniskraut	Hypericum	perforatum	1999					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1997					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Knoblauchhederich, Lauchkraut	Alliaria	petiolata	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Schaumkraut	Cardamine	pratensis	2007					lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Gelbe Resede	Reseda	lutea	2007					1 Pflanze	mässig viele Fundorte, wichtig als Nahrungsquelle für spezialisierte Bienenarten	
Wald-Schlüsselblume	Primula	elatior	1997					lokal häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	2007					lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Acker-Gauchheil	Anagallis	arvensis	2007					lokal häufig am Geleiserand	mässig viele Fundorte	
Gewöhnliches Leimkraut	Silene	vulgaris vulgaris	2007					lokal häufig	viele Fundorte	
Echter Baldrian	Valeriana	officinalis	1997					1 Pflanze	viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1997					vereinzelt	sehr viele Fundorte	
Grosse Winde	Calystegia	sepium	2011					lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Wald-Vergissmeinnicht	Myosotis	sylvatica	2007					häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Natterkopf	Echium	vulgare	2011					lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Gewöhnliche Sommerwurz	Orobanche	caryophyllacea	2017					vereinzelt, lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Echtes Eisenkraut	Verbena	officinalis	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Berg-Goldnessel	Lamium = Lamiastrum	galeoptolon montanum	2007					lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	1999					mässig häufig	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	1999					lokal sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Rundblättrige Glockenblume	Campanula	rotundifolia	1999					vereinzelt, mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Acker-Glockenblume	Campanula	rapunculooides	2011					vereinzelt	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region		
		erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2				BP3
Nessel-Glockenblume	Campanula	trachelium	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Wasserdost	Eupatorium	cannabinum	2011				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Echte Goldrute	Solidago	virgaurea virgaurea	2011				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Scharfes Berufkraut	Erigeron	acer acer	2011				1 Pflanze	wenig Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1997				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Huflattich	Tussilago	farfara	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Fuchs' Kreuzkraut Fuchs' Greiskraut	Senecio	ovatus = fuchsii Gmelin	1997				lokal mässig häufig	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaea	2011				häufig	viele Fundorte	
Knollige Kratzdistel	Cirsium	tuberosum	1997				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Kohldistel	Cirsium	oleraceum	1999				häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	2007				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	Leontodon	hispidus	1999				lokal sehr häufig in der Wiese	sehr sehr viele Fundorte	
Kompass-Lattich	Lactuca	serriola	2007				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Herbstzeitlose	Colchicum	autumnale	1999				lokal häufig	viele Fundorte	
Bärlauch	Allium	ursinum	2007				lokal häufig im Gebüsch	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Helm-Orchis	Orchis	militaris	1997				1 Pflanze	mässig viele Fundorte, im Kanton Solothurn geschützt.	
Schlaffe Segge	Carex	flacca	2007				lokal häufig	viele Fundorte	
Aufrechte Trespe	Bromus	erectus	1997				mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Fieder-Zwenke	Brachypodium	pinnatum	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Kalk-Blaugras	Sesleria	caerulea = varia	2007				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras	Anthoxanthum	odoratum	2007				lokal häufig	viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

erste letzte Anz. Ereignisse Bemerkungen zur Art
Beobachtung BP1 BP2 BP3 am Beobachtungsort

Bemerkungen zur Art in der Region

Deutsche Namen

Wissenschaftliche Namen

Gefleckter Aronstab

Arum

maculatum

2007

lokal mässig häufig

viele Fundorte