

Wiese Rintal Trimbach (SO) – Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 633800 246700 Höhe ü. M.: 520 m Exposition: NW Fläche: 30 a Neigung: 20% 30%

	BP1 (1997)	BP2 (2007 und 2008)	BP3 (2017)	alle BP (1997 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	4	8	6	18
Beobachtungsdauer:	03 Std. 10 Min.	08 Std.	05 Std.	16 Std. 10 Min.

Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:	Anzahl	BP1	BP2	BP3	alle BP	Summe der Werte:	BP1	BP2	BP3	alle BP	Seltenheits-Index:	BP1	BP2	BP3	alle BP
Ereignisse:		081	193	112	386		116	317	156	589		1,43	1,64	1,39	1,53
Bewertete Taxa:		071	138	092	301		106	255	135	496		1,49	1,85	1,47	1,65

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1 BP2 BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
----------------	-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------

WEICHTIERE

			1997		1								
Genabelte Strauchschncke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden				1
Seidenhaarschncke	Trochulus = Trichia	sericeus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig				1
Weinbergschncke	Helix	pomatia	1997	2008	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden				1
Weinbergschncke	Helix	pomatia	2007			5		Max. Ab2	sehr häufig gefunden				1
			1997										

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode
 E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum. Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.
 Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

- Index 1: sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse
- Index 2: häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse
- Index 4: mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse
- Index 8: wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse
- Index 16: selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse
- Index 32: sehr selten gefunden: 2 Ereignisse an verschiedenen Orten
- Index 64: äusserst selten gefunden: 1 oder mehrere Ereignisse am selben Ort
- Index 128: Erstfund(e) für die Schweiz oder die Schweiz nördlich der Alpen

- () in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert
- & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war
- * in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert
- ** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

Schmetterlinge Regio Basiliensis:
 Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
 Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
GLIEDERFÜSSLER			1997							
SPINNENTIERE			1997							
Herbstspinnen-Art	Metellina	segmentata	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	1
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1
Wolfsspinne Familie	(Lycosidae)	non det.	2007	2007		1	*	Max. Ab2	Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	
Wolfsspinnen-Artkomplex	Pardosa	lugubris- Komplex	2007	2007		1	*	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 1571	1
Listspinne	Pisaura	mirabilis	2007	2017		1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1997	2017	2	3	2	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	2007	2007		3		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1
Krabbenspinne Gattung	Xysticus	sp.	1997	2007	1	1	*	Max. Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	bifasciatus	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 59	4
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	kochi	2007	2007		2	*	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 3	2
Springsspinnen-Art	Heliophanus	cupreus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 12	2
INSEKTEN			1997							
Libellen										
Vierfleck	Libellula	quadrimaculata	2017	2017			1	Max. Ab1	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Schaben			1997							
Podas Waldschabe	Ectobius	sylvestris	1997	2007	1	1		Max. Ab3	häufig gefunden	2
Heuschrecken			1997							
Heupferd Gattung (Jungtier, nicht bestimmt)	Tettigonia	sp. J	2017	2017			1	Max. Ab2	Jungtiere häufig gefunden	
Grünes Heupferd (nur Stridulation)	Tettigonia	viridissima Gesang	1997	2017	1	2		Max. Ab2	sehr häufig gehört	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	BP5				
Westliche Beisschrecke	Platycleis	albopunctata albopunctata	2017				1		Max. Ab1	im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig	1	
Roesels Beisschrecke	Metrioptera	roeselii	2008	2008			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gewöhnliche Strauschrecke	Pholidoptera	griseoptera	1997	2017	2	3	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Feldgrille	Gryllus	campestris	2007	2017			1	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1	
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1997	2017	2	4	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1	
Langfühler-Dornschröcke	Tetrix	tenuicornis	2017	2017				1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Lauschschrecke	Mecostethus = Parapleurus	parapleurus = alliaceus	2008	2017			1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren	1	
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus	rufus	1997	2017	1	2	2		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1997	2017	2	1	1		Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1	
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1997	2017	2	3	2		Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1	
Wanzen			1997									
Spitzling, Getreide-Spitzwanze	Aelia	acuminata	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Kleine Blattwanze	Elasmotethus	minor	2007	2007			1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	8	
Leder- oder Saumwanzen-Art	Coriomeris	denticulatus	1997	1997	1				Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Feuerwanze	Pyrrhocoris	apterus	2007	2007			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1	
Weichwanzen-Art	Stenodema	laevigatum	2017	2017				1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 42	2	
Gleichflügler												
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	2007	2007			1		Max. Ab3	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1	
Erlen-Schaumzikade	Aphrophora	alni	2017	2017				1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Käfer			1997									
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	1997	1997	1				Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Anz. Ereignisse						Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		Beobachtung	BP1	BP2	BP3					
Zweifleckiger Warzenkäfer	Malachius bipustulatus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Trichodes alvearius	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes sputator	2007	2007		1		Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4	
Mausgrauer Schnellkäfer	Argypnus = Adelocera murinus	1997	1997	1			Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	Athous haemorrhoidalis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia nitidula	2007	2017		1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 117	2	
Prachtkäfer-Art	Agrilus cyanescens	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda villosa	1997	2017	1	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Schwarzspitziger Halsboock	Stictoleptura = Leptura fulva	1997	2007	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Roter Schmalbock, Roter Halsboock	Stictoleptura = Leptura rubra	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36	2	
Gefleckter Schmalbock	Rutpela = Strangalia = maculata	1997	2017	1	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	1	
Schwarznahtiger Halsboock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia melanura	1997	2007	1	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1	
Lilienhähnchen-Art	Lilioceris merdigera	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8	
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina salina	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus aureolus	2007	2017		1	1	Max. Ab2	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus hypochoeridis	2007	2017		1	1	Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus violaceus	2017	2017			1	Max. Ab1	auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1	
Gestreifter Blattrandrüssler	Sitona lineatus	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1	
Hautflügler		1997		1						
Gemeine Rosen-Bürstenhornblattwespe	Arge ochropus	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4	
Blattwespen-Art	Macrophya punctumalbum	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	4	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
		1970	2017	2018	BP1	BP2	BP3			
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata = ligata	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	bucculentus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Coelichneumon	cyaniventris	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Tribus	(Phygadeuon-tini)	non det.	2017	2017			1	Max. Ab1	Tribus häufig gefunden	
Schlupfwespen-Art	Trychosis	tristator	2017	2017			1	Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Stilbops	ruficornis	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Pimpla	contemplator	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Tryphon	atriceps = ephippium	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schmalbauchwespen-Art	Gasteruption	assectator	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schmalbauchwespen-Art	Gasteruption	tournieri	2007	2007		1		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gallwespe Familie	(Cynipidae)	non det.	2007	2007		1		Max. Ab1	Familie: Imagines wenig häufig gefunden, Gallen aber sehr häufig	
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1997	2017	1	1	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden in den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1
Mauer-Wegameise	Lasius	emarginatus	2017	2017			1	Max. Ab3	mässig häufig gefunden	4
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	2017	2017			1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 271	1
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	2008	2008		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Waldwespe	Dolichovespula	sylvestris	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Deutsche Wespe	Vespula	germanica	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 83	1
Wegwespen-Art	Priocnemis	perturbator	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 63	2
Wegwespen-Art	Priocnemis	agilis	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Bienenjagende Knotenwespe	Cerceris	rybiensis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Selten-
heits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung			Anz. Ereignisse			Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP1	BP2	BP3			
Grabwespen-Art	Pemphredon	inornata	2007	2007		1			Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	8
Grabwespen-Art	Ectemnius (Metacrabro)	lituratus	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Grabwespen-Art	Ectemnius (Clytochrysus)	lapidarius	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communis	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 26	2
Rotbeinige Furchenbiene	Halictus	rubicundus	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	2
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	simplex	2017	2017			1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 17	1
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1997	2017	1		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Weissbeinige Schmalbienen	Lasioglossum	albipes	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	2007	2007		2			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1
Acker-Schmalbiene	Lasioglossum	pauillum	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 49	1
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	2007	2007		1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	1
Glanzlose Zergsandbiene	Andrena	subopaca	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	2
Hahnenfuss-Scherenbiene	Chelostoma	florisomne	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	2
Hufeisenklee-Mauerbiene	Osmia	xanthomelana	2017	2017			1		Max. Ab1	knapp mässig häufig gefunden	4
Zweifarbige Schneckenhausbiene	Osmia	bicolor	2007	2007		1			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Langschwanz-Kegelbiene	Coelioxys	elongata	2007	2007		1			Max. Ab1	selten gefunden , den Fallen der WSL nur 1 Individuum	16
Wiesen-Wespenbiene	Nomada	marshamella	1997	1997	1				Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestris	2017	2017			1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Steinhummel	Bombus	lapidarius	1997	2017	2	3	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorum	1997	2017	1	3	1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilis	1997	1997	1				Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3			
Gartenhummel	Bombus hortorum	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	Bombus = Psithyrus barbutellus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Bombus = Psithyrus bohemicus	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	Bombus = Psithyrus sylvestris	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1
Honigbiene	Apis mellifera	2007	2017		3	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
Schmetterlinge		1997							
Langfühlermotten-Art	Nemophora metallica	2007	2017		2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Hufeisenklee- Widderchen	Zygaena transalpina	2007	2017		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 104	2
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena filipendulae	1997		1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142	1
Wickler-Art	Aethes tesserana	1997	2007	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Celypha striana	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Skabiosen-Federgeistchen	Stenoptilia bipunctidactyla	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Synaphe punctalis	2008	2008		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia culmella	1997	2017	1	1	1	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Crambus lathoniellus	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Weisser Graszünsler	Crambus perlellus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila straminella	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Purpurroter Zünsler	Pyrausta purpuralis	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta despicata	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega pandalis	1997	2017	1		2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega hyalinata	1997	2007	1	2		Max. Ab2	häufig gefunden	2

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	2017	2017			1	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	1997	2017	1	1	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Malven-Dickkopffalter, Eibischfalter	Carcharodus	alceae	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 19	4
Roter Würfelfalter	Spialia	sertorius	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 438	1
Kleiner Nördlicher Würfelfalter	Pyrgus	malvae	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 338	2
Schwalbenschwanz	Papilio	machaon	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1997	2017	3	6	4	Max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	
Tintenfleckweissling- Komplex	Leptidea	sinapis- Komplex	2007	2017		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae	1997	2017	1		2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1997	2007	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1997	2008	2	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis	1997	2017	1		1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Grosser Fuchs	Nymphalis	polychloros	2007	2017		3	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 19, 33	4
Tagpfauenauge	Inachis	io	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	1997	2017	1	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	Polygonia	c-album	2007	2017		2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1997	2017	1	3	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhaue	Maniola	jurtina	1997	2017	1	3	2	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anz. Ereignisse					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3				
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	1997	2017	1	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria	2007	2008		2		Max. Ab1	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megea	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	1997	2007	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	Aricia	agestis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 27, 250	2
Silbergrüner Bläuling	Polyommatus = Lysandra	coridon	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 32, 416	1
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra	bellargus	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	2007	2017		2	1	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Marmorierter Kleinspanner	Scopula	immorata	2017	2017			1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1
Spanner-Art	Xanthorhoe	spadicearia	2007	2007		1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 57	2
Spanner-Art	Epirrhoe	alternata	2007	2017		2	1	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Löwenzahnspanner	Camptogramma	bilineata	2007	2007		1		Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
Klee-Gitterspanner	Chiasmia = Semiothisa	clathrata	1997	2017	1	3	1	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 122	1
Pantherspanner	Pseudo- panthera	macularia	1997	1997	1			Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden gefunden, R.Bas.: 10, 95	1
Heidespanner	Ematurga	atomaria	2007	2017		1	1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1
Russischer Bär, Spanische Flagge	Euplagia	quadripunctaria	2007	2007		1		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 25, 118	2
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1997	2017	2	2	1	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Eulenfalter-Art	Phytometra	viridaria	2017	2017			1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 11, 37	2
Eulenfalter-Art	Panemeria	tenebrata	1997	2017	1		1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 2, 8	2
Gewöhnliche Skorpionsfliege	Panorpa	communis	2008	2008		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung					Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	
			letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	BP2	BP3					
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa	vulgaris	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Zweiflügler			1997								
Gemeine Wiesenschnake	Tipula U.g. s.str.	Tipula paludosa	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	vernalis	1997	2017	1	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	cornicina	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	non det.	2007	2007		2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Johannismücke	Bibio	johannis	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2	
Waffenfliegen-Art	Chloromyia	formosa	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Waffenfliegen-Art	Sargus	iridatus	2007	2007		1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Raubfliegen-Art	Choerades	fimbriata	2008	2008		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Raubfliegen-Art	Dioctria	rufipes	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Wollschweber-Art	Bombylius	major	2007	2007		1		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1	
Tanzfliegen-Art	Empis	pseudonuntia	2007	2007		1		Max. Ab2	häufig gefunden	2	
Tanzfliegen-Art	Empis	ciliata	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselata	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Tanzfliegen-Art	Empis	livida	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus	balteatus	2007	2017		2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1	
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebfliege	Sphaerophoria	scripta	1997	2007	1	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1	
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesii	2007	2007		2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1	
Späte Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	pedissequum	2008	2008		1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2	
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinum	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung				Anz. Ereignisse		Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			BP1	BP2	BP3	BP4	BP5	BP6			
Graue oder Schwarze Breitfussschwebefliege	Platycheirus	albimanus	2017	2017			1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	2	
Gemeine Breitfussschwebefliege	Platycheirus	clypeatus	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduata	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1	
Weissfuss-Erzschwebefliege Antigua-Gruppe	Cheilosia	albitarsis	1997	2017	1		1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Erzschwebefliegen-Art Antigua-Gruppe	Cheilosia	impudens	1997	1997	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4	
Trüffel-Erzschwebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	rufipes = soror	2007	2007			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Gemeine Schnauzenschwebefliege,	Rhingia	campestris	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1	
Gemeine Smaragd- oder Gelbbauch-Schwebefliege	Chrysogaster	solstitialis	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Distel- Binenenschwebefliege	Eristalis	jugorum	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenax	1997	2017	1	2	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1	
Totenkopfschwebefliege	Myathropa	florea	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1	
Gemeine Langbauchschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnis	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	1	
Dickkopffliegen-Art	Physocephala	rufipes	1997	1997	1			Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1	
Netzfliegen-Art	Pherbellia	cinerella	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, unscheinbar und oft übersehen oder nicht registriert, vermutlich sehr	1	
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercoraria	2007	2017		1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert		
Stubenfliegen-Verwandte	Mesembrina	meridiana	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig gefunden	2	
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	2007	2007		4	**	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1	
Raupenfliegen-Art	Gymnosoma	rotundatum	2017	2017			1	Max. Ab1	bis etwa 2013 nur selten auf die Art bestimmt, sehr häufig	1	
Raupenfliegen-Art	Cylindromyia = Ocyptera	brassicaria	2017	2017			1	Max. Ab1	unsicher bestimmt	2	
			1997								

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobachtung	letzte Beobachtung	Anz. Ereignisse BP1	Anz. Ereignisse BP2	Anz. Ereignisse BP3	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits- werte
WIRBELTIERE			1997							
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus	milvus	2017	2017			1	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Grauspecht	Picus	canus	2007	2017		1		Max. Ab1	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch wenig häufig	4
Grünspecht	Picus	viridis	1997	2017	2		2	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Gartengrasmücke	Sylvia	borin	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Schwanzmeise	Aegialus	caudatus	2007	2007		1		Max. Ab1	häufig beobachtet	2
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactyla	2007	2007		1		Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Elster	Pica	pica	2017	2017	()		2	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber früher meist nicht registriert	1
Kolkrabe	Corvus	corax	1997	1997	1			Max. Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Girlitz	Serinus	serinus	1997	1997	2		**	Max. Ab1	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	
Maulwurf	Talpa	europaea	1997	2007	1	2	**	Max. Ab1	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Dachs	Meles	meles	2017	2017			2	Max. Ab1	Anhand der Spuren häufig festgestellt, aber Baue oft auch vom Fuchs bewohnt	2
Wildschwein	Sus	scrova	2007	2017		1	1	Max. Ab2	anhand der Spuren zunehmend häufiger festgestellt	2
Gämse	Rupicapra	rupicapra	2017	2017			1	Max. Ab1	mässig häufig beobachtet	4
MOOSE	Auswahl								Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrassen sind registriert	
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	2007					mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte	
Sparriges Kranzmoos	Rhytidiadelphus	squarrosus	2007					lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Grosses Kranzmoos	Rhytidiadelphus	triquetrus	1997					sehr häufig (massenhaft), bes. am Waldrand	viele Fundorte	
SAMENPFLANZEN	Auswahl								Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Gewöhnliche Akelei	Aquilegia	vulgaris	2007					vereinzelt	viele Fundorte	
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosa	1997					häufig, lokal sehr häufig, bes. am Waldrand	sehr viele Fundorte	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2			
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	1997				häufig	sehr viele Fundorte	
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	2007				häufig, bes. am Waldrand	sehr viele Fundorte	
Walnussbaum	Juglans	regia	2007				1 Jungbaum am Waldrand	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1997				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna = neumanniana	2007				lokal häufig	viele Fundorte	
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis	vulneraria vulneraria	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Schopfiger Hufeisenklee	Hippocrepis	comosa	1997				sehr häufig	viele Fundorte	
Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia	cracca	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Bittere Kreuzblume	Polygala	amarella	1997				1 Pflanze	viele Fundorte	
Grosse Bibernelle	Pimpinella	major	1997				1 Pflanze	viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert	
Geissfuss, Baumtropfen	Aegopodium	podagraria	2007				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wilde Möhre	Daucus	carota	2008				1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Aufrechte Wolfsmilch	Euphorbia	stricta	2007				lokal sehr häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia	verrucosa	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Mandelblättrige Wolfsmilch	Euphorbia	amygdaloides	2007				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Echtes Johanniskraut	Hypericum	perforatum	2007				1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	1997				mässig häufig, lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Wald-Veilchen	Viola	reichenbachiana = sylvestris	2007				lokal sehr häufig, bes. am Waldrand	viele Fundorte	
Fieder-Zahnwurz	Cardamine = Dentaria	heptaphylla	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte , aber oft in grosser Anzahl	
Gelbe Resede	Reseda	lutea	2007				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, wichtig als Nahrungsquelle für spezialisierte Bienenarten	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Seltenheits-
werte

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anz. Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
			erste Beobachtung	letzte	BP1	BP2			
Wald-Schlüsselblume	Primula	elatior	1997				häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	2007				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Gefranster Enzian	Gentiana	ciliata	2017				2 Pflanzen	mässig viele Fundorte	
Niedriges Labkraut	Galium	pumilum	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Alpen-Geissblatt	Lonicera	alpigena	2007				lokal sehr häufig im wald	mässig viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1997				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Tauben-Skabiose	Scabiosa	columbaria	1997				ereinzelt	viele Fundorte	
Wiesen-Augentrost Gebräuchlicher Augentrost	Euphrasia	rostkoviana	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Immenblatt, Waldmelisse	Melittis	melissophyllum	1997				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	1997				vereinzelt, lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	2007				lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Rundblättrige Glockenblume	Campanula	rotundifolia	2007				vereinzelt, lokal mässig häufig	sehr viele Fundorte	
Ährige Rapunzel	Phyteuma	spicatum	2007				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Gewöhnl. Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1997				lokal häufig in der Wiese, lokal mässig häufig am	sehr viele Fundorte	
Skabiosen-Flockenblume	Centaurea	scabiosa	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	2007				1 Pflanze	sehr viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	Leontodon	hispidus	1997				häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milchkraut	Leontodon	hispidus	2007				lokal häufig	sehr sehr viele Fundorte	
Ästige Graslilie	Anthericum	ramosum	1997				vereinzelt. lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Weinberg-Lauch	Allium	vineale	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Bärlauch	Allium	ursinum	2007				sehr häufig am Waldrand	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheitswerte
			erste Beobachtung	letzte	Anz. Ereignisse	BP1			
Grosses Zweiblatt	Listera	ovata	1997				3 Pflanzen	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Mücken-Handwurz	Gymnadenia	conopsea	1997				häufig (> 100 Pflanzen)	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Geflecktes Knabenkraut	Dactylorhiza	maculata s.l.	2017				3 Pflanzen	viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Helm-Orchis	Orchis	militaris	2007				2 Pflanzen	mässig viele Fundorte, im Kanton Solothurn geschützt.	
Spitzorchis, Pyramidenorchis	Anacamptis	pyramidalis	2017				1 Pflanze	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt	
Feld-Hainsimse	Luzula	campestris	2007				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Berg-Segge	Carex	montana	1997				sehr häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte	
Frühlings-Segge	Carex	caryophyllea	2007				vereinzelt, lokal mässig häufig	viele Fundorte, typisch für Magerrasen	
Schlaffe Segge	Carex	flacca	2007					viele Fundorte	
Gefingerte Segge	Carex	digitata	1997				häufig im Waldschlag	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Aufrechte Trespe	Bromus	erectus	1997				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Mittleres Zittergras	Briza	media	1997				sehr häufig	viele Fundorte	
Gefleckter Aronstab	Arum	maculatum	2007				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	